Path. 96e Baumgärtner
12,2

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Dualistisches System

der

MEDICIN

oder

Lehre

von den

Gegensäzen in den Kräften

im lebenden thierischen Körper

von

Dr. K. H. Baumgärtner,

Grossherzogl. Bad. Hofrath, Professor der Medicin und Director des medicinischen Klinikums und der poliklinischen Anstalt an der Universität zu Freiburg, Medicinalreferenten bei der Grossherzogl. Bad. Regierung des Oberrheinkreises und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

Zweiter Theil.

Die specielle Krankheits- und Heilungslehre enthaltend.

Zweiter Band.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

STUTTGART und LEIPZIG,
Verlag von L. F. Rieger und Comp.
1837.

98.D

HANDBUCH
der
speciellen
Krankheits- und Heilungslehre
mit besonderer Rücksicht
auf die
Physiologie
ausgearbeitet

von
Dr. K. H. Baumgärtner,
Grossherzogl. Bad. Hofrath, Professor der Medicin und Director des medicinischen Klinikums und der poliklinischen Anstalt an der Universität zu Freiburg, Medicinalreferenten bei der Grossherzogl. Bad. Regierung des Oberrheinkreises und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

Zweiter Band.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

STUTTGART UND LEIPZIG,
Verlag von L. F. Rieger und Comp.
1837.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Gedruckt bei F. X. WANGLER
in FREIBURG I/B.

Fünfte Krankheitsfamilie.

DIE KRANKHAFTEN ABSONDERUNGEN.

Erster Abschnitt.

Von den krankhaften Absonderungen im Allgemeinen.

§. 1030.

Krankhafte Absonderungen sind diejenigen Krankheitsprozesse, wodurch entweder eine zu grosse Menge von Ausscheidungsstoffen gebildet wird, oder diese Stoffe eine fehlerhafte Beschaffenheit erhalten, oder in zu geringer Menge erzeugt werden.

§. 1031.

Das Krankheitsbild ist sehr verschieden, je nachdem die eine oder die andere dieser drei Abweichungen vom normalen Zustand stattfindet und je nachdem das eine oder das andere Absonderungsorgan leidet. Die Erkennung ist gewöhnlich leicht, indem in der Regel das Erzeugniss des krankhaften Vorgangs nach Aussen gestossen wird oder die gewöhnlichen Ausscheidungsstoffe nicht zum Vorschein kommen; doch gibt es auch Ablagerungen in das Innere des Körpers, die man vorzüglich aus den Folgen derselben zu erkennen suchen muss.

§. 1032.

a) *Die vermehrte Absonderung.* Dieselbe kommt oft vor als Ausgang von Entzündung, häufig als Begleiter von Fiebern, oft aber auch ohne dieselben. Sie kündigt sich zuweilen durch erhöhte Empfindlichkeit des leidenden Theiles an, in andern Fällen ist dieses nicht zu bemerken und die Absonderung beginnt ohne alle Vorboten. Die Ausscheidungen sind entweder erleichternd und hören, nachdem durch sie selbst der Krankheitszustand gehoben ist, von freien Stücken auf, oder sie sind dieses nicht, veranlassen verschiedene secundäre Krankheitszufälle und werden leicht langwierig. Das Absonderungsorgan selbst wird durch den andauernden Krankheitsprozess oft selbst mehr oder weniger in seiner Structur verändert, weich, empfindlich, zuweilen stocken die abgesonderten Stoffe in ihm und verursachen eine neue Reizung, Geschwulst und selbst Entzündung; ebenso können auch die abgesonderten Stoffe in benachbarten Theilen liegen bleiben und dort als krankhafter Reiz wirken; durch die vermehrte Absonderung kann allmälig eine fehlerhafte Mischung des Blutes und selbst der festen Theile herbeigeführt werden, und durch die übermässige Entleerung von Stoffen werde Entkräftung, Abmagerung und Zehrfieber bewirkt.

§. 1033.

b) *Die der Art nach veränderte Absonderung.* Es ist die vermehrte Absonderung in der Regel auch mehr oder weniger mit einer Umänderung in der Beschaffenheit der abgesonderten Stoffe verbunden. Zuerst sind die Stoffe mehr dünnflüssig, werden sodann zäher und zulezt dick und geballt. Oft ist aber die qualitative Umänderung sehr wichtig und wichtiger als die Menge der Stoffe, die zuweilen nicht grösser als im normalen Zustande ist. Es zeichnen sich die abgesonderten Stoffe oft dadurch aus, dass sie wegen veränderter Beschaffen-

heit nicht mehr zu den Zwecken, zu welchen sie im Körper noch verwandt werden sollen, gebraucht werden können, oder dass sie scharf sind und die Theile, mit denen sie in Berührung kommen, reizen und selbst in Entzündung oder Verschwärung versezen, oder dass sie ernährende Theile aus dem Körper ausscheiden und dadurch Abzehrung herbeiführen, oder endlich dadurch, dass sie bei einem Individuum, dem sie als Nahrung dienen sollen, Uebelbefinden veranlassen oder dass sie Ansteckungsstoffe enthalten, wodurch sie in einem gesunden, dafür empfänglichen Körper dieselbe Krankheit erzeugen. Oft erkennt man die veränderte Beschaffenheit der Ausscheidungsstoffe aus ihrem Aussehen und vermittelst der chemischen Untersuchung, oft aber auch nur an der üblen Wirkung, die sie auf den Körper des Kranken oder auf ein anderes Individuum äussern.

§. 1034.

c) *Die verminderte und unterdrückte Absonderung.* Die örtlichen und die allgemeinen Zufälle, die der Verminderung und Unterdrückung der Absonderung vorausgehen und sie begleiten, sind entweder Zufälle von Reizung, Krampf, Entzündung, insbesondere Hize, Geschwulst, Härte, entzündliches Fieber, oder Zeichen von verminderter Lebensthätigkeit und selbst von Lähmung. Die verminderte Absonderung kann in dem Absonderungsorgan eine Stockung der Säfte und selbst Entzündung zur Folge haben; es werden die Verrichtungen, welche durch die abgesonderten Stoffe unterstüzt werden sollen, gestört; es werden die Stoffe, welche durch die nunmehr gehemmte Absonderung aus dem Blute und den festen Theilen ausgeschieden werden sollen, nicht entfernt, die Mischung leidet daher und es kann Cachexie oder Fieber entstehen; endlich wird auch leicht durch die unterdrückte Absonderung antagonistisch eine krankhafte Thätigkeit geweckt, es entsteht in entfernten Theilen

eine Absonderung, die zuweilen den Character der unterdrückten Secretion deutlich an sich trägt, oder es entsteht Schmerz, Krampf, Entzündung etc.

§. 1035.

Anlage zu krankhaften Absonderungen haben vorzüglich Individuen mit erethischer Constitution und cachectische Leute.

Gelegenheitsursachen sind eines Theiles alle Reize, die unmittelbar oder durch Consens und Antagonismus auf ein Absonderungsorgan wirken. Insbesondere verdienen die Seelenreize Erwähnung, die nach der Verschiedenheit ihres Characters immer bestimmte Absonderungen erregen; so vermehrt der Zorn die Gallenabsonderung und zum Theil auch die Absonderung des Speichels, der bei Thieren zuweilen selbst eine giftige Beschaffenheit erhalten soll, das Gelüste nach Speisen die Speichelabsonderung, der Kummer die Thränen, die Furcht die Harnabsonderung etc.; auch verdient besonders erwähnt zu werden, dass gewisse Substanzen nur als Reize für bestimmte Absonderungen wirken, dass durch Unterdrückung einer Absonderung sehr leicht eine Erregung einer andern erfolgt, wodurch oft die gleichen oder wenigstens ähnliche Stoffe, wie durch die unterdrückte Absonderung, erzeugt werden und dass durch Vermehrung einer Absonderung oft eine andere vermindert wird; endlich auch, dass oft eine Veränderung der Säfte, wodurch das Material zur Absonderung ein anderes wird, der entferntere Grund der krankhaften Absonderung ist, wie dieses z. B. bei der durch das Quecksilber erzeugten Dyscrasie der Fall ist.

§. 1036.

Wesen der Krankheit. Die Absonderung ist ein Lebensprozess und zwar ein Prozess der Verflüssigung, der durch die Zusammenwirkung von wenigstens zweien Kräften oder Stoffen bewirkt wird. Eines Theiles wirkt

immer das Nervensystem und zwar bewirkt dasselbe an verschiedenen Endigungen (Polen) verschiedene Arten der Absonderung, andern Theiles nehmen das Blut und auch die verschiedenen Substanzen im Organengewebe Theil, denn es werden dieselben beständig aufgelöst, zu unorganischen Stoffen verwandelt und ausgeschieden, während sie immer von neuem ersezt werden. Krankhaft wird nun die Absonderung, wenn entweder das Nervensystem primär leidet oder die ihm entgegenstehenden Stoffe verändert sind. Eine fehlerhafte Thätigkeit des Nervensystems ist Ursache der fehlerhaften Absonderung bei verschiedenen Nervenkrankheiten, wie z. B. in Krampfkrankheiten, bei Hypochondrie, bei Lähmungen, ferner bei Seelenreizen, bei rein örtlich stattfindenden Einwirkungen, und bei den consensuell und antagonistisch wirkenden Reizen, wie z. B. ersteres bei der vermehrten Gallenabsonderung, die auf eine Reizung des Gehirnes eintritt, und lezteres bei dem schnell entstehenden Durchfall auf unterdrückte Hautausdünstung der Fall ist. — Von dem Nervensystem aus kann sowohl eine Absonderung erhöht werden, was der häufigste Fall ist, als auch qualitativ verändert werden, was z. B. bei manchen, auf Seelenreize eintretenden Veränderungen der Absonderungen, namentlich bei der Milch-, Gallen- und Speichelabsonderung, öfters der Fall ist, als auch unterdrückt werden, was z. B. bei Lähmung geschieht.

Von den dem Nervensysteme entgegen wirkenden Stoffen, die vorzüglich das Material zur Absonderung hergeben, geht die Krankheit aus, wenn das Blut quantitativ oder qualitativ verändert ist, wie dieses leztere z. B. der Fall ist bei Aufsaugung fremdartiger Stoffe, wo sodann das von den Nerven ausgehende Etwas, das Blut und der fremdartige Stoff, z. B. ein Contagium, die Factoren des krankhaften bio-chemischen Prozesses sind, ferner wenn Stoffe nicht aus dem Blute entleert

werden, die ausgeschieden werden sollen, z. B. bei Desorganisation der Leber oder der Nieren, oder wenn das Blut innerhalb der Gefässe durch langwierige Stockungen und krankhafte Lebensprozesse eine Mischungsveränderung erhalten hat etc., so wie auch, wenn die Organengewebe nicht die gehörige Beschaffenheit haben, z. B. zu viel Fett erzeugt worden ist, das zur Verflüssigung geneigt ist. Viele Einflüsse mögen zugleich auf's Nervensystem und durch Veränderung der Blutmasse wirken, auch mögen wohl manche Stoffe in die Blutmasse gelangen, ohne auf das Blut verändernd zu wirken, und nur auf diesem Wege in innigere Berührung mit dem Nervensystem gebracht, dieses doch primär afficiren. Manche äussere Einflüsse haben vorzugsweise zu bestimmten Organen eine Beziehung, mögen sie diese Theile auf consensuelle und antagonistische Weise oder indem sie in die Wege der Circulation aufgenommen sind, erregen, welches leztere namentlich bei den Contagien der Fall zu sein scheint.

Die vermehrte Absonderung ist wohl immer eine erhöhte Lebensthätigkeit, eine vermehrte Absonderung aus Lähmung scheint es nicht zu geben. Eine passive Ergiessung von Säften durch zerstörtes oder aufgelockertes Gewebe kann wohl nicht Absonderung genannt werden, und es liegt auch durchaus kein Beweis vor, dass die eigentlichen Absonderungen auf diesem Wege zu Stande kommen. Als einen Beweis für das Gegentheil kann ich anführen, dass ich in dem Darmkanal, der wegen der zarten Structur der Schleimhaut am meisten zur passiven Aussickerung seröser Flüssigkeit geeignet wäre, niemals bei langwierigen Durchfällen das Gewebe der Schleimhaut mit Serum infiltrirt sah, sondern dasselbe, wenn eine Veränderung angetroffen wurde, immer verschwärt und theilweise entzündet fand. Zuweilen ist wohl auch die Vermehrung der Absonderung nur scheinbar, indem

das Erzeugniss der Absonderung in seiner Beschaffenheit verändert ist und daher mehr in die Augen fällt, dieses mag z. B. oft bei der Verschleimung der ersten Wege statt finden, wo statt der farblosen und mehr wässerigen Feuchtigkeit, die die Schleimhaut überzieht, ein weisslicher, zäher Schleim abgesondert wird.

Die verminderte Absonderung kann sowohl durch eine gesunkene Lebensthätigkeit bedingt sein, z. B. bei Lähmung, als auch durch eine erhöhte, wobei aber in dem Absonderungsorgan der gewöhnliche Character seiner Thätigkeit, nämlich der der Verflüssigung aufgehoben ist; dieses findet vorzüglich bei einer vollkommenen Entzündung statt, bei welcher das Blut in eine gleichförmige festere Masse umgewandelt wird und also keine Verflüssigung zu Stande kommt.

§. 1037.

Vorhersage. Erscheinen krankhafte Absonderungen im Gefolge von andern Krankheiten, so sind dieselben sehr häufig, ja in der Regel wohlthätig, oft sind sie aber auch ein schlimmes Symptom und vermehren oft, besonders durch Erschöpfung der Kräfte, die Gefahr. Für sich bestehende krankhafte Absonderungen werden nur selten lebensgefährlich und können auch meistens gehemmt werden, doch gibt es auch sehr gefährliche und der Kunst meistens Troz bietende Arten von krankhaften Absonderungen. Oft muss die Vorhersage weniger günstig sein, weil wir nicht alle, uns zu Gebot stehende Mittel, um die Absonderung zu unterdrücken, wegen Gefahr einer Metastase, in Anwendung bringen dürfen.

§. 1038.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Wir müssen den etwa im Körper sich befindenden Reiz, der die Absonderung unterhält, aufsuchen und entfernen, so namentlich müssen auch die Producte der krankhaften Thätigkeit, insofern sie wieder

als Reiz wirken, hinweggebracht werden, wie z. B. Säure und scharfe Galle; wir müssen, ausser der krankhaften Absonderung, die zunächst der Gegenstand unserer Behandlung ist, auf die übrigen Secretionen im Körper unser Augenmerk richten und sie so zu reguliren suchen, dass sie nicht nachtheilig auf das kranke Absonderungsorgan zurück wirken; wir müssen die Diät des Kranken so ordnen, dass in den genossenen Speisen und Getränken Nichts enthalten ist, was nachtheilig auf die Absonderungen wirkt etc.

§. 1039.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Es gibt zwei Wege, um auf die Absonderungen zu wirken, Umstimmung der Nerventhätigkeit und Veränderung der Blutmasse. Manche Mittel scheinen auf beiden Wegen zugleich die krankhafte Thätigkeit umzuändern.

1) *Verminderung der krankhaft vermehrten Absonderung.* Wir vermögen dieselbe durch Einwirkung auf das Nervensystem zu bewirken: durch Besänftigung der Nerven, vermittelst örtlich angebrachter Mittel, besänftigender Umschläge, Einreibungen, Einsprizungen etc. und durch innerliche, schleimige und vorzüglich durch narkotische Mittel, insbesondere bei mehrern Arten der Absonderungen durch das Opium; ferner durch Ableitung der Nerventhätigkeit vermittelst Erhöhung der Lebensthätigkeit in andern Theilen, insbesondere durch Vermehrung anderer Absonderungen, z. B. bei dem Durchfall durch Erregung des Schweisses, und bei dem Speichelfluss durch Erregung des Schweisses oder der Absonderung der Darmsäfte, durch Hautreize etc., endlich durch Zurücktreibung der Nerventhätigkeit aus dem leidenden Organ nach andern Theilen oder durch Erregung einer Zusammenziehung des Gewebes im leidenden Theil oder einer mehr contractiven Thätigkeit im ganzen Körper,

vermittelst der örtlichen und nach Umständen auch der innerlichen Anwendung der Kälte und der tonischen und adstringirenden Arzneimittel.

Durch Einwirkung auf das Blut beschränken wir die Absonderungen, wie es scheint, dadurch, dass wir der Säftemasse eine weniger reizende Beschaffenheit geben, durch den Genuss milder Nahrungsmittel und einhüllender Substanzen, und auch durch Entfernung reizender Stoffe auf den für sie bestimmten Ausleerungswegen, z. B. durch Vermehrung des Urins, der Gallenabsonderung u. s. w. Ferner dadurch, dass wir die Quantität der zur Absonderung dienenden Säfte vermindern; hiezu können aber nicht leicht und nur bei besondern Verhältnissen, z. B. bei Stockung des Blutes in den krankhaft-absondernden Organen Blutentleerungen gebraucht werden, da nach denselben das Blut leicht dünnflüssiger wird; häufiger passt Verminderung der serösen Bestandtheile des Blutes durch Verminderung des Getränkes und Erregung einer serösen Absonderung. Endlich wirken vielleicht auch öfters auf diesem Wege die tonischen Mittel, Columbo, China, Eisen etc., indem sie vielleicht die festern, zur Verflüssigung weniger geeigneten Bestandtheile des Blutes und der Gewebe vermehren und ihnen mehr Widerstandskraft gegen die auflösende Wirkung des Nerveneinflusses geben.

§. 1040.

2) *Umstimmung der Absonderung.* Zum Theil wird dieselbe schon dadurch bewirkt, dass wir die krankhaft-vermehrte oder verminderte Thätigkeit beschränken oder erhöhen, womit auch meistens die Beschaffenheit des Abgesonderten verändert und zum Normalen zurückgeführt wird. Auch vermögen wir noch ausserdem die Nerventhätigkeit qualitativ umzustimmen und das Blut in der Art zu verändern, dass die abgesonderten Stoffe eine andere Beschaffenheit erhalten. Das erstere geschieht

durch gewisse Mittel, welche specifisch auf ein Organ wirken, und die Lebensthätigkeit in ihm eigenthümlich umstimmen, wie dieses z. B. bei den Expectorantien der Fall ist, die, wie es scheint, die unmerkliche oder die mehr flüssige Aushauchung in den Lungen befördern und den zähen Schleim losstossen und seine Erzeugung beschränken. Auch vermögen wir die Thätigkeit eines Absonderungsorganes qualitativ umzustimmen, indem wir auf ein anderes mit ihm in Antagonismus (Polaritätsverhältniss) stehendes Organ einwirken. So wird die (zum Theil durch Umtausch der Polaritätswirkung hervorgebrachte) krankhafte Thätigkeit der Haut in der Gelbsucht umgestimmt und zum Normalen zurückgeführt, wenn wir auf die Leber wirken. Auf dem zweiten Wege verändern wir die Absonderungen dadurch, dass wir Stoffe in die Säftemasse bringen, welche dieselbe mehr oder weniger verändern, z. B. dünnflüssiger machen, wie dieses reichliches Getränk thut, wodurch der Verflüssigungsprozess begünstiget und eine zu zähe Absonderung zum Normalen gebracht wird, oder dass wir Stoffe aus dem Blute hinwegbringen, welche die fehlerhafte Absonderung unterhalten, z. B. gallichte Stoffe durch Erregung einer vermehrten Gallenabsonderung in der Leber.

§. 1041.

3) *Vermehrung der Absonderung.* Ist die verminderte Absonderung in einem gereizten oder selbst entzündlichen Zustand des Absonderungsorgans begründet, so finden die besänftigenden oder die rein entzündungswidrigen Mittel ihre Anwendung, unter welchen, nach gemässigter Heftigkeit der Entzündung durch Blutentleerungen, diejenigen, die den Verflüssigungsprozess befördern, besonders angezeigt sind, wie der Brechweinstein, kühlende Mittelsalze etc. Auf diese Weise, durch Verminderung einer bis zum Entzündlichen ge-

steigerten Lebensthätigkeit, mögen die von *Currie* empfohlenen kalten Begiessungen unter gewissen Umständen den Schweiss befördern,*) obgleich die Kälte sonst derjenige Einfluss ist, der am leichtesten die Absonderung unterdrückt. — Ist die verminderte Absonderung durch verminderte Lebensthätigkeit begründet, so dienen, nebst den Mitteln, die überhaupt den Verflüssigungsprozess befördern, wie Wärme und reichliches Getränk, diejenigen Mittel, die specifisch auf die Absonderungsorgane wirken und ihre Thätigkeit erhöhen, wie bei gehemmter Hautausdünstung die Diaphoretica, bei unterdrückter Gallenabsonderung die Cholagoga etc.

§. 1042.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Die wichtigste Folge lange dauernder vermehrter Absonderungen ist Erschöpfung der Kräfte, welche durch Nahrung und tonische Mittel möglichst verhütet werden muss. Die Folgen der gehemmten Absonderungen sind sehr mannigfaltig und werden am besten durch schnelle Wiederherstellung der unterdrückten Absonderung gehoben; ausserdem müssen aber die Mittel in Anwendung gebracht werden, die sie ihrem besondern Character gemäss erfordern.

*) Vergl. das Kapitel von dem Scharlachfieber und dem Typhus.

Zweiter Abschnitt.

Von den einzelnen krankhaften Absonderungen.

§. 1043.

Eintheilung der krankhaften Absonderungen. Da die Absonderungen auf eine dreifache Weise vom normalen Zustand abweichen können, so können sie auch in drei Ordnungen getheilt werden, 1) vermehrte, 2) qualitativ veränderte und 3) verminderte und unterdrückte Absonderungen. Da übrigens meistens Vermehrung und qualitative Veränderung der Absonderungen zugleich besteht, so ist es zweckmässig, die beiden ersten Abweichungen vereinigt abzuhandeln und demnach die krankhaften Absonderungen nur in zwei Ordnungen einzutheilen.

Erste Ordnung der krankhaften Absonderungen.

Die vermehrten und die der Art nach veränderten Absonderungen.

Das krankhafte Schwizen.
(*Ephidrosis, Sudatio morbosa.*)

§. 1044.

Krankhaftes Schwizen nennen wir diejenigen Schweisse, welche ohne äussere erregende Ursache und

ohne Fieber ausbrechen, oder in Hinsicht ihrer Stärke in keinem Verhältniss zu den erregenden Einflüssen stehen.

§. 1045.

Man könnte wohl krankhafte Schweisse auch alle Schweisse nennen, in welchen die Hautausdünstung entweder der Menge oder der Art nach vom gesunden Zustande abweicht, mithin vorzüglich auch die durch besondern Geruch, oft durch eine klebrige Beschaffenheit, durch Veränderungen in der Farbe etc. sich öfters auszeichnenden Schweisse, die in Fiebern vorkommen, doch bezeichnet man mit Recht mit jenem Namen nur diejenigen Schweisse, welche als eine selbstständige Krankheit auftreten und ein Leiden der Haut sind.

§. 1046.

Die Individuen, welche an dieser Krankheit leiden, werden durch leichte Körperbewegungen, ja durch die geringsten Gemüths- und geistigen Anregungen in Schweiss versezt. Es ist hier freilich die Grenze zwischen dem gesunden und dem kranken Zustande schwer zu bestimmen, indem etwas stärkere Körperanstrengungen auch bei den Gesunden Schwizen veranlassen, doch gibt es sehr viele Fälle, in welchen das Krankhafte unzweifelhaft ist, z. B. wenn schon Schweisse durch das ruhige Auf- und Abgehen in dem Zimmer ausbrechen oder der Schweiss tropfenweis aus der Brust und allen Theilen hervordringt, wenn der Kranke nur zu einem gewöhnlichen Gespräche veranlasst wird, wie ich einen derartigen Fall beobachtet habe. Die Kranken schwizen besonders in der Nacht und vorzüglich gegen Morgen sehr stark, so dass sie oft mehrere Hemden zu wechseln genöthigt sind. — Die nächste Wirkung, die diese Schweisse hervorbringen, sind eine ausserordentliche Weichheit und Empfindlichkeit der Haut, so dass der Kranke sich sehr leicht verkältet; leicht entsteht eine

Art Wundsein (Intertrigo) an verschiedenen Theilen und ein frieselartiger Ausschlag. — Dauern die Schweisse lange an und sind sie stark und allgemein, so schwächen sie leicht den Körper; doch gewöhnt sich auch dieser so sehr an dieselben, dass, wenn kein inneres Leiden den gehörigen Wiederersaz der Kräfte hindert, sie viele Jahre und andauernd, ohne für das Leben gefährlich zu werden, ertragen werden. — Gesellen sie sich zu Schwächekrankheiten hinzu, so beschleunigen sie die Erschöpfung der Kräfte.

§. 1047.

Sind die Schweisse nur örtlich, so sind sie oft beinahe andauernd vorhanden, sie nehmen, insbesondere die Fussschweisse, oft einen äusserst widerlichen Geruch an, sie machen die Haut an diesen Theilen äusserst zart und empfindlich und veranlassen eine gefleckte, oft in's bläuliche gehende Röthe, zuweilen selbst mit Lostrennung der Epidermis, wodurch die Fussschweisse ein anstrengendes Gehen sehr schmerzhaft machen. Wirkt auf den, mit dem örtlichen Schweisse behafteten Theil Kälte und Nässe ein, so entstehen leicht Zahnweh, Katarrh, Rheumatismus, Furunkeln und auch schwerere Leiden.

§. 1048.

Anlage zum krankhaften Schwizen haben Personen mit einer sehr zarten und verweichlichten Haut, wie es scheint, mehr Individuen mit blonden, als solche mit dunkeln Haaren, und solche mit schwächlichem Körper und mit Anlage zur Schwindsucht. Gelegenheitsursachen werden die Gewohnheit, reichliches, warmes Getränk am Abend zu nehmen, zu starkes Zudecken des Körpers im Bette, das Tragen von zu warmen Kleidern und besonders anhaltendes Tragen von Flanell auf blosser Haut, Unreinlichkeit etc.

§. 1049.

Vorhersage. Es ist äusserst schwierig, der er-

weichten Haut die normale Beschaffenheit wieder zu geben, und es ist auch die Behandlung häufig ohne Erfolg, da wegen leicht eintretender Metastasen die Verfahrungsweisen, welche die übermässige Hautthätigkeit am sichersten zu beschränken vermöchten, oft nicht, und nur mit grosser Behutsamkeit in Anwendung gebracht werden dürfen.

§. 1050.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Der Kranke nehme die Getränke und Speisen mehr kühl und gewöhne sich allmälig an eine leichtere Kleidung und leichtere Bedeckung im Bette. Um die Fussschweisse zu mässigen, gewöhne sich der Kranke das Tragen von wollenen Strümpfen ab, gebrauche mehr baumwollene oder leinene Strümpfe oder hülle die Füsse nur in öfters zu wechselnde Leinwandlappen ein, auch trage er statt Stiefeln Schuhe und reinige die Füsse öfters durch ein nur wenig warmes Fussbad.

§. 1051.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Man sucht diese Absonderung durch den innerlichen Gebrauch kühlender und zusammenziehender Mittel zu beschränken, durch Weinsteinrahm oder Mineralsäuren in kaltem Wasser als Getränk genommen, einen Aufguss der Salbei, kalt getrunken, durch Weidenrinde, Tormentille, China, rothen Wein etc. Von *de Haen* wurde der Agaricus empfohlen, von *Reil*, besonders in hektischen Schweissen, zweimal täglich einen Esslöffel voll Rhum in einem Glase Eselsmilch.

Hiermit kann der vorsichtige Gebrauch äusserlicher Mittel verbunden werden. Der Kranke gebrauche zuerst warme, sodann laue und zulezt kalte Bäder, welche leztere aber nur unter angemessener Körperbewegung gebraucht werden dürfen; daher nur die Fluss- und Seebäder passen. Auch sind Soolebäder und Bäder mit

Aufgüssen von aromatischen und tonischen Mitteln, so wie Stahlbäder empfohlen worden. Ferner kann, mit vorsichtiger Gewöhnung der Haut an dieses Mittel, der Körper täglich einmal mit einem in kaltes Wasser getauchten Schwamme gerieben werden. *Percival* rühmt das Tragen von Hemden, die in eine Abkochung von China getaucht sind. Besonders gerühmt wurde auch die Kampherseife.

§. 1052.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Sind durch Unterdrückung der Schweisse Nachtheile entstanden, so sucht man das Schwizen durch die schweisstreibenden Mittel wieder zu Stande zu bringen. Um insbesondere die Fussschweisse wieder hervorzubringen, lässt man den Kranken wollene Strümpfe tragen, die Füsse in Flanell, Wachstaffent oder in ein Kaninchenfell einwickeln, erwärmen und reiben, und wendet warme und scharfe Fussbäder an.

Der Speichelfluss.

(*Ptyalismus, Salivatio.*)

§. 1053.

Der Speichelfluss ist eine, gewöhnlich mit veränderter Beschaffenheit des Speichels verbundene, vermehrte Absonderung in den Speicheldrüsen, so dass der Kranke häufig auszuspucken genöthigt ist oder der Speichel von selbst aus dem Munde fliesst.

§. 1054.

Manchmal gehen dem Speichelfluss Vorboten voraus, Hize und Trockenheit in der Mundhöhle, Empfindlichkeit und Anschwellung der Speicheldrüsen, und besonders bei der Merkurial-Salivation ein übler, beinahe

fauligter Geruch aus dem Munde und Anschwellung des Zahnfleisches. Sodann, oder auch ohne dass diese Vorboten sich zeigten, bemerkt man, dass der Mund des Kranken immer voll Speichel ist, und es fliesst ihm im Sprechen leicht Speichel aus, so wie auch im Schlafe Speichel nach dem Kehlkopfe gelangen und Husten und selbst Erstickungsanfälle veranlassen kann. Die Menge des Speichels ist oft sehr beträchtlich und kann selbst 12 Pfunde in einem Tage betragen; es ist der Speichel oft in seiner Beschaffenheit verändert, derselbe hat einen üblen Geruch, schmeckt süsslich oder salzig, ist sehr zähe, nach einer Beobachtung von *Reil* wurde er bei einer Wöchnerin, die am Kindbettfieber litt, trübe und molkigt. Die ganze Mundhöhle wird sehr empfindlich. Das Zahnfleisch wird aufgelockert und schwammig, es entstehen weisse Blätterchen oder Bläschen im Munde, welche in Geschwüre mit weisslichem Grunde übergehen, oft bilden sich weisse Callositäten an der innern Fläche der Wangen, die Zähne werden locker und schwarz, die Zunge schwillt oft bedeutend an und es fallen selbst zuweilen Stücke von ihr hinweg, die Parotiden und die Submaxillardrüsen schwellen an und werden schmerzhaft. Bei heftigem Uebel und langer Dauer leiden andere Theile und selbst der ganze Körper mit. Die Verdauung und Ernährung ist gestört. Durch den Speichel gehen viele Säfte verloren. Das Gesicht wird blass, aufgedunsen oder auch eingefallen, die Kräfte nehmen ab und es gesellt sich selbst ein Zehrfieber hinzu. — Die Krankheit kann nur wenige Tage dauern, aber auch sehr langwierig sein. Der Uebergang in Gesundheit geschieht unter allmäligem Geringerwerden der Absonderung, oft durch Schweiss und vermehrte Stuhlentleerungen. Der Tod kann durch Erschöpfung der Kräfte und auch durch schnelles Aufhören der Absonderung und Metastase herbeigeführt werden.

§. 1055.

Unter den **Ursachen** eines stärkern Speichelflusses ist die Aufnahme von Quecksilber in den Körper die häufigste; am leichtesten wird er erregt durch die Anwendung dieses Arzneimittels in Form von Einreibungen der grauen Quecksilbersalbe, insbesondere in der Nähe der Speicheldrüsen, auch gern durch das Calomel, weniger durch den Sublimat, am seltensten und beinahe gar nicht durch das schwarze Schwefelquecksilber und den Spiessglanzmohr etc. Ausserdem ist eine stärkere oder geringere Speichelabsonderung zuweilen die Folge von einer Halsentzündung, von Geschwürchen im Munde, von Zahnweh, vom Reiz eines hohlen Zahnes, des Bruches der Kinnlade, von gastrischen Reizen, Würmern, Galle, Schleim, vom Magenkrebs und dem Krebs der Bauchspeicheldrüse, von einer Leberverhärtung, von einer rheumatischen Affection der Speicheldrüsen, von unterdrückten Fussschweissen, von Metastasen der Gicht, der Flechten, der Kräze, von contagiösen Fiebern, namentlich der Blattern, von der Hundswuth u. s. w.

§. 1056.

Wesen der Krankheit. Die Speicheldrüsen scheinen stets in einem Zustande erhöhter Lebensthätigkeit zu sein, und es ist nicht wahrscheinlich, dass, wie man angenommen hat, auch Lähmung dieser vermehrten Absonderung zum Grunde liegen könne. Die erhöhte Thätigkeit besteht nicht in Entzündung, sondern in vermehrter Verflüssigung, und wird hervorgebracht durch unmittelbar von Aussen auf die Speicheldrüsen wirkende Reize, durch consensuelle und antagonistische Erregung und, wie es scheint, auch durch Veränderung der zur Absonderung dienenden Säfte, wie dieses wahrscheinlich bei der Merkurial-Salivation und vielleicht auch bei dem Speichelfluss in contagiösen Fiebern der Fall ist.

§. 1057.

Vorhersage. Der Speichelfluss ist zuweilen wohlthätig, gewöhnlich nicht gefährlich, jedoch auch in seltenen Fällen in den höchsten Graden der Krankheit tödtlich, öfters sehr hartnäckig.

§. 1058.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Man untersuche die Mundhöhle und nehme den etwa daselbst sich befindenden Reiz hinweg, man entferne Galle, Würmer und andere gastrische Reize; ist der Quecksilbergebrauch die Ursache des Speichelflusses, so vermindere man die Gabe oder wechsle mit dem Präparat, oder seze den Gebrauch dieses Mittels ganz aus. Auch sind bei der Mercurial-Salivation, ausser den unten anzugebenden Mitteln, Schwefel und Schwefelleber innerlich und in Bädern in Anwendung zu bringen.

§. 1059.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Wir vermögen die dieser Krankheit zum Grunde liegende erhöhte Lebensthätigkeit zu beschränken 1) durch die besänftigende Methode und zwar sowohl durch unmittelbar besänftigende Mittel, wie die Anwendung von milden Mundwassern aus einer Abkochung von Eibisch, Salep, Mohnköpfen mit Zusaz von Honig und Tinctura thebaica, durch besänftigende Umschläge von einer Abkochung von Herba Cicutae oder von Mohnköpfen, durch das Auflegen von erwärmtem Flanell, von Kräutersäckchen mit Kampher bestrichen, durch Einreibungen von Oleum Hyoscyami, Opiatsalbe, Kampheröl etc. und durch innerliche, die erhöhte Reizbarkeit mindernde Mittel, insbesondere Opium und Kampher, als auch durch mittelbar besänftigende Mittel, wie Ableitung auf die Haut durch die innerlichen, schweisstreibenden Mittel, Warmhalten des Körpers, warme Bäder, durch Hautreize, namentlich

Blasenpflaster, Fontanelle, durch Reiben und Bürsten der Haut etc. und durch Ableitung auf den Darmkanal, durch die abführenden Salze, Senneblätter, Rhabarber etc. — 2) Durch die den Verflüssigungsprozess beschränkenden tonischen Mittel. Diese Verfahrungsweise darf nur in Anwendung gebracht werden, wenn die Speicheldrüsen nicht zu sehr in einem gereizten Zustande sich befinden und wenn von der mehr gewaltsamen Hemmung der Absonderung kein Nachtheil zu entstehen droht. Hieher gehören die Mundwasser von einem Aufguss von Salbei, nach Umständen mit Zusaz von Alaun, Borax, Mineralsäuren, Myrrhentinktur, die Abkochungen von Eichen-, Weidenrinde, von Tormentille, China, Ratanhia etc. und der innerliche Gebrauch der Columbo, der China, der Ratanhia, des Eisens etc.

§. 1060.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Die Geschwüre im Munde und das aufgelockerte Zahnfleisch werden auf diese Weise behandelt, wie in dem Kapitel von der Mundfäule angegeben ist. Entsteht Entzündung und Geschwulst der Speicheldrüsen, so müssen die Mittel, welche in den Paragraphen über Speicheldrüsenentzündung bezeichnet worden sind, in Anwendung kommen. Ist der Speichelfluss zu schnell unterdrückt worden und werden hierdurch schlimme Zufälle veranlasst, so sucht man ihn wieder herzustellen, nach Umständen durch erweichende Bähungen oder durch Kaumittel oder durch Einreibungen der grauen Queksilbersalbe in die Gegend der Speicheldrüsen.

Der Milchfluss.

(*Galactorrhoea.*)

David (Paris 1783.)

§. 1061.

Milchfluss nennen wir sowohl eine solche Milchabsonderung, die eintritt, ohne dass eine Absonderung statt finden sollte, als auch eine solche, welche in dem Grade vermehrt ist, dass die Menge der abgesonderten Milch grösser ist, als das Bedürfniss eines gesunden Kindes, das gesäugt wird, erfordert.*)

§. 1062.

Wie in der Begriffsbestimmung schon angedeutet ist, gibt es zwei Arten von Milchfluss. Die erstere, in welcher eine Milchabsonderung bei Personen und zu einer Zeit vorkommt, wo sie nicht statt finden sollte, und die zweite, in welcher die Milchabsonderung unter

*) Gewöhnlich bestimmt man den Begriff der Krankheit auf die Weise: Der Milchfluss ist eine, für die Kräfte der Kranken zu starke Absonderung der Milch. Es kann jedoch selbst eine sehr sparsame Milchabsonderung für die Kräfte der Kranken zu reichlich sein, z. B. bei Schwindsüchtigen, in welchem Falle gewiss keine krankhafte Thätigkeit in den Brustdrüsen und also keine krankhafte Milchabsonderung angenommen werden kann. Sie ist in einem solchen Falle nur ein nachtheiliger Einfluss, wie auch eine ganz mässige Körperbewegung schädlich wirken kann, ohne dass sie selbst eine krankhafte Muskelthätigkeit ist. Krankhaft muss aber die Milchabsonderung genannt werden, wenn die Thätigkeit, in der sie besteht, im Verhältniss zum Reize zu gross ist; naturgemäss steht aber jene Thätigkeit im Verhältniss zum Bedürfniss des dieselbe andauernd unterhaltenden Kindes, das durch die Mutter genährt wird, und es ist also diejenige Milchabsonderung krankhaft, durch welche mehr Milch erzeugt wird, als das Kind, wenn es gesund und kräftig ist, bedarf.

der gewöhnlichen Bedingung eintritt, aber zu reichlich ist. Zur erstern Art werden gerechnet der geringe Ausfluss einer milchähnlichen Flüssigkeit bei neugebornen Kindern, der im Gefolge von Anschwellung der Brustdrüsen vorkommt und wobei sich oft entzündliche Härten und Eiterungen bilden, ferner ein ähnlicher Ausfluss mit Anschwellung der Brustdrüsen bei Jungfrauen, bei Weibern in den Jahren, in welchen die monatliche Reinigung verloren geht, so wie ein ähnlicher Zustand der Brustdrüsen, wie er in seltenen Fällen bei Männern vorkommt, endlich und vorzugsweise ein zu frühes und starkes Eintreten der Milchabsonderung in der Schwangerschaft und ein zu langes Fortdauern der Absonderung der Milch nach dem Entwöhnen des Kindes; es ist jedoch zweifelhaft, ob sämmtliche zuerst bezeichnete Krankheitszustände zu dem Milchfluss gehören.

§. 1063.

Kommt der Milchfluss als vermehrte Absonderung der Milch bei Frauen vor, die ein Kind nähren, so erkennt man denselben daran, dass ausser der Milch, die das Kind entzieht, eine ziemliche Menge Milch ausfliesst, und zwar geschieht dieses entweder, indem, während das Kind trinkt, auch aus der Brust, an welcher es nicht trinkt, Milch ausfliesst, oder indem die Milch auch sich entleert, wenn das Kind nicht angelegt wird. Zuweilen wird die Menge der ausfliessenden Milch sehr bedeutend, so z. B., dass täglich mehrere Pfunde Butter aus der überflüssigen Milch bereitet werden. Die Frauen ertragen oft lange Zeit die vermehrte Absonderung gut, indem die Prozesse der Blutbereitung ebenfalls sehr gesteigert sind, in andern Fällen und selbst oft, wenn die Absonderung nicht krankhaft vermehrt ist, ja selbst zuweilen, wenn sie sehr sparsam ist, äussert diese Ausscheidung von Säften grosse Nachtheile auf den Körper. Die Frau hat jedesmal nach dem Säugen eine Empfindung von Schwäche und Er-

schöpfung, sie wird allmälig magerer, das Gesicht blass, die Haare gehen aus, sie hat auch häufig Trockenheit im Halse und bekommt ein Hüsteln, zuweilen Herzklopfen, Kopfweh etc. Später stellen sich fliegende Hize der Wangen und nächtliche Schweisse ein, und es fangen die Lungen an, bedeutend zu leiden, bis sich zulezt wirkliche Lungenschwindsucht, zu welcher auch noch colliquative Durchfälle hinzukommen, entwickelt.

§. 1064.

Manche nehmen auch eine Galactorrhoea erronea an, worunter sie eine durch Metastase bewirkte Absonderung der Milch in andern Theilen als den Brustdrüsen verstehen; Andere leugnen das Bestehen dieser Krankheit. Es scheint dieselbe in soweit angenommen werden zu können, als wohl durch Metastase eine der Milch ähnliche, wenn auch nicht ganz gleiche Absonderung bewirkt werden kann, wie auch durch andere Theile, als die Leber, gallichte Stoffe ausgeschieden werden können.

§. 1065.

Anlage gibt ein schwacher und sehr reizbarer Körper (Erethismus), auch ist eine besondere Anlage zu starker Milchabsonderung zuweilen erblich vorgekommen.

Gelegenheitsursachen sind verschiedene Reize, welche auf die Brustdrüsen wirken, das zu häufige Anlegen des Kindes, das Stillen zweier Kinder, zu lange fortgeseztes Säugen, unkeusche Berührungen der Brust, der zu reichliche Genuss milchmachender Dinge, fetter, öligter Nahrungsmittel, Pflanzentheile mit ätherischem Oele, wie des Kerbels, Fenchels, Anises etc., endlich consensuelle Reize, besonders durch ein Leiden der Gebärmutter, wie z. B. einen Polypen.

§. 1066.

Wesen. Der krankhafte Zustand der Brustdrüsen, der dem Milchflusse zum Grunde liegt, scheint niemals ein lähmungsartiger Zustand, sondern erhöhte Lebens-

thätigkeit zu sein; doch ist dieselbe keine Entzündung, denn diese unterdrückt die Milchabsonderung.

§. 1067.

V o r h e r s a g e. Die Krankheit ist in der Regel leicht zu beseitigen. Gefahr entspringt meistens nur bei zu beharrlich fortgeseztem Säugen des Kindes, bei einer schwächlichen und zur Schwindsucht geneigten Frau. Ausser den Nachtheilen für die Mutter entsteht durch den Milchfluss bei Schwangern zuweilen Gefahr für das Kind.

§. 1068.

B e h a n d l u n g. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* In Fällen, in welchen die Milchabsonderung Nachtheile für die Frau bringt, muss das Kind seltener angelegt oder ganz entwöhnt werden; lezteres muss vorzüglich bei drohender Lungenschwindsucht geschehen. findet aber dagegen nur eine für das Bedürfniss des Kindes zu reichliche Milchabsonderung statt und wird diese von der Frau gut ertragen, so ist die Maassregel nicht nothwendig und es muss nur jede unnöthige Reizung der Brustdrüsen vermieden werden. Auch müssen die herabhängenden Brüste etwas in die Höhe gebunden werden, um das stärkere Eindringen der Säfte zu verhindern.

§. 1069.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um die erhöhte Thätigkeit der Brustdrüsen herabzustimmen, besizen wir zwei Mittel: Verminderung der erhöhten Nerventhätigkeit und Verminderung der Säfte. Zu ersterem Zwecke wenden wir die auf die Sensibilität so sehr beruhigend wirkende Wärme an, am besten durch starkes Einhüllen der Brüste in Wolle oder Baumwolle, welche auch mit Zucker durchräuchert werden kann, durch Bestreichen der Brüste mit Schmalz oder Oel, oder Auflegen von Schmalzläppchen, auch ist der Kampher

in Form des Oleum camphoratum und des Linimentum saponato-camphoratum empfohlen worden. Mit Vorsicht können auch in Fällen, in welchen die Milchabsonderung zu frühe eintritt, während des Säugens viel zu reichlich wird, oder nach dem Entwöhnen des Kindes zu lange fortdauert, Waschungen mit erwärmtem Weine, Branntwein, oder mit aromatischen und selbst mit gelind zusammenziehenden Aufgüssen gebraucht werden. Ableitend auf die Lebensthätigkeit wirken auch die zur Beschränkung der Milchabsonderung gebräuchlichen Abführungsmittel.

Dem zweiten Zwecke entsprechen wir am besten durch Verminderung der Nahrungsmittel. Auch wirken wir zugleich auf diese Weise durch die Abführungsmittel, unter denen am meisten die Salze und zwar vorzüglich der Tartarus vitriolatus im Gebrauche sind.

§. 1070.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Indem wir auf die angegebene Weise die Milchabsonderung zu beschränken suchen, ist es nun, besonders bei gleichzeitiger Entwöhnung des Kindes, unsere Aufgabe, die leicht eintretenden Milchstockungen, Verhärtungen, Entzündungen und Eiterungen zu verhüten und die schon entstandenen zur Heilung zu bringen. Wir suchen, die stockende Milch durch erweichende Bähungen (welche jedoch auch durch Verkältung leicht nachtheilig werden können) und durch gelindes Ausstreichen zum Ausfluss zu bringen und durch Auflegen von Wolle und die andern schon angegebenen besänftigenden Mittel, so wie auch durch Auflegen von Cicuta-, Quecksilber- und Campherpflaster, durch Einreibungen von Ol. Hyoscyami, Digitalissalbe etc., durch sparsame Diät und nach Umständen durch Ansezen von Blutegeln und selbst durch allgemeine Blutentleerungen, Verhärtungen und Entzündungen zu verhüten und zu zertheilen. Tritt Eiterung ein, so befördert man die Reifung des Abscesses durch

die gewöhnlichen Mittel und überlässt die Oeffnung desselben der Natur.

Qualitativ veränderte Milchabsonderung.

(*Galactia depravata, Galactacrasia.*)

§. 1071.

Die Milch ist zuweilen zu wässerig, in welchem Falle sie eine in's Bläuliche spielende Farbe hat, manchmal ist sie auch zu dick und fett, zuweilen ist sie säuerlich riechend oder hat einen andern eigenthümlichen, von irgend einem Fehler im Körper abhängenden oder von bestimmten Nahrungsmitteln herrührenden Geruch; in manchen Fällen findet man aber keine sichtbaren Fehler in der Milch und man schliesst nur auf die fehlerhafte Beschaffenheit derselben aus den üblen Zufällen, die sie bei dem Kinde erregt. *)

§. 1072.

Die gewöhnlichsten Ursachen sind ein sehr lange fortgeseztes Stillen, wodurch die Milch zuweilen sehr dick und fett wird, mancherlei Krankheiten der Stillenden, wie Flechten, weisser Fluss, stinkende Fussschweisse etc., ferner der Genuss ranziger, sehr stark gesalzener, saurer oder selbst faulender Speisen, starke und häufige Geschlechtsreizungen und vorzüglich häufiger Zorn oder anhaltender Kummer, was auf das Kind besonders in dem Falle nachtheilig wirkt, wenn es unmittelbar nach einem solchen Gemüthsaffect an die Brust gelegt wird.

*) Die nachtheiligen Wirkungen, die eine fehlerhafte Milch auf die Gesundheit des Kindes äussern kann, anzugeben, ist ein Gegenstand der allgemeinen Krankheitslehre.

§. 1073.

In der **Behandlung** ist die Erforschung und Beseitigung der Gelegenheitsursachen die wichtigste Aufgabe. Auffallend dünne Milch sucht man durch eine kräftige Nahrung, eine sehr dicke und fette Milch durch weniger nahrhafte Speisen und verdünnende Getränke zu verbessern. — (Ist eine solche Milch dem Kinde sehr nachtheilig und lässt sich nicht schnell ein Beschwerden erwarten, so muss das Kind eine andere Nahrung erhalten.)

Der saure Magensaft.

(*Acor primarum viarum.*)

§. 1074.

Der Magensaft des Menschen ist nach *Tiedemann's* und *Gmelin's* Untersuchungen immer sauer; wir bezeichnen aber mit der Benennung saurer Magensaft den Krankheitszustand, in welchem der Magensaft einen so bedeutenden Grad von Säure und Schärfe annimmt oder eine so bedeutende Menge von (saurem) Magensaft vorhanden ist, dass dadurch Krankheitszufälle erzeugt werden.

§. 1075.

Die Kranken leiden gewöhnlich am Sodbrennen; sie haben nämlich ein Gefühl von Brennen an dem Magenmunde und in der Speiseröhre, und die Empfindung, wie wenn ein heisser Dunst aus dem Magen emporsteige, sie haben dabei oft Heisshunger (Bulimia), aber keinen Durst, sie riechen sauer aus dem Munde, haben saures Aufstossen und zuweilen Erbrechen von sehr sauer riechenden, die Zähne stumpfmachenden Stoffen, häufig stellt sich auch Durchfall ein, welcher oft mit Leibschmerzen verbunden

ist und womit bei Kindern grünliche, schleimige, wie gehackt aussehende, sauer riechende Stoffe ausgeleert werden. Bei längerer Dauer und höherm Grade der Krankheit erhalten auch andere Absonderungen, wie der Schweiss und der Harn, eine säuerliche Beschaffenheit, das Gesicht wird bleich, die Lippen, das Zahnfleisch und die Zunge blass, bei den Kindern entstehen selbst Convulsionen. Alle diese Zufälle nehmen zu, wenn der Kranke saure und zur sauren Gährung geneigte Speisen geniesst.

Die Krankheit hat oft nur eine kurze Dauer, oft ist sie langwierig. In Gesundheit geht dieselbe über nach Entleerung der Säure, durch Erbrechen und Durchfall und auch durch allmälige Verbesserung des Magensaftes. Den Tod kann sie bei Kindern durch den Hinzutritt von Gichtern und bei langer Dauer durch Erschöpfung herbeiführen, auch bilden sich die Darrsucht der Neugebornen, Scropheln und Rheumatismus aus; doch kann auch in solchen Fällen die Säurebildung nur ein Symptom dieser beginnenden Krankheiten sein.

§. 1076.

Anlage haben besonders Kinder in den ersten Lebensmomenten und unter den Erwachsenen Hypochondristen und Hysterische.

Gelegenheitsursachen sind der Genuss saurer und zur sauren Gährung geneigter Nahrungsmittel, saurer Weine, des Punsches, der Limonade, reiner Pflanzennahrung, vieler Erdäpfel, schlechten Brodes, verdorbener oder zu vieler Milch, fetter Dinge, insbesondere Butterbackwerke etc., so wie zurückgetretene Fussschweisse, Flechten, Kräze, Gicht und Unordnungen in der monatlichen Reinigung.

§. 1077.

Es können dieser Krankheitsform zweierlei wesentlich verschiedene Krankheitszustände zum Grunde liegen:

1) die Absonderung eines besonders sauren Magensaftes. Dieses mag durch Resorption säuerlicher Stoffe und durch idiopathisch, consensuell oder antagonistisch erregte Umstimmung der Magennerven geschehen, und hierbei mag der Magen zuweilen sich in einem gereizten und selbst entzündlichen Zustande befinden. Vielleicht ist auch die Qualität des Magensaftes oft nicht sehr verändert, sondern die Absonderung desselben, der ja ohnehin eine säuerliche Beschaffenheit hat, nur *vermehrt*. 2) Darniederliegende Verdauung, wodurch die Nahrungsmittel in saure Verderbniss übergehen. In dem leztern Krankheitszustand ist die Säurebildung eigentlich keine Krankheit, so wenig die Aufnahme von sauren Stoffen von aussen für sich schon Krankheit ist, doch zieht die auf diesem Wege gebildete Säure ähnliche Folgen nach sich. Es können beide Zustände meistens nicht von einander unterschieden werden und sind wohl auch meistens mit einander verbunden.

§. 1078.

Vorhersage. Bei Erwachsenen wird die Krankheit wohl nie gefährlich. Die einzelnen Zufälle sind leicht zu heben, schwer aber ist die Anlage zur Säurebildung zu tilgen.

§. 1079.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Erwachsene müssen die oben bezeichneten und überhaupt diejenigen Nahrungsmittel, von denen sie bemerken, dass sie ihnen Verdauungsbeschwerden verursachen, sorgfältig vermeiden. Bei Kindern muss besonders darauf gesehen werden, dass die Muttermilch und die übrigen Nahrungsmittel eine gute Beschaffenheit haben. Leidet die Mutter an Säure, so müssen ihr, um auf das Kind zu wirken, die geeignete Diät vorgeschrieben und Arzneimittel verordnet werden. Die Mutter lege das Kind nicht unmittelbar nach einem Verdruss an. Leidet

die Mutter an Flechten, an den Drüsen, an stinkenden Fussschweissen oder stinkendem Athem, so muss eine Amme genommen oder das Kind künstlich ernährt werden. Wurde die Amme viel früher entbunden, als das Kind, das sie stillt, geboren wurde, und ist ihre Milch zu fett und zu nahrhaft für dasselbe, so muss das Kind auf eine andere Weise genährt werden. Wird das Kind künstlich genährt, so muss insbesondere die zu reichliche Darreichung von Nahrungsmitteln vermieden werden. Die Milch und das Mehl, welche zum Brei genommen werden, müssen von guter Beschaffenheit sein und dieser gut ausgekocht und nicht zu dick sein. Oft ist es zuträglich, der Thiermilch etwas Fleischbrühe von Kalbfleisch oder von einem Huhn zuzusezen, auch passen Zwiebackbrei, Griessuppen, bei schwachen Kindern eine Abkochung der Salepwurzel mit Fleischbrühe und Zusaz von etwas Eigelb.

§. 1080.

Die schon vorhandene Säure, die nicht allein verschiedene Beschwerden veranlasst, sondern auch wiederum Ursache vermehrter Säurebildung wird, sucht man entweder auszuleeren oder zu neutralisiren. Zu ersterm Zweck wendet man Brech- und auch Abführungsmittel an, zu welchen leztern man nicht leicht die die Verdauung schwächenden Salze, sondern vorzüglich Rhabarber benuzt; zu lezterm Zwecke verordnet man Magnesia carbonica, Kali carbonicum, die Lapides cancrorum, Conchae praeparatae etc. (Nro. 57 u. 58.)

§. 1081.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Liegt der fehlerhaften Absonderung des Magensafts ein entzündlicher Zustand zum Grunde, so müssen die gegen eine schleichende Magenentzündung dienlichen Mittel in Gebrauch gezogen werden; ist es blos ein erethischer Zustand des Magens, so dienen vorzüglich ätherisch-öligte

Stoffe, wie Fenchel, Anis, Kümmel, Melisse, Pfeffermünze, Baldrian, auch Asa foetida, so wie auch eine angemessene Anwendung des Opiums, und äusserlich geistige und aromatische Einreibungen, Pflaster etc.; ist mehr ein Zustand von Reizlosigkeit vorhanden und liegen die Verdauungskräfte darnieder, so sind Wein, Gewürze, aromatisch-tonische und rein-tonische Mittel passend, wie Rhabarber, Calamus aromaticus, die Pomeranzenschaalen, Quassia, Absinthium, Columbo, die China, das Eisen etc. Oft ist es sehr zweckmässig, säuretilgende, erregende und tonische Mittel mit einander zu verbinden. (Nro. 59 u. 60).

§. 1082.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Entsteht ein deuteropathisches Leiden, wie z. B. heftiger Magenkrampf oder Gichter, so sucht man die Säure so schnell wie möglich zu entfernen oder zu neutralisiren und wendet gegen das hinzugekommene Leiden die seiner Natur entsprechenden Mittel an, z. B. bei dem Magenkrampf etwas Opium.

Die krankhaft vermehrte Gallenabsonderung.

(*Polycholia*, *Status biliosus.*)

§. 1083.

Unter der angegebenen Krankheitsbenennung verstehen wir eine in *dem* Grade vermehrte Gallenabsonderung in der Leber, dass hierdurch Störungen in den Verrichtungen des einen oder des andern Organs bewirkt werden.

§. 1084.

Der Kranke erhält einen bittern Geschmack, die Zunge belegt sich in der Regel mit etwas Schleim, und es zeigen sich zwei gelbliche, gegen die Spize der Zunge hinlaufende Streifen, oft ist auch nur der hinterste Theil der Zunge mit einem gelblichen und oft grasgrünen Beleg versehen, zuweilen aber ist die Zunge ganz und zwar eigentlich krankhaft rein, glänzend und glatt. Der Kranke hat Abneigung gegen den Genuss von Speisen und insbesondere gegen Fleischspeisen, dagegen verlangt er säuerliche Getränke, er hat dabei ein Gefühl von Völle und Spannung in der Herzgrube, und dieselbe ist auch bei Berührung etwas empfindlich (Bilis in praecordiis); manchmal steigert sich diese Empfindung zum wirklichen Magenkrampf (cardialgia biliosa). Es stellen sich nunmehr oft Uebelkeit, Zusammenlaufen des Speichels im Munde, Aufstossen und Erbrechen ein, wodurch wiederholt eine grosse Menge gelber oder grüner Galle ausgeleert wird (Vomitus biliosus), oder es kommen unter starken Leibschmerzen (Colica biliosa) grünliche Durchfälle (Diarrhoea biliosa) zu Stande. Bei diesem gallichten Zustand und besonders, bevor die Entleerungen nach aussen eingetreten sind, fühlt der Kranke sich matt, er ist verstimmt, zornmüthig, hat oft Kopfschmerz in der Stirngegend, oft auch ziemlich beträchtliche Fieberbewegungen, selbst mit Delirien, und es bildet sich zuweilen ein vollkommenes Gallenfieber oder Gelbsucht aus.

Die Krankheit entscheidet sich durch gallichte Entleerungen, doch können diese geraume Zeit bei steter starker Erregung der Gallenabsonderung fortbestehen, ohne dass Besserung eintritt. Zum Tode kann dieser Zustand durch den Uebergang in das Gallenfieber, die Gelbsucht und allmälige Entwicklung von Desorganisationen in der Leber führen.

§. 1085.

Anlage zu diesem Leiden haben Individuen von cholerischem Temperamente.

Gelegenheitsursachen sind vorzüglich der Zorn und eine sehr hohe Temperatur der Atmosphäre, besonders wenn sie öfters mit einer kühlern Beschaffenheit derselben wechselt, wesshalb gallichte Krankheiten in den Tropenländern so häufig sind, ferner fortgesezter reichlicher Genuss geistiger Getränke, zu reichlicher Genuss von Fleischkost und fetten Speisen (jedoch nur bei besonderer Anlage), der Wurmreiz, der Missbrauch der drastischen Mittel, auch consensuelle Reizung durch Kopfverlezungen etc.

§. 1086.

Wesen. Die vermehrte Gallenabsonderung scheint sowohl dadurch bedingt werden zu können, dass die Nerven der Leber in einem gereizten Zustande sich befinden, wie z. B. bei Gemüthsaffecten und bei Gehirnverlezung, als auch dadurch, dass das in die Leber gelangende Blut Stoffe enthält, welche durch die Absonderung in der Leber ausgeschieden zu werden bestimmt sind, wie dieses bei einer überwiegend venösen Blutmasse der Fall zu sein scheint und vielleicht auch bei hoher Temperatur der Atmosphäre vorkommt, bei welcher durch die Einwirkung der Hize auf das Blut bei dem Athmen und vielleicht auch durch einen hierdurch beschränkten Athmungsprozess selbst das Blut eine fehlerhafte Beschaffenheit erhalten mag.

§. 1087.

Vorhersage. Diese Krankheitszufälle werden in unserm Klima in der Regel nicht gefährlich. Gefahr drohend werden sie vorzüglich, wenn der Abfluss der Galle aus der Gallenblase in die Gedärme gehindert ist.

§. 1088.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den*

Ursachen. Das Individuum, das zur Gallenerzeugung geneigt ist, darf besonders in hohem Sommer und in heissen Klimaten nicht reichlich geistige Getränke geniessen, es muss sich mehr der Pflanzen und insbesondere der Obstnahrung, als des Fleisches bedienen, es muss sich gegen die starke Hize durch den Aufenthalt in der kühl gehaltenen Wohnung schüzen, die Gelegenheit zum Verdruss meiden etc.

§. 1089.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Ist Galle in bedeutender Menge in den Magen ergossen und sind keine Gegenanzeigen da, so wendet man ein Brechmittel an, was nicht allein die im Magen, sondern auch die im Zwölffingerdarm, der Gallenblase und selbst den Gallengefässen in der Leber angehäufte Galle entleert. Ist schon Erbrechen vorhanden, so darf dieses, in so fern es Folge des Gallenreizes und nicht Ursache der vermehrten Gallenabsonderung ist, nicht gestillt werden. Ebenso dürfen gallichte Durchfälle, wenn sie nur Folge der vermehrten Gallenabsonderung sind, nicht gestillt werden, sondern müssen im Gegentheil durch gelinde Abführungsmittel, von Tamarinden, Weinsteinrahm, Manna etc. befördert werden. — Um die Gallenabsonderung zu beschränken, dienen säuerliche Mittel, z. B. Limonade, bei sehr gereiztem Zustande der Leber besänftigende Umschläge auf die Lebergegend, besänftigende Einreibungen, auch der vorsichtige Gebrauch des Opiums und bei Hinneigung zur Entzündung Blutegel.

§. 1090.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Gegen Magenkrampf dient vorzüglich der Riverische Trank mit Ueberschuss von Citronensäure (Nro. 61), oft reicht schon etwas Citronen- oder Pomeranzensaft hin, bei Kolik Citronensaft mit Oel, ausserdem sind aber auch Opium

und die übrigen gegen Magenschmerz und Kolik gebräuchlichen Mittel anzuwenden.

Die Verschleimung der ersten Wege.

(*Pituita primarum viarum.*)

Doussin-Dubreuil (Par. 1799, nach der 8. Ausgabe in's Deutsche von Schlegel. Ilmenau 1823 u. 3. Aufl. 1825). — *Himmer* (Dresden 1828).

§. 1091.

Die Verschleimung der ersten Wege ist eine derartige Veränderung der Absonderung in der Schleimhaut der Schlingwege des Magens und des Darmkanals, dass hierdurch ein weisslicher, mehr oder weniger zäher Schleim gebildet wird.

§. 1092.

Die Zunge ist mit einem oft sehr zähen, dicken, hautartigen Schleim belegt, der Kranke hat einen faden, pappigen Geschmack, Mangel an Appetit und gewöhnlich auch keinen Durst, es fliesst ihm häufig der Speichel im Munde zusammen, besonders am Morgen, wo sich auch leicht Würgen im Halse und Erbrechen einstellt, dabei empfindet der Kranke mehr oder weniger Druck und Spannung in der Magengegend, er ist zu Blähungen geneigt, hat meistens Verstopfung und von Zeit zu Zeit auch schleimigte Durchfälle (*Diarrhoea mucosa*), bei höherm Grade des Uebels zeigt auch der Harn eine schleimigte Beschaffenheit und das Gesicht des Kranken erhält ein mehr blasses und aufgedunsenes Aussehen.

Dieser Krankheitszustand ist gewöhnlich langwierig. In Gesundheit geht er allmälig, zuweilen unter kritischen,

schleimigten Durchfällen über, den Tod kann er herbeiführen durch den Uebergang in Schleimfieber oder in einen allgemeinen kachektischen Zustand.

§. 1093.

Anlage geben ein schlaffer Körperbau und die scrophulöse, die chlorotische und andere Cachexien.

Gelegenheitsursachen sind der andauernde, zu reichliche Genuss geistiger Getränke und sehr gewürzter Speisen, der Missbrauch der Abführungsmittel, der Wurmreiz, der Genuss schlechter, zäher, fader Nahrungsmittel, eine sizende Lebensweise, Kummer, der Aufenthalt in einer feuchten Wohnung etc.

§. 1094.

Wesen. Die Entstehungsweise dieser Krankheit scheint eine verschiedene sein zu können. Oft wird die fehlerhafte Absonderung durch einen Reiz, der auf die Schleimhaut wirkt, hervorgebracht, wobei selbst die Reizung bis zum Entzündlichen sich steigern kann; in andern Fällen scheint ein Fehler der Säfte der Krankheit zum Grunde zu liegen, vielleicht wegen schlechter Nahrungsmittel oder unkräftiger Verdauung ein gewisser Mangel an Blutroth und Faserstoff und dagegen Vorherrschen von Eiweiss und Serum, und wie es scheint auch überwiegende Venosität bei Stockungen des Blutes im Pfortadersytem.

§. 1095.

Vorhersage. Die Verschleimung der ersten Wege wird nicht leicht lebensgefährlich, ist aber oft sehr hartnäckig.

§. 1096.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Oft ist es nothwendig, im Darmkanal befindliche Reize, wozu auch der in grösserer Menge angesammelte Schleim selbst gerechnet werden kann, durch Brechmittel und Abführungsmittel, und Würmer zugleich

durch Wurmmittel zu entfernen. Der Kranke ändere seine Lebensweise dahin, dass er von dem Genusse vieler geistiger Getränke mehr zu einer milden Nahrung übergehe, ist aber eine fade Nahrung, der Aufenthalt in feuchter Luft, eine sizende Lebensart etc. Schuld, mehr der Fleischnahrung und des Weines sich bediene und häufig sich Bewegung im Freien mache.

§. 1097.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Ist der Darmkanal in einem gereizten Zustand, so sind oft mehr die besänftigenden Mittel geeignet, die Absonderung zum Normalen zurückzuführen, und daher die Zunge zu reinigen, als Mittel, die die Absonderungen im Darmkanal befördern, daher Oelmixturen, Getränke von Graswurzel, Süssholz, Molken, und selbst ein vorsichtiger Gebrauch von Opium. Ist der Darmkanal weniger gereizt und die Absonderung in *der* Art verändert, dass ein zäher Schleim bereitet wird, so dienen verflüssigende Mittel, die Salze in kleinen und zeitweise auch in grössern Gaben, besonders die mildern Salze, wie der Tartarus tartarisatus und der Tartarus natronatus, welche sehr passend in Verbindung mit auflösenden Extracten, z. B. dem von Taraxacum, Marrubium album, Fumaria etc. verbunden werden können. Bei höherm Grade von Reizlosigkeit dienen die Rhabarber, das Gummi Ammoniacum, Gummi Guajacum, die Aloe, die Jalappe und das Calomel. Den Beschluss der Kur macht man gerne mit bittern Mitteln, dem Extractum Millefolii, Cardui benedicti, Centaurei m., Gentianae und zulezt mit der China, welche Mittel die Neigung zur vermehrten Absonderung allmälig beschränken und zu einer bessern Blutbereitung beitragen.

Der wässerige Durchfall.

(*Diarrhoea serosa.*)

Lambsma (Amsterdam 1756). — *Dewar* (London 1805). — *Colson* (Paris 1808). — *Fritsch* (Breslau 1822).

§. 1098.

Wässerigen Durchfall nennen wir die Stuhlentleerungen, welche wegen zu reichlich abgesonderten Darmsäften und des Saftes der Bauchspeicheldrüse eine flüssige Beschaffenheit erhalten haben.

§. 1099.

Es geht entweder die wässerige Flüssigkeit unvermischt und nur durch etwas darin aufgelösten Koth braun gefärbt ab, oder es sind ihr verschiedene Substanzen beigemischt, oft Galle (Diarrhoea biliosa), saure Stoffe zugleich mit Galle (Diarrhoea acida), Schleim (Diarrhoea mucosa), Jauche, oft mit Blutwasser vermischt (Fluxus hepaticus), eine milch- oder eiterartige Flüssigkeit (Fluxus coeliacus), Blut (Diarrhoea cruenta), unverdaute Speisen (Lienteria), und nicht leicht finden diese Ausscheidungen in Form des Durchfalls statt, ohne dass nicht zugleich mit ihnen wässerige Entleerungen vorkommen; doch werden sie, da sie besondere Krankheitsarten bilden, in besondern Kapiteln abgehandelt werden.

§. 1100.

Der einfache wässerige Durchfall, d. h. derjenige, welcher nicht mit den genannten Ausscheidungen verbunden ist, gibt sich durch mehr oder weniger flüssige Stuhlentleerungen zu erkennen, in welchen, ausser mehr oder weniger Koth, nichts als eine wässerige Flüssigkeit wahrgenommen werden kann. Oft ist die Beimengung von Koth bedeutend, so dass die Stuhlentleerungen mehr

breiartig werden oder mit vielem Wasser auch Kothklumpen entleert werden (Diarrhoea stercoracea), oft ist es eine wässerige, nur etwas braun gefärbte Flüssigkeit (die gewöhnliche Diarrhoe). Diese Stuhlentleerungen erfolgen oft ohne Vorboten, nur mit plözlich eintretendem, schnell sehr dringend werdendem Bedürfniss zum Stuhlgang, oft gehen ihnen Kneipen im Leibe, Abgang von Blähungen, ein Kollern im Bauche und zuweilen auch heftige Kolik voraus, in welchem Falle dieselben, und wenn sie durch Verkältung entstanden sind, den Namen Diarrhoea rheumatica erhalten.

Gewöhnlich lässt der Durchfall nach einigen flüssigen Stuhlentleerungen wieder nach, zuweilen wird er aber auch sehr langwierig oder kehrt, wenn er gestillt ist, immer von Neuem wieder zurück. In diesen Fällen wird die Haut trockener, der Harn geht sparsamer ab, der Kranke hat vielen Durst, gewöhnlich Verdauungsbeschwerden und seine Kräfte werden erschöpft.

§. 1101.

Die gewöhnlichen Ursachen des serösen Durchfalles sind der Genuss zu vieler oder schwerverdaulicher Nahrungsmittel, z. B. des unreifen Obstes, oder der zu reichliche Genuss der geistigen Getränke, und Verkältung, besonders der Füsse und des Unterleibs. Ausserdem wird er veranlasst durch Kothansammlungen, den Wurmreiz, den Missbrauch der Abführungsmittel, so wie auch durch den Reiz von Galle, saurem Magensaft, Schleim, Eiter, Blut, von Desorganisationen oder entzündeten Stellen im Darmkanal, endlich auch zuweilen durch niederschlagende Gemüthsaffecte, insbesondere Furcht, den Zahnreiz, schnell geheilte Flechten, Fussgeschwüre etc.

§. 1102.

Das Wesen des serösen Durchfalles ist: erhöhter Verflüssigungsprozess in den Capillargefässen der Schleimhaut des Darmkanals und in der Bauchspeicheldrüse mit

vermehrter peristaltischer Bewegung. Der Krankheitsprozess hat wohl immer mehr oder weniger den Character der Reizung, welche idiopathisch, consensuell und antagonistisch erregt sein kann. Oft geschieht die Absonderung theilweise auf Geschwürflächen und ist mehr jauchigt, was aber in den Stuhlentleerungen sich meistens nicht erkennen lässt.

§. 1103.

Vorhersage. Der einfache wässerige Durchfall wird selten lebensgefährlich und ist meistens leicht zu heben, doch wird er auch zuweilen hartnäckig. Nicht selten ist er selbst wohlthätig.

§. 1104.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Der Kranke vermeide während des Durchfalles den Genuss blähender Gemüse, des Obstes, wenigstens der Zwetschgen, Pflaumen und alles nicht gehörig reifen Obstes, des Salates, insbesondere des Gurkensalates, der kalten Milch, der Sauermilch etc., und geniesse dagegen gebrannte Mehlsuppe, Mehlspeisen, Eier, Chocolade u. s. w. Er halte seinen Unterleib und seine Füsse warm. Oft ist es nothwendig, im Magen und Darmkanal vorhandene Reize durch Brechmittel, wozu am besten die Ipecacuanha gewählt wird, und selbst durch Abführungsmittel zu entfernen, doch dürfen die leztern Mittel nur bei sicherer Diagnose und nur mit Vorsicht gebraucht werden.

§. 1105.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um die erhöhte Sensibilität zu mässigen, wendet man einhüllende Mittel an, wie Abkochungen von Salep oder Eibisch, Mandelmilch, Hanfsamenmilch, arabisches Gummi, das Decoctum album Sydenhami (Nro. 5) etc., ferner Chamillen-, Melissenthee, die Ipecacuanha in kleinen Gaben, narkotische Mittel und zwar vorzüglich

das Opium, welches das Hauptmittel gegen Durchfälle ist (Nro. 23, 63 und 64). Hiermit verbindet man Klystire mit Amylum und Opium oder von einer Abkochung von Hanfsamen, in der Quantität von 3 bis 4 Unzen Flüssigkeit, sanft beigebracht. Auch sind, besonders bei'm rheumatischen Durchfalle, die innerlichen schweisstreibenden Mittel und warme Bäder sehr nüzlich. — Genügen diese Mittel nicht und ist der Reizungszustand im Darmkanal nicht zu bedeutend, so gibt man die dem Verflüssigungsprozess entgegenwirkenden tonischen und adstringirenden Mittel, wie Columbowurzel (Nro. 65), das Extractum Cascarillae, Tormentillwurzel, die Arnicawurzel, die Rhabarber in kleinen Gaben, den Zimmt, rothen Wein, Kinogummi, Ratanhia, Alaun, auch Bleizucker mit Opium, Eisenmittel etc. — Zugleich können geistige und gewürzhafte Dinge in den Unterleib eingerieben werden (Nro. 66), und aromatische oder Opiatpflaster, und auch bei grösserer Hartnäckigkeit Blasenpflaster und andere Ableitungsmittel auf denselben gesezt werden.

Der jauchige und der eiterige Bauchfluss.

(*Diarrhoea ichorosa, Fluxus hepaticus.*)

Richter (Journal d. Erfindg. 4tes und 5tes Stück).

§. 1106.

Zuweilen bemerkt man, dass die flüssigen Stuhlentleerungen eine röthliche, dem Fleischwasser ähnliche Farbe haben. Dieses kann bei einer gewöhnlichen serösen Absonderung durch die Beimengung von etwas Blut geschehen, wie dieses in der Ruhr, bei Hämorrhoiden,

bei einer Hinneigung zum Scorbute etc. der Fall sein kann, in andern Fällen ist die Flüssigkeit ihrem Wesen nach mehr eine blutige Jauche (Diarrhoea ichorosa), welche aus krebshaften und andern Geschwüren im Darmkanal, aus Geschwüren in der Leber (Fluxus hepaticus) oder aus andern mit dem Darmkanal in Verbindung stehenden Theilen ausgeschieden wird. Oft ist die entleerte Flüssigkeit durch Beimengung einer weisslichen, gräulichen und gelblichen Materie getrübt und es schwimmt auch diese Masse theilweise obenauf, oder sezt sich mehr zu Boden und klebt an dem Kothe an; auch bemerkt man hiebei oft weisse, grünliche und gelbliche, in der Flüssigkeit schwimmende Borken. Diese Stoffe sind in der Regel die Erzeugnisse von Verschwärungen im Darmkanal und ihr Vorkommen ist mit mancherlei Krankheitszufällen verbunden, welche in dem Kapitel von den Darmgeschwüren angegeben worden sind.

Die Behandlung ist die der angegebenen Desorganisationen in den Gedärmen.

Die Milchruhr.

(Fluxus coeliacus, Fluxus chylosus, Diarrhoea chylosa.)

Rud. Aug. Vogel (resp. Sothen, Diss. Goett. 1768). — *Uhthoff* (Diss. Goett. 1787). — *Richter* (med. chir. Bemerk. B. 1.).

§. 1107.

Milchruhr wird der langwierige Bauchfluss genannt, welcher in dem gewöhnlich ohne Kothentleerungen erfolgenden Abgange einer weisslichen, milchartigen Materie besteht und Abzehrung herbeiführt.

§. 1108.

Diese seltene Krankheit wird auf folgende Weise beschrieben. Dem Bauchflusse gehen verschiedene Verdauungsbeschwerden voran, Magendrücken, Brennen im Magen, saures Aufstossen, Mangel an Esslust, zuweilen aber auch Gefrässigkeit, Aufblähungen des Leibes, dumpfe Schmerzen in verschiedenen Theilen des Unterleibes, zuweilen aber auch wirkliche Kolik etc. Hierzu kommt nun ein, vorzüglich nach dem Genusse von Speisen unter Drängen zum Stuhlgange und unter Stuhlzwang erfolgender Abgang einer weissen, oft auch gräulichen und gelblichen, zuweilen mit Blutstreifen vermischten, milch- oder rahmartigen Flüssigkeit, in der Menge von etwas mehr oder weniger als einem Löffel voll. Gewöhnlich geht hierbei nur wenig oder kein Koth ab, indem die gewöhnlichen Stuhlentleerungen meistens schon am Morgen statt fanden, oder es zeigt sich wenigstens die abgegangene Materie von dem Kothe getrennt. Zuweilen erfolgen solche Entleerungen sehr häufig, selbst jede halbe Stunde. Es werden hierdurch die Kräfte des Kranken erschöpft und es gesellen sich zulezt Zehrfieber und auch wassersüchtige Anschwellungen hinzu. — Bei den Leichenöffnungen fand man die Darm- und Gekrösdrüsen angeschwollen.

§. 1109.

Als Ursachen werden beschuldigt: die scrophulöse Cachexie, Würmer, insbesondere Askariden, Hämorrhoiden, die Onanie und das Erdulden der Pädrastie, langwierige Durchfälle und Ruhren, zurückgetretene Gicht, Kräze, Milchversezung etc.

§. 1110.

Wesen. Man hielt früher die Krankheit für den Abgang von Chylus, der wegen Verschliessung der aufsaugenden Gefässe und der Gekrösdrüsen nicht aufgenommen werde; genügender ist aber die Erklärung von

Richter, welcher sie für eine Absonderung von eiterartigem Schleime in der Schleimhaut des Mastdarmes hält und ihr den Namen Fluor albus intestini recti beigelegt wissen will. Zuweilen mögen diesem Uebel auch Geschwüre im Mastdarm zum Grunde liegen.

§. 1111.

Vorhersage. Die Krankheit ist sehr gefährlich und schwer zu heilen.

§. 1112.

Behandlung. Man entferne den Reiz, der die krankhafte Absonderung unterhält. — Man sucht die Absonderung zu beschränken, wozu die gewöhnlichen, gegen hartnäckige Durchfälle dienlichen Mittel, wie das Opium, Columbo, Cascarille etc., gebraucht werden können. Auch sind Kalkwasser, Terpenthin, Copaivbalsam, so wie reizmildernde und auch zusammenziehende und andere verschiedenartige Klystire empfohlen worden, namentlich solche von kaltem Wasser, von Kalkwasser, von Sublimatauflösung.

Die Magenruhr.

(*Lienteria, Laevitas intestinorum.*)

Rud. Aug. Vogel (resp. Biel, Diss. Goett. 1770). — *Friedreich* (Würzburg 1824).

§. 1113.

Magenruhr wird der Durchfall genannt, in welchem die genossenen Speisen, selbst wenn sie sehr leicht verdaulich sind, unverändert abgehen.

§. 1114.

Mancherlei Störungen in den ersten Wegen gehen diesen Stuhlentleerungen voraus. Heisshunger mit öfters

sich einstellendem Erbrechen (Hundshunger, Fames canina, Cynorexia) oder auch Mangel an Appetit oder Abneigung gegen gewisse Speisen, z. B. Milchspeisen, ein Gefühl von Leere im Magen bei Ausdehnung der Herzgrube, Magenschmerzen, Kolik, Aufblähen etc. Gewöhnlich gehen die Speisen und Getränke sehr bald, selbst nur wenige Minuten nach dem Genusse derselben, meistens unter Leibschneiden unverändert und ohne allen Geruch mit Schleim, Blut oder Galle vermischt oder auch unvermischt ab, zuweilen erfolgt der Abgang dieser Stoffe aber auch erst am andern Tage. In der Zwischenzeit dauern verschiedene Unterleibsbeschwerden fort, auch geht der Harn sparsam und mit Brennen ab, und es entstehen oft Schwämmchen im Munde etc. In Genesung soll diese Krankheit vorzüglich unter vermehrtem Harnabgang und dem Eintritt von saurem Aufstossen und Sodbrennen, welches ein Zeichen der wiederbeginnenden Veränderung der Speisen sei, übergehen, in den Tod durch Auszehrung, nachdem ein Zehrfieber hinzugetreten ist, und auch durch sich hinzugesellende Wassersucht.

§. 1115.

Als entferntere Ursachen der Magenruhr werden beschuldigt langwierige Ruhren, Schwämmchen, die Schwindsucht, der Scorbut und andere Cachexien, contagiöse und gastrische Fieber, unterdrückte Hautausdünstung, zurückgetretene Gicht.

§. 1116.

Wesen. Den Krankheitszustand des Darmkanals, der diesen krankhaften Entleerungen zum Grunde liegt, haben Einige in Erweiterung und Erschlaffung des Pylorus geseztt, Andere aber wohl mit Recht in eine aus erhöhter Reizbarkeit des Magens und Darmkanals entspringende beschleunigte, peristaltische Bewegung mit vermehrter Absonderung. Hierbei muss wohl zugleich ein

aus irgend einer Ursache darniederliegendes Verdauungsgeschäft angenommen werden, wodurch selbst auf die ganz fein vertheilten Nahrungsstoffe die von der Magenwandung ausgehende lebendige Anziehung nicht stattfindet und daher diese Stoffe mit den zur Ernährung unbrauchbaren Substanzen durch die Stuhlentleerungen abgehen.

§. 1117.

Vorhersage. Die Magenruhr ist eine sehr gefährliche Krankheit, besonders bei alten Individuen, und schwer zu heilen.

§. 1118.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Zuweilen ist es nothwendig, durch ein gelindes Brech- oder Abführungsmittel einen vorhandenen Reiz aus dem Magen und dem Darmkanal zu entfernen. Der Kranke geniesse nur wenig, aber eine kräftig nährende und, wenn kein entzündungsartiger Zustand vorhanden ist, die Verdauungskraft erregende Nahrung, wie weich gesottene Eier, eine gewürzhafte Chocolade, rothen Wein etc.

§. 1119.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Es können hier die nämlichen Verfahrungsweisen stattfinden, wie bei der Behandlung eines gewöhnlichen langwierigen Durchfalles. Nur selten werden eigentliche entzündungswidrige Mittel passen oder nur einhüllende Mittel genügen. Am meisten ist wohl von dem Opium, in Verbindung mit tonischen Mitteln, namentlich mit Columbo zu erwarten. Man verbindet damit das Auflegen von Theriakpflaster und aromatischen Pflastern auf die Magengegend, aromatische und geistige Einreibungen in dieselbe, aromatische Bäder u. s. w. Auch sind die Absonderungen in der Haut und in den Nieren auf angemessene Weise zu befördern. Dem Kranken ist hierbei

zu empfehlen, nicht zu oft, sondern nur, wann es unumgänglich nothwendig ist, zu Stuhle zu gehen.

Die Ruhr.

(*Dysenteria, Difficultas intestinorum.*)

Sydenham (opp.). — *Pringle* (Beobachtungen über d. Krankheiten d. Armee. Th. 3.). — *K.* u. *G. Strack* (Mainz 1760 u. Leyd. 1766). — *Zimmermann* (Zürich 1767). — *Ackermann* (lat. Leipz. 1777). — *Stoll* (rat. med. P. III.). — *Richter* (med. chirurg. Bemerk. B. I.). — *Vogler* (Giess. 1797). — *Horn* (Erf. 1806). — *v. Wedekind* (herausgegeben v. Dannenberg, Frankf. a. M. 1811). — *L. Frank* (de peste, dysenteria et ophth. aegypt. Wien 1820). — *Malik* (Prag 1828). — *Kreysig* (im encyclopäd. Wörterb. der med. Wissensch. B. IX. Berl. 1833).

§. 1120.

Die Ruhr ist eine mehr oder weniger hizig verlaufende Krankheit, welche sich vorzüglich durch ein sehr oft sich wiederholendes Bedürfniss zum Stuhlgang, verbunden mit Stuhlzwang, und durch den Abgang von einer grössern oder kleinern Menge wässeriger, schleimiger oder blutiger Flüssigkeit zu erkennen gibt.

§. 1121.

Gewöhnlich gehen dem Eintritte der eigentlichen Ruhrzufälle verschiedene Störungen in den Verdauungswegen, insbesondere Durchfälle und Leibweh, so wie auch rheumatische, katarrhalische und zuweilen auch fieberhafte Erscheinungen voraus. Sodann, oder auch ohne diese Vorläufer, stellt sich ein immer stärker werdendes Drängen zum Stuhlgange ein, das der Kranke vorzüglich in dem Mastdarme wahrnimmt und womit ein Gefühl von Hize, Brennen und Spannen und auch heftigere schneidende Schmerzen verbunden sind (der Stuhlzwang, Tenesmus). Unter diesem Drange zum Stuhlgange wird

nun eine wässerige, von Koth gefärbte Flüssigkeit entleert, in welcher meistens viele weissliche Flocken schwimmen, die zum Theil auch gelblich und grünlich gefärbt sind und auch Blutstreifen zeigen, oft gehen auch häutige Stücke, wie von Pseudomembranen, ab, zuweilen ist viele weissliche eiterartige Flüssigkeit in dem Entleerten enthalten (die weisse Ruhr), oft ist viel Blut mit ihr gemischt oder es geht selbst reines Blut ab (die rothe Ruhr), in manchen Fällen wird auch auf einige Zeit die Absonderung ganz unterdrückt, so dass ungeachtet des heftigen Drängens Nichts entleert wird (die trockene Ruhr). Durch das heftige Drängen fällt zuweilen der Mastdarm vor und kann, wenn er nicht zurückgebracht wird, in den Brand übergehen. Es werden oft diese Anstrengungen so stark, dass Uebelkeit, Neigung zum Erbrechen und zur Ohnmacht und bei Kindern selbst Gichter eintreten. Solche Stuhlentleerungen oder auch ohne Erfolg bleibende Anstrengungen hiezu wiederholen sich oft nur einigemal des Tages, oft aber auch sehr häufig, jede Viertelstunde und noch öfter. Häufig verbinden sich mit diesen Beschwerden ähnliche in der Blase, schmerzhaftes Harnlassen und Harnverhaltung. In den höhern Graden der Krankheit gesellt sich ein Fieber hinzu, das deutlich nachlassend ist.

§. 1122.

Die gewöhnliche einfache Ruhr hat eine Dauer von 8 bis 14 Tagen, dehnt sich aber auch auf 4 Wochen und eine längere Zeit aus. In die Gesundheit geht sie unter allmäligem Nachlass der Zufälle und unter Wiedereintritt normaler Kothentleerungen und meistens unter Schweissen und kritischem Urin über. — Zum Tod kann sie durch Erschöpfung der Kräfte, durch den Hinzutritt von Krämpfen und durch Metastasen auf edle Organe führen. — Folgekrankheiten der Ruhr sind: langwierige Durchfälle, bei welchen sich zuweilen noch

einzelne ruhrartige Zufälle zeigen (Dysenteria chronica), Verstopfung, Vorfall des Afters, Magenruhr, aus Versezungen entstandene Uebel, wie, nach *Richter*, eine katarrhalische Bräune, Entzündungen der Lunge, des Gehirnes, Blindheit, Taubheit, Abscesse in den Ohrendrüsen, rheumatische Geschwülste, Ausschläge, Geschwüre in der Haut etc., endlich als Folge der Entkräftung Wassersucht.

§. 1123.

Durch verschiedene Umstände kann das Krankheitsbild etwas verändert werden. Oft ist die Ruhr von starken, reissenden Schmerzen im Kreuze und in den Gliedern, rheumatischen, oft wandernden Geschwülsten und von besonders heftigem Leibschneiden, so wie auch von katarrhalischen Zufällen begleitet (Dysenteria rheumatica, catarrhalis). Zuweilen werden die Schmerzen im Unterleibe anhaltend und festsizend, der Bauch wird empfindlich und aufgetrieben, das Drängen zum Stuhlgang ist heftig, aber es wird wenig oder nichts dadurch entleert oder es geht reines Blut ab, und es stellen sich häufiges Erbrechen, Fieber mit sehr gereiztem Pulse, Kopfweh, Delirien und mehr oder weniger alle Zufälle einer heftigen Darmentzündung ein (Dysenteria inflammatoria). — In andern Fällen sind besonders gallichte Erscheinungen hervorleuchtend, die Kranken haben einen stark bittern Geschmack, gallichtes Erbrechen, die unter Stuhlzwang abgehenden Entleerungen sind stark mit gallichten Stoffen gefärbt, die Haut wird trocken und gelblich, der Urin safranfarbig, es gesellt sich ein Fieber mit schnellem und heftigem Pulse, das gerne in's Nervöse übergeht, hinzu (Dysenteria biliosa). — Endlich zeichnen sich manche Krankheitszufälle durch grosse, oft schnell eintretende Erschöpfung der Kräfte, leicht sich hinzugesellendes Irrereden, Sehnenhüpfen, Flockenlesen, Petechien, Schwämmchen, äusserst stinkende Beschaffenheit

der Stuhlentleerungen und überhaupt durch die Ausbildung eines nervösen und fauligten Zustandes aus (Dysenteria nervosa, putrida, maligna).

§. 1124.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Man findet vorzüglich in der Schleimhaut des Mastdarmes mehr oder weniger ausgebreitete entzündete Stellen, zuweilen einen bläschenartigen Ausschlag, zwischen Friesel und Eczema stehend, Geschwüre, im Zeitraume der Vernarbung warzenähnliche Granulationen, Pseudomembranen, Verdickungen der Häute und Brand, ausserdem auch Spuren von Entzündungen in andern Theilen des Darmkanals, Anschwellungen der Gekrösdrüsen, Entzündung der Leber, seröses, eiteriges und blutiges Extravasat im Unterleibe etc.

§. 1125.

Ursachen der Ruhr sind vorzüglich schneller Temperaturwechsel und Erkältung, daher die Krankheit als Volkskrankheit vorkommt, wenn eine schwüle Hize mit kalter und nasser Witterung wechselt, oder die Tage heiss und die Nächte kühl sind, wie am Ende des Sommers und in heissen Klimaten, ferner wenn bei Armeen die Soldaten die Nächte auf feuchter Erde und unter freiem Himmel zubringen müssen etc., doch finden bei ausgebreiteten Ruhrepidemien nicht immer diese Einflüsse statt, so wie diese Ursachen auch häufig vorhanden sind, ohne dass die erwähnte Krankheit herrscht, und es muss daher bei solchen Epidemien noch eine andere, uns noch unbekannte Schädlichkeit wirken, wie auch z. B. die Grippe nicht allein bei einem Wechsel in der Witterung ausbricht, sondern einer uns noch unbekannten Eigenschaft der Atmosphäre ihren Ursprung zu verdanken scheint; ferner befördern die Sumpfluft und die Ausdünstung vieler Kranken und ihrer Excremente die Entstehung der Ruhr, vielleicht wird sie auch zuweilen,

wenn sie in das Fauligte übergeht, ansteckend, doch scheint dabei kein Contagium im engsten Sinne des Wortes, wie z. B. das der Blattern ist, sich zu entwickeln, sondern die abgesonderten Stoffe nur als specifischer Reiz auf die Schleimhaut des Darmkanals zu wirken, wie die Schnupfenmaterie auf die Schneiderische Haut wirkt. Zuweilen mögen auch schlechte Nahrungsmittel Ruhrepidemien veranlassen, z. B. verdorbenes Getreide, unreife oder verdorbene Erdäpfel, unreifes Obst etc. Bei einzelnen Individuen mögen auch ruhrartige Zufälle durch verdorbene Galle, zurückgetretene Gicht etc. hervorgebracht werden können.

§. 1126.

Das **Wesen** der Krankheit suchte die griechische Schule in Eiterung der Gedärme, *) *Sydenham* in einem Fieber, das seine Richtung gegen die Gedärme genommen habe, *Linné* glaubte, die Krankheit sei eine Art Kräze des Darmkanals, die durch eine eigene Milbenart (Acarus Dysenteriae) hervorgebracht werde, *Cullen*, *Hufeland*, *Horn* hielten sie für ein krampfhaftes Leiden der Dickdärme, in der neuern Zeit sehen viele Aerzte, nach *C. Aurelianus*, *Fr. Hoffmann's*, *P. Frank's* und Anderer Vorgang die Krankheit für eine rheumatische oder katarrhalische Affection der Gedärme oder auch, wie *Wedekind*, *Marcus* u. A., für wirkliche Entzündung und zwar des Mastdarmes an.

Es möchte wohl kaum in Zweifel gezogen werden können, dass bei der Ruhr eine entzündliche Affection der Schleimhaut des Dickdarmes statt findet, es ist hiermit viel Krampf verbunden und die Absonderungen sind in der Regel vermehrt, doch ist hierdurch noch nicht die ganze Natur der Krankheit aufgeklärt, da die ent-

*) Die Geschichte der Ansichten über die Natur der Ruhr hat *Haase* ausführlich gegeben. Chron. Krankh. 2te Aufl. 3ter B. S. 253 u. d. f.

ferntern Ursachen meistens unbekannt sind und man die Wege nicht kennt, auf welchen der Mastdarm ergriffen wird. Ist es unmittelbare Reizung des Mastdarms durch Stoffe, die von Aussen in den Darmkanal gelangen, und warum veranlassen sie nicht vielmehr Krankheit des Magens und der dünnen Gedärme? Sind Stoffe im Blute, die auf den Darmkanal abgelagert werden und diesen in einen gereizten Zustand versezen, und warum wenden sie sich gerade gegen den Mastdarm? Ist es eine consensuelle oder antagonistische Affection, durch Einwirkung von Schädlichkeiten auf die Haut erzeugt, und warum befällt dieselbe bei ganzen Volksmassen die dicken Gedärme?

§. 1127.

Die Vorhersage richte sich vorzüglich nach dem Character der Epidemie. Oft gibt es Seuchen, die zahlreiche Opfer fordern, oft kommen beinahe gar keine Todesfälle vor. Unter den angegebenen Abweichungen von der gewöhnlichen Form der Krankheit sind die nervöse und fauligte und sodann die gallichte und die entzündliche Ruhr die gefährlichern.

§. 1128.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Um Verkältung zu vermeiden, muss der Kranke den Unterleib durch eine flanellene Binde und die Füsse durch wollene Strümpfe warm halten, oder im Bette liegen bleiben, er gehe bei kaltem oder windigem Wetter nicht auf den Abtritt, sondern bediene sich eines Nachtstuhles oder der Bettschüssel. Der Kranke geniesse keine schwerverdauliche, blähende oder zu reizende Speisen, halte sich dagegen mehr an leichte Suppen, bei entzündlichem oder gallichtem Character an gekochtes Obst, wie gekochte Kirschen, Zwetschgen, Heidelbeeren und an Buttermilch, und bei Bedürfniss zu besserer Ernährung, an kräftige Fleischbrühsuppen

mit Reis, Gerste, Sago, weichgesottene Eier, leichte Mehlspeisen etc. — Zuweilen, wie z. B. öfters in der gallichten Ruhr, ist es nothwendig, im Darmkanal liegende Reize hinwegzubringen, man bewirke dieses nach Umständen entweder durch ein Brechmittel aus Ipecacuanha oder durch gelinde Abführungsmittel, wie öligte Mittel, Manna, Tamarinden, Weinsteinrahm etc.

§. 1129.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* In den gelindern Fällen wird die erhöhte Lebensthätigkeit im Darmkanal schon durch einhüllende Mittel, wie Abkochungen von Eibisch, Salep, Emulsionen von Mandeln, Hanfsamen, Mohnsamen, Auflösungen des arabischen Gummi, durch schleimigte Klystire und durch schweissbefördernde Mittel, wie die schweisstreibenden Thee, den Spiritus Mindereri, starkes Zudecken etc. gemässigt. Genügen diese Mittel nicht, so sind bei etwas stärker hervorstechendem krampfhaftem Zustande die Narcotica und unter ihnen vorzüglich das Opium, aber auch die Blausäure, die Nux vomica u. a. anzuwenden. Auch scheint die Ipecacuanha in kleinen Gaben auf den untern Theil des Darmkanals krampfstillend zu wirken. — Ist der Reizzustand bis zu einer vollkommenen Darmentzündung gesteigert, so müssen Aderlässe vorgenommen oder Blutegel gesezt werden. — Opium passt bei der entzündlichen Ruhr wegen der die Absonderungen im Darmkanal unterdrückenden Wirkung, wenn nicht ein sehr heftiger Krampf es durchaus erfordert, nicht, dagegen sind mehr einhüllende und verflüssigende Mittel, wie Oelmixturen, gekochtes Obst, Tamarinden und in den heftig entzündlichen Fällen Calomel anzuwenden. Unter den bei der Darmentzündung gebräuchlichen äusserlichen Mitteln können, wegen der bei den häufigen Stuhlgängen leicht eintretenden Verkältung, nicht wohl feuchte Umschläge gemacht werden, dagegen eher ein in er-

wärmtes Fett getauchter Flanell aufgelegt und warme Bäder angewandt werden. — Ist die Reizung nur unbedeutend und sind dagegen die flüssigen Stuhlentleerungen stark, so können, neben dem Opium, auch tonische Mittel in Anwendung gebracht werden, namentlich Columbo, die Cascarille, die Simaruba, die Arnicawurzel, die Rhabarber in kleinen Gaben, der rothe Wein. Diese Mittel sind besonders bei den nach der Ruhr oft noch einige Zeit fortdauernden ruhrartigen Durchfällen in Gebrauch zu ziehen.

§. 1130.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Kommt ein entzündliches Fieber hinzu, so muss das ganze Verfahren antiphlogistisch sein, nur dürfen die Salze, wegen der Reizung des Darmkanals, nicht gegeben werden. — Wird der Zustand nervös oder faulicht, so sind Wein, Valeriana, Serpentaria, Campher, die Mineralsäuren etc. zu Hilfe zu ziehen.

Die Harnruhr.

(*Diabetes, Dipsacus, Hydrops ad matulam, Urorrhoea.*)

Trnka de Krzowiz (lat. Wien 1778). — *Sprengel* (resp. Creuzwieser. Diss. 1794). — *Rollo* (a. d. Engl. v. Heidmann. Wien 1801, dasselbe von Jugler übersezt. Stendal 1801). — *Knebel* (Material. zu theoret. u. prakt. Heilk. B. I.). — *Formey* (vermischte med. Schriften. B. I.). — *Venables* (Lond. 1825). — *v. Stosch* (Berlin 1828).

§. 1131.

Die Harnruhr ist eine, gewöhnlich mit vermehrtem Harnabgange verbundene, in der Art veränderte Absonderung des Urins, dass durch dieselbe zur Ernährung nothwendige Bestandtheile des Körpers ausgeschieden werden und daher Abzehrung erfolgt.

§. 1132.

Die Krankheit beginnt gewöhnlich mit Störungen in der Verdauung, namentlich Sodbrennen und andern Zeichen der Säure, der Kranke hat dabei starken Hunger, heftigen Durst und Trockenheit im Munde, seine Haut wird trocken und selbst schuppig, er bemerkt allmälig, dass viel Harn abgeht, der Urin hat meistens eine strohgelbe Farbe und ist hell, zuweilen ist er aber auch trübe, molkenartig, er hat nicht den gewöhnlichen Harngeruch, riecht dagegen oft mehr süsslich-säuerlich oder nach Manchen den Veilchen ähnlich, er ist entweder ohne Geschmack (Diabetes insipidus), wobei er aber sehr reichhaltig an Eiweiss ist, oder er hat einen süsslichen Geruch und Geschmack und hinterlässt abgedampft ein zuckerhaltiges Extract, das sich überlassen in weinigte oder saure Gährung übergeht (Diabetes mellitus); auch fand man den Auswurf und das in den geschwollenen Füssen enthaltene Serum zuckerhaltig. [1]) Der von einem Tag gesammelte Harn beträgt oft 30 bis 50 Pfunde, und meistens mehr, als der Kranke flüssige und feste Nahrung zu sich nimmt, doch ist die Menge des Harnes nicht immer vermehrt. Bei dem Harnen empfindet der Kranke oft Schmerzen und es ist ihm, wie wenn kalte Tropfen in die Blase fielen, zuweilen ist Unvermögen, den Harn zu halten, vorhanden. Die Vorhaut schwillt oft an, es sammelt sich unter ihr eine käsige Materie an und sie wird wund. Der Kranke magert allmälig ab, seine Kräfte schwinden, sein Speichel wird zähe, das Zahnfleisch geschwollen, seine Stimme heiser, oft kommt ein säuerlicher, stinkender Geruch aus dem Munde vor, endlich gesellen sich ein Zehrfieber, Durchfälle und Wassergeschwülste hinzu.

Die Krankheit hat einen sehr langwierigen Verlauf.

1) Mittheil. aus Bonn in *Sachs* med. Zeitung. 1832. Nro. Y.

Der Tod wird durch Erschöpfung der Kräfte herbeigeführt.

§. 1133.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Man hat Verhärtungen der Leber und der Gekrösdrüsen gefunden (*Mead*), Schlaffheit und Weichheit der Nieren (*Ruysch*), Verhärtungen, Steine und Geschwüre in den Nieren (*Ballonius*), erweiterte, Steine haltende Harnleiter (*Fr. Hoffmann*), Erweichung aller Knochen (*Pott*), eine Menge Gallerte in der Fetthaut (*Duncan*), ein trübes Blut von molkiger Farbe und süssem Geschmack (*Dobson*, lezteres auch *P. Frank*), das Blut in eine chocoladefarbige Flüssigkeit von süsslich-saurem Geruch verwandelt, die Muskeln und alle sonst rothen Theile des Körpers ebenso gefärbt und in der Vena subclavia den Milchsaft vom Blute getrennt (*Marshal*), einen moschusartigen Geruch der Leiche, das Blut süsslich, braun und mangelhaft mit dem Chylus gemischt (*Michaelis*). [1])

§. 1134.

Ursachen. Die Krankheit soll beinahe nur bei Männern vorkommen und die Anlage dazu zuweilen erblich sein. — Als Gelegenheitsursachen werden beschuldigt: der Missbrauch geistiger Getränke und auch der harntreibenden Mittel, Geschlechtsausschweifungen, niederdrückende Gemüthsaffecte, der zu reichliche Genuss von Pflanzennahrung, unterdrückte Schweisse, zurückgetretene Gicht, Rheumatismus, Hautausschläge, Geschwüre, Verhärtungen von Eingeweiden, Nierensteine etc.

§. 1135.

Wesen. Aeltere Schriftsteller suchten die Krankheit aus einer Auflösung und Schärfe des Blutes zu erklären, *Mead* u. A. aus Verstopfung der Leber und

1) Vergl. hierüber *Dreyssig*, *Haase* und *Conradi*.

andern Fehlern der Baucheingeweide, wodurch eine fehlerhafte Galle bereitet und die Verdauung gestört werde und ein fehlerhafter Chylus zu den Nieren gelange, — *R. A. Vogel* aus einem Leiden der Nieren selbst, das entweder in einer Reizung und Krampf oder in Atonie und Erweiterung der Gefässe bestehen könne, — *Darwin* aus einer rückgängigen Bewegung in den Saugadern von dem Ductus thoracicus gegen die Nieren, wodurch es komme, dass der Chylus nicht in diesen, sondern in die Nieren abgelagert werde, auch glaubte er, dass die genossenen Getränke, ohne in die Blutmasse überzugehen, durch besondere Gefässe zu den Nieren geführt würden, — *Kausch* aus einem Krampf der Haut, wodurch die wässerigen Feuchtigkeiten nicht ausgedünstet, sondern zu den mit der Haut in Sympathie stehenden Nieren geleitet würden, — *P. Frank* sucht eine Analogie zwischen der Hundswuth und der Harnruhr nachzuweisen, und glaubt, dass auch bei dieser Krankheit ein eigenes Gift im Körper erzeugt werde, wodurch gleichsam ein Fieber im Saugadersystem hervorgebracht und dadurch ein zu schneller Uebergang des noch rohen Milchsaftes bewirkt werde, welcher sodann zu den Nieren geleitet und in Form des Zuckerstoffes ausgeschieden werde. — In der neuern Zeit hat man nach *Rollo's* Vorgang vorzüglich die Bildung der zuckerartigen Bestandtheile des Urins zu erklären gesucht. *Rollo* nimmt eine krankhaft vermehrte Thätigkeit des Magens an, wodurch der Magensaft vermehrt abgesondert und übermässig Säure gebildet werde, hierdurch würde aus den Pflanzenstoffen Zucker erzeugt, wegen geschwächter Assimilation komme aber der Zucker des Milchsaftes unverändert zu den Urinwerkzeugen und würde durch diese ausgeleert. — *Hufeland* findet eine Analogie zwischen der Steinerzeugung und der Harnruhr, in beiden Krankheiten sei ein Ueberschuss von freier, thierischer Harnsäure vorhanden, diese

verbände sich in dem einen Falle mit Schleim oder Erde und erzeuge den Stein, in dem andern Falle mit andern Stoffen und bringe Zucker hervor. — *Haase* erklärt die Harnruhr für eine dynamische und chemische Krankheit zugleich, es werde, meistens durch Störung der Funktion der Leber und der Milz, eine Hyperoxydation der Magen- und Darmsäfte hervorgebracht. Diese wirken nun zum Theil als Reiz, wodurch die Resorption im Darmkanal und in der Haut und die Absonderung in den Nieren vermehrt würden, was, so lange die Krankheit rein dynamisch bleibe, den Diabetes insipidus darstelle, zum Theil wirke aber die Säure chemisch auf die zur Nahrung gebrauchten Pflanzenstoffe, wodurch auf eine ähnliche Weise Zucker bereitet würde, wie man nach *Kirchhof's* Entdeckung vermittelst concentrirter Schwefelsäure aus Stärkmehl Zucker gewinnen könne. Der Zucker gelange aus den ersten Wegen in's Blut und werde mit dem Urin ausgeschieden (der Diabetes mellitus). — Endlich verdient die Ansicht *Formey's* Erwähnung, welcher die nächste Ursache in einem von dem Rückenmarke und dem Gangliensystem ausgehenden krankhaft vermehrten Nerveneinfluss auf die Harnwerkzeuge sucht.

§. 1136.

Vorhersage. Die Harnruhr ist höchst gefährlich, insbesondere soll die zuckerartige Harnruhr, wenigstens bei ältern Individuen, beinahe immer tödtlich sein und auch schneller als der Diabetes insipidus das unglückliche Ende herbeiführen. Auch macht die Harnruhr leicht Rückfälle und wechselt oft nach *Desault's*, *P. Frank's* und *Raimann's* Erfahrungen mit Wassersucht ab.

§. 1137.

Behandlung. Nach Verschiedenheit der Ansicht, die man von der Natur der Krankheit hatte, sind verschiedene Heilmethoden empfohlen worden. In der Voraussezung eines entzündlichen Leidens der Nieren hat

man Blutentleerungen gerühmt und will von ihnen grossen Nuzen gesehen haben (*Watt*, welcher zugleich Entziehung von Nahrung, Queksilber, kohlensaures Ammonium, Kalkwasser und Blasenpflaster empfiehlt). — Um den vermehrten Nerveneinfluss zu mindern, lässt *Formey* bei magerer Diät Blutegel längs dem Rückgrathe sezen, denselben mit kaltem Wasser waschen und begiessen, und wendet dabei bald Calomel, bald Opium, Campher, Flores Zinci, oder Wismuthkalk an. — In der Voraussezung des Vorhandenseins eines gereizten und krampfhaften Zustandes der Nieren gibt man schleimige Getränke, das Opium, so wie auch die Valeriana, die Asa foetida, Zinkoxyd, Kupfersalmiak nach *Frank*, und wendet auch Brechmittel von Ipecacuanha an nach *Richter*. — Zu demselben Zwecke und indem man glaubt, die Krankheit entstehe durch Zurückhaltung der Hautausdünstung, empfiehlt man schweisstreibende Mittel, insbesondere das *Dover*'sche Pulver, den Campher, warme Bäder, Dampfbäder und indem man zugleich eine vermehrte Aufsaugung in der Haut annimmt, Oeleinreibungen. — Indem man den Grund der Krankheit in Erschlaffung der Nieren suchte, hat man tonische und selbst stark reizende Mittel empfohlen, wie die Rhabarber, Hb. Uvae Ursi, die China, die Eichenrinde, Galläpfel, Gummi Kino, den Alaun, Eisen, die Mineralsäuren, kalte Bäder, die Canthariden. — Um die Säure zu tilgen, in der man die Ursache des Leidens zu finden glaubte, hat man Magnesia carbonica, das Kalkwasser, das Kali sulphuratum etc. in Anwendung gebracht. — Um die Erzeugung des Zuckers zu verhindern, hält *Rollo* eine rein animalische Kost für nothwendig, er empfiehlt insbesondere weiche Eier, Wildbret, Schweinefleisch, Blutwurst, fettes ranziges Fleisch, Lachs, Aal, fetten Käs, zum Getränk Milch mit Kalkwasser, Wasser mit Pfeffermünzwasser und rohem Eidotter, Fleischbrühe, Rhum mit

Milch etc. Zugleich lässt er den Kranken ein wollenes Hemd tragen, seine Haut alle Morgen mit Speck einreiben und gibt ihm zuerst das Kali sulphuratum zu 1 bis 2 Drachmen täglich in Wasser aufgelöst und späterhin das Ammonium hydrogenato-sulphuratum (Liquor fumans Boylei), welches kräftig desoxydirend und zugleich die erhöhte Sensibilität beschränkend wirkt, im Anfang zu 3 oder 4 und allmälig steigend zu 12 Tropfen viermal täglich in destillirtem Wasser in Verbindung mit Opium und Antimonialmitteln.

Unter den angegebenen Heilverfahren scheint das von *Rollo* empfohlene den Vorzug zu verdienen; übrigens kann man nach Verhältniss der Umstände auch verschiedene zugleich anwenden, namentlich scheint der Uebergang zu den tonischen Mitteln, wenigstens gegen das Ende der Krankheit oft nothwendig zu werden. Man kann diese Mittel auch gebrauchen, wenn man die vermehrte Absonderung auch nicht von Atonie herleitet, indem sie überhaupt die Absonderungen beschränkend wirken und wegen der eintretenden Erschöpfung der Kräfte oft nöthig werden. Vielleicht werden sich auch die Cubeben, die eine so auffallende Wirkung auf die Geschlechts- und Harnorgane bei'm Tripper und andern fehlerhaften Absonderungen äussern, nüzlich erweisen.

D e r S a a m e n f l u s s.

(*Gonorrhoea, Spermorrhoea.*)

Tissot (von der Onanie, 1ste Auflage. Lausanne 1760). — *Wichmann* (lat. Göttingen 1782, deutsch. Altenburg 1791). — *Fried. Hildebrand* (Braunschweig 1792). — *Doussin Dubreuil* (aus dem Franz. 1807, 4te Aufl. Pesth 1827). — *Leo-Wolf* (Bremen 1810). — *Wildberg* (Berlin 1817).

§. 1138.

Der Saamenfluss ist eine krankhaft vermehrte, auf eine geringe Reizung oder auch ganz ohne eine solche erfolgende Absonderung und Ausleerung des Saamens und des Saftes der Vorsteherdrüse.

§. 1139.

Die zu reichliche Ausleerung des Saamens ist eine sehr häufige Krankheitsursache und wird als solche in der allgemeinen Krankheitslehre betrachtet, so wie das Kranksein, das hierauf folgt, vollständig in dem Kapitel von der Rückenmarksdarre beschrieben werden wird; sie selbst ist aber nur dann Krankheit, wenn sie auf einem krankhaften Zustande des Absonderungsorgans beruht, was daran erkannt werden kann, dass die Ausleerung des Saamens erfolgt, ohne dass ein solcher Reiz eingewirkt hat, der auch im gesunden Zustande den Abgang des Saamens bewirkt. Nur solche Saamenentleerungen können als krankhafte Absonderung betrachtet werden. Man nimmt drei Grade dieses Uebels an: 1) die zu häufigen Ergiessungen des Saamens im Schlafe (die nächtliche Befleckung, Pollutio nocturna), diese ist jedoch selten Krankheit des Absonderungsorgans, sondern in der Regel Folge von wollüstigen Träumen und vom Reiben des Gliedes; 2) die im wachenden Zustand und auf einen geringen Reiz, z. B. schon durch Erregung der Phantasie

und oft ohne vollkommene Erection erfolgende Saamenentleerung (Pollutio diurna), und 3) der ohne alle Reizung und ohne das Gefühl der Wollust, entweder nur zeitweise, z. B. bei'm Harnen, bei'm Stuhlgange, bei'm Gehen etc., oder anhaltend tropfenweise erfolgende Abgang des Saamens (Gonorrhoea completa).

Man kann auf zu häufige Saamenentleerungen bei einem Individuum schliessen, wenn dasselbe in den Jahren ist, in welchen die Onanie am häufigsten stattfindet, das heisst in den nächstfolgenden 6 bis 10 Jahren nach eingetretener Mannbarkeit, und dabei dasselbe ein blasses Aussehen und etwas tief liegende Augen und Ringe um dieselben hat, wenn der Herzschlag leicht sehr vermehrt wird, der Kranke über Mattigkeit und andere fehlerhafte Gefühle klagt, ohne dass man von denselben einen andern genügenden Grund auffinden kann, wenn er sehr besorgt um seinen Körper, niedergeschlagen und zugleich verlegen ist, wobei die Kranken gewöhnlich den Arzt nicht anschauen, sondern den Blick auf die Seite wenden.

Die nachtheiligen Folgen des Saamenflusses sind zunächst das Gefühl der Schwäche und Schläfrigkeit an dem Tage, an welchem die Saamenentleerung stattfand, sodann allmälig erfolgende, bleibende Kraftlosigkeit des Körpers, Abmagerung, Schwäche der Verdauung, Niedergeschlagenheit des Geistes, Schwäche des Gedächtnisses, Schwäche der Sinne, insbesondere schwaches Sehvermögen, zulezt die Rückendarre.

§. 1140.

Der eigentliche Saamenfluss entwickelt sich mit seinen nachtheiligen Folgen in der Regel nur langsam und hat daher einen langwierigen Verlauf. Die Gesundheit stellt sich nach dem Aufhören der Gelegenheitsursache allmälig wieder her, doch bleibt bei schon weit gekommenem Uebel oft eine dauernde Schwäche des Körpers, Nervenschwäche, Schwäche des Geistes und häufig männliches

Unvermögen zurück. Den Tod können die zu häufigen Saamenentleerungen durch die Rückenmarksdarre und auch durch Schlagfluss zur Folge haben.

§. 1141.

Ursachen. Die Krankheit kommt am häufigsten unmittelbar nach eingetretener Mannbarkeit und bei schwächlichen und sehr reizbaren Subjecten vor.

Die vorzüglichste Gelegenheitsursache ist Onanie, auch tragen die Ausschweifungen in der Phantasie viel zur Erhöhung der Reizbarkeit der Geschlechtstheile bei und sind bei schon eingetretenem krankhaftem Zustande derselben schon hinreichend, die Absonderung und Entleerung des Saamens zu bewirken. Seltener hat der Beischlaf selbst den eigentlichen (krankhaften) Saamenfluss zur Folge, wiewohl sein Missbrauch ebenfalls grosse Störungen der Gesundheit nach sich ziehen kann. Ausserdem kann der Saamenfluss auch durch den Missbrauch der Urin treibenden und auf die Geschlechtstheile wirkenden Mittel, durch zu reichliche und reizende Nahrung, durch Würmer und andere Reize im Unterleibe, durch Geschwüre der Ausführungsgänge, der Vorsteherdrüse und der Saamenbläschen, und auch durch zu grosse Enthaltsamkeit, wenn zugleich die Phantasie aufgereizt ist, erregt und befördert werden.

§. 1142.

Vorhersage. Der Erfolg der Behandlung hängt vorzüglich von dem Grade der Willenskraft des Kranken ab, durch welche derselbe den aufgeregten Naturtrieb zu bekämpfen im Stande ist. Der Saamenfluss des dritten Grades (die Gonorrhoea completa) ist häufig unheilbar.

§. 1143.

Als das Wesen der Krankheit muss ein gereizter, jedoch nicht entzündlicher Zustand der Geschlechtstheile, insbesondere der die Saamenfeuchtigkeit absondernden

Theile, wodurch die Absonderung vermehrt wird, betrachtet werden.

§. 1144.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Es kommt Alles darauf an, den Kranken von der Onanie und den Reizungen der Geschlechtstheile durch die Phantasie abzuhalten. Hierzu ist es zweckmässig, um die Willenskraft des Kranken zu erregen, demselben die grossen Gefahren, welche die zu häufigen Saamenentleerungen nach sich ziehen hönnen, zu offenbaren. Der Kranke gebe dem Spiel der Phantasie keinen Raum, er vermeide böse Gesellschaft und das Lesen schlüpfriger Bücher, er beschäftige sich andauernd mit andern Gegenständen, die die Aufmerksamkeit fesseln, er ermüde sich durch geistige und körperliche Arbeiten, so dass sich Abends der Schlaf gewaltsam seiner bemächtigt, er bediene sich einer etwas sparsamen Nahrung, besonders am Abend, er schlafe auf einem nicht zu weichen Lager, er suche sich Morgens aus dem Halbschlafe, in welchem am häufigsten die Pollutionen eintreten, zu erwecken und stehe sodann gleich auf. Um bei beginnenden Erectionen Aufwachen zu bewirken, hat man das Einbinden der Hoden sammt dem Gliede in einen Tragbeutel empfohlen. Oft ist es gut, in das Schlafzimmer des Kranken noch ein anderes Individuum zu legen, damit er aus Scheu vor demselben die Selbstbefleckung unterlasse und auch um ihn zur geeigneten Zeit aus dem Schlafe zu wecken. — Würmer, Anhäufung von Koth in dem Darmkanale und andere Reize müssen entfernt werden. — Um die stete Aufregung der Phantasie zu vermeiden, ist im gehörigen Alter der mässige Genuss der physischen Liebe oft das beste Mittel.

§. 1145.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um die erhöhte Reizbarkeit der Geschlechtstheile

herabzustimmen, ist der Kampher innerlich und äusserlich als Einreibung etc. gebraucht als specifisches Mittel empfohlen worden, doch ist die Wirkung dieses Mittels nicht sehr bedeutend. Das ebenfalls empfohlene Opium kann durch die auf seinen Gebrauch nachfolgende Schwäche schaden, und ist wohl nur anzuwenden, wenn besondere Zufälle seinen Gebrauch anzeigen. Zu demselben Zwecke und um die Absonderung des Saamens zu beschränken, dienen kühlende Getränke, die Mineralsäuren, das Fluss- und Seebad, welche auch durch die bewirkte Ermüdung nüzen, kalte Umschläge auf das Mittelfleisch und kalte Waschungen der Geschlechtstheile, wiewohl es in der Regel rathsamer ist, keine örtlichen Mittel anzuwenden, um nicht hierdurch die Phantasie des Kranken in Thätigkeit zu sezen, bei grosser Atonie und beständiger Absonderung der Saamenflüssigkeiten sind auch tonische und die balsamischen Mittel in Anwendung zu bringen. Endlich hat man auch die Castration vorgeschlagen.

§. 1146.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Bei andauernder Schlaflosigkeit und bei grosser Aufregung im Nervensystem leistet das Opium oft sehr gute Dienste. Bei stark sinkenden Kräften sind gut nährende, aber nicht erhizende Nahrungsmittel und der vorsichtige Gebrauch der stärkenden Heilmittel angezeigt. Ueber die Behandlung der aus zu starken Saamenentleerungen entspringenden Krankheitszufälle ist übrigens das Kapitel von der Rückendarre zu vergleichen.

Der Tripper.

(*Schleimfluss der Harnröhre, Blennorrhoea urethralis, Gonorrhoea.*)

Allen (Diss. Lugd. Bat. 1751). — *Tode* (1te Aufl. 1774, 3te Aufl. 1790, 2 Bde.). — *Baldinger* (lat. Göttingen 1778). — *Murray* (lat. Gött. 1785, a. d. lat. Gött. 1794) — *Hecker* (Erf. 1802.) — *Whately* (aus d. Engl. v. Töpelmann, mit 1 K. Leipzig 1806). — *Töpelmann* (Lpz. 1809) — *Cullerier* (m. Zusäzen v. Renard, Mainz 1815). — *Ritter* (Lpz. 1819). — *Eisenmann* (Erlang. 1830, 2 Bde.).

§. 1147.

Der Tripper ist ein mit entzündlichen Zufällen verbundener, schleim- oder eiterartiger Ausfluss aus der Harnröhre, und beim weiblichen Geschlecht zugleich aus der Scheide, welcher Ansteckungsfähigkeit besizt.

§. 1148.

Gewöhnlich 6 — 8 Tage nach einem unreinen Beischlaf entsteht ein Jucken und Brennen in der Harnröhre, vorzüglich an der Mündung derselben und in der Gegend der kahnförmigen Grube, und es zeigt sich dieselbe an ihrer Oeffnung geröthet und etwas angeschwollen (urethritis). Es beginnt nun eine zuerst dünne, schleimige und bald dick und eiterartig werdende, gewöhnlich gelblich, zuweilen auch grünlich aussehende und manchmal auch mit Blutstreifen gemischte Materie auszufliessen. Bei dem Wasserlassen nimmt das schmerzhafte Gefühl zu, besonders empfindet der Kranke bei demselben ein sehr heftiges Brennen, er hat sehr häufige und oft mehr anhaltende, schmerzhafte Erectionen, wobei, wenn die schwammigen Körper entzündet sind, wegen der an der entzündeten Stelle nicht stattfindenden Ausdehnung des Gliedes eine schmerzhafte Krümmung desselben (Chorda)

entsteht. Wegen der mehr oder weniger stattfindenden Anschwellung der innern Haut der Harnröhre fliesst oft der Harn nur in einem dünnen Strahle aus. Zuweilen ist auch die äussere Fläche der Eichel entzündet und sondert eine eiterartige Flüssigkeit ab (der Eicheltripper), wobei oft oberflächlich Excoriationen statt finden. Ziemlich häufig entzündet sich die Vorhaut, schwillt an und kann nicht mehr hinter die Eichel zurückgezogen werden (Phimosis); tritt aber die Entzündung der Vorhaut ein, wenn sie sich hinter die Eichel zurückgezogen befindet, so kann sie nicht mehr über die Eichel vorgezogen werden, schnürt diese ein und veranlasst Anschwellung und selbst Brand derselben (Paraphimosis). Manchmal schwellen auch die Leistendrüsen an (consensuelle Bubonen) und auch zuweilen ein Hode.

Beim weiblichen Geschlechte findet ebenfalls Brennen in der Harnröhre statt, der schleim- und eiterartige Ausfluss kommt aber zugleich aus der Scheide und diese ist geröthet und oft beträchtlich angeschwollen.

Erreicht bei dem Tripper der entzündliche Zustand einen sehr hohen Grad, so wird die Absonderung oft ganz unterdrückt (der trockene Tripper), es werden die Schmerzen hierbei sehr beträchtlich, es schwellen auch in diesem Falle besonders leicht die Leistendrüsen und die Hoden an, es entsteht zuweilen eine sehr gefährliche Augenentzündung und auch Entzündungen der Gelenke und es gesellt sich selbst Fieber hinzu.

§. 1149.

Die Dauer des Trippers ist sehr verschieden. In den leichtern Fällen 3—4 Wochen, wo sodann die Schmerzen beim Harnlassen geringer werden, der Ausfluss wieder mehr schleimartig wird und sich zulezt die Zufälle ganz verlieren; zuweilen wird der Tripper aber ganz langwierig, die Heftigkeit der Zufälle lässt hierbei zwar ebenfalls nach, es fliesst aber noch Monate und selbst Jahre

lang eine dünne, weissliche, schleimige Flüssigkeit, besonders beim Harnlassen, in geringer Menge aus (der Nachtripper). Folgekrankheiten des Trippers sind Verengerungen (stricturae) der Harnröhre, durch Verdickung der die Harnröhre umkleidenden Haut und durch Auswüchse erzeugt, Anschwellung der Vorsteherdrüse und auch zuweilen eine langwierige eiterartige Absonderung in der Blase, den Harnleitern und selbst den Nierenkelchen.

§. 1150.

Die *Unterscheidung* des Trippers vom weissen Flusse ist oft schwierig. Das Vorhandensein des Trippers muss angenommen werden, wenn der Ausfluss sogleich mit Brennen beim Harnlassen beginnt und die Scheide, besonders in der Gegend der Oeffnung der Harnröhre sich entzündet zeigt; es ist dagegen die Krankheit als weisser Fluss anzuerkennen, wenn der Ausfluss unmerklich beginnt und nur allmälig zunimmt und wenigstens im Anfange mit keinem Brennen verbunden ist, und wenn er dagegen mit Ziehen im Kreuze und mit einer allgemeinen Cachexie in Verbindung steht und nicht anhaltend ist, sondern nur vor oder nach der monatlichen Reinigung erscheint, oder die Stelle derselben vertritt. Es kann übrigens der weisse Fluss auch anhaltend sein, mit keiner Cachexie in Verbindung stehen, mit keinen Kreuzschmerzen verbunden sein und eine scharfe Beschaffenheit erhalten haben.

§. 1151.

Als Ursachen des Trippers werden dreierlei Arten von schädlichen Einflüssen beschuldigt.

1) Reize, die auf die Harnröhre wirken, aber keine ansteckenden Stoffe sind. Hieher gehören scharfe Substanzen, welche durch Einsprizungen oder auf Bougies in die Harnröhre gebracht worden sind, Quetschungen der Harnröhre, Reizung der Blase und der Geschlechtstheile durch den Genuss von scharfen Stoffen, wie von

Canthariden, Terpenthin, jungem Wein und Bier etc. Metastasen von Flechten, die scrophulöse und gichtische Dyscrasie u. s. w., auch wird der Beischlaf mit einer unreinlichen oder gerade mit dem Monatlichen behafteten Person beschuldigt. Von diesen Ursachen wirken einige nur höchst selten ein, andere vermögen wohl kaum eine schleim- oder eiterartige Absonderung in der Harnröhre hervorzubringen, und wenn dieses auch geschieht, so ist die Frage, ob diese Eiterung dieselbe Krankheit wie der eigentliche Tripper sei, in welchem ein eigenthümlicher, ansteckender Stoff gebildet wird. Ich glaube z. B. nicht, dass Eiter, welcher durch eine Quetschung der Harnröhre entstanden ist, anstecke.

2) Ein eigenthümliches Trippercontagium. Es scheint dieses von dem syphilitischen verschieden zu sein, da so höchst selten auf den so häufig vorkommenden Tripper die Lustseuche folgt, in welchen Fällen selbst noch immer die Möglichkeit angenommen werden kann, dass neben der Ansteckung durch den Tripper auch eine Mittheilung von syphilitischem Gifte statt fand, und da auch der Tripper eine ganz andere Behandlung erfordert, als die Lustseuche.

3) Das syphilitische Gift. Es lässt sich wohl annehmen, dass das Schankergift, wie ein anderer Reiz, eine schleim- und eiterartige Absonderung in der Harnröhre hervorbringen könne, doch geschieht dieses gewiss sehr selten, da in der Regel der Schanker nur den Schanker fortpflanzt. Auch kann, wo scheinbar durch den Schanker der Tripper hervorgebracht worden ist, auch zugleich eine Ansteckung durch Trippercontagium geschehen sein.

§. 1152.

Der Tripper scheint seinem **Wesen** nach eine durch einen eigenthümlichen Ansteckungsstoff erzeugte Entzündung und schleim- und eiterartige Absonderung

in der Harnröhre, wodurch derselbe ansteckende Stoff von Neuem erzeugt wird, zu sein. Eiterungen in der Harnröhre, die nicht ansteckend sind, sollten nicht als dieselbe Krankheit betrachtet werden.

§. 1153.

Die Vorhersage ist, wenn der Tripper vor Kurzem entstanden ist, günstig, ein schon sehr lange dauernder Tripper ist dagegen oft schwer zu heilen. Durch die oben beschriebene eiterartige Absonderung in den Harnwerkzeugen kann der Tripper den Tod heibeiführen.

§. 1154.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Es muss alles das vermieden werden, was reizend auf die Harnröhre wirkt und was Erectionen veranlasst, daher der Beischlaf und der Genuss stark gesalzener Speisen, des Weines, des Bieres, heftige Bewegung durch Reiten etc. Die Hoden können durch einen Tragbeutel unterstüzt werden, damit sie weniger leicht anschwellen.

§. 1155.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Da das Leiden entzündlicher Natur ist, so ist eine nur sparsame Kost zu gestatten. Selten sind innerliche antiphlogistische Mittel nothwendig, und es ist selbst vortheilhafter als Salze, blos einhüllende Getränke, z. B. Mandelmilch oder Molken zu geben. Blutegel an das Glied gesezt oder allgemeine Blutentziehungen sind nur bei einem hohen Grade des entzündlichen Characters der Krankheit erforderlich und es genügt in der Regel die örtliche Anwendung von einhüllenden und besänftigenden Mitteln, z. B. durch Baden des Gliedes in lauer Milch und, was ich zu diesem Zwecke mit Vortheil anwende, das Einbringen von frischem Schweinefett in die Harnröhre. Bei starker Entzündung, z. B. bei der Chorda,

sind, nebst den örtlichen Blutentziehungen, auch erweichende Umschläge in Anwendung zu bringen. Ist das Entzündliche gemässiget, so werden die Mittel in Anwendung gebracht, welche auf specifische Weise auf die Schleimhaut der Harnwerkzeuge wirken und die Absonderung beschränken. Die gebräuchlichsten sind der Copaivbalsam (Nro. 65) und die Cubeben, auch sind Balsamum peruvianum, Balsamum tolutanum, das Terpenthinöl, das Roob Juniperi, Resina Guajaci, Tinctura Jodinae etc. empfohlen worden. Bei grosser Schlaffheit sind bei dem Nachtripper China, Gummi Kino, Ratanhia, Eisen etc. anzuwenden, scheint dagegen ein sehr sensibler Zustand Schuld des fortdauernden Schleimausflusses zu sein, so sind vorzüglich die Mineralsäuren in Verbindung mit Opium anzuwenden. Die Wirkung dieser innerlichen Mittel unterstüzt man durch Einsprizungen von Bleiwasser mit Opium, Kalkwasser, gehörig verdünnter Schwefelsäure, Auflösungen von Zink oder Sublimat, Abkochungen von Eichenrinde, Weidenrinde etc., auch kann man das Glied in kaltem Wasser baden lassen und aromatische Spiritus einreiben lassen.

§. 1156.

Nach einer neuern Behandlungsweise, die vorzüglich *Delpech* [1]) eingeführt hat und welche auch ich sehr vortheilhaft finde, wendet man, ohne auf den entzündlichen Zeitraum Rücksicht zu nehmen, sogleich und zwar in sehr grossen Gaben ein Mittel an, das sonst nur im zweiten Zeitraum und in kleinern Gaben gebraucht wurde, das aber den Krankheitsprozess auf eine noch unerklärte Weise oft sehr schnell beschränkt, die Cubeben. Man gibt dieses Mittel als Pulver wenigstens zu einer halben Unze täglich in vier Portionen getheilt, man steigt auch

1) Mémoire sur l'emploi du piper cubeba dans le traitement de la gonorrhée, Revue méd. 1822, Mai und Juni.

mit der Gabe viel höher, wie z. B. *Delpech* es that, der in manchen Fällen selbst zwei und drei Drachmen viermal täglich nehmen liess. Erregt das Mittel blos eine leichte Wärme im Unterleibe, so kann man dasselbe fortgebrauchen lassen, entstehen nur vorübergehende Leibschmerzen, so kann man ebenfalls das Mittel noch gebrauchen lassen, werden diese aber mehr anhaltend oder sehr heftig und entstehen Durchfälle, so muss man mit dem Mittel einige Tage aussezen, wornach man sodann wiederum mit kleinen Gaben beginnt. Man bewirkt oft auch, dass das Mittel besser ertragen wird, wenn man zugleich mit demselben einige Nahrungsmittel geniessen lässt. Das Mittel muss noch nach dem Verschwinden aller Erscheinungen ungefähr acht Tage fortgebraucht werden.

§. 1157.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Sind die Schmerzen sehr bedeutend, so dienen, nebst den gegen das Wesen der Krankheit selbst gerichteten Mitteln, ein angemessener innerlicher Gebrauch des Opiums und schmerzstillende Umschläge. — Gegen die Phimosis sind, wenn die Entzündung bedeutend ist, Blutentleerungen anzuwenden, in den gelinden Fällen aber reichen einhüllende und besänftigende Umschläge mit Zusaz von Bleiwasser, öfteres Baden des Gliedes in milden Flüssigkeiten, Anbringung von kühlem Fette und Einsprizungen zwischen die Vorhaut und die Eichel von erweichenden Dingen hin. Sind Schankergeschwüre unter der Vorhaut, so müssen zugleich Mittel, die gegen dieselben dienlich sind, zwischen dieselbe und die Eichel gebracht werden, z. B. vermittelst Einsprizung eine schwache Sublimatauflösung. Nur selten ist die Operation angezeigt, indem Harn und Eiter in der Regel einen gehörigen Abfluss finden; ist dieses nicht der Fall, so ist, so wie auch bei zurückbleibenden Verhärtungen und Verengungen, chirur-

gische Hilfe nothwendig. Bei ödematöser Geschwulst der Vorhaut sind aromatische Kräutersäckchen mit Kampher anzuwenden. — Die Paraphimosis wird zuweilen schon dadurch gehoben, dass man die Eichel mit der kalten Hand, auf welche man auch Schnee oder zerstossenes Eis legen kann, anfasst, oder kalte Umschläge auf dieselbe anbringt, wo sodann die Geschwulst der Eichel sich vermindert und die Vorhaut wiederum vorgezogen werden kann. Genügt dieses nicht, so müssen Blutegel gesezt und bei krampfhaftem Zustand Opium angewandt werden. Schwillt ein Hode an, so sucht man die Ausbildung der Geschwulst und Entzündung durch kalte Umschläge von Bleiwasser zu unterdrücken, wobei man zugleich, wenn der Tripper trocken wird, erweichende Umschläge um das Glied machen lässt. Ist der Hode schon geschwollen und stark entzündet, so sezt man Blutegel an den Damm und macht erweichende und besänftigende Breiumschläge. Auch kann man innerlich Calomel geben und nach gemässigter Entzündung bei grosser Schmerzhaftigkeit Opium damit verbinden. Bleibt eine Anschwellung und Härte des Hodens zurück, so kann man wiederholte Breiumschläge umlegen und die graue Quecksilbersalbe mit Campher einreiben lassen, wobei der Kranke stets den Tragbeutel beibehalten muss. Nicht leicht möchte die ebenfalls empfohlene örtliche Anwendung scharfer und reizender Mittel, wie der Abkochung von Cortex Mezerei, der Auflösung von Gummi Ammoniacum in Meerzwiebelessig, der Electricität etc., passen, indem hierdurch der Uebergang in Eiterung oder krebsartige Entartung des Hodens befördert werden kann. Auch hat man vorgeschlagen, einen neuen Tripper durch Einbringung von Kerzen, welche mit rother Praecipitatsalbe bestrichen sind, hervorzubringen. Nach *Delpech* werden entzündliche Geschwülste und Verhärtungen der Hoden, wenn sie durch den Tripper entstanden sind, ebenfalls durch Cubeben

geheilt. Ist der Uebergang in Eiterung oder krebshafte Entartung erfolgt, so ist chirurgische Hilfe nothwendig.

Die nach dem Tripper zurückgebliebene Verengerung der Harnröhre erfordert ebenfalls chirurgische Mittel.

Der weisse Fluss.

(*Fluor albus, Leucorrhoea, Medorrhoea.*)

Raulin (Tom. II. 1766, aus dem Franz. v. Riederer, mit einer Vorrede v. Ackermann, Nürnb. 1793). — *Trnka de Krzowitz* (Wien 1781). — *Mansfield Clarke* (Lond. 1814, a. d. Engl. v. Heinecken, Hannover 1818 — 1823. 2 Bde.). — *Sporer* (lat. Wien 1819). — *Dubouchet de Romans* (Paris 1825).

§. 1158.

Weisser Fluss wird der Ausfluss einer weisslichen, schleimigten Materie aus den weiblichen Geschlechtstheilen genannt, insofern derselbe nicht aus der Blase kommt oder der Tripper ist.

§. 1159.

Im Beginne des Uebels fliesst, ohne eine bemerkbare Veränderung in dem Allgemeinbefinden der Kranken, nur von Zeit zu Zeit eine geringe Menge einer milden, blassweisslichen, schleimigten Flüssigkeit ohne allen Schmerz aus. Zuweilen stellt sich dieser Ausfluss nur unmittelbar vor oder nach dem Eintreten der monatlichen Reinigung ein, in welchem Falle er weniger aus der Scheide, als aus der Gebärmutter zu kommen scheint. Allmälig wird dieser Ausfluss reichlicher und oft auch andauernd. Kommt er nur zur Zeit der Reinigung vor, so verdrängt er oft theilweise oder ganz dieselbe, indem statt reinen Blutes, nur eine röthliche, schleimigte

Flüssigkeit ausfliesst (der Blutschleimfluss oder die missfarbige Menstruation), oder auch reiner Schleim in beträchtlicher Menge abfliesst, endlich wird er auch in diesem Falle mehr anhaltend und die monatliche Periode deutet sich nur durch Vermehrung des schleimigten Abganges an. Die abgehende Materie enthält auch allmälig eine andere Beschaffenheit, sie wird oft ganz dicklicht, gelblicht, grünlich oder mehr bräunlich, oft auch sehr dünn, fressend scharf, und erhält einen eigenthümlichen, widerlichen, käseartigen Geruch. Hiebei stellen sich nun ein Jucken und Brennen in der Scheide und den äussern Geschlechtstheilen, und wenn der Ausfluss aus der Gebärmutter kommt, öftere Stiche in diesem Theile und oft auch ziehende Schmerzen im Kreuze ein, und bei der Untersuchung findet man die Schleimhaut der Scheide geröthet und geschwollen, wegen der angeschwollenen Drüschen etwas körnigt anzufühlen und in den äussern Theilen Frattsein. Vermittelst des Speculums erkennt man oft auch Geschwüre und andere Entartungen am Grunde der Scheide und an der Gebärmutter. Bei so hohem Grade des weissen Flusses verändert sich nun auch das Aussehen der Kranken, sie wird blass, aufgedunsen, erhält dunkle Ringe um die Augen, sie fühlt sich matt, leidet leicht an Nervenzufällen, die Verdauung wird gestört und es gesellen sich zulezt selbst hektisches Fieber oder wassersüchtige Anschwellungen hinzu.

Heilt der weisse Fluss, so wird er allmälig geringer und die monatliche Reinigung kommt wieder in Ordnung, zuweilen geschieht dieses, indem Hautausschläge ausbrechen, frühere Fussschweisse wieder zu Stande kommen etc. Den Tod kann er durch die grosse Menge des Ausflusses und Jahre lange Dauer durch Erschöpfung herbeiführen. Er hat auch leicht Unfruchtbarkeit und zuweilen Neigung zu Missfällen, die Bildung von Polypen, Verhärtungen etc. zur Folge.

§. 1160.

Anlage zum weissen Flusse haben sowohl solche Personen, welche ein schwammiges Fleisch haben, an der Bleichsucht, an Scropheln, an Verschleimung der ersten Wege etc. leiden, als auch sehr reizbare Individuen und insbesondere solche mit sehr regem Geschlechtstriebe.

Gelegenheitsursachen sind viele schwächende Einflüsse, wie andauernder Kummer, schlechte, fade, schleimigte Nahrungsmittel, der Aufenthalt in einer feuchten Atmosphäre, der zu reichliche Genuss erschlaffender Getränke, öftere Blutflüsse, besonders bei Missfällen, eine sizende Lebensart, langes Schlafen etc., so wie auch verschiedene Reize, welche auf die Schleimhaut der Scheide und der Gebärmutter wirken, wie Onanie, wollüstige Phantasie, zu häufiger Beischlaf, der Missbrauch der Feuerstübchen, Verlezung bei schweren Geburten, der Hämorrhoidalreiz, auf die Geschlechtstheile sich werfende Flechten, zurückgetretene Fussschweisse, Fussgeschwüre, Gicht, consensuelle Reizung durch Würmer, vielleicht auch durch starke Kothansammlung in den Gedärmen, in die Scheide gelangte Ascariden, in derselben liegen gebliebene Mutterkränzchen, Polypen in der Gebärmutter, Krebs und Markschwamm in derselben oder in der Scheide etc.

§. 1161.

Wesen. Es scheint der weisse Fluss auf zweierlei Weise entstehen zu können: durch Cacochymie, vielleicht durch überwiegend venöse oder wässerige Beschaffenheit des Blutes, Stockungen des Blutes in den Gefässen der Pfortader etc., wodurch dem absondernden Organ fehlerhafte Stoffe zu den bio-chemischen Prozessen dargeboten werden und die Absonderung verändert wird, und zweitens durch Reizung, und zwar mehr oder weniger einen entzündlichen Zustand der Schleimhaut, entweder durch

unmittelbar auf dieselbe wirkende Reize oder durch consensuelle oder antagonistische Erregung hervorgebracht, wodurch, ohne alle ursprüngliche Entmischung in den Säften, die Schleimabsonderung vermehrt und verändert werden kann.

§. 1162.

Vorhersage. Der weisse Fluss wird höchst selten lebensgefährlich, er widersteht aber öfters hartnäckig den Heilversuchen. Ein von Desorganisation in der Scheide oder der Gebärmutter herrührender weisser Fluss ist in der Regel unheilbar. Zuweilen verliert sich das Uebel bei grossen Umänderungen in der Lebensthätigkeit, z. B. bei eintretender Schwangerschaft, in Wechselfiebern etc. Ist die ausfliessende Materie mild, so ist eher Heilung zu erwarten, als wenn dieselbe jauchigt und scharf ist.

§. 1163.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Man ordne die gehörige Lebensweise an, empfehle insbesondere viele Bewegung im Freien, eine einfache und nahrhafte Kost, suche auf eine angemessene Weise nachtheiligen Geschlechtsreizungen vorzubeugen, suche Verstopfungen und Stockungen im Pfortadersystem zu heben, Würmer zu entfernen, wirke dem etwa vorhandenen herpetischen Leiden entgegen und untersuche in hartnäckigen Fällen die Geschlechtstheile, indem zuweilen in ihnen selbst die entferntere Krankheitsursache aufgefunden wird.

§. 1164.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Man empfiehlt gewöhnlich, wenn sich bei dem weissen Flusse ein Zustand von Reizung bemerkbar macht, einhüllende Einsprizungen, Bähungen und Bäder in Anwendung zu bringen, innerlich ein antiphlogistisches Verfahren eintreten zu lassen und im Nothfalle selbst Blut zu entziehen. Lezteres Mittel hat sich allerdings

zuweilen hilfreich bewiesen, doch möchte es selten angezeigt sein, und erstere Mittel vermögen allerdings die Reizung zu mässigen, aber sind wohl selten im Stande, den weissen Fluss zur Heilung zu bringen. — Bei mehr atonischem Zustande empfiehlt man die tonischen Mittel, das Extractum Millefolii, Trifolii fibrini, Quassiae, Gentianae, die China, die Ratanhia, die Mineralsäuren, Eisenmittel etc. Die grösste Wirkung äussern übrigens die balsamischen und gewisse scharfe, auf die Geschlechtsorgane wirkenden Mittel, wie Balsamum Copaivae, die Kubeben, die Sabina und die Canthariden. Mir scheinen die Kubeben das Hauptmittel in dieser Krankheit zu sein und auch da angewandt werden zu können, wo die Schleimhaut der Scheide in einem gereizten, entzündlichen Zustande sich befindet.

Mit diesen innerlichen Mitteln müssen zugleich äusserliche in Gebrauch gezogen werden, bei sehr scharfem Ausflusse Einsprizungen und Waschungen mit lauwarmer Milch, einer Abkochung von Mohnköpfen, etwa mit Zusaz von Quittenschleim etc., welche Mittel auch vermittelst eines Schwammes in die Scheide gebracht werden können, ausserdem aber Einsprizungen von kaltem Wasser, Kalkwasser, Bleiwasser oder Auflösungen von Zincum sulphuricum, Alaun etc., mit Zusaz von Opium, oder von einer Abkochung von Eichenrinde, Weidenrinde oder der Ratanhia. Auch sind örtliche und allgemeine Bäder, insbesondere Schwefel- und Stahlbäder, Waschungen des Unterleibs, des Dammes, der Kreuzbeingegend etc. mit Kamphergeist oder aromatischen Geistern und auch Räucherungen der Geschlechtstheile mit Weihrauch, Bernstein, Mastix etc. empfohlen worden.

Zweite Ordnung der krankhaften Absonderungen.

Verminderte und unterdrückte Absonderungen.

Die verminderte Hautausdünstung.

§. 1165.

Die krankhaft verminderte Hautausdünstung gibt sich, wenn sie mehr andauernd ist, durch eine besondere Trockenheit und Sprödigkeit der Haut zu erkennen, wobei die Epidermis sich gerne lostrennt, zuweilen ist auch die Haut in einem entzündeten Zustand, und oft auch entartet, wie z. B. in dem Fischschuppenausschlag und andern Hautkrankheiten. Meistens ist die andauernd verminderte Hautausdünstung mit innern Krankheiten verbunden, von denen sie meistens Symptom ist, namentlich mit Wassersucht, Harnruhr, Durchfällen, Lähmung etc.

§. 1166.

Die verminderte Hautausdünstung kommt nicht leicht als selbstständige Krankheit vor und gehört daher mehr in die Symptomatologie als in die specielle Krankheitslehre, und in so fern sie durch äussere Einflüsse erzeugt ist und Krankheiten hervorbringt, in die Aetiologie, und ist daher Gegenstand der allgemeinen Krankheitslehre. — Die Erregung einer vermehrten Hautausdünstung (Methodus diaphoretica) wird in der allgemeinen Therapie gelehrt.

Die verminderte und die unterdrückte Milchabsonderung.

(*Agalactia.*)

Bergius (Samml. auserlesener Abhandl. 2ter Bd.). — Die Schriftsteller über Weiberkrankheiten.

§. 1167.

Die angeführte Benennung wird der Krankheit gegeben, in welcher zur gewöhnlichen Zeit des Stillens die Milch im Verhältniss zum Bedürfniss des Kindes zu gering ist oder ganz fehlt.

§. 1168.

Die Milch erscheint nach der Niederkunft der Frau nur in geringer Menge in den Brüsten, so dass das Kind neben der Muttermilch nothwendig noch andere Nahrung erhalten muss, oder die Milchabsonderung kommt gar nicht zu Stande, oder sie vermindert sich wieder, oder bleibt aus, wenn sie schon in hinreichender Menge floss, was bald nach der Entbindung oder auch mehrere Wochen und Monate nachher geschehen kann. Gewöhnlich werden hierbei die Brüste klein, welk und wenig reizbar, doch können sie auch hart und schmerzhaft sein. Verliert sich die Milch allmälig, so hat dieses gewöhnlich für die Frau keinen Nachtheil, wird die Absonderung aber plözlich unterdrückt, so kann dieses Entzündung, Verhärtung und Eiterung in der Brustdrüse nach sich ziehen, so wie auch Entzündungen, Ausschwizungen und Eiterungen in andern Theilen (Milchmetastase, Milchversaz, Milchdepot, Metastasis lactis) zur Folge haben.

§. 1169.

Anlage zur Agalactia haben besonders Weiber von phlegmatischem Temperamente und schlaffem und fettem

Körperbau und solche, die erst in vorgerücktem Alter geheurathet haben oder in frühern Kindbetten nicht gestillt haben; auch soll die Anlage zur sparsamen Milchabsonderung oft ererbt sein.

Gelegenheitsursachen sind vorzüglich allgemein schwächende Einflüsse, insbesondere anhaltender Kummer, wenige und schlechte Nahrungsmittel, öfteres Nachtwachen und Krankheiten, die allgemein schwächend wirken, insbesondere die Schwindsucht, ferner erhöhte Thätigkeit in einzelnen Theilen des Körpers, die antagonistisch die Lebensthätigkeit in den Brustdrüsen beschränken, wie öfterer Beischlaf, neue Schwangerschaft, Entzündung der Gebärmutter, des Bauchfells (Kindbettfieber), starker weisser Fluss, Durchfälle etc.; endlich Einwirkungen auf die Brustdrüse, die einen zu hohen Grad der Reizung und wirkliche Entzündung hervorzubringen vermögen, wie z. B. Verkältung oder stockende Milch wegen unterlassenen Anlegens des Kindes.

§. 1170.

Wesen. Der krankhafte Zustand der Brustdrüsen, welcher der Unterdrückung der Milchabsonderung zum Grunde liegt, ist in dem einen Falle verminderte Lebensthätigkeit wegen geschwächter Nervenkraft oder Säftemangel, in dem andern Falle Entzündung.

§. 1171.

Die Vorhersage. Lebensgefährlich wird diese Krankheit wohl nur durch Metastasen und auch zuweilen dadurch, dass sie Verhärtungen in den Brustdrüsen zur Folge hat, die späterhin den Krebs nach sich ziehen können. Oft hält es sehr schwer, die Absonderung der Milch reichhaltiger zu machen.

§. 1172.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Man suche der stillenden Frau, welcher die

Milch auszubleiben droht, die gehörige Nachtruhe zu verschaffen, indem man das Kind in der Nacht der Pflege einer zuverlässigen Wärterin übergibt und nur der Mutter bringen lässt, wenn es an die Brust gelegt werden soll. Man untersage den Beischlaf. Sind Durchfälle, Blutflüsse, innere Entzündungen vorhanden, so müssen gegen dieselben die geeigneten Mittel angewandt werden. — Droht Verhärtung der Brustdrüsen zu entstehen, weil die Milch nicht gehörig entleert wird, was besonders bei Erstgebärenden gleich nach der Entbindung wegen schlechter Beschaffenheit der Brustdrüsen öfters der Fall ist, so suche man mit grösster Beharrlichkeit das Kind zum Trinken zu bringen, lasse durch erwachsene Personen, vermittelst Sauggläser, die Milch entleeren und gelingt dieses nicht, so lege man ein schon etwas älteres Kind, das stark zieht, so lange und so oft an die Brust, bis dieselbe weich wird und die Brustwarzen besser hervorgehoben sind.

§. 1173.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Liegt verminderte Lebensthätigkeit in den Brustdrüsen der verminderten Absonderung zum Grunde, so sucht man diese dadurch zu erhöhen, dass man die Nerventhätigkeit erregt und die Säftemasse vermehrt. Zu erstern Zwecke dient vor allem der Reiz vom Saugen des Kindes, welches daher sehr fleissig angelegt werden muss, und damit es stark ziehe, keine oder möglichst wenige Nahrung neben der Muttermilch erhalten darf, auch sollen Fenchel, Anis, Kümmel, Kerbel etc. specifisch auf die Brustdrüsen erregend wirken. Zum zweiten Zwecke empfehle man den reichlichen Genuss von kräftigen Nahrungsmitteln, von Fleischbrühe, von Eiern, Fleisch, frisch gemolkener Milch, einem nahrhaften Biere etc.

Ist die Unterdrückung der Milchabsonderung durch einen entzündlichen Zustand bedingt, so werden örtliche

und selbst allgemeine Blutentleerungen vorgenommen, erweichende Umschläge auf die Brust gemacht oder Baumwolle auf dieselbe gelegt und innerlich kühlende und eröffnende Mittel gegeben.

§. 1174.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Ist eine Metastase erfolgt, so sucht man die Lebensthätigkeit wieder nach den Brüsten hinzuleiten, indem man das Kind fleissig anlegt, reizende Umschläge auf die Brüste legt, dieselben reiben lässt, Ventosen auf dieselben oder ein Blasenpflaster zwischen die Brüste setzt.

Die verminderte Gallenabsonderung und die gehemmte Ablagerung der Galle in die Gedärme.

§. 1175.

Gelangt zu wenig Galle in den Darmkanal, so werden die Stuhlentleerungen sparsamer und das Entleerte hat eine festere Beschaffenheit und eine mehr in's Gräuliche spielende Farbe, fehlt die Galle ganz, so wird der Stuhlgang noch fester und erhält eine vollkommen graue Farbe; auch leidet mehr oder weniger die Verdauung, und es bildet sich leicht die krankhafte Säure des Magensaftes. Durch zu geringe Reinigung des Blutes in der Leber entstehen bei verminderter Gallenabsonderung eine vermehrte venöse Beschaffenheit des Blutes und Stockungen im Pfortadersystem und daher auch leicht Hämorrhoiden; indem aber andere Organe für die Leber in Thätigkeit treten und gallichte Stoffe absondern, entsteht Gelbsucht und nach Umständen

Gallenfieber. Die gleichen Zufälle entstehen auch, wenn die Galle keinen Abfluss aus der Gallenblase in den Zwölffingerdarm findet, nur bildet sich hier noch leichter die Gelbsucht oder das Gallenfieber aus, es entstehen leicht in der Gallenblase Gallensteine und die Anfüllung der Gallenblase und der Gallengänge veranlasst verschiedene örtliche Beschwerden. Zugleich mit den, durch die verminderte Absonderung der Galle oder die gehemmte Ablagerung der Galle hervorgebrachten Symptomen, welche die Verstopfung, die Plethora abdominalis, den Status atrabilarius und die Gelbsucht, so wie das Gallenfieber begleiten, sind mit diesen Zuständen die Erscheinungen, die die Krankheit der Leber characterisiren, verbunden, die Symptome der Entzündung, der Physconie, der Verhärtung der Leber etc.

Die Entscheidung zur Gesundheit geschieht durch den Wiedereintritt der Gallenabsonderung und Ablagerung der Galle in den Darmkanal. Der Tod wird herbeigeführt durch Gallenfieber, Gelbsucht und die auf Desorganisation in der Leber leicht folgenden Nachkrankheiten, insbesondere Wassersucht.

§. 1176.

Die Ursachen, die Vorhersage und die Behandlung der verminderten Gallenabsonderung und der gehemmten Gallenablagerung in die Gedärme werden bei der Darstellung der Gelbsucht, der Krankheitsform, in welcher die erwähnten Krankheitszustände der Leber vorzüglich vorkommen, angegeben werden.

Die verminderte Absonderung der Darmsäfte und des Saftes der Bauchspeicheldrüse.

§. 1177.

Die Haupterscheinung der verminderten Absonderung der Darmsäfte und des pancreatischen Saftes ist die Verstopfung, von welcher in einem besondern Kapitel die Rede sein wird. Ausserdem kann auch die Hemmung dieser Absonderungen verschiedene andere Zufälle zur Folge haben, wie z. B. die Unterdrückung der Absonderung des pancreatischen Saftes den Speichelfluss und die Hemmung aller genannten Absonderungen Congestionen nach dem Gehirne und den Lungen etc. Auch kommt die Unterdrückung der erwähnten Absonderungen häufig nur als Symptom anderer Krankheiten vor und tritt daher in Verbindung mit sehr verschiedenartigen Krankheitszufällen auf, mit den Zufällen der Darmentzündung, des Scirrhus der Bauchspeicheldrüse, der Wassersucht, des übermässigen Schwizens, der Lähmung eines Theiles des Rückenmarkes etc.

§. 1178.

Die Ursachen der Unterdrückung der Absonderung der Darmsäfte und des pancreatischen Saftes, so wie die Prognose und die Behandlung dieser Krankheitszustände, werden in dem Kapitel von der Verstopfung angegeben werden.

Die verminderte Absonderung des Harnes.

(Unrichtig: *Ischuria renalis.*)

§. 1179.

Der Harn geht ganz sparsam oder längere Zeit gar nicht mehr ab und ist in der Regel auch in seiner Beschaffenheit verändert, meistens dunkelbraun gefärbt und trübe. Hiebei fehlen die Symptome der Harnverhaltung (Ischuria und Dysuria) und es entstehen krankhafte Absonderungen in andern Organen, als den Nieren, und zwar vorzugsweise Wassersucht, oder es bestehen schon solche Absonderungen, wie Wasserergiessungen in die Gewebe, Schweisse etc., und die verminderte Harnabsonderung stellt sich erst im Gefolge dieser Krankheiten ein. Auch sind bei dieser gehemmten Absonderung öfters die Symptome der Nierenentzündung oder einer andern Krankheit der Nieren, von welcher die Störung der Absonderung nur Symptom ist, vorhanden.

§. 1180.

Ursachen. Die Verminderung der Harnabsonderung ist oft keine Krankheit der Nieren, indem sie oft dadurch entsteht, dass weniger Absonderungsstoffe den Nieren zur Ausleerung dargeboten werden, wie bei Verminderung des Getränkes und starker Ausleerung flüssiger Stoffe durch andere Theile als die Nieren, wie dieses bei dem übermässigen Schwizen und vorzüglich bei der Wassersucht der Fall ist, oft ist sie aber auch Krankheit der Nieren und kommt vor bei Entzündung der Nieren, bei Desorganisationen derselben, besonders Vereiterung, bei Krampf und bei Lähmung.

§. 1181.

Behandlung. *Nach den Anzeigen aus den Ur-*

suchen haben wir die Aufgabe, die krankhaft vermehrte Absonderung, welche die Harnabsonderung beschränkt, so wie auch die Krankheit der Nieren, wie Entzündung, Vereiterung, Krampf derselben etc. zu heben. Nach dem Wesen der Krankheit müssen wir, insofern der Zustand der Nieren kein Hinderniss in den Weg legt, die Absonderungsthätigkeit in den Nieren zu erhöhen suchen. Es wird übrigens dieses Verfahren in dem Kapitel von der Wassersucht beschrieben werden.

Anhang zu den krankhaften Ausscheidungen.

§. 1182.

Es gibt gewisse so hervorstehende Krankheitszufälle, dass eine einzelne solche Erscheinung oft vorzugsweise die Krankheitsform darstellt. Diese Hauptzufälle sind aber oft das Symptom sehr verschiedenartiger Krankheitszustände, die also dem Gesammtausdrucke nach als eine einzige Krankheitsform erscheinen, und so kommt es, dass einzelne Krankheitserscheinungen als besondere Krankheitsarten in der Krankheitslehre anerkannt werden, die eigentlich nur einzelne Symptome verschiedener Krankheiten sind. Zu diesen Krankheitssymptomen gehören die Verstopfung, die Harnverhaltung, das Unvermögen, den Urin zu halten, und auch die zurückgehaltene Menstruation. Da es für die Therapie von Nuzen ist, eine Uebersicht über die den angegebenen Störungen in den Ausleerungen zum Grunde liegenden krankhaften Zustände im Körper zu haben, so will ich den alten Gebrauch beibehalten und den erwähnten Krankheitssymptomen, gleich den eigentlichen Krankheitsarten, besondere Kapitel widmen.

Die Hartleibigkeit und die Verstopfung.

Ludwig (lat. Lpz. 1770). — *Wedekind* (Abhandl. von der wahren Kenntniss und Kur der Krankheit der ersten Wege. Aus d. Lat. Nürnberg 1795). — *Röschlaub* (in s. Magaz. B. 4.).

§. 1183.

Längere Zurückhaltung und Verhärtung der Excremente wird **Hartleibigkeit** (adstrictio alvi), gänzlicher Mangel des Stuhlgangs, **Stuhlverhaltung** oder **Verstopfung** (obstipatio, obstructio alvi) genannt.

§. 1184.

Verlauf. Die Hartleibigkeit kann oft mehr andauernd sein und die vollkommene Verstopfung 4 bis 6 Tage und länger dauern, ohne mit Beschwerden verbunden zu sein, oft veranlasst aber auch schon ein geringer Grad von Hartleibigkeit Nachtheile und eine längere Zeit andauernde Verstopfung wird nicht selten lebensgefährlich. Der Leib ist mehr oder weniger voll und der Kranke hat das Gefühl von Völle und Aufblähung, und es stellen sich leicht Appetitlosigkeit, Eingenommenheit des Kopfes und Mattigkeit ein. Bei höherm Grade des Uebels entstehen Koliken und Kollern im Leibe, der Unterleib wird stark aufgebläht und gespannt, zulezt sehr empfindlich, es treten immer mehr die Symptome von Darmentzündung hervor, und es stellt sich ein heftiges gallichtes Erbrechen und zulezt Kothbrechen ein. Der Puls ist gereizt und die Wangen sind heiss, oft aber auch, besonders bei den heftigen Kolikanfällen, sind Wangen, Stirne und die Hände kalt und die Stirne mit einem kalten Schweisse bedeckt.

Zur Gesundheit geht das Leiden über, indem nach wiederholten Koliken und starkem Kollern im Leibe

Blähungen anfangen abzugehen und hierauf die Entleerung von zuerst ganz hartem und sodann breiartigem Kothe folgt, worauf sodann sich noch gewöhnlich Durchfälle einstellen. Mit dem Eintritt der Stuhlentleerungen verschwinden die Schmerzen und die übrigen Krankheitserscheinungen in der Regel sehr schnell; es bleibt jedoch eine grosse Anlage zur Wiederkehr der Verstopfung zurück.

Der Tod wird bei langer Dauer der Krankheit durch Erschöpfung der Kräfte in Folge der heftigen Koliken, des Erbrechens und des Fiebers, so wie auch durch die Entstehung von Darmentzündung, Brand und Zerreissung der Gedärme und Entleerung des Kothes in die Unterleibshöhle herbeigeführt.

§. 1185.

Anlage zur Verstopfung haben insbesondere Individuen von höherm Alter, solche von phlegmatischem Temperamente, so wie auch solche von sehr straffem Körperbau, Schwangere und mehr Personen vom weiblichen als solche vom männlichen Geschlechte.

Die Gelegenheitsursachen können nach der Verschiedenheit des Körperzustandes, welcher der Verstopfung zum Grunde liegt, in folgende drei Reihen getheilt werden:

1) Die Reihe derer, welche die Absonderung der Darmsäfte, der Galle und des pancreatischen Saftes vermindern oder diese Säfte in ihren Kanälen zurückhalten, oder sie zäher machen und die nothwendige Verdünnung des Kothes verhindern. Hieher gehören ein zu starker Verbrauch der Säfte in andern Organen als dem Darmkanale, bei starken Körperanstrengungen, starken Schweissen, längere Zeit andauerndem Fieber, vermehrtem Urinabgang, Wassersucht etc., ferner allgemeine Schwäche und Lähmungen, die Darmentzündung, Stockungen im Pfortadersystem, Verschliessung des Ductus

choledochus durch Steine, Krampf, Entzündung, Verschleimung der ersten Wege, der Gebrauch des Opiums, Mangel an flüssiger Nahrung etc.

2) Solche, welche die peristaltische Bewegung der Gedärme fehlerhaft machen, und zwar entweder Trägheit und Mangel der Bewegung verursachen oder eine krampfhafte Zusammenziehung einer Stelle der Gedärme, oder eine antiperistaltische Bewegung veranlassen. Der erstere Fehler wird durch allgemeine und örtliche Schwäche, Lähmungen, Mangel des gewohnten Reizes der Speisen, Mangel an Galle, Schleimüberzug der Gedärme, und durch gewisse Stoffe, die die Sensibilität der Gedärme herabstimmen, insbesondere Opium hervorgebracht, der zweite und dritte durch heftige Reizung der Gedärme und Hervorbringung von Entzündung und Krämpfen durch scharfe in den Darmkanal gelangte Stoffe, Metastasen, allgemeine Krämpfe, vorhergegangenes anhaltendes Erbrechen, mechanische Hemmung in der peristaltischen Bewegung.

3) Solche, welche der Kothentleerung ein mechanisches Hinderniss in den Weg legen: sehr harte und zusammengeballte Kothmassen, verschluckte Obststeine, zusammengeballte Würmer, sackartige Erweiterung der Gedärme, das Einschieben der Gedärme (volvulus, intussusceptio intestinorum), Umschlingung der Gedärme durch das Nez, Verdickung der Gedärme, scirrhöse Entartung, polypöse Auswüchse, der eingeklemmte Bruch, Druck der vergrösserten Leber auf den Zwölffingerdarm, Zurückbiegung der Gebärmutter und Druck derselben auf die Gedärme, grosse Hämorrhoidalknoten und Verschliessung des Afters durch Verwachsung.

§. 1186.

Vorhersage. Die Grösse der Gefahr hängt ganz von der Ursache der Verstopfung ab. Am wenigsten gefährlich ist die Verstopfung von fehlerhafter Absonderung,

am ungünstigsten aber die durch mechanische Hindernisse hervorgebrachte. Die Anlage zur Verstopfung ist oft schwer zu beseitigen.

§. 1187.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Die entferntern Ursachen der Verstopfung müssen zuerst beseitigt werden. Gegen eine vorhandene Darmentzündung müssen die geeigneten Mittel angewandt werden, die Wirkung des Bleies muss durch die in dem Kapitel von der Bleikolik angegebenen Mittel aufgehoben werden, der Gebrauch des Opiums und anderer stopfenden Mittel muss, wenn nicht besondere Anzeigen für denselben vorhanden sind, ausgesezt werden, bei vorhandenen Würmern müssen zugleich Wurmmittel gegeben werden, einen eingeklemmten Bruch (der oft von dem Patienten verschwiegen wird) entfernt man durch die Operation, zuweilen verstopfen Kirschensteine und Kothmassen so sehr die untere Darmöffnung, dass mechanische Hilfe nothwendig wird etc.

§. 1188.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Der Krankheitszustand der Gedärme, welcher zunächst der Verstopfung zum Grunde liegt, ist verminderte Absonderung und fehlerhafte peristaltische Bewegung. In der Regel ist es nothwendig, gegen beide Krankheitszustände zugleich zu wirken, doch haben wir in dem einen Falle mehr die Aufgabe, auf die Absonderungen, in dem andern aber die Aufgabe, mehr auf die peristaltische Bewegung zu wirken.

Um vorzüglich auf die Absonderungen zu wirken, gibt man die Salze, wie Magnesia sulphurica, Natrum sulphuricum, Kali sulphuricum, Natrum phosphoricum, Tartarus tartarisatus, Tartarus natronatus, Cremor tartari etc., so wie auch Tamarinden und Manna, und in gefährlichen Krankheiten, wenn der Darmkanal die Salze nicht erträgt

und man stark verflüssigend wirken will, das Calomel, so wie in Fällen, in welchen man zugleich mehr erregend und tonisch wirken will, die Rhabarber und die Aloë. Will man vorzugsweise die Gallenabsonderung befördern, so gibt man Tartarus tartarisatus, die auflösenden Extracte, die Rhabarber, die Aloë und in dringenden Fällen, wenn man die erregende Wirkung der zulezt genannten Mittel scheut, das Calomel. Zugleich sucht man die mangelnde Absonderung zu ersezen und die Wirkung der abgesonderten Flüssigkeit zu unterstüzen durch reichlicheres Getränk und durch schlüpfrig machende Mittel, wie die milden, fetten Oele und grössere Portionen frischer Butter.

§. 1189.

Um die peristaltische Bewegung zu befördern, muss, wenn eine krampfhafte Bewegung der Gedärme dieselbe hindert, dieser gemildert werden durch Oelmixturen, Bäder, Umschläge und in dringenden Fällen selbst durch Opium. Ist Trägheit in der peristaltischen Bewegung vorhanden, so sucht man diese zu heben, wozu schon die Gewöhnung der Natur zum täglichen Stuhlgange zu einer bestimmten Zeit Vieles beiträgt. Unter den Abführungsmitteln wählt man vorzüglich die Senne, die Jalappe, die Rhabarber, die Aloë, das Ricinusöl, das Oleum Crotonis, das Oel von Euphorbia Lathyris etc., und unterstüzt diese Mittel durch Klystire von einer Kleienabkochung oder einem Chamillenaufguss mit Zusaz von Oel und etwas Kochsalz oder Seife oder Honig oder einem Aufguss von Senneblättern und selbst in dringenden Fällen durch Tabaksrauchklystire, so wie auch durch Stuhlzäpfchen von Honig, Seife etc. (Nro. 41 — 52.)

§. 1190.

Nach den einzelnen Fällen ist bald das eine, bald das andere der angegebenen Abführungsmittel vorzugsweise

passend, so z. B. bei einer Darmentzündung Calomel und Ricinusöl, bei vorhandenen Würmern Calomel, Jalappe etc. Gewöhnlich ist es zuträglich, besonders bei Mitteln, die die eine der oben angegebenen Wirkungen besizen, und die andere mehr entbehren, ein Mittel zuzusezen, das die andere Wirkung vorzüglich besizt; so z. B. ist es oft nothwendig, zum Calomel die Jalappe zu fügen, damit die durch das Calomel bewirkten abgesonderten Stoffe auch schleunig ausgeleert werden; man verbindet gerne die Salze und die Senne mit einander, obgleich beide Arzneimittel die beiden Wirkungen der Abführungsmittel, nämlich Erregung der Absonderungen und der peristaltischen Bewegung in ziemlich hohem Grade besizen, da doch die Salze mehr die Absonderung und die Senne mehr die peristaltische Bewegung befördern.

§. 1191.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Tritt zur Verstopfung heftige Kolik hinzu, so müssen die besänftigenden Mittel mit den eröffnenden verbunden werden und namentlich ist es oft sehr nüzlich, zugleich mit den Abführungsmitteln etwas Opium zu geben; das Erbrechen bekämpft man durch die gewöhnlichen Mittel und eine beginnende Darmentzündung sucht man durch Blutentleerungen, besänftigende Umschläge etc. zu unterdrücken.

Die Harnverhaltung.
(*Ischuria*, *Retentio urinae.*)

Wichmann (Ideen z. Diagnostik). — *Heinlein* (in Harless Jahrb. d. deutschen Med. u. Chir. B. I. u. B. III.). — *Civiale* (Par. 1823). — *Segalas* (Par. 1828). — Ausserdem die Schriftsteller über die Krankheiten der Urinwerkzeuge überhaupt, namentlich *Chopart*, *Desault*, *F. A. Walter*, *Sömmering*, *W. Schmidt*, *Bell*, *Howsip*, *Lallemand*, und die über die Krankheiten der Urinblase, insbesondere *Troja*, *Nauche* und *Bingham*.

§. 1192.

Die Harnverhaltung ist die Zurückhaltung des Harnes in seinen Ausführungswegen. Geht der Harn mit Beschwerden ab, so wird dieser Zufall beschwerliches Harnen (Dysuria) genannt, geht insbesondere der Harn nur tropfenweise, unter brennenden und zusammenschnürenden Schmerzen ab, so belegt man diesen Zustand mit dem Namen Harnzwang oder Harnstrenge (Stranguria).

§. 1193.

Der Harn ist entweder in den Nierenkelchen oder dem Nierenbecken oder in den Harnleitern oder in der Blase zurückgehalten.

Am seltensten kommt Ansammlung des Urins in den Nierenkelchen (Ischuria renalis vera) und dem Nierenbecken vor. Diese Ischurie ist meistens mit Schmerzen in der Nierengegend und mit Abgang eines rothen oder auch eiterartigen Urines verbunden. In einem von mir beobachteten Falle war die Ausdehnung des Nierenbeckens so gross, dass der Unterleib stark ausgedehnt wurde, Schwappen statt fand und die Krankheit vollkommen einer freien Bauchwassersucht glich.

§. 1114.

Die Harnverhaltung in den Harnleitern (Ischuria

ureterica). Nur in seltenen Fällen sind beide Harnleiter verschlossen, wo sodann durchaus kein Harn abgeht. Ist nur in einem Harnleiter der Urin zurückgehalten, so geht etwas, meistens stark gefärbter Harn ab, der Kranke hat aber heftige Schmerzen nach dem Verlaufe des leidenden Harnleiters und dieser stellt oft eine Geschwulst in der Form eines angefüllten Darmes dar. Findet der Harn keinen Abfluss, so entsteht auch Harnansammlung in dem Nierenbecken und den Nierenkelchen. Die Krankheit kann tödten durch Zerreissung des Harnleiters und Ergiessung des Urins in die Unterleibshöhle, so wie auch durch den Hinzutritt von Entzündung und Vereiterung in den Harnwerkzeugen und darauf folgende Wassersucht oder Abzehrung.

§. 1195.

Die Harnverhaltung in der Blase (Ischuria vesicalis). Die Blase wird ausgedehnt und ist in Gestalt eines Straussenecies über dem Schoossbogen zu fühlen. Dabei hat der Kranke einen heftigen Trieb zum Harnlassen, grosse Angst und heftige Schmerzen, die durch Berührung der Unterleibsgegend vermehrt werden. Das Athmen ist erschwert und es stellen sich kalte Schweisse und Ohnmachten ein. Liegt die Ursache der Harnverhaltung nicht in Verschliessung der Wege, wodurch der Harn abgeht, so bleibt oft die Ausdehnung der Harnblase bei einem gewissen Grade stehen und der aus den Harnleitern neu hinzufliessende Harn geht nun auf dem gewöhnlichen Wege tropfenweise ab.

In Gesundheit geht das Uebel durch Entleerung des Urins auf dem gewöhnlichen Wege über, wobei aber längere Zeit eine Neigung zu einer neuen Verhaltung zurückbleibt. Zuweilen entsteht Entzündung und Durchlöcherung der Blase, wobei sich der Urin einen Weg in das Zellgewebe bahnt und an irgend einer Stelle der Oberfläche, bei Männern insbesondere im Hodensack,

eine Geschwulst, Entzündung und Brand verursacht, wodurch dem Urin ein Ausweg nach Aussen gebahnt wird und Heilung bewirkt werden kann. Oft bleiben nach diesen Vorgängen unheilbare Urinfisteln und bei Durchlöcherung des Mastdarmes auch Kothfisteln zurück. Zuweilen bahnt sich auch der Harn einen Weg durch den Harnstrang und wird durch den Nabel ausgeleert. Manchmal dringt das Wasser in die Harnleiter, dehnt diese, so wie auch das Nierenbecken aus und veranlasst die Folgen der Ischuria ureterica. Zum Tod führt das Leiden durch Entzündung und Brand und die hierdurch bewirkte, so wie auch zuweilen ohne Brand erfolgende Zerreissung der Blase und Ergiessung des Urins in die Unterleibshöhle, so wie auch durch Abzehrung, welche in Folge der Urinfisteln sich entwickelt.

§. 1196.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Man sah die Nieren einer zweiten Urinblase gleichen, ihre Substanz verzehrt und die Ureteren bis zur Dicke des Grimmdarms ausgedehnt (*Walter*). In einem Falle fand ich das Nierenbecken der linken Niere in einen Sack, der 36 – 37 Pfunde Wasser enthielt, ausgedehnt und die Niere selbst in 7 Säcke (ehemalige Nierenkelche), jeden von der Weite von 2 – 3 Unzen Flüssigkeit, verwandelt, welche mit einer dünnen Lage von Nierensubstanz umgeben waren, an der Seite dieses Sackes entsprang der Harnleiter, welcher seinen normalen Durchmesser hatte und die verdickte Haut des Sackes in schiefer Richtung durchdrang, so dass dadurch eine Art Klappe gebildet wurde, welche den Ausfluss des Urins hinderte. In einem andern Falle fand ich in beiden Nieren mehrere Aushöhlungen (ehemalige Nierenkelche), welche einige Unzen Flüssigkeit enthielten, die diese Säcke, so wie das Nierenbecken, die Harnleiter und die Blase auskleidende Schleimhaut entzündet und mit einer eiter-

artige Flüssigkeit bedeckt. Die Blase selbst hat man zu einem grossen, über den Nabel heraufreichenden und beinahe die ganze Unterleibshöhle ausfüllenden Sack ausgedehnt angetroffen.

§. 1197.

Ursachen. Die Harnverhaltung in den Nierenkelchen, dem Nierenbecken nnd den Harnleitern wird durch Verschliessung dieser Theile an irgend einer Stelle hervorgebracht, und diese wird bewirkt durch einen Blutpfropf, Ansammlung von dickem Schleime, einen Nierenstein, Entzündung und dadurch hervorgebrachte Verdickung und Verwachsung der Häute der Harnleiter etc. Die Harnverhaltung in der Blase ist entweder die Folge einer Verhinderung der Zusammenziehung der Blase oder eines Hindernisses in dem Ausführungsgange der Blase. Die *Zusammenziehung der Blase wird gehemmt* durch Lähmung der Blase (Ischuria paralytica) in Folge einer Verlezung des Rückenmarkes, des Schlagflusses, übermässiger Ausdehnung der Blase und dadurch bewirkter Dehnung der Muskelhaut derselben bei zu lange zurückgehaltenem Urin, Entartung der Gewebe der Blasenhäute in Folge von schleichenden Entzündungen etc. Der *Ausführungskanal der Blase ist verschlossen* in Folge eines Krampfes (Ischuria spasmodica) oder einer Entzündung (Ischuria inflammatoria) im Blasenhalse, und diese beiden Krankheitszustände werden hervorgebracht durch verschiedene Reize, welche auf die Blase wirken, wie z. B. durch den zu starken Genuss von jungem Weine, eines schlechten Bieres, zu starken Gebrauch der harntreibenden Mittel, insbesondere der Canthariden, welche auch schon bei der äusserlichen Anwendung in Blasenpflastern zuweilen dieselbe Wirkung hervorbringen, einen scharfen, an salzigen Theilen reichen Urin, Harnsteine, Hämorrhoidalbeschwerden, die sich auf die Blase ausdehnen, die auf den Blasenhals

sich ausbreitende Tripperentzündung, Verkältung, unterdrückte Hautausschläge, unterdrückte Gicht, allgemeine krampfhafte Affectionen etc., — ferner in Folge von blos mechanischen Hindernissen im Blasenhalse und der Harnröhre, durch Verstopfung des Blasenhalses, durch Blutgerinnsel, Schleim, einen Stein, varicöse Ausdehnung der Gefässe, Verdickung der Wände, Verhärtung der Vorsteherdrüse, Zusammendrückung des Blasenhalses durch Rückwärtsbeugung oder einen Vorfall der Gebärmutter, die Schwangerschaft, Fleischgewächse etc., so wie durch Verengerung und Verschliessung der Harnröhre (Ischuria urethralis) durch Fleischwärzchen, welche durch den Tripper veranlasst sind etc.

§. 1198.

Vorhersage. Die Harnverhaltung in den Nierenkelchen, dem Nierenbecken und den Harnleitern ist meistens tödtlich, die Ischurie der Harnblase ist, wenn sie von nicht erfolgender Zusammenziehung der Blase herrührt, nicht gefährlich, es ist aber das ihr zum Grunde liegende Leiden der Blase oft schwer zu heben; gefährlicher ist die durch einen Fehler in dem Ausführungsgange der Blase bedingte Urinverhaltung, doch ist die von einem Krampf und von Entzündung in dem Blasenhals herrührende oft schnell zu entfernen, schwerer dagegen ist die von Desorganisationen in dem Blasenhals der Harnröhre oder den benachbarten Theilen entstandene Harnverhaltung zu heben.

§. 1199.

Behandlung. Nach Verschiedenheit des Krankheitszustandes, der die Harnverhaltung bedingt, müssen bald Mittel angewandt werden, die den lähmungsartigen Zustand der Blase heben, bald solche, die den Krampf, so wie die etwa vorhandene Entzündung im Blasenhalse beseitigen, so wie auch solche, welche die rein mechanischen Hindernisse entfernen.

Um die Lähmung der Blase zu heben und ihr die Zusammenziehungsfähigkeit wieder zu geben, ist es vorerst nothwendig, den Urin von Zeit zu Zeit vermittelst des Catheters zu entleeren, um der Blase die Contraction zu erleichtern. Am wirksamsten sind sodann örtlich angebrachte Mittel, Einreibungen in die Blasengegend und das Kreuz von ätherischen Geistern mit ätherischen Oelen, Balsamen, dem Liquor ammonii caustícus, der Tinctura Cantharidum u. a., Umschläge und Bäder von erregenden Stoffen, Dampfbäder, insbesondere der Strahl des Dampfes auf die Blasengegend und auf das Kreuz geleitet, und auch kalte Umschläge, reizende Klystire, Senfteige und Blasenpflaster auf die Blasengegend, den Damm oder das Heiligenbein gelegt, mit Vorsicht unternommene Einsprizungen in die Blase von zusammenziehenden Stoffen, endlich auch die Electricität und die Moxen. Innerlich gibt man zugleich erregende und insbesondere auf die Harnwerkzeuge reizend wirkende Mittel, wie die Arnica, den peruvianischen Balsam, das Terpenthinöl, die Canthariden, die Folia Rhois Toxicodendri etc.

§. 1200.

Um den Krampf in dem Blasenhalse aufzuheben, dienen besänftigende Umschläge auf die Blasengegend von einer Cicutaabkochung, Chamillen etc., und solche von erwärmtem Fett, Einreibungen von Oleum Hyoscyami oder Opiatsalbe, Dämpfe an den Unterleib geleitet, warme Bäder, so wie auch Senfteige und andere Ableitungsmittel, jedoch keine Blasenpflaster. Innerlich gebe man Mandelmilch und andere einhüllende Getränke, Opium und andere Narcotica und auch den Kampher, besonders wenn Canthariden die krampfhafte Harnverhaltung veranlasst haben. — Liegt eine Entzündung des Blasenhalses der Harnverhaltung zum Grunde, so muss das gegen die Blasenentzündung dienliche Verfahren in Anwendung

gebracht werden. — Mechanische Hindernisse müssen auf die passende Weise entfernt werden.

Gelingt es nicht, auf die angegebene Weise dem Harne einen freien Abfluss zu verschaffen, so muss der Katheter eingebracht werden; ist die Anwendung desselben aber unmöglich, so muss bei dringender Gefahr die Paracentese der Blase vorgenommen werden.

Der unwillkürliche Harnabgang.

(Das Unvermögen den Harn zu halten, Enuresis, Incontinentia urinae.)

§. 1201.

Der unwillkürliche Harnabgang ist der Abgang des Urins, welcher gegen den Willen des Kranken geschieht. — Ein im bewusstlosen Zustande eines Individuums, wie z. B. im Schlafe (Enuresis nocturna), im Rausche und in gewissen Fiebern erfolgender Urinabgang, der also nicht durch eine Krankheit der Blase bedingt ist, kann nicht hieher gerechnet werden.

§. 1202.

Der Urinabgang erfolgt entweder aus dem Grunde unwillkürlich, dass die Theile, durch welche der Harn seinen Weg nach Aussen nimmt, nicht unter dem Einflusse des Willens des Kranken stehen, oder aus dem, dass die austreibenden Kräfte so stark sind, dass hierdurch das dem Harnausfluss durch den Willen entgegengesezte Hinderniss überwältigt wird.

Die erste Art des unwillkürlichen Urinabganges kann man den *passiven Harnabgang* nennen, da hier der Mangel an dem normalen Widerstand die Ursache des Harnabganges ist, und der Urin oft nur den Gesezen der

Schwere folgend entleert wird. Es fliesst in diesem Falle der Urin meistens tropfenweis und oft ohne dass der Kranke ein Gefühl davon hat, ab. — Dieses Uebel ist häufig durch eine Schwäche und Lähmung des Schliessmuskels der Blase bedingt (Enuresis paralytica) und kommt vor in Folge von Altersschwäche, Lähmung des untern Theiles des Rückenmarkes, Schlagfluss, Quetschung des Blasenhalses bei schweren Geburten, Ausdehnung bei'm Steinschnitt und Verziehung desselben bei Vorfall der Gebärmutter etc.; ferner durch Zerstörung des Schliessmuskels des Blasenhalses in Folge von Verschwärungen, so wie auch durch Zerstörung eines andern Theiles der Blase, in deren Folge sich Fisteln gebildet haben und der Harn auf einem ungewöhnlichen Wege abgeht. — Bei einem lähmungsartigen Zustand der Blase sammelt sich oft der Harn wegen Mangel an austreibenden Kräften bis zu einem gewissen Grade an und geht sodann, wenn die Blase sich nicht noch mehr ausdehnt, so oft neuer Urin zufliesst, tropfenweis ab, so dass hier Harnverhaltung und Unvermögen den Urin zu halten zugleich vorhanden sind (Enuresis paradoxa).

§. 1203.

Die zweite Art ist *der durch einen Krampf der Blase bedingte unwillkürliche Harnabgang* (Enuresis spastica). Bei dieser Art des unwillkürlichen Harnabganges wird der Urin plözlich mit Gewalt ausgesprizt, wobei auch zuweilen Schmerzen in der Blase statt finden. — Es wird dieser Zufall erregt durch Reize, die auf die Blase wirken, durch scharfen Harn, einen Stein, Würmer, den Hämorrhoidalreiz, Erkältung, anomale Gicht, Geschwüre in der Blase etc., so wie durch allgemeine krampfhafte Affectionen, namentlich epileptische Krämpfe.

§. 1204.

Ausser der beständigen Nässe der Kleidungsstücke und dem üblen Geruch hat der unwillkürliche Abgang

des Urins die nachtheiligen Folgen, dass die Theile, auf welche der Harn gelangt, sich etwas entzünden, wund werden und selbst verschwären, welches Leiden mit Jucken und Brennen verbunden ist.

§. 1205.

Die Prognose hängt von dem Krankheitszustand, der dem unwillkürlichen Harnabgang zum Grunde liegt, ab. Am leichtesten ist in der Regel die Enuresis spastica zu heben.

§. 1206.

Die Behandlung richte sich nach dem krankhaften Zustand der Blase, der den unwillkürlichen Harnabgang veranlasst. Ist dieser durch Schwäche und Lähmung der Blase bedingt, so dienen, wie bei der Ischuria paralytica erregende Umschläge und Einreibungen, Dampfbäder, Tropfbäder, kalte Umschläge und Einsprizungen von tonischen Mitteln, so wie innerliche erregende und tonische Mittel, wobei auch auf den Zustand des Nervensystems im allgemeinen und insbesondere auf das Rückenmark die gehörige Rücksicht genommen werden muss. — Sind Desorganisationen und insbesondere Fisteln da, so müssen diese auf die geeignete Weise behandelt werden, wobei oft chirurgische Hilfe nothwendig wird. — Bei der krampfhaften Enuresis passen dieselben Mittel, die in dem Kapitel von der krampfhaften Harnverhaltung angegeben worden sind. — Um die durch den unwillkürlichen Abfluss des Harnes verursachten Unannehmlichkeiten zu beseitigen, dienen die Harnhalter; auch kann man bei dem weiblichen Geschlechte die Harnröhre durch einen Druck gegen die Schambeine vermittelst eines in die Scheide gebrachten Schwammes oder eines Mutterkränzchens zusammendrücken und dadurch den Weg für den Abfluss des Harnes schliessen.

Der Mangel der monatlichen Reinigung.

(*Amenorrhoea.*)

Freind (Oxon. 1703). — *Osthoff* (Lemgo 1804).

§. 1207.

Der krankhafte Mangel des Monatsflusses ist entweder eine, aus innern Ursachen erfolgende Zurückhaltung der Reinigung in den Jahren, in welchen sie erscheinen sollte, oder, wenn sie schon früher vorhanden war, in der Zeit, in welcher sie eintreten sollte, in so fern nicht eine Schwangerschaft oder das Säugen eines Kindes hievon die Schuld trägt (Retentio, Emansio mensium, Amenorrhoea emansionis), oder sie ist die Unterdrückung des Monatsflusses, wenn derselbe schon begonnen hatte (Suppressio mensium, Amenorrhoea suppressionis, Menostasia). Oft wird zwar Blut entleert, aber nicht in genügender Menge (Menstruatio parca), und oft ist der Blutabgang, besonders wenn er zu sparsam ist, mit ähnlichen Beschwerden, als bei der vollkommenen Amenorrhoea stattfinden, verbunden (Menstruatio difficilis, Dysmenorrhoea).

§. 1208.

Zuweilen fehlt die monatliche Reinigung geraume Zeit, ohne dass Krankheitszufälle damit verbunden sind, häufiger ist aber die Amenorrhoea von mehr oder weniger bedeutenden Krankheitserscheinungen begleitet. Diese Zufälle sind ein Gefühl von Schwere in den untern Gliedmassen, ein drückender und reissender Schmerz im Kreuze, kolikartige Leibschmerzen, nur gewöhnlich mehr in dem untern Theil des Leibes, ein Gefühl von Drängen gegen die Geschlechtstheile, ferner Schwindel und Röthe des Gesichtes, Brustbeklemmung, Herzklopfen, Mangel an Appetit, gastrische Unreinig-

keiten, Erbrechen, öfters auch Blutflüsse, namentlich Bluthusten, Blutbrechen, Nasenbluten, Hämorrhoiden, Blutungen aus Geschwüren, unmittelbar aus der Haut in Form eines blutigen Schweisses erfolgende Blutentleerungen, Blutergiessungen aus den Augen, den Brüsten etc., welche Blutflüsse man die Menstruation auf ungewöhnlichen Wegen (Menses aberrantes, Mensium insolitae viae) nennt. Oft tritt statt des Blutes ein Schleimfluss aus den Geschlechtstheilen ein.

Bei andauerndem Mangel der Menstruation entwickelt sich häufig ein kachektischer Zustand. Häufig ist mit der Amenorrhoea Bleichsucht verbunden, welche übrigens in der Regel nicht die Folge, sondern vielmehr die Ursache des Mangels des Monatsflusses ist. Durch die Stockungen des Blutes in den Gefässen des Unterleibes entstehen chronische Verdauungsbeschwerden, Leberleiden und Gelbsucht, Hypochondrie, Gicht und selbst zuweilen Wassersucht. Bei andauerndem Mangel der Menstruation entwickelt sich auch öfters Lungenschwindsucht, wiewohl auch diese Krankheit häufiger die Ursache als die Folge des Mangels der monatlichen Reinigung ist. Endlich kommen oft auch chronische Hautausschläge, Nervenkrankheiten, Seelenstörungen und andere Krankheiten in Folge der Amenorrhoea vor.

§. 1209.

Ursachen. Die häufigste Ursache ist wohl allgemeine Schwäche, welche entweder durch Verminderung und Entmischung der Säfte oder durch Verzehrung der Nervenkräfte erzeugt ist, daher kommt die Amenorrhoea vor in Folge von Blutflüssen, langwierigen, krankhaften Absonderungen, z. B. dem weissen Flusse, von Kachexien, wie die Bleichsucht, die Wassersucht, die Schwindsucht, Rhachitis und Scropheln und bei dem diesen Kachexien sich nähernden schwächlichen Körperbau, so wie auch bei Hysterie, Hypochondrie, anhaltendem Kummer etc.

— Eine zweite Ursache ist blos örtliche Schwäche und verminderte Lebensthätigkeit, und diese kann hervorgebracht sein durch Stockungen im Pfortadersystem, langwierigen weissen Fluss, eine sizende Lebensart, ganz schlummernden Geschlechtstrieb, Entartungen des Gewebes der Gebärmutter, wie Verhärtung, Wassersucht derselben oder der Eierstöcke etc. — Eine dritte Reihe von Ursachen sind Krampf und Entzündung der Gebärmutter, welche hervorgebracht sein können durch Verkältung, Zorn, zu starken Genuss reizender Getränke, besonders bei schon vorhandener Vollblütigkeit, consensuelle Reizungen durch Würmer, gallichte Unreinigkeiten, Kothansammlungen etc. — Eine vierte Ursache endlich sind mechanische Hindernisse, die dem Blute den Ausfluss nicht gestatten, namentlich ein vollkommen geschlossenes Hymen und Verwachsung des Muttermundes.

§. 1210.

Die Vorhersage muss sich zum Theil nach dem Krankheitszustande, welcher der Amenorrhoea zum Grunde liegt, und zum Theil nach den Zufällen, die durch dieselbe hervorgebracht sind, richten.

§. 1211.

Behandlung. Hat der Mangel der monatlichen Reinigung keine nachtheiligen Folgen, so ist es rathsam, keine Mittel anzuwenden, die unmittelbar auf den Monatsfluss treiben, da die Natur das durch die Reinigung abgehende Blut oft zu andern Zwecken verbraucht. Hiebei muss man nicht vergessen, dass oft eine Schwangerschaft verheimlicht wird.

Oft ist der Krankheitszustand des Körpers von der Art, dass er die Anwendung der auf die Menstruation unmittelbar treibenden Mittel nicht gestattet oder nur die Anwendung einiger Mittel aus dieser Klasse, z. B. die der nicht erhizenden Emmeniagoga, zulässt, und es

muss daher vorerst untersucht werden, ob nicht der Amenorrhoea ein derartiger Krankheitszustand zum Grunde liegt und die Anwendung der Mittel eintreten muss, die dieser Krankheit entgegenwirken. Ist Vollblütigkeit und ein entzündlicher Zustand vorhanden, so müssen Blutegel an die Geschlechtstheile geszt und zuweilen selbst eine Aderlässe unternommen werden. — Liegen Stockungen im Pfortadersystem dem Ausbleiben des Monatsflusses zum Grunde, so sind die auflösenden Mittel, Tartarus tartarisatus, Tartarus natron., die auflösenden Extracte und nach Umständen auch stärkere Abführungsmittel angezeigt. — Ist ein krampfhafter Zustand die Ursache, so dienen warme Bäder, Dämpfe an die Geschlechtstheile geleitet, besänftigende Umschläge und Einreibungen und der Gebrauch der Narcotica, insbesondere des Opiums, so wie auch nach Umständen der der Antihysterica. — Ist eine grosse Körperschwäche vorhanden, so wendet man die tonischen Mittel, insbesondere die China und das Eisen, innerlich gebraucht und in Stahlbädern an. — Desorganisationen in der Gebärmutter sucht man zu heben. — Ist das Hymen verschlossen, so muss die Operation unternommen werden.

§. 1212.

Ist der Körperzustand von der Art, dass er die Anwendung der auf die Menstruation treibenden Mittel gestattet, und liegt der Amenorrhoea eine verminderte Lebensthätigkeit in der Gebärmutter zum Grunde, so sind die specifisch auf die Gebärmutter wirkenden und den Trieb des Blutes nach ihr hinleitenden Mittel angezeigt. Hieher gehören: der Borax (Nro. 67), der Tartarus boraxatus, die fixe Luft, das Millefolium, die Färberröthe, der Crocus, die Myrrhe, das Terpenthinöl, der Copaivbalsam, die Aloe, die Coloquinten, die Niesswurz, die Sabina (Nro. 68) etc. Mit diesen innerlichen Mitteln verbindet man Blutegel an die Geschlechtstheile gesezt,

Schröpfen an der innern Seite der Schenkel, Fussbäder mit Zusaz von Senf, Salz oder Asche, Dampfbäder, Halbbäder, Senfteige oder Blasenpflaster an die innere Seite der Schenkel gesezt, das Zusammendrücken der Schenkelschlagader, die Electricität etc. — Es werden die treibenden Mittel am schicklichsten zu der Zeit angewandt, wann die monatliche Reinigung naturgemäss eintreten soll.

§. 1213.

Die üblen Zufälle, die der Mangel der Menstruation veranlasst, werden am besten durch die schnelle Herstellung der unterdrückten Blutentleerung gehoben, sind sie aber von Bedeutung, so dass die Herstellung der monatlichen Reinigung nicht genügen würde oder der Eintritt derselben nicht abgewartet werden kann, so muss eine künstliche Blutentleerung, gewöhnlich eine Aderlässe, vorgenommen werden. Im übrigen behandelt man diese Zufälle nach ihrer Natur. — Was insbesondere die gewöhnlichen Menstruationsbeschwerden betrifft, so sind warme Bäder, Dampfbäder, besänftigende Umschläge und Einreibungen, besänftigende Klystire, örtliche Blutentziehungen und innerlich vorzüglich Opium in Anwendung zu bringen.

Sechste Krankheitsfamilie.

DIE HAUTAUSSCHLÆGE.

Erster Abschnitt.

Von den Hautausschlägen im Allgemeinen.

Schriftsteller.

Plenk (lat. Wien 1776, deutsch v. Wasserburg 1777 u. Dresden 1797). — *Lorry* (lat. Paris 1777, deutsch v. Held, Lpz. 1778). — *Willan* (London 1798—1808, improved by Bateman 1815, a. d. Engl. v. Friese. Breslau 1799—1816. 4 Bde. m. ill. K.). — *Alibert* (Descript. des maladies de la peau. Paris 1806—26. Fol. m. ill. K., neue Ausg. Paris 1833. — Eb. précis théorique sur les maladies de la peau. Vol. 2. Paris 1822). — *Bateman* (a practical synopsis of cutaneous diseases. Lond. 1808 u. 1817, aus d. Engl. v. Hanemann, mit einer Vorrede von Kurt Sprengel, m. 1 ill. K. Halle 1815. — Eb. delineat, of cutan. diseasas exhib. the characterist. appear, of the princip. gen. et spec., compris. in the classificat. of the late Dr. Willan and completing the series of engravings, began by that author. Lond. 1817. Fasc. XII. in 4. maj., a. d. Engl. Weimar 1829). — *Plumbe* (Lond. 1829, a. d. Engl. Weimar 1825). — *Biett* (aus d. Franz. v. Cazenave und Schedel. Weimar 1829). — *Struve* (Breslau 1829. Fol. m. K.). — *Rayer* (Vol. 3. 2te Ausg. Paris 1835. 8., mit einem Atlas in 4.).

§. 1214.

Hautausschläge sind die Veränderungen im Gewebe der Haut, welche sich als Entzündungen und Ab-

lagerungen verschiedenartiger Stoffe darstellen und nicht die unmittelbare Folge einer äussern Verlezung sind.

§. 1215.

Aehnliche Veränderungen erscheinen auf den Schleimhäuten, insbesondere der des Darmkanals, und werden mit dem Namen *Schleimhautexantheme* belegt.

§. 1216.

Verlauf. Dem Ausbruche des Ausschlags gehen häufig allgemeine Krankheitserscheinungen und auch Störungen in einzelnen andern Theilen, als die Haut, voraus. Einigen Hautausschlägen, wie z. B. den Blattern und dem Scharlach, geht immer ein Fieber von bestimmter Dauer vorher, welches sich meistens durch den bei den entzündlichen Fiebern vorkommenden Orgasmus im Blute characterisirt und das durch den Ausbruch des Ausschlags meistens sehr gemildert und selbst entschideen wird. In andern Fällen tritt der Ausschlag auch während des Verlaufes eines Fiebers hervor, es geschieht dieses aber weder an einem bestimmten Tage, noch hat gewöhnlich das Erscheinen des Exanthems einen grossen Einfluss auf das Fieber und es erscheint überhaupt der Ausschlag in Beziehung zum Fieber als eine mehr zufällige Erscheinung. In vielen Fällen fängt das Kranksein nicht mit einem Fieber an, sondern mit verschiedenen andern innern Störungen, mit Zufällen gastrischer Unreinigkeiten, mit Mattigkei , Beengung, Angst, Ziehen in den Gliedern, fehlerhaften Absonderungen etc., der Ausschlag bricht nach kürzerer oder längerer Zeit hervor und entscheidet entweder die vorangegangenen Zufälle oder hat keinen Einfluss auf dieselben und nimmt allmälig mit denselben zu oder ab. Endlich gibt es Fälle, in welchen keine deutlichen innerlichen, dem Ausschlag vorhergehenden Affectionen wahrgenommen werden, sondern das Exanthem plözlich erscheint. In der Haut selbst kündigt sich der Ausschlag oft durch verschiedene Krankheitserschein-

ungen an, wie durch das Gefühl von Jucken und Brennen, durch einen gewissen Turgor in der Haut und selbst entzündete Stellen, durch Schweisse etc., oder er bricht ohne diese Begleiter unmerklich hervor, so dass der Kranke sein Vorhandensein nur vermittelst des Anschauens wahrnimmt.

§. 1217.

Auf eine ähnliche Weise verhalten sich die Schleimhautexantheme, nur dass sie selten als fieberlose Krankheit vorkommen, da sie, wenn sie nicht die Begleiter eines essentiellen Fiebers sind, ihrer Seits leicht Fieber verursachen. Indem sie selbst in der Regel der unmittelbaren Wahrnehmung entzogen sind, erscheinen sie verhüllt in der Form von Entzündungen, gastrischen und nervösen Fiebern, Diarrhoeen, Ruhren etc.

§. 1218.

Der Ausschlag nimmt gewöhnlich von seinem Erscheinen bis zum Verschwinden verschiedene Formen an. Viele Ausschläge stellen bei ihrem Entstehen kleine Entzündungshärten dar, sodann bildet sich in denselben eine durchscheinende, mehr farblose Flüssigkeit, diese geht in Eiter über (so dass das Knötchen zur Pustel wird) und endlich entstehen hieraus Krusten, andere erscheinen zuerst als oberflächliche seröse Entzündungen, es bilden sich sodann auf denselben kleinere oder grössere, mit seröser Flüssigkeit gefüllte Bläschen, und zulezt bilden sich ebenfalls wiederum Schuppen und Borken, zuweilen entstehen solche Bläschen ohne offenbare Hautentzündung und verwandeln sich hierauf in Schuppen, auch gehen oft Blattern und Bläschen in Hautgeschwüre über etc. Die vorzüglichsten Formen, unter welchen die Hautausschläge erscheinen, sind folgende:

1) *Flecken* (Maculae). Es sind dieses einfache Veränderungen der Hautfarbe, an mehr oder weniger umschriebenen Stellen der Haut. Es kann bei dem Flecken

auch das Gewebe der Haut verändert sein, doch nennt man die Veränderung Flecken, wenn sie vorzüglich in der Farbe der Haut hervortritt. Ist der Flecken roth und ist diese Farbe durch eine Entzündung in der Haut begründet, so werden diese Flecken von manchen Schriftstellern, nach *Willan's* Vorgang, Exantheme (im engsten Sinne des Wortes) genannt. Ist der Flecken sehr klein, nur wie ein Punkt, so nennt man ihn Stippe (Stigma), die sehr ausgebreiteten Flecken wurden früher Maalpläze (Panni) genannt.

2) *Knötchen* und *Blätterchen* (Papulae). Die erstern sind sehr kleine, rundliche, zugespizte, rothe und harte Erhabenheiten in der Haut, welche an der Spize noch keine Lymphe enthalten, Blätterchen aber sind diese Erhabenheiten, wenn sie schon etwas Lymphe enthalten. Gewöhnlich nimmt man die Ausdrücke Knötchen und Blätterchen für gleichbedeutend, doch liegt ein Unterschied in ihrer Bedeutung, indem das Blätterchen eine kleine Blatter ist, was bei dem Knötchen noch nicht der Fall ist.

3) *Blattern* (Pustulae). Es sind dieses grössere, rundliche Erhabenheiten in der Haut, welche an ihrem Grunde eine Entzündungshärte haben, in dem obern Theile aber aus der von der harten entzündeten Stelle losgetrennten Epidermis, die mit einer meistens eiterartigen Flüssigkeit gefüllt ist, bestehen. Pustel nennen Manche auch die mit einer eiterartigen Flüssigkeit gefüllte Blase.

4) *Blasen* (Vesiculae et Bullae). Dieselben sind die Erhabenheiten in der Haut, welche blos in der Epidermis, unter welche eine Flüssigkeit ergossen ist, bestehen. Es unterscheiden sich die Blasen von den Blattern dadurch, dass ihr unterer Theil nicht in einer entzündlichen Verhärtung der Haut besteht. Die Blase kann zwar auch auf einer entzündeten Stelle der Haut stehen, doch ist

diese Entzündung keine Entzündungshärte, und dieselbe bildet jedenfalls nicht einen Theil der diese Form des Ausschlags darstellenden Erhabenheit der Haut; auch ist meistens in der Blase kein Eiter enthalten, wo hingegen die Flüssigkeit in der Blatter in der Regel eiterartig wird. Der Inhalt der Blase ist meistens eine farblose oder perlfarbige oder gelbliche, seröse Flüssigkeit (die Lymphbläschen), zuweilen jedoch auch eine gelbliche, eiterartige Materie (die Eiterbläschen) und manchmal auch eine blutige Flüssigkeit (die Blutblasen). Oft sind die Blasen sehr klein, z. B. von der Grösse eines Hirsekorns bis zu der einer Erbse, in welchem Falle sie Bläschen (Vesiculae, Phlyctaenae) genannt werden, oder sie sind von bedeutender Grösse, z. B. wie eine wälsche Nuss, in welchem Falle man sie Blasen (Bullae) heisst.

5) Die *Beulen* und *Knoten* (Phymata, Tubercula). Sie sind harte, begränzte Erhabenheiten der Haut, welche grösser sind, als die Knötchen, und sich nicht sowohl, wie diese, an der Spize mit Lymphe füllen, welche die Epidermis von der unter ihr befindlichen Hautstelle trennt, sondern, wenn sie entzündet sind, in kleine Abscesse übergehen, oder sich allmälig zertheilen, oder auch, wenn sie nicht entzündet sind, unverändert stehen bleiben.

6) Die *Auswüchse* (Excrescentia). Es sind dieses Gebilde verschiedener Art, welche aus der Haut wuchernd hervorwachsen. Die Gewebe dieser Gebilde sind von dem der Haut verschieden; oft sind es mehr weiche, fleischartige Auswüchse, oft sind sie warzenartig, zuweilen hornartig etc. Die Auswüchse sind zuweilen Knoten, insofern sie nämlich harte Erhabenheiten der Haut darstellen, es sind übrigens nicht alle Knoten oder Beulen Auswüchse, indem dieselben häufig keine neue Gebilde sind, sondern oft nur in einer in entzündlicher Verhärtung begriffenen Hautstelle bestehen.

7) Die *Schuppen* (Squamae). Zuweilen blättert sich die Epidermis in ganz kleinen, mehl- oder kleienartigen Schuppen los (die Kleien, Furfura), in andern Fällen bilden sich etwas grössere, festere, halbdurchsichtige Lamellen (die Schuppen, Squamae), und in manchen Fällen entsteht aus dem in dem Ausschlag enthaltenen und eintrocknenden Eiter und aus ausgeschwizter Lymphe eine dicke, harte, undurchsichtige Substanz (die Borke oder der Grind, Crusta).

§. 1219.

Die so eben beschriebenen Veränderungen in der Haut bleiben oft nur eine kurze Zeit, z. B. wenige Tage, oft aber auch sehr lange stehen und können selbst unverändert das ganze Leben eines Individuums hindurch andauern. Es heilen die Hautausschläge, indem sie gewisse Veränderungen durchlaufen, wornach sie entweder verschwinden, ohne dass etwas auf der Haut losgestossen wird, oder indem gewisse Substanzen, meistens in der Form von Schuppen, auf die Oberfläche der Haut abgelagert und losgestossen werden, wobei häufig auch die Haut in vermehrte Ausdünstung versezt wird, und indem meistens zugleich das Allgemeinbefinden sich verändert, nämlich das vorhandene Fieber verschwindet, eine Kachexie zur Heilung gelangt, gastrische Unreinigkeiten ausgeleert werden etc. Meistens geschehen diese Verbesserungen des Allgemeinbefindens unter kritischen Ausleerungen, namentlich Schweissen und kritischem Harne.

§. 1220.

Nachkrankheiten der Hautausschläge sind zum Theil Affectionen in den Theilen, in welchen der Ausschlag seinen Siz hatte, wie z. B. Geschwüre auf der Cornea, Leucome etc., wenn der Ausschlag die Conjunctiva des Auges befallen hatte, zum Theil Störungen in den innern Theilen des Körpers. Die leztern können

hervorgebracht werden, sowohl durch das Leiden des Körpers, das mit dem Ausschlag zugleich bestand, z. B. durch das ihn begleitende Fieber oder die mit ihm verbundene Kachexie, als auch durch unvollkommene Entwicklung oder den Zurücktritt des schon gebildeten Hautausschlags.

§. 1221.

Den Tod führt der Hautausschlag durch sich selbst in der Regel nur dann herbei, wenn die Ablagerung von Stoffen auf die Haut so bedeutend ist, dass hierdurch Abzehrung bewirkt werden kann, wie dieses z. B. in dem schuppigen Aussaze öfters der Fall ist, gewöhnlicher tödtet die Krankheit durch das allgemeine Leiden, von dem der Hautausschlag nur die Folge oder ein Theil ist, insbesondere durch Fieber oder eine Kachexie, oder dadurch, dass die Entwicklung des Hautausschlags nicht zu Stande kommt oder der Krankheitsprozess sich von den äussern auf die innern Theile wirft.

§. 1222.

Die Schleimhautexantheme können tödtlich werden durch die Störung der Verrichtung des Theiles, in welchem sie ihren Siz haben, z. B. durch Störungen des Athmens und der Verdauung, durch das Fieber, das sie so leicht erregen, und die profusen Absonderungen, welche sie hervorbringen.

§. 1223.

Eine besondere Anlage zu Hautausschlägen, insbesondere zu gewissen Arten von Exanthemen, haben Kinder, welche von syphilitischen und überhaupt von kachektischen Eltern stammen; es hat aber, wenn die Eltern an der Lustseuche litten, desshalb das Exanthem bei den Kindern nicht gerade den syphilitischen Character. Oft bleibt die Anlage zu Hautausschlägen bei mehrern Generationen *erblich.* — Wie bei Kindern, findet man auch häufig bei Personen vom Greisenalter Hautkrank-

heiten; ebenso trifft man sie oft in der Periode des Mannbarwerdens, der monatlichen Reinigung und der Schwangerschaft an. Im Allgemeinen sind Personen mit sehr zarter, verweichlichter Haut und auch solche mit sehr derber, trockener Haut mehr als andere zu diesen Krankheitsformen geneigt, vorzüglich leiden aber daran Individuen von dyscrasischem Körper, insbesondere syphilitische und scrophulöse. Die specifischen, fieberhaften Hautausschläge heben durch den Krankheitsprozess selbst die Anlage zur Erneuerung der Krankheit mehr oder weniger vollkommen auf.

§. 1224.

Als Gelegenheitsursachen werden zum Theil genannt: rein örtlich wirkende Ursachen, welche den normalen Hautausdünstungsprozess hemmen, wie z. B. grosse Unreinlichkeit der Haut, so wie auch Dinge, welche die Haut in einen gereizten Zustand versezen, wie z. B. reizende Salben und Pflaster, doch gehören diejenigen Veränderungen der Haut, die die unmittelbare Folge äusserer Einwirkungen sind, wie z. B. die Blasen nach dem Auflegen der Blasenpflaster, eigentlich nicht zu den Hautausschlägen, ferner die Ansteckungsstoffe, welche stets specifische Hautausschläge hervorbringen, so wie die Ursachen allgemeiner Mischungsausartung der Säfte, namentlich der Scropheln, des Scorbutes und der Lustseuche, zum Theil auch die Unterdrückung der Absonderungen, z. B. der Galle oder des Harnes, auch die Ursachen allgemeiner Nervenzerrüttung, z. B. Onanie. Sehr häufig sind die consensuell und antagonistisch wirkenden Ursachen: reizende Stoffe im Magen und den Gedärmen, wie Galle, Schleim, Würmer, der Genuss von Krebsen, Käse etc., auch zum Theil die Unterdrückung von Absonderungen, die Unterdrückung des monatlichen Blutabganges etc.

§. 1225.

Die Ursachen der Schleimhautexantheme sind zum Theil ebenfalls Ansteckung, nicht selten essentielle Fieber, Kachexien und gastrische Reize.

§. 1226.

Wesen. Die ältern Aerzte sehen als den Grund der Hautausschläge eigenthümliche Schärfen an, und zwar wird zum Theil angenommen, dass jede Art von Exanthem durch eine bestimmte Schärfe bedingt sei. (Diese Schärfen können übrigens immer nur als eine entferntere Ursache der Ausschläge angesehen werden). *Authenrieth*[1]) nimmt eine zu starke Oxydation der Lymphe an, *Reil*[2]) sezt die nächste Ursache der Exantheme in eine Störung der respiratorischen Hautthätigkeit, *Henke*[3]) in krankhafte Reproduction der Haut, *Marcus*,[4]) *Haase*[5]) u. A. in Entzündung der Haut, *Kieser*[6]) erklärt die Exantheme, unter welcher Benennung derselbe jedoch nur die Blattern, die Masern, den Scharlach und das Fleckfieber versteht, für die äussern Reflexe innerer Entwicklungsprozesse, wodurch das Individuum auf eine höhere Stufe des Lebens gehoben werde, und *Danzer*[7]) sieht sie wie eigene Organismen an, die ähnlich den Zoohpyten ein parasitisches Leben führen.

§. 1227.

Sowohl was die Veränderungen in der Haut und in den Schleimhäuten selbst betrifft, als auch was die Störungen im Allgemeinbefinden anbelangt, welche die Hautausschläge begleiten, sind es dem Wesen nach sehr

1) Hildenbrand institut. pract. med. Tom. IV. — 2) Fieberlehre. B. V. S. 37. — 3) Handbuch d. spec. Pathologie. B. II. pag. 586. — 4) Spec. Therap. B. III. pag. 10. — 5) Chron. Krankh. B. 3. §. 582. — 6) Ueber das Wesen der Exantheme. pag. 7 u. 25. — 7) Synopsis der Hautkrankheiten. S. 17.

verschiedenartige Krankheitsprozesse, welche die den Ausschlag darstellende Abweichungen in der Farbe und in der Form der Haut hervorbringen; es haben daher auch manche Aerzte, namentlich *Sauvages*, *R. A. Vogel*, *Swediaur* und *Sagar*, die Hautausschläge in verschiedene Krankheitsfamilien, z. B. in die der Fieber, der Kachexien und der örtlichen Krankheiten vertheilt.

Die Krankheitsprozesse in der Haut und in den Schleimhäuten, welche den Ausschlag darstellen, sind entweder:

1) *wahre Entzündungen* (Erhärtungsentzündungen). Sie haben meistens mehr oder weniger tief in der Lederhaut oder der Schleimhaut ihren Siz und stellen harte entzündete Knötchen (Papulae) und zuweilen auch grössere entzündliche Beulen dar und gehen meistens in Eiterung über. Hieher gehören die Blattern, die Finnen, die Furunkel im Darmkanal, die Dothienterite etc. oder

2) *seröse Entzündungen.* Dieselben haften in den mehr auf der Oberfläche sich befindenden Capillargefässen der Lederhaut oder der Schleimhaut und stellen rothlaufartige Flecken dar, die entweder, ohne eine andere Veränderung der Haut, als eine etwa nachfolgende Abschuppung zurückzulassen, wieder verschwinden oder durch den Uebergang in Ausschwizung unter die Epidermis eine andere Form von Ausschlägen (die Blasen) hervorbringen. Hieher gehören der Scharlach, das Erythema, die rothen Flecken, welche dem Pemphigus und andern blasenartigen Ausschlägen oft vorhergehen, die Schwämmchen etc.

3) *Absonderungen.* Die Absonderung geschieht vorzüglich in den oberflächlich liegenden Capillargefässen der Lederhaut und zum Theil vielleicht auch in der Substanz der Haut bei der rückschreitenden Metamorphose. Oft werden Flüssigkeiten secernirt, die sich zwischen der Lederhaut und der Epidermis ansammeln und hier-

durch Blasen bilden; zuweilen hat sich die Epidermis schon abgeblättert und es entsteht eine nässende Fläche oder die mehr dicklichte Flüssigkeit verdichtet sich zu Schuppen und Krusten, manchmal werden auch nur gewisse Pigmente secernirt und unter die Epidermis abgelagert, wodurch verschiedene Flecken entstehen. Auf dem Wege der Secretion entstehen mit oder ohne Entzündung die blasenartigen Ausschläge, die flechtenartigen Ausschläge (der Salzfluss), die Sommersprossen etc.

4) *Blutflüsse.* Die Petechien und die grössern Ecchymosen sind Blutergiessungen unter die Epidermis.

5) *Nicht entzündliche Erhärtungen* der Gewebe. Diese Verhärtungen sind eine krankhafte Stoffanlagerung und zum Theil auch Verschmelzung der im Gewebe des Organs sich befindenden Similartheile zu einer festern Substanz. Es gehören vorzüglich hieher die Warzen, die Knollen im arabischen Aussaz und mancherlei nach Hautausschlägen zurückbleibende und sie begleitende Callositäten der Haut, doch sind die angeführten Verhärtungen zum Theil zugleich Aftergefilde.

6) *Erweichung der Gewebe.* Es verschmelzen die im Organ befindlichen Similartheile zu einer gleichförmigen weichen Masse, die bei den verschiedenen Arten der Erweichung von sehr verschiedener Beschaffenheit ist. Hieher gehören die weisse und die dunkle Morphea in dem Aussaz und manche Verschwärungen, die aus Pusteln, Blasen etc. zuweilen entstehen.

7) *Afterbildungen.* Sie bestehen in eigenthümlichen Umänderungen in den reproductiven Prozessen, die, so wie die andern angeführten Krankheitsprozesse, in besondern Kapiteln der speciellen Krankheitslehre näher erörtert werden sollen. Es gehören hieher z. B. die himbeerartigen Auswüchse in der Framboesia.

§. 1229.

Die Krankheitsvorgänge im übrigen Körper, welche

bei manchen Hautausschlägen wesentlich zur ganzen Krankheit gehören, sind insbesondere Fieber und Kachexien.

§. 1230.

Die Krankheitsprozesse in der Haut und den Schleimhäuten, die den Hautausschlag bilden, können auf zwei Wegen hervorgebracht werden:

1) Durch primäre Affection des Nervensystems. Eine veränderte Einwirkung der Nerven auf das Blut und auf das Organengewebe kann alle die oben angeführten krankhaften Prozesse, welche die Hautausschläge unmittelbar bedingen, wie wahre Entzündung, seröse Entzündung, krankhafte Absonderung etc. hervorbringen. Von primärer Affection des Nervensystems entstehen diese Krankheitsprozesse 1) bei Hautausschlägen, welche durch örtliche Reizung hervorgebracht werden, wie z. B. durch scharfe Pflaster; 2) bei Hautausschlägen, die auf consensuelle oder antagonistische Weise sich bilden, welche Entstehungsweise z. B. da angenommen werden muss, wo an einem entfernten Theil solche Reize wirken, die nicht als fremde Stoffe in die Wege der Circulation gelangen können, z. B. wenn Hautausschläge durch den Wurmreiz entstehen, so wie da, wo Hautausschläge sich nur an bestimmten, mit dem primär leidenden Organ in Consens stehenden Stellen bilden, wie z. B. die Bläschen an den Lippen bei gastrischen Reizungen, und 3) bei Hautausschlägen, die im Gefolge eines allgemeinen Nervenleidens auftreten, wie zuweilen der Pemphigus bei Hysterie, doch kann bei allgemeinem Nervenleiden sich die Säftemasse verändern und die Entstehung des Ausschlags auch in solchen Fällen durch einen Fehler der Säfte bedingt sein.

§. 1231.

2) Durch eine fehlerhafte Beschaffenheit des Blutes. Ist das Blut fehlerhaft, so tritt es in den Capillargefässen mit dem Nervensysteme und mit dem ganzen Organen-

gewebe in eine fehlerhafte Wechselwirkung, wodurch in der Haut mancherlei Veränderungen hervorgebracht werden. Zuweilen ist das Blut zu dünnflüssig und es dringen kleine Blutstropfen oder wenigstens färbende Theile des Blutes durch das Gewebe und lagern sich unter die Epidermis ab, wodurch Petechien und grössere Ecchymosen entstehen; oft mag das Blut durch eine fehlerhafte Beschaffenheit veranlassen, dass krankhafte Stoffe in das Gewebe der Haut abgelagert werden und somit dieselbe fehlerhaft ernährt wird; häufig sind scharfe Stoffe in dem Blute vorhanden, welche in das Capillargefässnez der Haut gelangen und Entzündungen mit verschiedenen Produkten, fehlerhafte Absonderungen etc. erregen. In solchen Fällen sind im Krankheitsprozess verwickelt: 1) das in den Nerven wirkende Prinzip, 2) das Blut, so wie auch in gewissen Fällen das Gewebe der Haut und 3) der in das Blut oder in das Gewebe der Haut gelangte fremdartige Stoff. Ist dieser fremde Stoff ein Contagium, so wird er durch den bio-chemischen Prozess zwischen den so eben bezeichneten drei Factoren vervielfältigt und ausgeschieden. Die Art des Hautausschlages hängt ab: 1) von der Stimmung der Nerven, 2) von der Beschaffenheit des Blutes und zuweilen von der des Gewebes der Haut und 3) in gewissen Fällen von der Beschaffenheit des von Aussen eingedrungenen Stoffes. Dass zuweilen Schärfen im Blute Hautausschläge hervorbringen, wird schon dadurch bewiesen, dass öfters Arzneimittel, die man in verschiedenen Absonderungen wieder findet, Hautausschläge veranlassen, wie z. B. das Terpenthinöl.

§. 1232.

Die Vorhersage richtet sich, in Hinsicht auf die zu erwartende Heilung, 1) nach der Art des Exanthems, indem es Ausschläge gibt, welche ganz von selbst in einer gewissen Zeit verschwinden, und andere, die in

der Regel nicht geheilt werden, 2) nach den Ursachen des Exanthems, indem bei leicht zu entfernender Ursache in der Regel auch der Ausschlag leicht geheilt wird, 3) nach der Dauer der Krankheit, indem erst vor kurzem entstandene Ausschläge meistens leichter zu beseitigen sind, als schon lange bestehende, die oft sehr hartnäckig sind, und die man wegen der üblen Folgen, die ihre Entfernung haben kann, nicht immer heilen darf, 4) nach der Ausbreitung des Exanthems, indem ein allgemein über den Körper verbreiteter Ausschlag meistens schwierig zu beseitigen ist und oft nicht ohne nachtheilige Folgen zur Heilung gebracht wird, doch gilt dieses nur von chronischen Ausschlägen und nicht von den fieberhaften, 5) nach dem Alter des Kranken, indem Ausschläge bei Personen vom Greisenalter im Allgemeinen hartnäckig sind und auch ihre Entfernung, wegen leicht entstehenden innern Krankheiten, Vorsicht erfordert, während die Kinder befallende Hautausschläge meistens von selbst verschwinden, insbesondere bei dem Uebertritt des Individuums von dem Knaben- in das Jünglingsalter und 6) von dem Vorhandensein specifischer Mittel. — Die Gefahr der Krankheit hängt vorzüglich von der Art des Ausschlags ab.

§. 1233.

B e h a n d l u n g der Hautausschläge. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Es ist darauf zu sehen, dass die normale Hautausdünstung nicht gehemmt werde und es sind desshalb reine Wäsche, öfteres Waschen des Körpers mit lauwarmem Wasser und Bäder anzuempfehlen; der Kranke muss alle scharfen Stoffe in der Nahrung, die auf die Haut wirken können, wie eingesalzenes und geräuchertes Fleisch, Käse etc., vermeiden und sich dagegen milder Nahrungsmittel, namentlich der Milchspeisen, bedienen, sind gastrische Reize vorhanden,

so müssen sie entfernt werden, die monatliche Reinigung sucht man wieder herzustellen etc.

§. 1234.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Da manche Ausschläge nur die Krise eines innern Leidens sind, so darf ihre Entwicklung nicht immer gehemmt werden, und es muss selbst zuweilen ihre Entstehung befördert und für ihr Fortbestehen Sorge getragen werden.

Manche Hautausschläge, namentlich die fieberhaften, heilen von selbst, nachdem sie gewisse Veränderungen durchlaufen haben, und es hat daher der Arzt nur dafür zu sorgen, dass dieses nicht unter zu stürmischen Bewegungen geschehe.

§. 1235.

Um den Krankheitsprozess, der den Hautausschlag bildet, zur Heilung zu führen, haben wir die doppelte Aufgabe: die etwa vorhandenen fehlerhaften Stoffe, welche in den Krankheitsprozess eingehen, zu tilgen und unmittelbar die Nerventhätigkeit in der Haut umzustimmen und auf ihren Normalgrad zurückzuführen. Zum erstern Zweck dienen die unter dem Namen mischungsändernde Mittel bekannten Arzneistoffe, sei es, dass sie gewisse, in den Körper gelangte specifische Stoffe zu neutralisiren vermögen, oder nur im Allgemeinen eine Veränderung in der Mischung der festen und flüssigen Theile hervorbringen. Zu diesen Mitteln gehören vorzüglich die Quecksilberpräparate, welche sowohl specifisch bei gewissen contagiösen Hautkrankheiten, insbesondere den syphilitischen, wirken, als auch eine allgemeine, der scorbutischen ähnliche Auflösung der Säfte hervorbringen, mehr oder weniger die Antimonialien bei herpetischen Ausschlägen, wie es scheint, der Schwefel bei der Kräze, die Mineralsäuren bei scorbutischen Ausschlägen etc. Ebenso wirken wir mischungsändernd,

indem wir gewisse Stoffe, aus welchen bestimmte Bestandtheile des Blutes bereitet werden, in vermehrter Menge dem Körper darbieten oder sie ihm entziehen, so ist z. B. reichliches Getränk oft sehr wohlthätig, die Entziehung stark nährender Speisen ist bei Ausschlägen mit wuchernder Vegetation nothwendig, und dagegen sind bei Exanthemen, welche aus einer gewissen Auflösung der Säfte entspringen, China und Eisen nüzlich, indem dieselben zur Vermehrung des Blutrothes und Faserstoffes im Blute beitragen etc. Zu dem zulezt angegebenen Zwecke dienen überhaupt die Mittel, welche eine kräftigere Verdauung und dadurch eine bessere Bereitung der Lymphe bewirken. — Diese verschiedenen, auf die Mischung wirkenden Mittel können sowohl innerlich gegeben, als auch unmittelbar auf die Haut, in Form von Bädern, Waschungen und Salben angewandt werden, wo sie nach erfolgter Resorption wirken. Hieher gehören die Bäder und Waschwasser mit Sublimat, Mineralsäuren, Schwefelleber etc. und die verschiedenen Quecksilbersalben, Schwefelsalben, Graphitsalben etc.

§. 1236.

Wie wir dadurch mischungsändernd wirken, dass wir gewisse, zur Veränderung der Mischung beitragende Stoffe in die Säfte bringen, so bewirken wir auch dadurch eine Umwandlung in den Mischungsverhältnissen, dass wir gewisse, in den Säften oder im Gewebe der Organe befindliche Stoffe entfernen.

Zu diesem Zwecke dienen sowohl Mittel, die auf die Resorption wirken und daher zur Aufsaugung der in das Gewebe der Haut und in andere Theile abgelagerten Stoffe beitragen, wie die Antimonialien (Nro. 69), die Mercurialien, Baryta muriatica, das Jod, die auflösenden, narcotischen Mittel, wie Belladonna, Cicuta, Blausäure etc., als auch Mittel, die auf die Absonderungen wirken und dadurch die Ausscheidung von Stoffen

aus den Wegen der Circulation bewirken, hieher gehören insbesondere die schweisstreibenden Mittel, welche aus dem leidenden Organe selbst Stoffe ausscheiden, aber auch urintreibende Mittel, die auf die Absonderung der Galle wirkenden Mittel etc. Mehrere, der zu diesem Zwecke gebräuchlichen Mittel wirken auf mehrere Absonderungen zugleich, und man unterstüzt ihre Wirkung, indem man sie in flüssiger Form mit reichlichem Wasser gibt. Die meisten der unter dem Namen blutreinigender Mittel bekannten Arzneistoffe gehören hieher, namentlich das Guajak, Herba Jaceae, Radix Sarsaparillae, Caricis arenariae, Bardanae, Stipites Dulcamarae, Turiones et Lignum Juniperi, Pini, cortex Ulmi, die Extracte und frisch ausgepressten Säfte von radix Graminis, Taraxaci, Saponariae, Herba Chaerefolii, Fumariae, Nasturtii aquatici, Cochleariae etc. Um die Ausscheidungen aus der Haut zu vermehren, wendet man auch warme, einfache Bäder, Schwefelbäder, Dampfbäder etc. an.

§. 1237.

Die zweite Aufgabe ist, die Nerventhätigkeit in der Haut auf ihren Normalgrad zurückzuführen. In der Regel ist die Haut in einem Zustand von Reizung und selbst von Entzündung, und es leisten aus diesem Grunde die besänftigenden Mittel oft so vortreffliche Dienste in Hautausschlägen. Die besänftigenden Mittel innerlich gegeben, haben in der Regel eine geringere Wirkung, als die äussern, doch sind Oelmixturen und einhüllende Getränke, so wie die ein narkotisches Princip habenden Stipites Dulcamarae, das Aconitum Napellus, die Blausäure und zuweilen auch das Opium von Nuzen. Die äusserlichen besänftigenden Mittel sind vorzüglich: das Bestreichen der kranken Hautstellen mit frischem Schweinefett, Butter oder einem milden Oel, das Waschen derselben mit lauwarmem Wasser und Milch, mit einer

Abkochung von Kleien, Eibischwurzel, Mohnköpfen, das Bähen der Theile mit solchen Abkochungen, so wie auch lauwarme Bäder mit Milch, Kleien, das Malzbad, das Thierbad.

§. 1238.

Zuweilen ist auch die Haut in einem Zustand von Reizlosigkeit und Atonie. In diesen Fällen passen innerlich zum Theil erregende und zum Theil tonische Mittel, und äusserlich Salben mit reizenden Stoffen, z. B. Salben mit weissem oder rothem Queksilberpräcipitat, mit Schwefelblumen, Salmiak, Lorbeeröl etc., Waschwasser und Bäder mit Zusaz von Alkalien, Salzen (das Seebad), Schwefelleber, Sublimat, Eisen, Mineralsäuren, scharfen oder aromatischen und tonisch wirkenden Pflanzen, Räucherungen mit schwefelichter Säure etc.

§. 1239.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Ist der Hautausschlag unter nachtheiligen Zufällen zurückgetreten, so hat man zunächst die Ursache dieses Zurücktrittes aufzusuchen und zu entfernen; insbesondere ist Verkältung zu vermeiden; trägt ein erhöhter Lebensprozess, insbesondere Entzündung in innern Theilen, die Schuld an dem schnellen Erlöschen des Krankheitsprozesses auf der Haut, so bewirken oft Mittel, die gegen jene Krankheit gerichtet sind, z. B. eine Aderlässe, das Wiedererscheinen des Ausschlags. Sezt die Ursache des Zurücktrittes des Ausschlages keine Hindernisse entgegen, so wendet man Mittel an, die auf die Haut treiben, den Spiritus Mindereri, einen schweisstreibenden Thee, den Kampher, das *Dover*'sche Pulver, warme Bäder, Bäder mit Schwefelleber etc., so wie auch Hautreize, Senfteige, Blasenpflaster, Seidelbast, die Brechweinsteinsalbe, in gewissen Fällen selbst die Moxen oder auch die neue Einimpfung des verschwundenen Ausschlags. Zugleich behandelt man das durch den Zurücktritt des Ausschlags

entstandene innere Leiden nach den Anzeigen, welche die Natur des Uebels gibt.

§. 1240.

Die Behandlung der Schleimhautexantheme ist im Allgemeinen die in dem Kapitel von den Entzündungen angegebene Behandlung der schleichenden Entzündungen und die der Geschwüre im Darmkanal. Ausserdem muss man aber die für die Behandlung der Hautausschläge geltenden allgemeinen Anzeigen berücksichtigen.

§. 1241.

Eintheilung der Hautausschläge. Schon die ersten Versuche, die gemacht worden sind, die Hautausschläge einzutheilen, unterscheiden sich von einander darin, dass in dem einen die Verschiedenheit der Form des Exanthems und in dem andern die nächsten und die entferntern Ursachen desselben das Eintheilungsprinzip waren. *Plenk* war der erste, welcher die Hautausschläge nach ihrer Form ordnete, und *Lorry* (beinahe gleichzeitig) der erste, welcher dieselben nach ihrer Entstehungsweise eintheilte.

Nach der Form der Krankheit wurden die Exantheme auf eine zweifache Weise eingetheilt, von den Einen nach bestimmten einzelnen Merkmalen in den Veränderungen in der Haut selbst (künstliche Systeme), nach den Andern nach dem Gesammtausdruck der ganzen Krankheit. Die erstere Eintheilungsart wählte *Plenk* und ordnete die Hautkrankheiten in folgende Klassen: 1) Maculae, 2) Pustulae, 3) Vesiculae, 4) Bullae, 5) Papulae, 6) Crustae, 7) Squamae, 8) Callositates, 9) Excrescentiae cutaneae, 10) Ulcera cutanea, 11) Vulnera cutanea, 12) Insecta cutanea, 13) Morbi unguium, 14) Morbi pilorum. Ihm folgten im Wesentlichen die meisten neuern Schriftsteller, namentlich auch *Willan* und *Bateman*. Ersterer nimmt folgende Ordnungen an: 1) *Papulae* mit den Gattungen Strophulus, Lichen und Prurigo, 2) *Squamae* mit den Gattungen Lepra, Psoriasis, Pityriasis

und Ichthyosis. 3) *Exanthemata* mit den Gattungen Rubeolae (Masern), Scarlatina, Urticaria, Roseola, Purpura (Petechien), Erythema. 4) *Bullae* mit den Gattungen Erysipelas, Pemphigus, Pompholyx, Herpes, Varicellae, Miliaria, Eczema, Aphthae. 5) *Pustulae* mit den Gattungen Impetigo, Ecthyma, Variolae, Scabies, Porrigo. 6) *Tubercula* mit den Gattungen Phymata, Verrucae, Acne, Lupus, Elephantiasis, Framboesia und 7) *Maculae* mit den Gattungen Ephelis, Naevus und Spilus. *Bateman* trennte die Ordnung Bullae in die der Bullae und Vesiculae. Zu den Eintheilungen der Ausschläge nach ihrem Gesammtausdruck kann die von *P. Frank* u. A. angenommene Eintheilung derselben in Exantheme (die acuten, mehr oder weniger mit Fieber vorkommenden Hautausschläge) und Impetigines (die chronischen mit einem kachektischen Habitus verbundenen Ausschläge) gerechnet werden. Auch gehört hierher *Alibert's* Eintheilung, nach welcher es folgende Familien von Hautkrankheiten gibt: 1) Dermatoses eczémateuses, 3) Derm. exanthémateuses, 3) Derm. teigneuses, 4) Derm. dartreuses, 5) Derm. cancéreuses, 6) Derm. lépreuses, 7) Derm. véroleuses, 8) Derm. strumeuses, 9) Derm. scabieuses, 10) Derm. hémateuses, 11) Derm. dyschromateuses, 12) Derm. hétéromorphes.

§. 1242.

Nach dem Wesen und den Ursachen theilte *Lorry* die Hautkrankheiten in folgende Klassen: I. Krankheiten, welche auf die Haut geworfen werden durch ein im Innern liegendes Leiden, und II. Krankheiten, welche in der Haut selbst entstehen. Die erste Klasse zerfällt in folgende Abtheilungen: 1) Krankheiten, welche auf die ganze Haut abgelagert werden. Es sind dieses entweder hizige Krankheiten, bei welchen nicht kritische Ausbrüche auf der Haut geschehen (die symptomatischen Hautausschläge in manchen Fiebern), oder hizige Krank-

heiten, deren Krise nach der Haut geht (wie z. B. bei dem Scharlach und den Masern), oder nicht hizige Reinigungskrankheiten, die nach der Haut gehen (wohin z. B. Lichen, Kräze, Flechten und Aussaz gehören) und 2) reinigende Hautkrankheiten, welche nur einen einzelnen Theil befallen (wie der Gürtel, der Kopfgrind etc.). Die zweite Klasse wird getheilt: 1) in die Krankheiten, welche in der ganzen Haut entstehen können (wie zu grosse Dichtheit der Haut, Flecken auf der Haut, einzig von einem Fehler der Haut abhängend, wie z. B. Sommersprossen etc.) und 2) Krankheiten, welche einzelnen Theilen eigen sind (wie der Kahlkopf, der Kupferhandel etc.).

Nach der wesentlichen Verschiedenheit der in der Haut selbst vor sich gehenden Krankheitsprozesse theilte *Rayer* die Hautkrankheiten ein: 1) in Entzündungen der Haut, 2) Congestionen und Blutflüsse der Haut, 3) Nevrosen der Haut, 4) Veränderungen der Farbe der Haut, 5) krankhafte Absonderungen und 6) Fehler der Bildung. Die meisten Ausschläge zählt derselbe zu den Entzündungen und nahm als verschiedene Ordnungen Inflammations exanthémateuses, bulleuses, vésiculeuses, pustuleuses etc. an, wodurch im Ganzen dieselben Familien gebildet werden, wie sie *Plenk* und *Willan* annehmen.

§. 1243.

Unter den angeführten Eintheilungsmethoden der Ausschläge hat im Ganzen die von *Willan* am meisten Beifall erhalten, indem sie die Diagnose der Hautausschläge erleichtert; es hat jedoch diese Methode folgende bedeutende Mängel: 1) sie stellt Krankheiten in verschiedene Klassen, die offenbar natürliche Familien bilden, und auch ihrem Wesen nach ganz mit einander verwandt sind, so z. B. werden die ansteckenden fieberhaften Exantheme in der 3ten, der 4ten und der 5ten Klasse,

ja die Varicellen, die vielleicht nur eine Modification der Variola sind, in einer andern Klasse als diese Krankheit abgehandelt, der schuppige Aussaz steht in der 2ten und der knotige Aussaz in der 6ten Klasse etc. 2) Ausschläge, die ihrer Bedeutung nach weit von einander verschieden sind, bilden eine Familie, so die Flechten und die Varicellen, die gewöhnliche Warze und die Elephantiasis etc. Es gehört nach diesem Eintheilungsprincip ein und dieselbe Ausschlagsart in verschiedenen Stadien der Krankheit und nach verschiedenen Modificationen, unter welchen sie oft zu gleicher Zeit auf dem nämlichen Individuum erscheint, ganz verschiedenen Klassen an, so z. B. müsste die Variola sogleich nach ihrem Ausbruch in die erste Klasse, im Zeitraum der Füllung in die 5te Klasse und im Zeitraum der Abschuppung in die 2te Klasse gestellt werden, die Flechten gehören in ihrem Beginnen zur 4ten, und bei längerer Dauer zur 2ten Klasse, und die die Kräze darstellenden verschiedenen Veränderungen in der Haut, welche oft zugleich an einem Individuum angetroffen werden, müssen, so weit sie in Blätterchen bestehen, in die 3te, in so fern sie aber Bläschen und Pusteln darstellen, in die 4te und 5te Klasse gereiht werden; 3) endlich gewährt diese Eintheilung für die Therapie durchaus keine Vortheile.

§. 1244.

Viel mehr nach dem Wesen der Gesammtkrankheit und also auch mit grösserm Gewinn für die Therapie ordnen wir die Hautausschläge (nach dem Vorgange von *Lory*) nach ihrer *Entstehungsweise*, nämlich nach den im Körper selbst liegenden Ursachen des krankhaften Zustandes der Haut. Nach diesem Eintheilungsgrunde theile ich die Hautausschläge in folgende Ordnungen ein, die zugleich natürliche Familien darstellen:

Erste Ordnung: *Die specifischen fieberhaften Haut-*

ausschläge. Es ist der Ausschlag stets das Erzeugniss eines ansteckenden Fiebers, von dem er einen wesentlichen Bestandtheil ausmacht, und zwar hat er bei jeder Art der contagiösen Fieber eine ganz bestimmte Form. Immer geht einem solchen Ausschlag ein Fieber von bestimmter Dauer und mit eigenthümlichen Erscheinungen vorher, sodann bricht der Ausschlag hervor und hat mehr oder weniger die Eigenschaft der Krisen, und die durch ihn hervorgebrachten Stoffe pflanzen stets die nämliche Krankheitsart fort. Hieher gehören der Scharlach, die Rötheln, die Masern, die Blattern, die Varicellen, das Typhusexanthem und die Pestkarbunkeln.

§. 1245.

Zweite Ordnung: *Die symptomatischen Hautausschläge.* Diese Ausschläge sind Symptome verschiedenartiger Krankheitszustände, und zwar kommt jede einzelne Art derselben im Gefolg von sehr verschiedenen Krankheiten vor. Oft geschieht der Ausbruch dieser Exantheme mit Erleichterung, oft aber auch ohne dieselbe und niemals ist das Erscheinen des Ausschlags eine nothwendige Bedingung der Heilung der bestehenden Krankheit.

§. 1246.

Man kann zwei Gruppen symptomatischer Hautausschläge unterscheiden. In der einen bemerken wir Exantheme, von denen jedes bald mit, bald ohne Fieber vorkommt, die in der Regel schnell entstehen und nie festwurzeln, nämlich die einzelne Veränderung in der Haut, während durch immer sich wiederholende Ausbrüche die Krankheit ziemlich langwierig werden kann, und welche niemals ansteckend werden. Wegen der kürzern Dauer der einzelnen Veränderungen auf der Haut möchte ich diese Gruppe der Ausschläge *die flüchtigen symptomatischen Exantheme* nennen. Zu dieser Gruppe gehören die Hautröthe (Erythema), das Röschen (Roseola), die Nesselsucht (Urticaria), die Hizblätterchen

(Strophulus), die Schwindflechte (Lichen), die Petechien (Petechiae), der Friesel (Miliasia), die Hizbläschen (Eczema), der Gürtel (Zona), der Blasenausschlag (Pemphigus), die Eiterblase (Ecthyma), die Schmuzrufe (Rhypia), das Bluteisen (Furunculus), der Karbunkel (Anthrax) und die Schwämmchen (Aphthae).

§. 1247.

Die zweite Gruppe der symptomatischen Ausschläge bilden solche Exantheme, die nie als ein bloses Fiebersymptom, sondern immer im Gefolge eines chronischen Leidens auftreten und auch nicht eine flüchtig vorübergehende Veränderung in der Haut sind, sondern in derselben festere Wurzel schlagen, so dass sie zu einem selbstständigen Leiden der Haut werden können. Diese Hautausschläge bilden den Munttheil der Krankheit oder stellen selbst eine selbstständige Krankheitsform dar, sie sind dem Ausdruck der Krankheit nach mit der dritten Ordnung der Hautausschläge, der specifischen fieberlosen Ausschläge, verwandt und erhalten zum Theil bei besonderer Bösartigkeit eine Ansteckungsfähigkeit, so dass sie in die eben bezeichnete Ordnung der Exantheme übergehen. Ich möchte diese Gruppe von Ausschlägen die *festwurzelnden symptomatischen Exantheme* nennen. Hieher gehören die Finnen (Acne), die Juckknötchen (Prurigo), die Hautkleie (Pityriasis), der Leibgrind (Impetigo), die Flechten (Herpes) und der Kopfgrind (Tinea).

§. 1248.

Dritte Ordnung: *Die specifischen fieberlosen Hautausschläge.* Es sind chronische Krankheiten, welche der Erscheinung nach entweder nur in dem Hautausschlag bestehen, oder in welchen derselbe doch als der Haupttheil der Krankheit sich darstellt; das Leiden der Haut ist ein fortschreitender Krankheitsprozess, der am Ende den ganzen Organismus in Mitleidenschaft zieht, insbe-

sondere Kachexie hervorbringt, und dadurch als ein specifischer Prozess sich beurkundet, dass er ansteckend ist. Hieher gehören die Kräze, der Aussaz, der Weichselzopf und die Frambösia.

§. 1249.

Vierte Ordnung: *Die unverändert bleibenden ausschlagsartigen Hautfehler.* Es sind dieses Veränderungen in der Farbe und dem Gewebe der Haut, von denen es zum Theil zweifelhaft ist, ob sie nach Art der Hautausschläge entstanden sind, und die auch meistens kein fortschreitender Krankheitsprozess, sondern unverändert bleibende Strukturveränderungen sind, die auch in der Regel mit keinem innern Leiden in Verbindung stehen. Hieher müssen gestellt werden: die Sommersprossen (Ephelis), die Leberflecken (Chloasma), die Warze (Verruca), der Fischschuppenausschlag (Ichthyosis), das Muttermaal (Naevus maternus) etc.

Erste Ordnung der Hautausschläge.

Die specifischen fieberhaften Hautausschläge.

Da der Hautausschlag einen Theil des Fiebers ausmacht, die mit diesen Hautausschlägen verbundenen Fieber aber schon in der Fieberlehre in dem Abschnitt von den ansteckenden Fiebern beschrieben worden sind, so wird hier auf jenes Kapitel der Krankheitslehre verwiesen.

Die besten Abbildungen vom Scharlachexanthem findet man bei *Willan* und *Bateman*, Tab. 22 u. 23, und bei *Rayer*, Pl. 1, die von den Masern bei *Willan* und *Bateman*, Tab. 19, 20 u. 23, und bei *Rayer*, Pl. 1, die von den Blattern bei *Alibert*, Tab. 8, und bei *Rayer*, Pl. VI.; die von den Varicellen bei *Willan* und *Bateman*, Tab. 47 u 48, *Alibert*, Tab. 9, und *Rayer*, Pl. VI., und die von den Pestkarbunkeln bei *Willan* und *Bateman*, Tab. 59.

Zweite Ordnung der Hautausschläge.

Die symptomatischen Ausschläge.

Erste Gruppe:

Die flüchtigen symptomatischen Hautausschläge.

Die Hautröthe.

(*Erythema.*)

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 31 u. 32, *Alibert*, Tab. 2 u. 3, und *Rayer*, Pl. 2.

§. 1250.

Die **Hautröthe** ist der symptomatische Ausschlag, welcher in entzündlichen Flecken der Haut besteht, die, ähnlich dem Rothlauf, auf den Druck mit dem Finger an der berührten Stelle auf einen Augenblick verschwinden und ohne scharfe Begrenzung sich in die gesunde Hautfarbe verlieren.

§. 1251.

Meistens gehen dem Erythem innere Störungen voraus, es erscheint aber dasselbe selten kritisch. Der Ausbruch selbst geschieht nur mit geringer schmerzhafter Empfindung in der Haut, gewöhnlich nur unter etwas Brennen der Haut. Oft entstehen rothe Flecken von unregelmässiger Form, welche schnell wieder verschwinden und gern wiederkehren (Er. fugax. W.); manchmal entstehen, besonders an ödematösen Stellen,

ganz gleichförmige und glänzende Flecken (Er. laeve W.); zuweilen ist die Hautröthe auf der einen Seite durch einen harten, erhabenen und an einzelnen Stellen mit kleinen Blätterchen beszten rothen Rand begrenzt, während die andere Seite offen ist und die Röthe sich unbestimmt verliert (Er. marginatum *W.*); manchmal ist das Erythem auf seiner Oberfläche mit kleinen Blätterchen besäet (Er. papulatum); auch zeigt sich das Erythem als unregelmässige, rothe Flecken, welche um kleine, leicht erhabene Geschwülste (wie sie in der Nesselsucht vorkommen) sich ausbreiten (Er. tuberculatum *W.*); endlich gibt es eine Hautröthe, die in grossen, abgerundeten, rothen Flecken besteht, welche sich in ihrem Mittelpunkt erheben und schmerzhafte Knoten bilden, die aber wieder weich werden und sich senken, ohne in Eiterung überzugehen (Er. nodosum. *W.*).

§. 1252.

Der Verlauf des Erythems ist oft so schnell, dass in wenigen Stunden die ganze Erscheinung vorüber ist, bei fortdauernder Ursache kann aber auch die Krankheit chronisch werden. Es verschwindet die Hautröthe unter einer leichten Abschuppung der Oberhaut. Zuweilen entsteht aus dem Erythem eine Verschwärung und selbst Brand.

§. 1253.

Ursachen und Bedeutung. Das Erythema fugax kommt bei gallichten Diarrhöen, schleichenden Nervenfiebern, beim Typhus, Kindbettfieber, Lungenentzündungen etc. vor und deutet im Allgemeinen auf einen gefährlichen Gang der Krankheit; auch ist es oft die Folge von chronischen Krankheiten, Hysterie, Unterleibsstörungen, Urin- und Steinbeschwerden etc. Das Er. laeve wird bei stark gespannter Haut in der Hautwassersucht angetroffen, bei gallichten Affectionen, Schwächefiebern etc., und deutet überhaupt auf Schwäche

und auf Säfteentmischung. Das Er. marginatum kommt besonders in Krankheiten alter Personen vor und ist im Ganzen ein ungünstiges Zeichen. Das Er. papulatum findet man bei Handarbeitern, deren Arme sorglos dem plözlichen Wechsel der Temperatur blosgestellt sind, und bei Personen, die im Uebermaass geistige Getränke geniessen. Das Er. nodosum hat man vorzüglich bei Frauenspersonen an dem vordern Theil des Unterschenkels beobachtet; es steht zuweilen mit der monatlichen Reinigung in Verbindung.

§. 1254.

Behandlung. Man hat hier in der Regel nur die Aufgabe, das innere Leiden, von dem die Hautröthe ein Symptom ist, zu behandeln. Sollte ein Verfahren gegen das Hautleiden selbst nothwendig werden, so kann dieses nach den bei dem Rothlauf angegebenen Regeln eingerichtet werden.

Das Röschen.

(*Roseola W.*)

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 25, 26 und 27, *Alibert*, Tab. 10, *Rayer*, Pl. I.

§. 1255.

Das **Röschen** ist der symptomatische Ausschlag, der in einer rosenfarbigen, verschiedentlich gestalteten (mehr begrenzten) Röthe der Haut besteht, welche weder Blasen, noch Hautknötchen enthält.

§. 1256.

Willan beschreibt folgende Arten der Roseola: 1) Die Roseola aestiva, welche nach vorhergegangenen Fiebersymptomen ausbricht, in grössern und unförm-

lichern Flecken, als die der Masern besteht, Jucken erregt und mit Anschwellung der Mandeln verbunden ist. Es stimmt die Beschreibung *Willan's* in Manchem mit der *Heim's* von den umschriebenen Rötheln überein, doch beschuldigt *Willan* nicht ein Contagium, sondern Fatiguen, den plözlichen Wechsel der Temperatur etc. 2) Die Roseola autumnalis. Es besteht dieselbe in einzelnen, nicht über die Haut hervorgehenden Flecken, welche eine ovale, oft fast kreisförmige Gestalt haben, nach und nach bis zur Grösse eines Schillings wachsen und von so dunkelrother Farbe sind, dass man in einiger Entfernung glaubt, die Haut sei mit dem Safte schwarzer Kirschen oder Maulbeeren bestrichen worden. Der Ausschlag erregt weniger Jucken, ist mit keinem deutlichen Allgemeinleiden verbunden und endigt sich meistens durch Abschuppung. Er kommt bei Kindern von 5 — 10 Jahren, vorzüglich zur Herbstzeit, vor. — 3) Die Roseola annulata. Sie besteht in rosenfarbigen Ringen, innerhalb welchen die Haut die natürliche Farbe behält. Der Ausschlag kommt mit und ohne Fieber vor und wurde in Verbindung mit verschiedenen Krankheiten beobachtet, mit Unordnung in den Regeln, mit der Gicht etc. — 4) Die Roseola infantilis, welche in kleinen, rothen, in einander gedrängten Flecken besteht, und während der Zahnperiode, bei Fiebern und Unordnungen im Unterleibe bei Kindern vorkommt. — 5) Die Roseola variolosa. Dieselbe besteht in unregelmässigen, länglichten, in einander laufenden und mit kleinen Punkten untermischten Flecken und bricht zuweilen bei geimpften und zufälligen Blattern während des Eruptionsfiebers aus. 6) Die Roseola vaccina. Es kommt bei den Kuhpocken zuweilen eine ähnliche Efflorescenz, wie bei den wahren Blattern, vor, zuweilen kommen aber Masern von kleinen Punkten und Flecken zum Vorschein, die etwas über die Hautfläche hervorragen. Dieser Ausschlag

erscheint am häufigsten am 9ten oder 10ten Tag nach der Impfung und breitet sich von der Gegend der Impfstelle mehr oder weniger über den ganzen Körper aus. — 7) Die Roseola miliaris. Mit Frieselbläschen verbundene rothe Flecken. Kommt im Typhus vor.

§. 1257.

Die **Behandlung** der Roseola sei vorzüglich auf das innere Leiden gerichtet. Meistens möchten kühlende Getränke aus reichlich verdünnten Mineralsäuren etc. passen. Eine gegen das Hautleiden unmittelbar gerichtete Behandlung ist nicht nothwendig.

Die Nesselsucht.

(*Der Nesselausschlag*, *Urticaria*, *Uredo*, *Exanthema urticatum Burser.*, *Febr. rubra pruriginosa nach Sauvages.*)

Heberden (med. Transact. B. II. und in Comment. de morb. hist. et cur. p. 131.). — *Koch* (lat. Leipz. 1792). — *Wichmann* (Ideen zur Diagnostik).

Abbildungen v. *Willan* und *Bateman*, Tab. 24, und *Rayer*, Pl. II.

§. 1258.

Die **Nesselsucht** ist der symptomatische Ausschlag, der in schnell entstehenden und schnell wieder verschwindenden, rundlichen oder striemenartigen, härtlichen, sich nie mit Eiter oder Lymphe füllenden Geschwülsten in der Lederhaut, deren Rücken gewöhnlich weisser als die Seitentheile und die sie umgebende Haut ist, und welche überhaupt denen Veränderungen in der Haut, die durch die Brennesseln hervorgebracht werden, ähnlich sind (Quaddeln), besteht, und mit heftigem Jucken und Brennen verbunden ist.

§. 1259.

Häufig gehen dem Ausbruch des Nesselausschlages gastrische Affectionen und ein Fieber vorher, und der Ausschlag erscheint unter besonders starkem Brennen und Stechen und mit entzündlicher Röthe um jede einzelne Quaddel (Urt. febrilis *W.*); in andern Fällen erscheint das Exanthem ohne Fieber, die Haut ist ohne Entzündung und die Quaddeln sind sehr blass, auf ihrem Rücken selbst weisser als die normale Hautfarbe und erscheinen und verschwinden mehreremal den Tag hindurch (Urt. evanida *W.*); in seltenen Fällen verweilt der Ausschlag eine längere Zeit an ein und derselben Stelle, auf welche er auch meistens beschränkt ist, so dass diese Hautstelle oft zwei und selbst drei Wochen leidend sein kann (Urt. perstans); zuweilen sind die Quaddeln besonders zahlreich und stehen so dicht beisammen, dass sie in einander fliessen und dadurch eine sehr unregelmässige Form erhalten (Urt. conferta *W.*); manchmal erscheint der Ausschlag nur nach langen Zwischenräumen und dauert jedesmal nur wenige Tage, in der Zwischenzeit empfindet aber der Kranke dasselbe Brennen und Stechen in der Haut, wie wenn der Ausschlag vorhanden wäre (Urt. subcutanea *W.*); in seltenen Fällen erreichen die Schwielen eine so beträchtliche Grösse, dass sie wie harte Knoten tief in die Muskelsubstanz einzudringen scheinen und eine Contraction der sehnigten Theile mit gänzlichem Unvermögen zur Bewegung und selbst Schmerzen in den Knochen hervorbringen, aber es dauern diese Geschwülste nur wenige Stunden, indem sie meistens zur Nachtzeit entstehen und am Morgen verschwinden (Urt. tuberosa *Willan* u. *P. Frank*). — Endlich gibt es einen Nesselausschlag mit sehr breiten Quaddeln, welcher von Manchen als eine eigene Ausschlagsart angesehen und unter dem Namen

Essera (Porcellanfieber, Sora, Morbus porcinus) beschrieben wurde.

§. 1260.

Die Dauer des Bestehens des Ausschlages ist in der Regel nur kurz, nur wenige Tage und selbst nur wenige Stunden, doch erscheinen die Nesseln oft nach so kurzen Zwischenräumen von Neuem, dass dieses wiederholte Auftreten nur als *eine* Krankheit angesehen werden kann, welche zuweilen langwierig ist. Das Exanthem verschwindet gewöhnlich ohne alle Abschuppung und meistens ohne kritische Ausscheidungen. Man schreibt dem schnellen Zurücktritt des Nesselausschlages das Entstehen innerer Krankheiten zu, doch ist ein ziemlich schnelles Verschwinden des Exanthems die gewöhnliche Art der Heilung dieser Krankheit.

§. 1261.

Ursachen und Bedeutung. Die Urticaria entsteht oft schnell nach dem Genusse von Austern, geräucherten Fischen, Krebsen, Erdbeeren etc., sie steht oft mit Stockungen im Pfortadersysteme, mit Leberaffectionen, Gicht etc., in Verbindung; meistens liegt übrigens der Nesselsucht kein sehr schweres Leiden zum Grunde und der Ausschlag für sich ist ohne Gefahr.

§. 1262.

Behandlung. Es muss die Diät sorgfältig geordnet werden. Oft leisten Abführungsmittel Nuzen. Im Allgemeinen ist eine milde Beförderung der Hautausdünstung zuträglich. Um das Juken zu mässigen, dienen vorzüglich lauwarme Bäder; auch ist das Waschen des Körpers mit Weingeist empfohlen worden.

Die Hizblätterchen.

(*Schälblätterchen, das rothe Ausfahren, Strophulus nach Willan.*)

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 1, 2 u. 3, und *Rayer*, Pl. X.

§. 1263.

Die **Hizblätterchen** sind der symptomatische Ausschlag, welcher in rothen und zuweilen in weisslichen Blätterchen besteht, die etwas grösser als ein Mohnsaamenkorn sind, ganz oder beinahe ohne Jucken bestehen und vorzüglich bei Kindern vorkommen.

§. 1264.

Die Blätterchen brechen meistens, ohne dass sich dieses durch ein schmerzhaftes Gefühl kund gibt, vorzüglich an den Wangen, dem Rücken der Hände und den Vorderarmen hervor; oft sind sie lebhaft roth, stehen von einander abgesondert und sind mit kleinen erythemartigen Flecken untermischt (St. intertinctus *W.*); zuweilen haben sie eine blässere Farbe (St. albidus *W.*); oft sind die Blätterchen sehr zahlreich zusammengedrängt (St. confertus *W.*, der Zahnausschlag); manchmal entstehen zirkelförmige Flecken und es brechen die Blätterchen truppweise hervor, so dass auf jedem Häufchen bis 12 derselben sich befinden, nach etwa 4 Tagen schuppen sie sich ab, es erscheint aber, so wie ein Fleck verschwindet, in geringer Entfernung davon ein anderer (St. volaticus *W.*). Endlich gibt es Blätterchen, die grösser als die bisher angeführten sind, ohne Entzündung am Grunde, und auf ihrer Oberfläche glatt und glänzend sind, sie erscheinen zerstreut, beinahe nur an den Lenden, Schultern und Oberarmen (St. candidus *W.*). Die Hiz-

blätterchen füllen sich an ihrer Spize nur wenig mit einer hellern Lymphe, sie verschwinden in unbestimmter Zeit wieder unter einer sehr geringen Abschuppung der Epidermis. Der Zurücktritt derselben soll innere Entzündungen, Diarrhoea etc. veranlassen können.

§. 1265.

Diagnose. Die Hizblätterchen sind kleiner als die Blätterchen der Schwindflechten, des Hautjuckens und der Kräze, weniger chronisch als die Schwindflechten und die Kräze, weniger hart, aber in der Regel röther, als die drei genannten Ausschläge und beinahe mit keinen Beschwerden verbunden, während diese Ausschläge stark jucken.

§. 1266.

Ursachen und Bedeutung: Einwirkung starker Sonnenhize auf die blose Haut, zu warmes Verhalten, der zu reichliche Genuss von Milch, so wie gastrische Reize verschiedener Art, das Zahnen. — Die Hizblätterchen für sich sind ein unbedeutendes und leicht wieder verschwindendes Uebel und stehen auch in der Regel mit keinem bedeutenden innern Leiden in Verbindung.

§. 1267.

Behandlung. Ausser der Entfernung der Gelegenheitsursachen hat man hier in der Regel Nichts zu thun. Oefteres Waschen der Haut mit lauwarmem Wasser und lauwarme Bäder werden empfohlen.

Die Schwindflechte.

(Schwindflecken, Hautmoos, der Flug, Licken nach Willan.)

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 4 und 5, und *Rayer*, Pl. X.

§. 1268.

Die Schwindflechte ist der symptomatische Ausschlag, welcher in zugespizten, meistens etwas röthlichen, ziemlich stark juckenden, weit verbreiteten Knötchen und Blätterchen, ungefähr von der doppelten bis dreifachen Grösse der Hizblätterchen besteht, die oft verschwinden und leicht wieder kehren, von innern Ursachen abhangen und vorzüglich bei Erwachsenen vorkommen.

§. 1269.

Der Ausschlag bricht meistens nach vorhergegangenen allgemeinen Beschwerden, insbesondere Mattigkeit, gastrischen Erscheinungen, Kopfweh und Fieberbewegungen unter starkem Jucken hervor. Meistens besteht derselbe in einzeln stehenden, mehr oder weniger über den ganzen Körper verbreiteten Knötchen und Blätterchen (L. simplex *W.*); zuweilen sind die Blätterchen, statt ausgebreitet zu sein, auf umschriebene Flecken beschränkt (L. circumscriptus), wobei oft die Grundfläche entzündet und schmerzhaft und selbst rissig wird, und sich die Knötchen mit serös-eiteriger Flüssigkeit füllen, die sich ergiesst und Schorfen bildet (L. agrius *W.*). Zuweilen entstehen die Knötchen blos an den Wurzeln der Hauthaare und werden wahrscheinlich durch die Anschwellung der Haarzwiebeln gebildet; aus der Mitte eines jeden Knötchens ragt ein Hauthaar hervor (L. pilaris *W.*). In den heissen Klimaten ist mit dem Exanthem,

das in Knötchen und Blätterchen von der Grösse eines Stecknadelknopfes besteht, ein äusserst heftiges Jucken und ein Stechen verbunden, wie wenn eine Menge von Nadeln in die Haut gestochen würde (L. tropicus *W.*). *Biett* sah die Knötchen zu Gruppen vereinigt, welche wie ein Band von der vordern Seite der Brust auf die innere Seite des Vorderarms und nach dem Verlauf des Nervus cubitalis bis zum kleinen Finger hinzogen (L. gyratus), und *Bateman* beschreibt breitere, entzündete, heftiges Brennen erregende Knötchen (L. urticatus). — Zuweilen kommen gleichzeitig mit dem Lichen kleine Bläschen, wie im Eczema, oder etwas grössere und mit einer eiterartigen Flüssigkeit gefüllte Bläschen, wie im Ecthyma und Impetigo, vor.

§. 1270.

Der Verlauf dauert 1 — 3 Wochen, kann aber auch, indem der Lichen immer von Neuem wieder zurückkehrt, sich auf mehrere Monate ausdehnen. Der Ausschlag schuppt sich kleienartig ab und verschwindet gewöhnlich, ohne eine Spur zurückzulassen, doch bleiben manchmal kleine Narben und eine Verdickung der Haut zurück. Der Lichen agrius geht zuweilen in eine chronische Hautkrankheit über, die sich von den Flechten nicht mehr unterscheiden lässt. Durch Metastase soll zuweilen die Krankheit gefährlich werden.

§. 1271.

Diagnose. Die Unterscheidung der Schwindflechten von den Hizblätterchen und der Kräze ist in den Kapiteln über diese Hautausschläge angegeben, von den Juckknötchen ist dieser Ausschlag dadurch zu unterscheiden, dass die Knötchen in der Regel zugespizter und röther sind und sich dagegen nicht leicht die schwärzlichen kleinen Krusten vorfinden, und vorzüglich dadurch, dass er leicht verschwindet und wiederkehrt, da jene mehr bleibend sind.

§. 1272.

Ursachen und Bedeutung. Man beschuldigt gastrische Störungen, scharfe und erhizende Getränke und Speisen, grosse Sonnenhize, das gichtische und scorbutische Leiden etc. — Der Ausschlag ist zwar beschwerlich, aber nicht leicht Gefahr bringend; er zeigt meistens ein tieferes Leiden, als die Hizblätterchen an, doch ist in der Regel das Allgemeinbefinden ebenfalls nicht im hohen Grade gestört.

§. 1273.

Behandlung. Nebst den Mitteln, die zur Entfernung der Ursachen dienen, wendet man kühlende Getränke, besonders mit Zusaz von Mineralsäuren, kühlende Abführungsmittel, lauwarme Bäder und besänftigende, kühlende Salben an. Der Lichen agrius kann wie die entzündlichen Flechten behandelt werden. Die bei dem Lichen empfohlenen Quecksilber-, Jod- und Arsenikpräparate sind wohl überflüssig.

Die Petechien und grössern Ecchymosen.

(*Peteschen*, *Petechiae*, *Peticulae*, *Purpura Willan.*)

In den zahlreichen Monographien über die Petechien ist nicht sowohl dieser Ausschlag für sich, als das Petechialfieber, das ist entweder das Faul- und das Nervenfieber oder der Typhus, abgehandelt.

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 28, 29 u. 30, und *Rager*, Pl. XX.

§. 1274.

Die **Petechien** sind der symptomatische Ausschlag, welcher in blutrothen und zum Theil in's Schwärzliche

gehenden unschmerzhaften Flecken der Haut, die auf einen Druck mit dem Finger sich nicht verändern, und mehr oder weniger deutlich das Aussehen darbieten, wie wenn Blut unter das Oberhäutchen ergossen wäre, besteht.

§. 1275.

Die Petechien kommen meistens erst zum Vorschein, wenn schon einige Zeit eine Krankheit besteht. Häufig ist diese Krankheit ein Fieber, in welchem Falle die Petechien in der Regel nicht an einem bestimmten Tage, wie die eigentlichen fieberhaften Hautausschläge, sondern zu einer unbestimmten Zeit, zuweilen eingestreut zwischen ein schon bestehendes fieberhaftes Exanthem und meistens ohne Erleichterung hervorbrechen. Oft sind die primäre Krankheit ein fieberloses Leiden, insbesondere der Scorbut, und oft gastrische Störungen, bei welchen Affectionen die Petechien und grössern Ecchymosen ebenfalls, ohne Erleichterung zu verschaffen, sich entwickeln. Die Veränderungen in der Haut bestehen entweder in dunkelbraunen Punkten oder in Flecken von mehr hellrother Farbe und der Grösse eines frischen Flohstiches (von dem sie sich durch den Mangel des Stigma's in der Mitte unterscheiden) oder in Flecken von dunkelblaurother und schwärzlicher Farbe, oder von grüngelblicher und bläulicher Farbe, wie oft die Farbe der Haut nach Contusionen ist, welche oft unter der Grösse eines frischen Flohstiches sind, oft aber sehr ausgebreitet sind und zuweilen in der Form von Striemen (vibices) erscheinen. In seltenen Fällen bildet die Epidermis an

*) *Willan* nimmt vier Arten der Petechien an. Die Purpura simplex, P. haemorrhagica, P. urticans und die P. contagiosa. Die Werlhofische Blutfleckenkrankheit besteht, was die Veränderungen in der Haut betrifft, in Petechien, sie wird aber von mir in dem Kapitel von dem Scorbut abgehandelt werden.

den blutrothen Flecken, genauer betrachtet, kleine Erhöhungen, welche kleine Blutblasen sind.

§. 1276.

Die Dauer des einzelnen Petechialfiebers ist gewöhnlich einige Tage, innerhalb welchen derselbe (auf dem Wege der Resorption) meistens ohne Abschuppung wieder verschwindet; doch bilden sich in der Regel zur gleichen Zeit neue Flecken und die Krankheit wird auf diese Weise zuweilen chronisch. Grössere Ecchymosen haben zu ihrem Verschwinden eine Woche und längere Zeit nothwendig.

§. 1277.

Ursachen und Bedeutung. Die Petechien, welche ihrem Wesen nach in kleinen Blutergiessungen unter die Epidermis bestehen, sind durch zweierlei Krankheitszustände bedingt, entweder durch eine gewisse Auflösung des Blutes und Erschlaffung der Haut, oder durch einen heftigen Andrang des Blutes nach der Peripherie, und zuweilen auch durch beide Krankheitszustände zugleich; sie kommen vor im Scorbut, im Faulfieber, im Typhus, in der Pest, in den Blattern, dem Scharlachfieber und den Masern, besonders wenn diese Krankheiten den faulichten Character haben, bei Unterdrückung der monatlichen Reinigung, bei Stockungen im Pfortadersystem, gastrischen Reizen, innern Entzündungen etc. — Die Petechien für sich sind nie lebensgefährlich, zeigen aber meistens ein bedeutendes Kranksein an.

§. 1278.

Die Behandlung der Petechien muss gegen die denselben zum Grunde liegende Krankheit gerichtet sein. Am häufigsten passen die gegen den Scorbut gebräuchlichen Mittel, insbesondere verdünnte Mineralsäuren, zuweilen aber, wenn nämlich die Krankheit von der Unterdrückung einer Blutentleerung herrührt, sind auch

Blutentziehungen angezeigt. Um der Haut mehr Tonus zu geben, dienen Waschungen mit kaltem Wasser oder mit Wasser mit einem Zusaz von Mineralsäuren.

Der Friesel.

(*Miliaria, Exanthema miliare, Purpura.*)

Welsch (lat. Leipzig 1655). — *Salzmann* (lat. Argent. 1736). — *Allioni* (Turin 1758, aus d. Lat. v. Wigand, Mühlhausen 1792, und von Römer, Winterthur 1794). — *Molinari* (lat. Wien 1764). — *Damilano* (Mandov. 1774, aus d. Ital. v. Lentin, Göttigen 1782). — *Kreysig* (in Hufeland's Journ. 12ter Bd.). — *Rayer* (Par. 1822). — *Fodéré* (Strassb. 1828).

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 55, *Rayer*, Pl. IV.

§. 1270.

Der Friesel ist der symptomatische Hautausschlag, der in hirseförmigen und oft etwas kleinern oder grössern, meistens mit heller Lymphe gefüllten und oft truppweise beisammenstehenden Bläschen besteht, welche meistens ohne ein bedeutendes schmerzhaftes Gefühl in der Haut, aber unter reichlichen Schweissen hervorbrechen und sich in der Regel bald kleienartig abschuppen.

§. 1280.

Verlauf. Der Friesel hat sehr häufig folgende Vorläufer: Angst und Beklemmung mit einem zusammenschnürenden Gefühle in der Herzgrube, Schwindel, Kopfweh, rheumatische Schmerzen, ein Gefühl von Taubsein und selbst Zuckungen. Kommt der Friesel im Gefolge von einem Fieber vor, so erscheint er häufig zu der Zeit, in welcher das Fieber einen bösartigen

Character annimmt (in's Nervöse übergeht); beinahe regelmässig aber bricht der Friesel nur dann aus, wenn sehr profuse sauer und schimmlich riechende Schweisse vorhanden sind. Oft aber auch entsteht der Friesel ohne so bedeutende Vorgänge bei ziemlicher Unverleztheit des Wohlbefindens nur bei schwizender Haut und unter dem Gefühl eines ganz leichten, stechenden oder juckenden Schmerzes in der Haut. Gewöhnlich erscheinen die Frieselbläschen truppweise, vorzüglich auf der Brust, aber auch an dem Rücken, den Armen, dem Unterleibe etc., nicht wohl aber im Gesichte; oft sind sie auch mehr gleichmässig allgemein verbreitet. Sie sind meistens so gross wie Hirsekörner und von einander getrennt stehend, oft fliessen sie aber auch zusammen (M. confluentia) und bilden theilweise grössere Bläschen (der Blasenfriesel). Meistens sind die Bläschen mit einer wässerigen, krystallhellen Flüssigkeit gefüllt (M. aquosa, crystallina) und stehen zuweilen auf einer rothen Hautfläche, wodurch sie selbst roth erscheinen (M. rubra s. Purpura), doch fehlt meistens diese Röthe (M. alba), oft sind sie auch mit einer milch- oder eiterartigen Flüssigkeit gefüllt (M. lactea, M. purulenta).

Nach dem Ausbruch des Friesels lassen oft die bis dahin bestandenen Krankheitszufälle bedeutend nach, oft aber tritt nach dem Ausbruch des Exanthems keine Erleichterung ein und es verschlimmert sich selbst die Krankheit sehr häufig. Gewöhnlich trocknen die Bläschen in wenigen Tagen ein, worauf sich die Haut kleienartig abschuppt. Tritt der Friesel plözlich zurück, so können bedeutende Krankheitszufälle entstehen.

§. 1281.

Ursachen und Bedeutung des Friesels. Man hat den mit Fieber vorkommenden Friesel für ein eigenthümliches Fieber, das Ansteckungsfähigkeit besize (Frieselfieber) erklärt; es scheinen aber diese Fieber Fieber

anderer Art zu sein, insbesondere Typhus und Scharlachfieber, und die Ansteckungsfähigkeit nicht sowohl dem Friesel, als der Krankheit, bei welcher er symptomatisch auftritt, zuzukommen. — Der Friesel kommt in allen den Körperzuständen häufig symptomatisch vor, in welchen sehr reichliche Schweisse sich einstellen, besonders wenn sie sauer reagiren, namentlich im Typhus, im Scharlachfieber, in rheumatischen und katarrhalischen Fiebern, bei Kindbetterinnen (bei welchen man denselben, wenn er mit einer weisslichen Lymphe gefüllt ist, *Milchfriesel* nennt, indem man eine Versezung der Milch annimmt), bei Individuen, die sich durch zu starke Bedeckung im Bette, andauernd starke Körperbewegung bei grosser Hize der Atmosphäre etc., in starke Schweisse versezen; auch scheint der Friesel durch gastrische Reize hervorgebracht werden zu können und auch zuweilen durch Schärfen im Blute zu entstehen, z. B. nach starkem Gebrauche des Sublimates. — Es wird der Frieselausschlag für sich nicht leicht gefährlich, und oft ist derselbe auch in semiotischer Hinsicht beinahe ohne Bedeutung, doch kommt dieses Exanthem sehr häufig in ganz bösartigen Fiebern vor und es ist in denselben im Allgemeinen kein gutes Symptom.

§. 1282.

Behandlung. Das Exanthem selbst erfordert in der Regel wenig Berücksichtigung und das ganze Heilverfahren muss gegen die Hauptkrankheit gerichtet werden. Ein zu warmes Verhalten und eine stark schweisstreibende Methode müssen vermieden und dagegen mehr kühlende Mittel gegeben werden, doch muss auch alles das vermieden werden, was ein schnelles Zurücktreten der Lebensthätigkeit aus der Haut herbeiführen würde, also insbesondere Verkältung. — Bei dem immer wiederkehrenden und dadurch mehr chronisch erscheinenden Friesel hat man die sogenannten blutreinigenden und

auch die tonischen Mittel, unter den leztern namentlich die China und das Eisen, innerlich und in Stahlbädern gebraucht, empfohlen.

Die Hizbläschen.

(*Hidroa und Eczema.*)

Abbildungen des Eczema von *Willan* und *Bateman*, Tab. 55, 56, 57 u. 58, und *Rayer*, Pl. V.

§. 1283.

Unter der Bezeichnung **Hizbläschen** kann man die symptomatischen Lymphbläschen verstehen, die in Hinsicht der Grösse zwischen dem Friesel und dem Pemphigus stehen, und auf kleinern oder grössern unregelmässigen Pläzen der Haut angesammelt sich befinden.

§. 1284.

Hieher gehören die im Gefolge von Fiebern, z. B. gastrischen Fiebern und Wechselfiebern, an einzelnen Stellen der Haut, z. B. um die Mundöffnung herum, ausbrechenden Bläschen (Hidroa febrile nach *P. Frank*), welche aber auch ohne Fieber, z. B. bei gastrischen Unreinigkeiten vorkommen, und welche ich nach ihrer wahrscheinlichen Entstehungsweise consensuelle Hizbläschen (Hidroa consensuale) nennen möchte. Aehnliche Bläschen entstehen auch zuweilen auf einen Schrecken, so wie bei hysterischen und hypochondrischen Personen (Hidroa nervosum nach *P. Frank*). Die Bläschen trocknen nach einigen Tagen ein und bilden kleine, noch einige Zeit festsizende Krusten.

Das Eczema nach *Willan* und *Bateman* besteht in kleinen, auf unregelmässigen und mehr oder weniger entzündeten Stellen der Haut sehr gedrängt stehenden

Bläschen, welche nach einigen Tagen eintrocknen und in Schüppchen oder dünne Grinde übergehen und zuweilen auch kleine Excoriationen veranlassen. Als Spielarten desselben werden angenommen das Eczema solare, welches durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen auf die entblösten Theile hervorgebracht wird und in Bläschen besteht, die unter stechenden Schmerzen und Jucken auf der etwas angeschwollenen Hautstelle zahlreich sich erheben, mit trübem Serum sich füllen und in kleine Schorfen übergehen. Der gleiche Ausschlag wird auch durch die Einwirkung der Hize des Feuers, einer sehr heissen und scharfen Lauge beim Waschen etc. hervorgebracht. Ferner das Eczema pharmacorum externorum, welches dem Eczema solare sehr ähnlich ist und durch Pflaster und Salben hervorgebracht wird. Das Eczema impetiginodes bildet sich aus den so eben bezeichneten Arten des Eczema, wenn die Ursachen nicht aufhören; es bilden sich sodann Krusten, die dem Leibgrind gleichen, aber sich dadurch von ihm unterscheiden, dass hiebei nicht sowohl Eiterbläschen als Lymphbläschen erscheinen. Das Eczema rubrum ist ein Eczem, das unter stärkerm Brennen und Spannen der Haut hervorbricht und bei welchem die Bläschen, die gewöhnlich die Grösse eines kleinen Stecknadelknopfes haben, auf einer lebhaftern Entzündungsröthe stehen. Das Eczema mercuriale endlich, welches sowohl nach dem innerlichen als dem örtlichen Gebrauch des Quecksilbers sich bilden kann, entsteht mit einer erythematösen Röthe, welche sich bei dem von dem innern Gebrauch des Mercurs verursachten Eczem oft in einem einzigen Tag über den grössern Theil des Körpers verbreitet; auf dieser Röthe erscheinen äusserst zahlreiche Bläschen, welche etwas in der Grösse zunehmen, sich mit einem trüben Serum füllen und in dünne Grinde übergehen und zuweilen auch Excoriationen und Schrunden veranlassen.

§. 1285.

Es erscheinen zuweilen die Hizbläschen mit Milderung der Zufälle, meistens aber ohne dieselbe; sie werden wohl nie gefährlich und sind, wenn die Gelegenheitsursache nicht fortdauert, leicht zu beseitigen.

§. 1286.

Behandlung. Nach Hinwegräumung der entferntern Ursachen verschwinden in der Regel die Hizbläschen von selbst; von Nuzen sind übrigens eine etwas magere Diät, kühlende Getränke mit etwas Pflanzen- oder Mineralsäure, kühlende Abführungsmittel, lauwarme Bäder, Bähungen und Waschungen der leidenden Theile mit einer Kleienabkochung, einer bittern Mandel-Emulsion, Bestreichen derselben mit frischem Schweinefett etc. Geht der Ausschlag in das Impetiginöse und Herpetische über, so müssen die gegen Impetigo und Herpes wirksamen Mittel in Gebrauch gezogen werden.

Die Eiterblase.

(*Blasengrind, Ecthyma nach Willan, Phlyzacium nach Alibert.*)

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 43 und 44, von *Alibert*, Tab. 7, und von *Rayer*, Pl. IX.

§. 1287.

Das **Ecthyma** ist ein, bald acutes, bald chronisches, symptomatisches Exanthem, das in dem, unter geringem Jucken erfolgenden Ausbruch von Eiterbläschen von dem Durchmesser von 2 — 3 Linien besteht, die gewöhnlich discret stehen, aber auf einem unregelmässigen Fleck der Haut ausbrechen, ihren Eiter ergiessen und in dicke Borken übergehen.

§. 1288.

Als Arten des Ecthyma werden angenommen: Die milden Eiterbläschen (Ecthyma mite, vulgare). Es sind dieses kleine mit einem gelblichen Serum gefüllte Bläschen, die nach einigen Tagen plazen und einen gelblichbräunlichen Schorf bilden. Bei Erwachsenen kommen diese Eiterbläschen gewöhnlich nur an den Extremitäten, dem Halse und den Schultern vor, bei Kindern auch im Gesichte und dem behaarten Theile des Kopfes (Ecth. mite infantile). — Die schmuzfarbigen Eiterbläschen (Ecth. luridum). Dieselben sind grössere Blasen als das milde Ecthyma, welche sich auf einem dunkel-gerötheten, schmuzfarbigen, harten Hautplaze erheben. Die in den Bläschen enthaltene Materie ist mit Blut gemischt und es bilden sich Geschwüre, die mit dunkeln, braunen Schorfen sich bedecken. — Die kachektischen Eiterbläschen (Ecth. cachecticum). Dieselben sind dadurch characterisirt, dass immer von neuem Eiterbläschen erscheinen, während andere schon zu Krusten geworden oder schon abgetrocknet sind und dass sich daher der Ausschlag in verschiedener Entwicklung zur gleichen Zeit vorfindet. Die Schorfen sind immer kleiner als die in dem milden und schmuzigen Ecthyma.

§. 1289.

Es wird das Ecthyma hervorgebracht durch scharfen Staub, Einreibungen von scharfen Salben, z. B. Brechweinsteinsalbe, das Auflegen von scharfen Pflastern, Unreinigkeiten der ersten Wege, Geschlechtsausschweifungen, und kommt auch vor in Begleitung des Scharlachs, der Blattern, der Kräze, eines kachektischen, insbesondere eines scrophulösen Zustandes, vorzüglich bei Kindern und alten Leuten.

§. 1290.

Die Behandlung kann sich in der Regel auf die Beseitigung der äussern Ursachen und des dem Ecthyma

zum Grunde liegenden innern Leidens beschränken. Sollten eine etwas starke Entzündung der Haut, festaufsizende Borken oder Geschwüre eine örtliche Behandlung nothwendig machen, so können die Mittel in Anwendung gebracht werden, die in dem Kapitel von dem Grinde angegeben werden sollen.

Die Schmuzrufe.

(*Rhypia.*)

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 53 u. 54, und *Rayer*, Pl. III.

§. 1291.

Die Rhypia besteht in einzeln stehenden, abgeflachten Blasen, welche mit einer trüben, eiterartigen Flüssigkeit gefüllt sind und in dicke, dunkle Rufen übergehen, unter welchen oft etwas Ulceration fortdauert. — Sie kann als eine Modification des Ecthyma (Ecthyma luridum) angesehen werden.

§. 1292.

Man nimmt folgende Arten der Schmuzrufe an: Die einfache Schmuzrufe (Rhypia simplex). Es ist dieses die so eben beschriebene Veränderung in der Haut, bei welcher die Rufe mehr flach ist. — Die hervorragende Schmuzrufe (Rh. proëminens). Sie wird durch grössere Bläschen gebildet, die in kegelförmig hervorragende Rufen übergehen. — Die brandige Schmuzrufe (Rh. escharotica *W.*, Rh. gangraenosa). Sie scheint, das Gleiche wie der Pemphigus gangraenosus zu sein.

§. 1293.

Ursachen und Bedeutung. Es kommt die Schmuzrufe, besonders die hervorragende, bei alten kachektischen Individuen vor, bei grosser Unreinlichkeit

und Entbehrungen, die einfache Schmuzrufe auch in Folge des Scharlachs, der Blattern etc. Die brandige Schmuzrufe kommt zuweilen bei Kindern, besonders während des Zahnens, in Folge von Unreinlichkeit, schlechter Nahrung etc. vor. — Es ist die Schmuzrufe schon ein bedeutenderes Leiden; die gewöhnliche und die hervorragende Schmuzrufe werden zwar nicht leicht gefährlich, die brandige ist aber öfters tödtlich.

§. 1294.

Behandlung. Ausser den Mitteln, die zur Beseitigung der entferntern Momente gebraucht werden müssen, ist nothwendig, unmittelbar gegen das Localleiden gerichtete Mittel anzuwenden. Oft reichen Bähungen mit einem Chamillenaufguss hin, zuweilen sind, wenn die Vernarbung nicht eintreten will, leichte Cauterisation mit Höllenstein nothwendig, bei dem Uebergang in den Brand Umschläge von erregenden nnd antiseptischen Mitteln.

Der Gürtel.

(*Das höllische Feuer, Zona, Zoster, Circinus, Ignis sacer, Erysipelas Zoster nach Sauvages, Erysipelas phlyctaenodes nach Cullen, Herpes Zoster nach Willan.*)

Wichmann (Ideen zur Diagnostik). — *Behrnauer* (Diss. mit 1 K. Würzburg 1810).

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 50, von *Alibert*, Tab. 6, und von *Rayer*, Pl. IV.

§. 1295.

Der Gürtel ist der symptomatische Ausschlag, welcher in truppweise beisammen stehenden und von Entzündungsrändern umgebenen Bläschen besteht, die sich an irgend

einer Stelle des Körpers, wie die Hälfte eines Gürtels, um den halben Theil des Leibes herumziehen.

§. 1296.

Dem Ausbruch des Ausschlags gehen oft verschiedene krankhafte Zufälle, gastrische Erscheinungen, Angst, Gliederschmerzen, Fieber vorher, sodann und auch ohne diese Zufälle zeigen sich unter Brennen und Prickeln rothe Flecken, auf welchen die Bläschen ausbrechen. Meistens, nach *Biett's* Beobachtungen, unter 20mal 19mal, entsteht der Gürtel auf der rechten Körperhälfte und zwar meistens in dem Raume, welcher ein 3—4 Finger breites Band einnehmen würde, das man von den Dornfortsäzen der mittlern Rückenwirbelknochen über den untern Theil des Schulterblattes und über die Lebergegend bis zur weissen Bauchlinie hinziehen würde. Hat sich der Ausschlag ausgebildet, so stellt er stahlgraue, ziemlich platte und selbst in der Mitte eingedrückte Bläschen von der Grösse einer Linse bis zu der einer kleinen Bohne dar, welche in der Regel nicht auf einem gemeinschaftlichen entzündeten Grunde stehen, von denen aber jedes einen Entzündungsrand von 1 bis 1½ Linie Breite hat. Indem die Entzündungsränder der Bläschen und zuweilen die Bläschen selbst in einander fliessen, bilden sie mehr oder weniger ein zusammenhängendes Ganze und stellen gewissermassen ein Band dar, das aber viele Stellen in sich enthält, an welchen die Haut die gesunde Beschaffenheit zeigt.

§. 1297.

Die Dauer des Ausschlags beträgt in der Regel nicht viel mehr als 8 Tage. Innerhalb dieser Zeit werden die Bläschen welk, auch zum Theil aufgerissen und es bilden sich bald abschuppende Borken. Meistens bleiben noch einige Zeit Flecken und Schmerz an der ergriffenen Stelle und längere Zeit leichte Narben zurück. Nur selten brechen nach der Abschuppung wiederholt Bläschen aus,

wodurch der Gürtel chronisch werden kann, und in seltenen Fällen hinterlässt der Gürtel Verschwärungen.

§. 1298.

Ursachen und Bedeutung. Es entsteht der Gürtel (der mit Unrecht zum Rothlauf von *S. G. Vogel* und *Richter*, zum Pemphigus von *Hufeland* und zum Herpes von *Willan* gerechnet wurde) oft ohne erkennbares inneres Leiden und ohne eine äussere Ursache; man schreibt ihn häufig Diätfehlern, insbesondere dem Genuss geistiger Getränke und stark gesalzener Speisen, Verkältung, einem eigenthümlichen Miasma (*Wichmann*) und in einzelnen Fällen einem Ansteckungsstoffe (*Conradi*), so wie auch der gichtischen, scorbutischen und scrophulösen Dyscrasie zu. Mir ist es wahrscheinlich, dass der Gürtel, wie auch das Hidroa consensuale am Munde, vorzugsweise auf eine consensuelle und antagonistische Weise und durch eine eigenthümliche Störung in den Verrichtungen irgend eines innern Organs bedingt sei. Entsteht, wie gewöhnlich, der Gürtel auf der rechten Seite des Körpers und zieht sich derselbe über die Lebergegend hin, so fällt der Verdacht des Ursprungs dieser Krankheit auf ein Leiden der Leber. — Der Gürtel ist immer eine gefahrlose Krankheit.

§. 1299.

Behandlung. Entdeckt man ein inneres Leiden, so suche man dieses zu heben; in der Regel verschwindet übrigens der Gürtel von selbst, und es ist daher zum Zwecke seiner Heilung gewöhnlich keine innere Behandlung nothwendig. Veranlasst der Ausschlag grosse Beschwerden, so kann man Cicutaumschläge verordnen oder die schmerzenden Stellen mit frischem Schweinefett bestreichen lassen, und wenn die Haut stark entzündet ist, selbst einige Blutegel auf die Umgegend des Gürtels sezen lassen.

Der Blasenausschlag.

(*Pemphigus*, *Pemphix*, *Pompholyx*.)

Dickson (Samml. auserles. Abhandl. f. prakt. Aerzte. B. 13.). — *Christie* (ebendaselbst). — *Wichmann* (Erf. 1791). — *Reil* (Memoir. clin., fasc. II.). — *Braune* (mit 1 ausgemalten Kupf. Lpz. 1795). — *Sachse* (in Hufeland's Journ. 1825).

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 33, *Alibert*, Tab. 5, *Rayer*, Pl. III., und *Braune* im ang. Werke.

§. 1300.

Der Blasenausschlag ist der symptomatische Ausschlag, welcher in einzeln stehenden, meistens mit einer hellen, gelblichen Flüssigkeit gefüllten Blasen von der Grösse einer Erbse bis zu der einer Wallnuss oder eines Eies besteht.

§. 1301.

Oft geht dem Ausschlag ein Fieber voraus (Febr. bullosa, Pemph. febrilis), zuweilen gastrische Beschwerden, Krämpfe u. s. w., öfters erscheint er aber auch ohne Vorläufer. Es entstehen, unter Jucken und Brennen, einzelne kleine, erythemartige Flecke; auf jedem dieser Flecke bildet sich ein Bläschen, das in wenigen Stunden von der Grösse einer Erbse bis zu der einer Kirsche oder einer wälschen Nuss wächst, und welches bei seiner vollkommenen Ausbildung ganz den Blasen von kleinen Stücken Blasenpflasters erzeugt gleicht, und meistens einen kleinen, nur ⅓ — 1 Linie breiten Entzündungsrand hat. Meistens bilden sich an einem bestimmten Körpertheile mehrere, in einer gewissen Entfernung von einander stehende Blasen, zuweilen erscheinen auch zugleich an andern Körpertheilen eine oder einige Blasen, in seltenen Fällen zeigt sich am ganzen Körper nur eine einzige Blase (Pemph. solitarius), welche aber oft eine

so bedeutende Grösse erhält, dass sie selbst eine Theetasse voll, meistens wasserheller, Lymphe enthält. Der Inhalt der Blasen bildet meistens unverändert eine helle, gelbliche Flüssigkeit, doch wird derselbe zuweilen auch ein trübes, milchigtes oder wie mit Eiter gemischtes Wasser. Nach wenigen Tagen werden die Blasen runzlich und vertrocknen ganz und plazen auch zuweilen auf. Die sie bildende Epidermis löst sich sodann los und hinterlässt keine Narben, sondern nur noch einige Zeit einen röthlichen und bläulichen Fleck. Selten bleiben nässende Hautgeschwüre zurück und in seltenen Fällen geht die Hautstelle unter den Blasen in den Brand über.

§. 1302.

Es ist der Ausbruch des Exanthems in der Regel mit keiner bedeutenden Milderung des Allgemeinleidens verbunden, doch erzeugt der Ausschlag auch keine erheblichen Beschwerden, wenn nicht etwa in innern Theilen, namentlich im Munde und der Speiseröhre, gleichfalls Blasen sich bilden. Das Bestehen der einzelnen Blasen ist von kurzer Dauer, doch wird oft die ganze Krankheit, indem immer neue Blasen zum Vorschein kommen, langwierig (Pemph. chronicus). *)

§. 1303.

Ursachen und Bedeutung. Der Pemphigus soll mehr bei Kindern und beim weiblichen Geschlechte, als bei Männern vorkommen, und durch Verkältung,

*) *Willan* trennt den Blasenausschlag in zwei Krankheitsarten: 1) den Pemphigus oder das Blasenfieber, von welchem er drei Modificationen annimmt, den Pemph. vulgaris, den Pemph. contagiosus (welche beide Krankheiten derselbe aber nicht selbst gesehen hat) und den Pemph. infantilis, und 2) den Pompholyx oder fieberlosen Blasenausschlag, von welchem er ebenfalls drei Varietäten beschreibt, den Pompholyx benignus, den Pompholyx diutinus und den Pomph. solitarius.

gastrische Unreinigkeiten, insbesondere schleimige und gallichte Stoffe, Störungen in der Harnabsonderung, Gicht, unterdrückte Hautausschläge, insbesondere die Kräze und die Flechten, und durch hysterische Krämpfe (Pemph. nervosus hystericus) veranlasst werden können, auch soll er zuweilen ansteckend sein, doch ist die Ansteckungsfähigkeit desselben nicht erwiesen. Die gestörte Harnabsonderung wird von manchen Aerzten, insbesondere *Braune*, als die Hauptursache des Pemphigus angesehen, und *Haase*[1]) leitet die Krankheit von einem Ueberwiegen der Phosphorsäure in den Säften her, welche meistens in einer unvollkommenen oder aufgehobenen Ausscheidung phosphorsaurer Salze durch den Urin bei Stein- und Gichtkranken begründet sei. — Der Pemphigus, als Hautkrankheit, wird wohl nie gefährlich, doch ist er meistens mit einem geschwächten Zustand des Körpers verbunden und soll zuweilen sehr hartnäckig sein.

§. 1304.

Behandlung. Nach Verschiedenheit der Ursachen hat man bald gastrische Stoffe zu entleeren, bald antihysterische Mittel in Anwendung zu bringen; öfters mögen, beim Ursprung der Krankheit aus Störungen in den Urinwegen, die vielfach gerühmten harntreibenden Mittel nüzlich sein, so wie auch die, besonders von *Haase* (wegen der Annahme des Vorherrschens der Phosphorsäure) empfohlenen desoxydirenden Mittel, namentlich die Alkalien und die Schwefelleber, sich in einzelnen Fällen hilfreich bewiesen haben; endlich hat man auch im chronischen Pemphigus die gegen Hautkrankheiten im allgemeinen empfohlenen Mittel in Anwendung gebracht, Quecksilbermittel, Antimonialien, Guajak, Sarsaparill etc.

1) Handb. B. III. Abtheil. 2. S. 320.

Eine örtliche Behandlung ist in der Regel nicht nothwendig. Sind die Blasen sehr gross und erregen sie ein heftiges Brennen, so kann man sie aufzwicken und die Flüssigkeit entleeren. Ist die Haut sehr empfindlich, so kann man lauwarme Bäder und Bähungen von einer Abkochung von Leinsamen, Malve etc. anwenden, auf geschwürige und entzündete Stellen bringt man etwas Quittenschleim, in Rosenwasser aufgelöst, ein Sälbchen von Eiweiss und süssem Rahm, milde Oele, das Campheröl; nur in hartnäckigen Fällen dürfen Bleiwasser und andere trocknende Mittel in Anwendung gebracht werden.

Das Blutschwär und der Karfunkel.

§. 1505.

Das Blutschwär (Furunculus, Jonthus Furunculus) und der Karfunkel (Carbunculus, Jonthus Carbunculus, Anthrax) entstehen nach Art der Exantheme und müssen daher unter den Hautausschlägen angeführt werden. Sie sind, insofern sie bei sehr verschiedenartigen Krankheiten vorkommen, symptomatische Exantheme, doch gibt es bestimmte Arten von Carbunkeln, welche von den übrigen getrennt und zu den specifischen Hautausschlägen gestellt werden müssen, wie die Pestcarbunkel. Da übrigens das Blutschwär und der Karfunkel chirurgische Hilfe erfordern und in den Lehrbüchern über die Chirurgie abgehandelt werden, so will ich hier die Beschreibung derselben und die Angabe ihrer Behandlung übergehen.

Die Schwämmchen.

(*Mehlhund, Mehlkruste, Voss, Fasch, Soor, Mundsöhr, Kurvos, Aphthae.*)

Ketelaer (lat. Leiden 1672). — *Stark* (nebst einer Uebersezung v. Ketelaer's und Slevogt's Abhandl. Jena 1784). — *Arnemann* (lat. Gött. 1787). — *Lentin* (Beiträge z. ausüb. Arzneiwissensch B. I.). — *Lélut* (Répert. gén. d'anat. et de physiol., pathologie et de chirurgie. Paris 1827, ausgezogen in den klin. Kupfertafeln. Weimar 1828). — Ausserdem die Schriftsteller über die Kinderkrankheiten.

§. 1306.

Die Schwämmchen sind kleine, weissliche, etwas zugespizte, bläschenartige Erhabenheiten, welche auf der innern Fläche der Lippen, am Zahnfleisch, an der Zunge, in der ganzen Mundhöhle, und zuweilen auch im Darmkanal ausbrechen, auf einem dunkelrothen, entzündeten Grund sizen, schnell in schwammige, weisse Borken übergehen und sodann sich gewöhnlich nach einigen Tagen abschuppen.

§. 1307.

Oft brechen die Schwämmchen ohne vorhergegangenes Unwohlsein aus, zuweilen gehen ihnen gastrische Affectionen und auch Fieber voran. Im Anfange sind es nur wenige Bläschen und weissliche Borken, bei weiterm Fortschreiten des Uebels aber werden die Zunge, die innere Seite der Lippen etc. dicht mit weisslichen Borken bedeckt. Die Kinder (bei welchen die Krankheit am meisten vorkommt) saugen nun nicht mehr gehörig, indem sie wohl die Brustwarze ergreifen, aber schnell wieder los lassen, auch ist das Schlingen erschwert und die Kranken empfinden einen brennenden Schmerz in der Mundhöhle, welche auch heiss und trocken wird. Waren ursprünglich

auch keine gastrischen Affectionen vorhanden, so gesellen sich solche nunmehr hinzu, Erbrechen von saurem Magensaft, Empfindlichkeit der Magengegend, Koliken, Durchfälle. Zuweilen wird auch die Stimme heiser und es stellen sich selbst Schluchzen und Zuckungen ein.

Gewöhnlich schuppen sich die Schwämmchen in wenigen Tagen ab, ohne dass so bedeutende Zufälle erregt worden sind; die hautartigen, weisslichen Borken stossen sich los und es bleibt nur noch einige Zeit eine rothe, empfindliche Stelle zurück. Den Tod können die Schwämmchen herbeiführen durch Erschöpfung der Kräfte, vermittelst der durch sie bewirkten Durchfälle, des Erbrechens und der allmäligen Abmagerung, wie auch durch den Uebergang in den nervösen und putriden Zustand, wobei sie eine dunkle und selbst schwarze Farbe annehmen. Zuweilen tödten sie auch durch Erregung von Zuckungen.

§. 1308.

Anlage haben vorzüglich Kinder in dem ersten Lebensjahr. Gelegenheitsursachen sind bei Kindern vorzüglich Unreinigkeit, insbesondere vernachlässigte Reinigung des Mundes, das beständige Liegenlassen der Schluzer in dem Munde, das Liegenlassen des Kindes an der Brust der Mutter, wenn dasselbe auch nicht trinkt, z. B. im Schlafe, vernachlässigtes Wechseln der Wäsche, ferner zu reichliche Darreichung von Nahrungsmitteln und Darreichung schlechter Nahrungsmittel, z. B. geronnener Milch, Fehler in der Verdauung, Säure des Magensaftes, Zurückhaltung des Kindspechs, gehemmte Ausdünstung, die Atrophia neonatorum, bei Erwachsenen die Lungenschwindsucht und zuweilen auch die Lustseuche und die Wassersucht. Auch besizen die Schwämmchen eine Art Ansteckungsfähigkeit, doch wie es scheint nur bei einer besondern Anlage zu dieser Krankheit, so dass der übertragene Stoff vielleicht nur

wie andere unreine Stoffe, die die Krankheit hervorzubringen vermögen, wirkt.

§. 1309.

Vorhersage. Die Schwämmchen sind in der Regel keine gefährliche Krankheit und meistens leicht zu beseitigen. Nur bei fortdauernder Ursache werden sie hartnäckig und zulezt tödtlich. Kommen sie bei Erwachsenen im Gefolge anderer Krankheiten vor, so sind sie meistens ein schlimmes Zeichen.

§. 1310.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Vorzüglich muss für Reinlichkeit und eine nicht zu reichliche, aber gute Nahrung gesorgt werden. Man kann die Schwämmchen oft schon dadurch verhüten, dass man dem Kinde jedesmal nach Darreichung der Brust oder anderer Nahrung den Mund mit einem in frisches Wasser getauchten reinen Leinwandläppchen reinigen lässt. Der Mehlbrei muss gut ausgekocht sein. Leidet die Mutter oder Amme an Flechten oder einer andern, die Milch verderbenden Krankheit, so muss eine andere Amme genommen werden. Gegen Säure des Magensaftes, Verstopfung etc. müssen die geeigneten Mittel in Anwendung gebracht werden.

§. 1311.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Ist der Grund, auf welchem die Bläschen und Borken sizen, stark entzündet, so dienen Oelmixturen, Mundsäftchen mit arabischem Gummi oder mit Quittenschleim. Ist dieses weniger der Fall, so passen sanftes Einreiben von gepulvertem Zucker und noch mehr Bestreichen der krankhaften Stellen mit Rosenhonig, Honig, oder Maulbeersyrup, rein oder mit Zusaz von Borax (Nro. 72), und wenn dieses nicht genügen sollte, von verdünnter Schwefel- oder Salzsäure (zu 10—20 Tropfen zu einer Unze Saft), oder von Alaun oder Zinkvitriol

(von ersterm zu 1 Scrup. bis zu ½ Drachm. und von lezterm 10 Grane als Zusaz zu derselben Menge von Saft). Sind die Schwämmchen missfarbig, so wählt man vorzüglich die genannten Mineralsäuren, so wie auch Chlor, und sezt auch den genannten Säftchen etwas Chamillen- oder Chinaextract zu und wendet auch Mundwasser von einem Aufguss von Salbei, Raute etc. an. Vermuthet man, dass auch Schwämmchen im Darmkanal sich befinden, so kann man von den genannten Mitteln kleine Portionen schlingen lassen, jedoch nicht wohl, oder nur mit besonderer Vorsicht, von dem Safte mit Zinkvitriol.

§. 1312.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Sind Koliken und Durchfälle vorhanden, so wendet man einhüllende und besänftigende Mittel, namentlich Mixturen mit arabischem Gummi und Opium an, seltener passen gegen die Durchfälle die tonischen Mittel.

Der Rachencroup.

(Diphthérite nach Bretonneau, Angine covenneuse, Angina tonsillaris membranacea, Aphtha anginosa nach Bateman.)

Bretonneau (des inflammations speciales du tissu muqueux et en particulier de la diphthérite. Paris 1826).

§. 1313.

Unter Rachencroup verstehen wir ein entzündliches Leiden des Rachens und der benachbarten Theile, mit

welchem die Bildung von Pseudomembranen verbunden ist.*)

§. 1314.

Die Krankheit beginnt oft mit Fieberbewegungen, welche dem örtlichen Leiden mehrere Tage vorhergehen. Sodann wird das Schlingen schmerzhaft und der Kranke hat das Gefühl wunder Rauhigkeit in der ganzen Rachenhöhle. Es zeigt sich nun am Gaumensegel, dem Zäpfchen, den Mandeln und im Grunde des Rachens eine nicht sehr lebhafte punktirte, flockige oder gestreifte Röthe, welche zuweilen schnell in's dunkel-purpurfarbige übergeht. Bald werden auf der entzündeten Stelle grau-weisse oder völlig weisse Flecken gebildet, welche zuerst vereinzelt stehen, sich aber in kurzer Zeit vervielfältigen und sich zu grössern Flecken vereinigen. Es sind diese Flecken Pseudomembranen, welche zuweilen so dünn sind, dass sie durchsichtig bleiben, oft aber auch sehr dick sind und in Hinsicht ihrer Consistenz vom Brei- und Käseartigen bis zum wirklich häutigen und selbst bis zum fibrösen Gebilde übergehen. Die Farbe wird oft späterhin grau und selbst schwärzlich. Der Athem des Kranken nimmt einen faulen Geruch an. — In den leichtern Fällen bleibt das Uebel auf den

*) Bevor mir die Beschreibung *Bretonneau*'s von der Diphtherit bekannt war, beobachtete ich einige Fälle von Bildung eines weissen, speckartigen Ueberzugs auf der Schleimhaut des Rachens, und hielt dieses Erzeugniss für aphthösen Ursprungs. Auch andere Beobachter hielten dieses häutige Gebilde für das Erzeugniss von Schwämmchen. — Weil nun jedenfalls in der Form der Krankheit einige Verwandtschaft zwischen Diphtherit und Schwämmchen, wenn sie in die Bildung der weissen Borken übergegangen sind, besteht, und weil die specifischen Entzündungen der Schleimhäute mehr oder weniger als Schleimhautexantheme betrachtet werden können, so glaube ich die Diphtherit neben den Aphthen abhandeln zu können. Vielleicht hat auch der Croup in den Luftwegen häufig einen exanthematischen Ursprung.

Rachen beschränkt; zuweilen breitet es sich aber auf die Athmungswege aus, wo sich die Symptome des Croups hinzugesellen, öfters auch auf die Nasenhöhle, in welchem Falle Schmerz in der Nase, Nasensprache, erschwertes Athmen durch die Nase und Aussickern einer scharfen Feuchtigkeit aus den Nasenlöchern eintreten, und zuweilen dehnt es sich auch auf die Speiseröhre, den Magen und den Darmkanal aus, in welchem Falle erschwertes Schlingen und Erscheinungen von Magen- und Darmentzündung sich hinzugesellten. *Gendrin* beobachtete selbst, dass bei der Diphtherit auf der Schleimhaut der Genitalien und am After sich Pseudomembranen bildeten; auch hat man sie im äussern Gehörgang gefunden. Zuweilen scheint auch der Anfang der Membranbildung an einer andern Stelle, als dem Rachen zu geschehen, und sich dieselbe erst später auf den Rachen auszudehnen.

§. 1315.

Geht das Uebel in Genesung über, so werden die Pseudomembranen stückweise losgestossen und ausgeworfen. Häufig entstehen an den Stellen, an welchen sich die falsche Haut losgetrennt hat, wiederum neue Pseudomembranen, wodurch die Krankheit in die Länge gezogen wird. Zum Tode führt das Leiden entweder unter Erschöpfung der Kräfte, meistens nachdem der nervöse Zustand hinzugekommen ist, oder unter Erstickung, indem die Pseudomembranen die Luftwege verschliessen.

§. 1316.

Ursachen. Es kommt die Krankheit vorzüglich bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, besonders Frauen, vor. Gelegenheitsursachen sind Verkältung, schlechte Lebensweise, wie sie sehr arme Personen oft zu führen genöthigt sind, vielleicht zuweilen Miasmen, nach einigen Beobachtungen ein Contagium.

§. 1317.

Ueber das **Wesen** der Krankheit sind die Meinungen noch getheilt. Aehnliche hautartige Gebilde, wie die oben beschriebenen, werden bei zwei in andern Kapiteln dieser Krankheitslehre dargestellten Krankheiten, nämlich den Schwämmchen und der brandigen Halsentzündung, gebildet, und es gibt auch Beobachter, welche die Diphtherit für nichts anderes, als für die eine oder die andere der genannten Krankheitsformen erklären; es ist jedoch keinem Zweifel unterworfen, dass eine plastische Ausschwizung etwas ganz anderes, als der aphthöse und als der gangränöse Schorf sei, und es lässt sich auch nicht in Abrede stellen, dass diese plastische Entzündung auf der Schleimhaut des Rachens vorkommen könne. Die Heftigkeit der Entzündung ist es übrigens nicht, was den Ausgang in plastische Ausschwizung bedingt, denn es ist bei dieser Krankheit eine grosse Neigung, in's Nervöse überzugehen, vorhanden, und somit müssen wir wohl diese Entzündung als eine specifische betrachten, die vielleicht einen exanthematischen Character hat.

§. 1318.

Behandlung. Im Anfange der Krankheit findet die gewöhnliche Behandlung der Halsentzündung ihre Anwendung, jedoch mit gehöriger Schonung der Kräfte, indem sich leicht ein nervöser Zustand entwickelt. *Bretonneau* empfiehlt das Calomel in grossen Gaben und Reinigung des Schlundes vermittelst eines Schwammes, welcher mit gleichen Theilen Honig und Hydrochlorsäure befeuchtet worden ist. Manche Aerzte rühmen den innerlichen Gebrauch der Mineralsäuren und tonisirender und erregender Mittel. Sehr nüzlich endlich hat sich die Cauterisation erwiesen, welche nach *Mackenzie* in der Weise vorgenommen wird, dass zweimal täglich der Schlund, die Mandeln und der hintere Theil des Gaumens

mit einer Auflösung des Höllensteins (Argent. nitr. ℈j solv. in Aq. destillat. ℥j) bestrichen wird.

Zweite Gruppe
der symptomatischen Ausschläge.

Die festwurzelnden symptomatischen Ausschläge.

Die Finnen.
(*Vari*, *Acne*, *Jonthus Acne.*)

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 62, 63, 64 u. 65, *Alibert*, Tab. 28, 29 u. 30, und *Rayer*, Pl. VIII.

§. 1319.

Die **Finnen** sind harte, entzündete, mehr oder weniger zugespizte Knoten in der Haut (entzündete Schmierbälge) von dem Durchmesser von 1 — 3 Linien, die meistens an der Spize sich mit etwas Eiter füllen, jedoch selten zu vollkommenen Pusteln werden und oft verhärten.

§. 1320.

Am häufigsten kommen die Finnen im Gesichte vor, besonders an der Stirne, in der Schläfengegend und an der Nase, doch öfters auch am Halse, auf der Brust etc. Es stehen die Finnen immer von einander getrennt, doch sind sie oft sehr zahlreich, so dass sie das Gesicht sehr entstellen; zwischen denselben befindet sich häufig eine grosse Menge von den sog. Mitessern, welche auch zuweilen in den Finnen selbst zu bemerken sind, und das Gesicht ist oft fettig-glänzend. Es haben die Finnen entweder eine mehr arteriell rothe Farbe und gehen

auch schneller in Eiterung über, etwa in 8 Tagen (Acne simplex), worauf sie allmälig verschwinden, wiewohl immer neue zum Vorschein kommen, oder sie haben eine mehr in's Violette gehende Farbe, sind sehr hart, eitern nur sehr langsam und wenig, und stellen mehr unverändert bleibende Knoten dar (Acne indurata). An der Spize erhalten die Finnen nach dem Aufbrechen derselben einen kleinen Schorf. Auf das Allgemeinbefinden hat der Ausbruch der Finnen in der Regel keinen sichtbaren Einfluss.

§. 1321.

Als eine besondere Modification der Finnen kann der **Kupferhandel** angesehen werden (Kupfergesicht, Kupfernase, Acne rosacea, Erythema ros., Gutta ros., Phoenigmus Ploucq.). Es wird im Anfange nur nach der Mahlzeit und dem Genusse geistiger Getränke die Nase oder eine andere Stelle des Gesichtes sehr roth, es wird aber diese Röthe, die oft in's Violette geht, allmälig bleibend, es zeigen sich überfüllte venöse Gefässchen und es entstehen auf derselben oft sehr zahlreiche Finnen, wobei die Nase allmälig um ein Bedeutendes an Umfang zunimmt. Bei langer Dauer der Krankheit erhält oft der grösste Theil des Gesichtes eine ähnliche Beschaffenheit. Nur selten verschwindet dieses Uebel allmälig ganz, doch wird es oft um Vieles geringer, nimmt aber sodann, besonders nach erneuerter Einwirkung der Gelegenheitsursachen, wiederum zu.

§. 1322.

Zu den Finnen gehört auch der **Feigenausschlag** (Sycosis, Jonthus Sycosis), welches Haufen von Finnen im Barte (Sycosis menti, Mentagra) oder zwischen den Kopfhaaren sind (Sycosis capillitii).

§. 1323.

Endlich werden auch die sog. **Mitesser** (Acne punctata *W.*) zu den Finnen gerechnet, sie sind aber nicht

sowohl, wie die Finnen, Entzündungen der Schmierbälge, als ein anderes Leiden derselben, welches sich in der Regel nur dadurch ausspricht, dass die Masse, welche in den Hautbälgen enthalten ist, fester wird und an dem der Luft zugekehrten Ende braun oder schwärzlich wird und sich in Form eines Würmchens herausdrücken lässt. Es kommen die Mitesser vorzüglich an den Nasenflügeln, am Kinn und an den Schläfen vor, aber auch an andern Stellen des Gesichtes und am Körper. — Zwischen den Mitessern entstehen oft kleine, zugespizte, weisse, den Hirsekörnern ähnliche Erhabenheiten, die mit einer weissen Schmiere gefüllt sind, welche in der Regel lange unverändert stehen bleiben (die Hautgrüze, Comedo Milium).

§. 1324.

Ursachen. Die Anlage zu den Finnen ist oft erblich. Die einfachen Finnen kommen besonders bei jungen Leuten zur Zeit des Mannbarwerdens vor und werden oft bei sonst ganz gesunden und kräftigen Individuen angetroffen. Vorzügliche Ursachen der Finnen sind übrigens Geschlechtsausschweifungen, zu reichlicher Genuss geistiger Getränke, Stockungen im Pfortadersysteme, Fehler in der Gallenabsonderung, Gicht, Scropheln, die Lustseuche, Flechten etc.

Der Kupferhandel insbesondere ist am häufigsten die Folge von einem fortgeseztcn starken Genuss der Spirituosa, doch auch oft von Stockungen im Pfortadersysteme etc.

Die Mitesser kommen am häufigsten bei scrophulösen Individuen und atrophischen Kindern (daher ihr Name) vor, doch auch oft bei wohlgenährten und dem Anscheine nach vollkommen gesunden Personen.

§. 1325.

Vorhersage. Die bei jugendlichen Individuen vorkommenden Finnen verschwinden oft von selbst, zuweilen

nach dem Heirathen. Oft ist der Ausschlag sehr schwer zu heben und selbst unheilbar.

§. 1326.

Behandlung. Auch bei diesem Ausschlag muss vorzüglich auf Entfernung der Gelegenheitsursachen hingewirkt werden, insbesondere muss sich der Kranke des Genusses der geistigen Getränke möglichst enthalten. Ist bei den Finnen und dem Kupferhandel die Haut stark entzündet, so leisten das Bestreichen derselben mit frischem Schweinefett und auch Bähungen mit milden Flüssigkeiten oft sehr gute Dienste. Bei dem Kupferhandel kann man selbst Blutegel in die Umgegend der kranken Hautstelle sezen lassen. Ausserdem sind empfohlen worden: Waschungen mit Schwefelwasser, verdünnter Benzoetinctur, Auflösungen von Borax, Kali carbonicum, Hydrargyrum muriaticum corrosivum, Blei, Essig etc., so wie das Bestreichen mit dem Unguentum Hydragyri praecipitati albi, oder Salben mit Schwefel, Graphit, Blei, Zink etc. Auch sind ableitende Mittel gerühmt worden, namentlich Fontanelle und das anhaltende Tragen von grünem Wachstaffent unter den Fusssohlen. In bedeutenden Fällen kann man auch den innerlichen Gebrauch der hautreinigenden Mittel zu Hilfe ziehen.

§. 1327.

Die Mitesser entfernt man, wenn sie nur in geringer Zahl vorhanden sind, am besten durch das Ausdrücken derselben. Zur Entfernung derselben und zur Verhinderung ihrer Entstehung zeigen sich ferner nüzlich: warme Bäder mit Seife, Waizen, Salz, aromatischen Kräutern, das Reiben der Haut im Bade mit wollenen Tüchern und ein solches Reiben der Haut im Bade, nach vorhergegangener Bestreichung des Körpers mit Honig oder mit einer Salbe von Honig, Mehl und Bierhefe etc.

Die Juckknötchen.

(*Juckblätterchen, das Hautjucken, Pruritus, Prurigo W.*)

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 6, und *Rayer*, Pl. X.

§. 1328.

Die **Juckknötchen** sind der symptomatische Ausschlag, welcher in ziemlich flachen Knötchen von der Farbe der Haut und der Grösse eines kleinen Stecknadelknopfes, die mit heftigem Hautjucken verbunden sind, abgekrazt kleine, schwarze Krusten bilden und chronisch sind, besteht.

§. 1329.

Zuweilen gehen dem Ausschlag innere Störungen, namentlich gastrische Affectionen vorher. Das Uebel erscheint in verschiedenem Grade der Heftigkeit. Oft sind, besonders bei jugendlichen Individuen, die Knötchen ziemlich klein, weich und in geringerm Grade juckend (Pr. mitis *W.*), oft sind die Knötchen breiter und versteckter und sehr heftig juckend, und erregen zugleich das Gefühl, wie wenn kleine Insekten auf der Haut hinkröchen und die Haut mit Nadeln gestochen würde (Pr. formicans *W.*), besonders heftig und hartnäckig ist das Uebel bei alten Leuten, bei welchen die Haut oft sehr uneben und wie granulirt erscheint (Pr. senilis *W.*). Der Ausschlag und das Hautjucken sind entweder über verschiedene Theile des Körpers verbreitet oder haben nur an beschränkten Stellen ihren Siz, wie die Prurigo podicis, Pr. scroti, Pr. praeputialis, Pr. urethralis, Pr. pudendi muliebris etc.

§. 1330.

Die Krankheit ist langwierig, besonders die Pr. senilis, welche meistens bleibend ist. Der Ausschlag verschwindet

ohne Spuren zurückzulassen. Er soll zuweilen in Kräze übergehen und durch Versezung auf innere Theile bedeutende Zufälle hervorbringen können.

§. 1331.

Diagnose. Die Juckknötchen sind oft schwer von den Schwindflechten und der Kräze zu unterscheiden.*)

§. 1332.

Ursachen und Bedeutung. Schlechte Speisen, namentlich sehr gesalzene Speisen und Seefische, Unreinlichkeit, Gemüthsbewegungen, Störungen in den Harnwerkzeugen, Stockungen im Pfortadersysteme, Hämorrhoiden, scheinen den Ausschlag hervorbringen zu können; meistens ist übrigens das Allgemeinbefinden nicht sehr gestört. — Das Uebel ist oft sehr hartnäckig und beschwerlich, wird aber nicht wohl Gefahr bringend.

§. 1333.

Behandlung. Gegen das Hautjucken dienen, nebst der Berücksichtigung der Gelegenheitsursachen, verdünnende, einhüllende und kühlende Getränke von einer Eibischabkochung, Mandelmilch, Molken, Auflösung von Weinsteinrahm, schweiss- und urintreibende Mittel und vorzüglich örtliche Mittel, wie lauwarme Waschungen mit schleimigen Dingen, lauwarme Bäder, mildernde Salben, mit Vorsicht gebrauchte kalte Waschungen, das Seebad etc. — Da *Willan* in einem Falle von Prurigo senilis viele kleine Insekten auf der Haut des Kranken wahrnahm, so wandte er Waschungen von einer Sublimatsolution an, was einen günstigen Erfolg hatte.

*) Vergl. die Kapitel über die beiden genannten Ausschlagsformen.

Die Hautkleie.

(*Der Kleiengrind, Pityriasis, Furfuratio.*)

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 15, *Alibert*, Tab. 23, und *Rayer*, Pl. XI.

§. 1334.

Die **Hautkleie** ist der symptomatische Ausschlag, der sich ausser einiger Veränderung in der Farbe der Haut allein unter der Form einer fortdauernden, oft sehr reichlichen und unter geringem Jucken erfolgenden, kleienartigen Abschuppung einzelner Hautstellen darstellt.

§. 1335.

Gewöhnlich bemerkt man keine sichtbare Hautentzündung, nur zuweilen ist die Haut an der leidenden Stelle etwas geröthet (Pit. rubra *W.*), meistens ist sie aber auch rauh und trocken, zuweilen nimmt sie eine bunte, scheckige Färbung an (Pit. versicolor. *W.*). Es entsteht die Abschälung der Epidermis ohne Vorhandensein von Blätterchen, Bläschen oder Geschwürchen, nur sondert der leidende Theil der Haut zuweilen eine scharfe und stinkende Feuchtigkeit ab. Die Epidermis löst sich in kleinen, kleien- und mehlartigen Schüppchen los, welche meistens in grosser Menge immer von neuem erzeugt werden. Befinden sich die Hautkleien in den behaarten Theilen (Pit. capitis *W.*), was sehr häufig der Fall ist, so gehen zuweilen die Haare verloren. Meistens ist der Kleiengrind mehr bleibend, zuweilen auch schneller vorübergehend; auch hat man denselben mit den Jahreszeiten wechseln und namentlich im Herbste und Frühjahr zurückkehren gesehen.

§. 1336.

Ursachen und Bedeutung. Häufig kann man keine Veranlassung der Hautkleie entdecken, öfters ent-

steht dieselbe von scharfen Waschmitteln, scharfem Haarpuder, der Einwirkung der Sonnenstrahlen, dem Missbrauch geistiger Getränke, oft auch aus einem veralteten, flechtenartigen Uebel, Scropheln, Gicht und Lustseuche. — Das Uebel wird wohl nie gefährlich, ist aber oft schwer zu beseitigen.

§. 1337.

Behandlung. Die Schuppen müssen fleissig durch Bürsten des Kopfes und mildes Reiben der Haut entfernt werden. Ist die Haut empfindlich oder selbst geröthet, so muss man sie mit milden Dingen, wie frischem Schweinefett, Oleum Hyoscyami, süssem Rahme etc. bestreichen, mit milden Waschwassern waschen, auch kalte Waschungen und Bäder anwenden, und auch mit Vorsicht Bleisalben, Bleiwasser etc. zu Hilfe ziehen. Ist die Haut mehr in einem torpiden Zustande, so kann man Waschungen mit Seifenwasser, Sublimatwasser etc., Salben mit weissem Präcipitat und sämmtliche bei den Flechten gebräuchliche Mittel in Anwendung bringen, so wie auch in hartnäckigen Fällen die innerlichen, gegen flechtenartige Uebel nüzlichen Mittel in Gebrauch gezogen werden können.

Der Leibgrind.

(*Grindflechte, Impetigo Willan.*)

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 34, 35 und 36, und *Rayer*, Pl. VII. Ueber die Milchkruste und den räudigen Ansprung, die Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 37, 38 u. 42, und *Rayer*, Pl. VII.

§. 1338.

Der **Leibgrind** ist der chronische, symptomatische Ausschlag, der in dem Ausbruch von Eiterbläschen be-

steht, die auf einer entzündeten Grundfläche sich bilden und in dicke, gelbliche, festaufsizende Grinde übergehen.

§. 1339.

Es entstehen unter heftigem Jucken ein oder mehrere getrennt stehenbleibende oder zusammenfliessende, rothe Flecken, die oft auch zu einer stärkern, rothlaufartigen Entzündung werden, und auf welchen dicht beisammenstehende Eiterbläschen ausbrechen. In zwei bis drei Tagen öffnen sich diese Bläschen und ergiessen den Eiter, der nun trocknet und zu einem dicken, gelblichen leicht zerreiblichen Grinde wird. Indem der eiterartige Ausfluss immer fortdauert, werden die Grinde dicker, gelbgrünlich und erhalten eine unregelmässig runde Gestalt (Impetigo figurata *W.*). Zuweilen werden die Krusten so dick, dass sie den Baumrinden gleichen (Imp. scabida *W.*). Indem im Umkreise des Grindes neue Pusteln entstehen, wächst der Grind oft zu einem bedeutenden Umfang. Zuweilen sind die Eiterbläschen nicht auf die angegebene Weise zusammengruppirt, sondern sind mehr einzeln über den Körper zerstreut, gehen aber ebenfalls in dicke, kleienartige Grinde über (Imp. sparsa *W.*). Zuweilen gesellen sich zu dem Grinde eine bedeutende Hautentzündung und Fieber hinzu (Imp. erysipelatodes *W.*). Manchmal entstehen auch ausgebreitete Eiterungen, die Nägel werden zerstört und es entwickelt sich zulezt Wassersucht.

Die Krankheit kommt zur Heilung, indem keine neue Eiterbläschen sich bilden und auch unter den Krusten die Eiterung aufhört, worauf auch die Kruste abfällt und nur noch einen röthlichen Flecken zurücklässt. In den günstigern Fällen kann die Krankheit in 3 bis 4 Wochen ein Ende erreichen, in der Regel wird sie aber langwierig und kann eine ganz unbestimmte Zeit dauern.

§. 1340.

Zur Impetigo muss die **Milchborke** (Milchgrind, Ansprung, Sägesprünge, Crusta lactea, Lactumen infantum, Tinea faciei, Porrigo larvalis *Willan*) gerechnet werden.

C. Strack (lat. Frankf. a. M. 1779, a. d. Lat. v. Weitz, Weimar 1788). — *Wichmann* (Ideen z. Diagnost. B. 2.).

Es besteht dieser Ausschlag in Bläschen, die unter geringem oder auch stärkerm Jucken auf einem etwas entzündeten Grunde im Gesichte hervorbrechen, eine zähe, mehr oder weniger eiterartige Flüssigkeit ergiessen, und in Krusten übergehen, die der am Feuer eingetrockneten Milch ähnlich sind. Es erscheint der Ausschlag vorzüglich am Kinn, den Wangen und der Stirne, überzieht aber allmälig, indem immer neue Bläschen hervorbrechen und in Krusten übergehen, oft den grössten Theil des Gesichtes und dehnt sich selbst über den Hals und die Brust aus. Diese Krusten bleiben oft mehrere Monate und selbst ein Jahr lang stehen, wobei oft einzelne abfallen und neue sich bilden, endlich stossen sich die Krusten los und es schält sich die Epidermis wiederholt ab, worauf aber keine Narben zurückbleiben. Der Uebergang in Gesundheit soll oft unter dem Abgang eines trüben, milchigten Urins erfolgen, der den Geruch des Kazenharnes hat.

§. 1341.

Von der Milchborke unterscheidet man den **räudigen Ansprung** (Crusta serpiginosa nach *Wichmann*), welcher übrigens mehr den Flechten, als dem Grinde angehört. Es brechen hier statt Eiterbläschen mehr Lymphbläschen aus, die ein heftiges Jucken veranlassen und eine scharfe Feuchtigkeit ergiessen, die die Theile, auf welche sie fliesst, in Entzündung versezen und zur Erzeugung neuer Bläschen Veranlassung geben. Es bildet die ausgeschwizte Lymphe keine so dicken Grinde,

wie die Milchkruste, sondern dünnere Schuppen, die sich auch leicht lostrennen, so dass an vielen krankhaften Stellen die Haut nicht davon bedeckt ist, sondern roth, wund und nässend erscheint. Es breitet sich der räudige Ansprung oft über den grössten Theil des Gesichtes, namentlich auch über die Augenlieder aus, die die Milchborke nicht ergreift. Zuweilen dehnt sich der Ausschlag über den grössten Theil des Körpers aus. — Die Krankheit kann Jahre lang dauern und zulezt allgemeine Schwäche, Abmagerung und ein Zehrfieber veranlassen.

§. 1342.

Die Ursachen des Leibgrindes sind nicht alle hinreichend bekannt. Oft wird das Uebel nur durch äussere Schädlichkeiten, wie Kalk, Metallstaub etc., veranlasst. Kinder beim Zahnen und Frauen in den klimakterischen Jahren leiden öfters an diesem Ausschlag. Häufig ist er bei scrophulösen und andern dyscrasischen Leiden, auch scheint er durch Ausschweifungen und Gemüthsaffecte hervorgebracht werden zu können und entwickelt sich auch zuweilen im Gefolge von andern Ausschlägen.

Die Milchborke befällt besonders Kinder in dem ersten Lebensjahre. Als Ursache derselben werden vorzüglich die Scropheln, eine zu alte und dicke Ammenmilch, Ueberfütterung, Säure, Verschleimung der ersten Wege, grosse Vollsaftigkeit des Kindes und auch ein eigener Ansteckungsstoff beschuldigt.

Der räudige Ansprung kommt vorzüglich bei Kindern vor, die schon an der Kräze oder an einem syphilitischen Uebel gelitten haben oder deren Eltern oder Amme mit Kräze, Flechten, Syphilis oder einem andern unreinen Leiden behaftet sind oder es wenigstens waren.

§. 1343.

Vorhersage. Die Impetigo wird nicht leicht ge-

fährlich, ist aber langwierig und oft sehr hartnäckig. — Die Milchborke wird niemals tödtlich und verschwindet mit der Zeit von selbst. — Der räudige Ansprung ist sehr hartnäckig und kann selbst Gefahr bringend werden.

§. 1344.

Behandlung. Es sind sowohl diejenigen Mittel in Anwendung zu bringen, die zur Beseitigung der der Impetigo zum Grunde liegenden Krankheit erforderlich sind, namentlich oft die gegen Scropheln dienlichen Mittel, als auch solche, welche die hier schon etwas bedeutendere Hautaffection erfordert. Ist der Hautfleck, auf welchem der Grind sich gebildet hat, in einem gereizten und entzündeten Zustand, so ist es zuweilen selbst nothwendig, Blutegel in den Umkreis der kranken Stelle zu sezen, in der Regel genügt es aber, ihn mit einem mit frischem Fett bestrichenen oder in ausgelassenes Fett getauchten Leinwandläppchen bedecken zu lassen oder mit Fett, Oel, süssem Rahm etc. bestreichen zu lassen, oder besänftigende Bähungen, Bäder, den Wasserdampf etc. in Anwendung zu bringen. Vorzüglich empfohlen werden auch Waschungen mit Blausäure, mit Wasser verdünnt und dem Zusaze von essigsaurem Blei und etwas Alkohol. Auch können bei Hartnäckigkeit des Uebels Blei- und Zinksalben angewandt werden. Ist die Haut weniger entzündet, so wendet man Schwefelbäder, Quecksilbersalben u. s. w. an. Genügen diese Mittel nicht, so muss man die Stelle mit einer Mineralsäure, besonders Salzsäure, oder einer Auflösung von salpetersaurem Silber cauterisiren, oder ein Blasenpflaster auf dieselbe legen. In den schlimmsten Fällen hat man den Arsenik äusserlich angewandt. — Als innerliche Mittel hat man zum Theil Abführungsmittel, zum Theil die gewöhnlichen hautreinigenden Mittel empfohlen, namentlich die Antimonialien, die Quecksilbermittel und das Zittmännische Decoct.

§. 1343.

Bei der Behandlung der Milchborke ist es von der grössten Wichtigkeit, die Diät des Kindes und die der Amme auf eine angemessene Weise zu ordnen, so wie auch der krankhaften Säure des Magensaftes, den Scropheln etc. entgegenzuwirken. Im Allgemeinen finden übrigens bei der Milchborke die gegen die Impetigo gebräuchlichen Mittel nach den nämlichen Anzeigen ihre Anwendung, nur möchten die stärkern äusserlichen und innerlichen Mittel, wie das Cauterisiren und die äussere Anwendung des Arseniks, so wie der innerliche Gebrauch der Antimonialien, der Quecksilbermittel und des Zittmännischen Decoctes nicht nothwendig sein, dagegen sind vorzüglich im Gebrauch die Herba Jaceae (von *Stark* empfohlen, zu einer halben bis ganzen Drachme des frischen oder des getrockneten Krautes mit 3 — 4 Unzen Milch oder Wasser gekocht, morgens und Abends genommen, oder jüngern Kindern esslöffelvollweise den Tag über gegeben, so wie auch das Pulver zu 10 — 15 Grane mehrmal des Tages unter den Brei gemischt oder mit Syrup gegeben) und die Schwefelmittel innerlich und in Bädern in Anwendung gebracht. — Bei dem räudigen Ansprung müssen zuweilen Quecksilber- und Antimonialmittel zu Hilfe gezogen werden.

Die Flechten.

(*Herpes, Serpigo.*)

De Roussel (lat. Cadom. 1779). — *Poupart* (a. d. Franz. 1784, übers. v. Conrad. Strassb. 1785). — *Tilesius* (Lpz. 1802, mit 1 K.). — *Alibert* (Dict. des sciences méd. Par. 1814. Tom. 8.).

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 9 bis 14, und 49 bis 52, *Alibert*, Tab. 23 bis 27, und Tab. 34, und *Rayer*, Pl. IV und XI.

§. 1346.

Die Flechten sind der fieberlose und meistens chronische Hautausschlag, welcher in beissenden und juckenden, entzündeten Hautflecken besteht, die vermittelst Bläschen und auch ohne dieselben eine scharfe, seröse Feuchtigkeit ausschwizen und sich mit Schuppen bedecken.

§. 1347.

Unter dem Namen Flechten sind von vielen Aerzten beinahe alle chronische, sich vorzüglich durch Schuppenbildung characterisirende Hautausschläge begriffen worden, von *Willan* aber nur eine bestimmte, mit Bläschen bezeichnete Form von Ausschlag. Zu den Flechten der ältern Aerzte gehören die Pityriasis, zum Theil der Lichen (namentlich Lichen agrius), zum Theil das Eczema, Ecthyma, Rhypia, Impetigo, der Herpes und die Psoriasis nach *Willan*. Es hat diese ältere Darstellungsweise den Vortheil, dass nicht wegen einer, oft wie es scheint zufälligen Verschiedenheit in der Beschaffenheit des Exanthems, diejenigen Veränderungen in der Haut von einander getrennt werden, die in ein und derselben Art von Störung im Körper wurzeln, doch hat man allerdings zu verschiedenartige Krankheitsformen, die doch auch nicht ganz dieselbe Bedeutung haben, unter *einem*

Namen begriffen. *Willan* auf der andern Seite begieng den Fehler, dass er ganz allein die Form der Hautveränderung berücksichtigend, Hautkrankheiten von den Flechten trennte, die vorzugsweise diese Krankheitsart darstellen, und Ausschläge unter denselben begriff, die nicht zu ihnen gehören, da sie das vorzügliche, von Alters her angenommene und durch das Wort Herpes (von ʾρεπω kriechen) schon bezeichnete Merkmal der Flechten, das langsame Umsichfressen, gänzlich entbehren und vielmehr schnell vorübergehende, meistens in Begleitung von Fiebern auftretende Exantheme sind, wie z. B. der Herpes Zoster nach *Willan.*

§. 1548.

Als die beiden Hauptmerkmale der Flechten glaube ich die meistens in kleinen Bläschen, aber auch ohne dieselben geschehende Bildung von einer scharfen, serösen Flüssigkeit, die leicht die Theile, wo sie hinkommt, in Entzündung versezt und sich zu Schuppen umwandelt, und die Neigung, ein festwurzelndes Hautübel zu bilden, annehmen zu dürfen. Diesemnach trenne ich die durch einfache Abschuppung der Epidermis und die durch Eiterblasen entstandenen Schuppen und Grinde von den Flechten, mithin die Pityriasis, Ecthyma, Rhypia und Impetigo, so wie auch diejenigen schuppigen Hautausschläge, die zwar durch Bläschen entstanden sind, aber nur ein flüchtiges, symptomatisches Exanthem sind, wie z. B. den Gürtel, die um den Mund herum im Wechselfieber und bei gastrischen Reizen sich bildenden consensuellen Bläschen (Herp. Zoster und Herp. labialis, nach *Willan* und *Bateman*), das Eczema etc.

Nach diesen gegebenen Bestimmungen gehören von den von *Willan* und *Bateman* aufgestellten Ausschlagsarten folgende beide zu den Flechten: Der Herpes, in so fern die hier entstehenden Bläschen nicht blos ein

flüchtiges Symptom, namentlich einer fieberhaften Krankheit, sind, und die Psoriasis.

Die *Flechte* (Herpes) ist nach *Willan* und *Bateman* eine meistens acute Krankheit, welche in dem mit Jucken und Brennen verbundenen Ausbruch von Bläschen besteht, die auf entzündeten Hautpläzen angehäuft sich befinden und in Schüppchen und Krusten übergehen. Zum Theil als Arten, zum Theil als Varietäten werden angenommen: Die Kleienflechte (H. furfuraceus). Sie besteht in kaum sichtbaren, auf schwach entzündeten Stellen, stehenden Bläschen, welche kleienartig sich abschuppen. — Die Frieselflechte (H. miliaris). Sie sind Flechten, bei welchen die Bläschen die Grösse der Frieselbläschen haben. — Die Blasenflechte (H. phlyctaenoides) ist eine solche Flechte, bei welcher die Bläschen 1 bis 2 Linien im Durchmesser haben. — Die Ringflechte (H. circinatus) ist in Beziehung auf die Grösse der Bläschen entweder Kleien- oder Friesel- oder Blasenflechte, und unterscheidet sich nur von diesen Flechtenarten dadurch, dass die einzelnen Pläze nur an ihrem Rand von Bläschen besezt sind. Indem dieser Rand sich allmälig mehr ausdehnt, wird hierdurch zu neuen Ausbrüchen von Bläschen Veranlassung gegeben. — Die Regenbogenflechte (H. Iris). Sie besteht in kleinen runden Flecken, welche aus concentrischen Ringen von verschiedener Farbe zusammengesezt sind und auf welchen Bläschen in der Art stehen, dass in der Mitte ein grösseres und im übrigen Theile des Fleckes kleinere Bläschen sich befinden. — Die Gürtelflechte (H. Zoster), sie ist von mir als eine eigene Ausschlagsart abgehandelt worden. — Die Lippenflechte (H. labialis). Sie ist der vorzüglich beim Wechselfieber vorkommende Bläschenausbruch an den Lippen und wurde von mir in dem Kapitel von dem Hidroa beschrieben. — Die Vorhautflechte (H. praeputialis). Es sind dieses auf der innern und der äussern Seite der Vorhaut vorkommende, auf entzündeten Flecken stehende Bläschen, welche leicht in oberflächliche Geschwürchen übergehen, die aber sich mit Krusten bedecken und in wenigen Tagen von selbst heilen. — Aehnliche Blasengruppen kommen auch an den Augenliedern (H. palpebralis), an dem Ohre (H. auricularis) etc. vor (H. localis).

Die Ursachen dieser Veränderungen auf der Haut sind: örtlich angebrachte Reize, wie scharfe Waschwasser, unreine Stoffe, die sich an einzelnen Stellen, z. B. zwischen der Vorhaut ansammeln etc., gastrische Reize verschiedener Art, rheumatische und catarrhalische Fieber, Wechselfieber, Gemüthsbewegungen, auch Scropheln, Gicht etc.

Die *Schuppenflechte* (Psoriasis). Dieselbe besteht in Flecken von trockenen, unregelmässig gestalteten Schuppen, fortlaufend oder von unterbrochenem Umfange, oft mit Rissigkeit der Haut. Es entstehen entzündete, kaum oder gar nicht über die Haut hervorragende Pläze, mit einer sehr zarten Oberhaut, die ohne wahrhafte Excoriationen Serum ausschwizen, welches in dünne, halbdurchsichtige Schuppen und oft auch in einen ausgedehnten, von Spalten durchrissenen Grind übergeht. *Willan* nimmt folgende Arten an: Die tropfenartige Schuppenflechte (Ps. guttata), dieselbe besteht in Pläzen von der Schuppenflechte von dem Durchmesser von 2 — 4 Linien, welche vorzüglich an den Extremitäten wie Tropfen aufgesprizt sind. Häufig steht ein derartiger Schuppengrind mit einem syphilitischen Uebel in Verbindung, in welchem Falle die Flecken oft eine braune und dunkelrothe Farbe annehmen (Ps. guttata syphilitica). — Die ausgebreitete Schuppenflechte (Ps. diffusa). Sie besteht in grossen, irregulär begränzten, röthlichen, rauhen und schrundigen Flecken, auf denen hin und wieder Schuppen sizen. — Die gewundene Schuppenflechte (Ps. gyrata). Dieselbe stellt schmale, verschiedentlich gestaltete, oft geschlängelte Flecken und Streifen dar. — Als Modificationen der ausgebreiteten Schuppenflechten können angesehen werden die Psoriasis infantilis, bei welcher zugleich entzündete Pusteln, die in Eiterung übergehen, entstehen, die Nasenlöcher verstopft werden, die Haare der Augenlieder und die Wimpern ausfallen und bei welchen zwischen den schuppigen Flecken glatte, glänzende Erhabenheiten der Epidermis zum Vorschein kommen, die an der Spize etwas flach sind und eine zirkelförmige oder ovale Grundfläche haben, und die Psoriasis inveterata, welche sich durch einen fast allgemein schuppigen Zustand auszeichnet, wobei die Haut rauh, trocken und widernatürlich dick ist. — Nach Verschiedenheit des Sizes nimmt *Willan* auch noch als besondere Arten der Schuppenflechten die Psoriasis palmaria, Ps. labialis und Ps. scrotalis an.

Die Schuppenflechte ist erblich und wird erzeugt durch den Genuss stark gesalzener Speisen, Seefische, Stockungen im Pfortadersystem, niederdrückende Gemüthsaffecte, einen dyscrasischen Zustand des Körpers, Unreinlichkeit, unmittelbar auf die Haut wirkende Reize etc.

§. 1349.

Es können drei Hauptarten der Flechten angenommen werden:

1) Die *mehlichten Flechten* (Herpes farinosus). Es

erscheinen dieselben unter etwas Jucken und Brennen der Haut, welche einen rauhen und röthlichen Fleck oder mehrere derartige Flecke enthält, auf welchen man bei genauer Betrachtung, besonders mit bewaffnetem Auge, ganz kleine Bläschen wahrnimmt. Von selbst oder indem sie aufgekrazt werden, ergiessen diese Bläschen eine scharfe Feuchtigkeit, welche zu mehlartigem Staub oder kleienartigen Schüppchen vertrocknet. Oft kann man auch jene Bläschen nicht mit Bestimmtheit erkennen, und es entstehen die mehlartigen Schuppen durch blosse Aushauchung jener Feuchtigkeit aus dem mehr oder weniger entzündeten Hautfleck. Es gehen dem Ausbruche dieses Exanthems oft verschiedene Affectionen vorher, z. B. mangelnde Esslust, Mattigkeit und Nervenzufälle, die zuweilen durch denselben gehoben werden, oft ist er aber mit keinen solchen Beschwerden verbunden.

§. 1350.

2) Die *schuppigen Flechten* (Herpes squamosus). Auf entzündeten Flecken der Haut entstehen zusammengehäufte Bläschen von der Grösse der Hirsekörner (H. miliaris) oder grösser (H. phlyctaenoides), welche eine scharfe, klebrichte und übelriechende Feuchtigkeit ergiessen, oder es wird diese Feuchtigkeit aus der entzündeten und wunden Hautstelle, ohne jene Bläschen ausgeschwizt. Es bilden sich nunmehr Schuppen (H. squamosus) und Borken (H. crustaceus), unter welchen oft fortdauernd etwas Feuchtigkeit sich ergiesst (H. squamosus madidus) und welche eine lange Zeit festsizen oder durch neue Schuppen ersezt werden. Im Umfang dieser Schuppen entzündet sich die Haut mehr oder weniger und es entstehen oft neue Bläschen oder nässende Stellen und Schuppen, wodurch die Flechte allmählig an Umfang zunimmt, während sie oft in der Mitte trockener wird. Diese Art der Flechten erregt stärkere Beschwerden, als die mehligten Flechten, insbesondere

stärkeres Jucken und Brennen, das oft Schlaflosigkeit verursacht, auch wird oft der Harn trübe, bei Weibern stellt sich ein weisser Fluss ein und die Ernährung leidet.

§. 1351.

3) Die *fressenden Flechten* (Herpes exedens, Herpes ἐσθιομενος, rodens, depascens, phagedänicus, Lupus). Diese Flechte, die vorzüglich im Gesichte, namentlich an der Nase und dem Kinne (Mentagra)*) vorkommt, zeichnet sich durch heftige Schmerzen und vorzüglich dadurch aus, dass eine sehr scharfe Feuchtigkeit abgesondert wird und unter den Borken Verschwärungen entstehen, wodurch die Haut immer mehr angefressen und selbst die darunter liegenden Theile zerstört werden.

§. 1352.

Diese verschiedenen Arten von Flechten erscheinen unter verschiedenen Modificationen, wohin der Herp. circinatus, Herp. Iris, die Psoriasis guttata, und die Ps. gyrata, nach *Willan*, gehören.

§. 1353.

Es haben die Flechten immer einen mehr chronischen Verlauf und dauern oft selbst Jahre und sind selbst habituell. Zuweilen verschwinden sie und kehren an derselben oder an einer andern Stelle wieder zurück, und oft erscheinen sie nur zu gewissen Zeiten, z. B. zu gewissen Jahreszeiten. — In Gesundheit gehen dieselben durch allmählige Abschälung der Haut, oft unter dem Eintritt von Ausscheidungen, z. B. dem der Hämorrhoiden, über. In Nachkrankheiten und den Tod durch Metastasen und allmälige Entwicklung einer allgemeinen Kachexie und Abzehrung.

*) Unter diesem Ausdruck versteht man übrigens verschiedenartige Ausschläge am Kinn.

§. 1354.

Die Anlage zu Flechten ist oft ererbt. Auch bedingen gewisse Lebensperioden, namentlich bei Weibern die Zeit des Aufhörens der Geschlechtsfunctionen und gewisse Constitutionen, namentlich die lymphatische Constitution, eine besondere Anlage zu dieser Krankheit. Als Gelegenheitsursachen werden beschuldigt: gastrische Reize, wie Säure, Galle, Schleim in den ersten Wegen, der reichliche Genuss stark gesalzener und schwer verdaulicher Speisen, namentlich des eingesalzenen Fleisches und mancher Fische, häufige Gemüthsaffecte, insbesondere Zorn, Unterdrückung gewohnter Ausleerungen, z. B. eines weissen Flusses, der Hämorrhoiden, zu sparsamer Harnabgang, Stockungen im Pfortadersystem, vorzüglich auch unvollkommen geheilte Kräze, Syphilis, die Scropheln, die Bleichsucht und die Gicht. Von einigen Aerzten (*Poupart* und *Roussel*) wurde auch bei den höhern Graden der Flechten Ansteckungsfähigkeit beobachtet, doch wird (von *Richter* und *Haase*) das Vorhandensein eines eigenen Flechtencontagiums geleugnet und behauptet, dass bei einer etwa erfolgten Ansteckung nicht die Flechten an sich, sondern die Krankheit angesteckt habe, in deren Verbindung sie vorkommen, wie die Syphilis. Endlich werden auch flechtenartige Veränderungen in der Haut durch unmittelbar auf die Haut wirkende scharfe Stoffe, wie reizende Pflaster, Salben, Staub, z. B. bei Webern, und das Tragen rauher, wollener Kleider hervorgebracht.

§. 1355.

Ueber das Wesen der Flechten wurden verschiedene Meinungen ausgesprochen. *Hippokrates* leitete die Krankheit von einem zähen Schleime ab, *Galen* von überflüssiger und heisser Galle, mehrere Aerzte (*Sanctorius, Ballonius, Piso, Gorter*) von einem scharfen Serum, andere

hielten sie für eine abnorme Secretion des im Blute zurückgebliebenen Harnstoffes, [1]) einige neuere Aerzte endlich (*Haase*, *Rayer*), wie überhaupt die Hautausschläge, für Hautentzündungen. — Ich erkläre die Entstehung der Flechten, wie überhaupt die der Exantheme [2]) und halte dieselbe für eine oberflächliche seröse Entzündung und krankhafte Absonderung in der Haut. Hiebei ist es mir wahrscheinlich, dass häufig in der Säftemasse oder im Gewebe der Haut selbst schadhafte (scharfe) Stoffe, z. B. entarteter Kräzstoff, sich befinden, die der Entzündung und krankhaften Absonderung den eigenthümlichen Character geben und die Ursache des Festwurzelns des Exanthemes sind.

§. 1356.

Vorhersage. Die Flechten sind, mit Ausnahme der fressenden Flechten, eine zwar selten gefährlich werdende, aber eine oft sehr hartnäckige Krankheit, besonders da man die kräftiger wirkenden Mittel, nämlich viele äussere Mittel, nur mit grosser Vorsicht, um keine Metastase zu veranlassen, anwenden darf. Am schwersten sind die angeerbten und die in höherm Alter und von innern Ursachen entstandenen Flechten zu heilen, leicht dagegen die neu und von äussern Ursachen entstandenen flechtenartigen Veränderungen in der Haut.

§. 1357.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Vorzüglich ist die Diät zu ordnen, insbesondere sind stark gesalzene und gewürzte Speisen und eine reichliche Fleischnahrung zu vermeiden, und dagegen mehr Vegetabilien, insbesondere säuerliche Früchte, z. B. Aepfel, zur Nahrung zu wählen. Gegen Verstopfung

1) *Raimann*, Handb. d. spec. Path. u. Therap. B. II. S. 188. — 2) Vergl. die §§. 1190—93.

und Stockungen im Pfortadersysteme, so wie gegen eine vorhandene Dyscrasie, namentlich die Lustseuche und die Scropheln sind die geeigneten Mittel in Anwendung zu bringen. Die in den Flechten abgesonderte scharfe Feuchtigkeit, die selbst wieder Ursache der grössern Ausbreitung der Krankheit wird, muss durch fleissiges Reinigen der Theile vermittelst milder Waschwasser und Bäder entfernt werden, so wie es auch zuträglich ist, die Theile durch Bestreichen mit einem Fette vor der Einwirkung der scharfen Feuchtigkeit zu schüzen etc.

*§. 1358.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um den Krankheitsprozess in der Haut aufzuheben, sind zum Theil Mittel dienlich, die den Lebensprozess in der Haut überhaupt herabstimmen, zum Theil solche, die qualitativ umstimmend wirken (die mischungsändernden und hautreinigenden Mittel), die nach den im allgemeinen Theil von den Hautausschlägen angegebenen Anzeigen in Anwendung gebracht werden müssen. Ersterm Zwecke entsprechen die von Manchen empfohlenen, aber meistens entbehrlichen Blutentziehungen und die wohl viel nüzlichern, von Zeit zu Zeit in Anwendung zu bringenden Abführungsmittel, so wie auch, wenn es das Allgemeinbefinden des Kranken gestattet, eine magere Diät. Die leztere Wirkung haben vorzüglich die Mercurialien, die Antimonialien, der Schwefel, besonders mehrere dieser Mittel in Verbindung mit einander, wie in dem Aethiops antimonialis, Aeth. mercurialis, den Plummerschen Pulvern (Nro. 69) etc., der von *Weinhold*[1]) empfohlene Graphit (innerlich Erwachsenen zu einer Unze innerhalb 8 Tagen verbraucht, in Lattwergen,

1) Der Graphit oder neu entdecktes Heilmittel wider die Flechten. Meissen 1812.

Bissen oder Pillen für sich oder in Verbindung von Queksilber, Spiessglanz, Schwefel etc.). Das Jod (nach *Biett*), der Arsenik (doch nur in den schlimmsten Fällen), die Herba Jaceae, Stipites Dulcamarae, Guajak, Sarsaparill, Cortex Ulmi, die Tinctura Cantharidum (nach *Biett*) etc.

§. 1559.

Mit diesen innerlichen Mitteln müssen zugleich entsprechende äussere Mittel in Anwendung gebracht werden, von denen jedoch die schnell heilenden, nur mit Vorsicht und bei grösserer Gefahr einer Metastase nach vorher geschehener Sezung einer Fontanelle oder Auflegen von Seidelbast auf eine benachbarte, gesunde Hautstelle in Gebrauch gezogen werden dürfen. Um den erhöhten Lebensprozess in der Haut herabzustimmen, also vorzüglich bei grosser Empfindlichkeit und einem entzündlichen Zustand der Haut, wendet man an: frisches Fett, Oel, milde Salben, Waschungen mit milden Waschwassern, warme Bäder, einfachen Wasserdampf, Blei- und Zinksalben, und bei starker Entzündung auch Blutegel im Umfang derselben gesezt. Um qualitativ umändernd zu wirken, wendet man an: Salben mit weissem oder rothem Queksilberpraecipitat (Nro. 73), das Unguentum oxygenatum, Waschungen mit Sublimatwasser (*Wedekind*), Graphitsalben und Pflaster (Nro. 74), Schwefelsalben, Schwefelbäder, Schwefelräucherungen (nach *Gale's* Methode), nach *Biett* eine Salbe mit einfachem oder doppeltem Jodqueksilber (von ersterm 12 Grane bis zu 1 Scrup., von lezterm 12 — 15 Grane auf eine Unze Schweinefett), salinische Bäder, Waschungen mit einer Abkochung von Stipites Dulcamarae, Ulmenrinde, Wallnussschaalen etc. Um die krankhafte Hautstelle zu zerstören, hat man Blasenpflaster auf dieselbe gelegt, die Brechweinsteinsalbe eingerieben und Aezmittel angewandt. Bei der fressenden Flechte muss die kranke

Hautstelle vollkommen zerstört werden, was am besten durch das Hellmund'sche Mittel [1]) geschieht.

§. 1360.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Sind die Flechten zurückgetrieben, so dienen Hautreize und die schweisstreibende Methode. Entwickelt sich ein allgemein kachektischer Zustand, so müssen oft stärkende Mittel in Anwendung gebracht werden.

Der Kopfgrind.

(*Tinea, Porrigo nach Willan.*)

Murray (lat. Gött. 1782). — *Hillairet* (Paris 1814). — *Mahon* (Paris 1829).

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 38 bis 41, *Alibert*, Tab. 13 bis 14, und *Rayer*, Pl. VII.

§. 1361.

Der **Kopfgrind** ist der chronische, bisweilen ansteckende, vorzüglich bei Kindern vorkommende Ausschlag an dem behaarten Theile des Kopfes, welcher in Eiterbläschen und zuweilen auch in kleinen Abscessen in der Kopfschwarte besteht, wodurch eine klebrige, übelriechende, in Grinde übergehende Feuchtigkeit erzeugt wird und oft die Haarzwiebeln zerstört werden.

§. 1362.

Es gehen dem Ausbruch des Grindes Jucken und das Gefühl von Spannung und Hize in der Kopfhaut, und oft Anschwellung der Drüsen am Halse, so wie auch Kopfweh vorher. Sodann brechen kleinere und

1) Rust's Magazin. Bd. XIX. Heft 1.

grössere, mit einer halb eiter-, halb lymphartigen, zähen, übelriechenden Flüssigkeit gefüllte Bläschen an dem behaarten Theile des Kopfes, vorzüglich am Hinterhaupte aus, welche zum Theil ganz oberflächlich sind, zum Theil auch tiefer sizen und mit welchen zuweilen Ansammlungen einer grössern Menge einer ähnlichen Flüssigkeit im Zellgewebe verbunden sind, welche kleine Abscesse darstellen. Diese Bläschen und kleinen Abscesse brechen gewöhnlich auf und ergiessen durch enge Oeffnungen (Augen) die erwähnte Flüssigkeit, welche nunmehr zu Schuppen und Borken von sehr verschiedenartiger Gestalt erhärten. Zuweilen finden diese Eiteransammlungen um die Haarzwiebeln herum statt, wobei sodann aus der Mitte des Eiterbläschens ein Haar hervorgeht, und die Haare leicht ausgezogen werden können und von selbst ausfallen. Oft erkranken auch die Haarzwiebeln, ohne dass sie der Mittelpunkt des Abscesschens sind, wobei die Haare entweder nur ihre Farbe verlieren und kraus werden, oder auch ganz ausgehen. In andern Fällen endlich gehen die Bläschen und Abscesschen in um sich greifende Geschwüre über, wodurch nicht allein die Haarzwiebeln zerstört, sondern auch die Haut selbst zerfressen wird, ja zulezt die Schädelknochen selbst angegriffen werden. Bei dem Kopfgrind werden viele Läuse erzeugt und es entwickelt sich bei langer Dauer und in den höhern Graden der Krankheit zulezt ein kachektischer Zustand und selbst Zehrfieber.

§. 1363.

Man hat sehr verschiedene Arten des Kopfgrindes angenommen. Indem man die Achores und die Favi der Alten für zwei verschiedene Veränderungen in der Kopfhaut hielt, hat man hiernach zweierlei Arten des Grindes, je nachdem sie mehr in Achores oder Favi bestehen und von denselben herstammen, angenommen; man ist aber über die Bedeutung beider angegebenen Worte nicht

einig, indem die Einen unter Achores nur enge Oeffnungen verstehen, durch welche die klebrige Lymphe aus den Bläschen und Abscesschen fliesse, und unter Favi grössere, den Bienenzellen ähnliche Oeffnungen, Andere eine Verschiedenheit der Bläschen darunter begreifen, indem sie die Achores für kleinere Eiterbläschen (Wachsbläschen) von dem Durchmesser einer Linie erklären, die aufplazen und kleine Löcher oder Augen bilden, aus welchen viele Feuchtigkeit dringt, die zu Krusten erhärten, und die Favi für grössere Bläschen von dem Durchmesser von 2 Linien und mehr, welche nicht leicht aufplazen, sondern zu einer käseartigen Masse eintrocknen, wobei der Mittelpunkt einsinkt und einen becherförmigen Nabel bildet, oder indem sie die Achores für etwas ausgedehntere Eiterbläschen als die Favi halten, die sehr oberflächlich seien, oft zusammenfliessen und in breite, gelbliche oder braune Grinde übergehen, und die Favi für kleine, vollkommen runde und in die Epidermis gleichsam eingekeilte, im Mittelpunkt eingedrückte Pusteln, welche einen dicken cellulösen Grind bilden, der längere Zeit hindurch wächst und bald einen Eindruck und die Form eines Näpfchens bekommt, bald aber diese Eigenschaft verliert und blos als ein dicker, gelbgrauer Grind erscheint, und indem viele Andere unter den genannten Ausdrücken mehr die Beschaffenheit der Krusten verstehen und unter Achores flache, leichte Krusten begreifen, unter welchen mehr eine allgemeine Eiterabsonderung als die Erzeugung einzelner Geschwürchen stattfindet, unter Favi dagegen dickere zellenartige Grinde, die mehr isolirte Geschwürchen bedecken. Nach diesen Unterschieden hat man den Kopfgrind eingetheilt in die Tinea achorosa (Wachsgrind) und die Tinea favosa (Wabengrind), zu welcher man als dritte Art entweder noch die Tinea pilaris (Haargrind), bei welcher aus den Eiterbläschen Haare hervorgehen, oder den bösartigen

oder Erbgrind (Tinea maligna), welcher vorzüglich durch bedeutende Schmerzen und um sich fressende Geschwüre characterisirt ist, hinzugefügt hat.

Willan und *Bateman* theilen die Porrigo, zu welcher von denselben aber nicht allein der Kopfgrind, sondern auch die crusta lactea gezählt werden, ein: in die Porrigo larvalis, welches die Crusta lactea der Schriftsteller ist; — die P. furfurans, bei welcher die Achores in dünne blätterige Schuppen übergehen; — die P. lupinosa, welche sich durch trockene kreisförmige Schorfe von gelblicher Farbe characterisirt, mit erhabenen Rändern und einem becherförmigen Eindruck, welche oft einen schuppigen Staub enthalten und im Allgemeinen den Saamen der Lupinen gleichen; — die P. scutulata, welche durch Haufen kleiner, hellgelber Pusteln gebildet wird und in dünnen Schorfen besteht, welche auf abgesonderten und von einander entfernt stehenden Flecken von unregelmässiger Kreisform angehäuft sind; — die P. decalvans, welche durchaus keine andere Erscheinung als einfache, kahle Flecken, von mehr oder weniger kreisförmiger Gestalt zeigt, auf welchen nicht ein einziges Haar bleibt, während das, welches die Flecken umgibt, so dick wie gewöhnlich ist; die Oberfläche der Kopfhaut ist innerhalb dieser Flecken glatt, glänzend und auffallend weiss; — die P. favosa, welche in grossen abgeplatteten Eiterblasen von unregelmässigem Umfang (Favi) besteht, die grünliche oder gelbliche, halb durchsichtige Grinde bilden.

Alibert theilt die Dermatoses teigneuses in folgende Gattungen und Arten ein: 1) Achore (Milchschorf und räudiger Ansprung), *a)* A. muqueux, *b)* A. lactumineux; 2) Porrigine (Haarschuppen), *a)* P. furfuracée, *b)* P. amiantacée, *c)* P. granulée, *d)* P. tonsurante; 3) Favus (Grind), *a)* F. vulgaire, *b)* F. scutiforme; 4) Trichoma (Weichselzopf), *a)* Tr. vulgaire, *b)* faux.

§. 1364.

Da die Form der Eiterbläschen und der Grinde von mancherlei unwesentlichen Verhältnissen abhängen, so ist es zweckmässiger, den Grind nach den mehr wesentlichen Verschiedenheiten des Krankheitsprozesses, durch welche auch die geringern oder grössern Folgen des Uebels und der Erfolg der Kur bedingt sind, einzutheilen. Hiernach haben die grössten Aerzte, wie *Hufeland*, *Richter* u. A., den Kopfgrind nur in den gutartigen und den bösartigen Grind eingetheilt. Ich glaube nach diesem Eintheilungsgrunde drei Arten des Grindes annehmen zu dürfen:

1) Den gutartigen, einfachen Grind (Tinea benigna simplex). Es besteht derselbe in Eiterbläschen, welche in Grinde von verschiedener Form übergehen, bei welchen aber die Haarzwiebeln nicht erkrankt sind und daher auch kein bleibender Nachtheil daraus hervorgeht.

2) Der kahlmachende Kopfgrind (Tinea benigna decalvans). Es sind hier die Haarzwiebeln erkrankt, was man zum Theil daran erkennt, dass die Eiterbläschen gerade an den Wurzeln der Haare sich befinden und die Haare dieselben durchbohren, und auch daran, dass die Haare bleich und wollig werden und ausgehen, wobei aber keine um sich fressende Geschwüre in der Kopfhaut entdeckt werden können. Derselbe kann aus dem einfachen, gutartigen Grinde entstehen, wenn die Haarzwiebeln mit in den Krankheitsprozess gezogen werden.

3) Der bösartige Kopfgrind (Tinea maligna, exedens). Es ist diese Art des Grindes von starken Schmerzen begleitet, grosse Schorfen bedecken die Kopfhaut und unter denselben entdeckt man um sich fressende Geschwüre, die zuweilen selbst den Knochen angreifen und eine äusserst stinkende Jauche von sich geben.

Als Spielarten der hier angegebenen drei Hauptarten können mehrere von *Willan* und von *Alibert* angeführte Arten des Kopfgrundes angesehen werden.

§. 1365.

Anlage haben vorzüglich Individuen vom kindlichen Alter. Gelegenheitsursachen sind: eine zu warme Kopfbedeckung, insbesondere durch Pelzmüzen, nicht gehöriges Reinhalten der Haare, insbesondere viel Ungeziefer bei starkem Haarwuchse, eine zu nahrhafte Kost und daher Ueberfluss in der Säftebereitung, Unordnungen in der Verdauung, Unterdrückung von Absonderungen, und vorzüglich auch Scropheln und Lustseuche, von welchen beiden Kachexien man insbesondere die Entstehung des bösartigen Kopfgrindes herleitet. Zuweilen bemerkt man die Entstehung durch Ansteckung, welches besonders bei dem bösartigen Kopfgrind der Fall ist.

§. 1366.

Es scheint, wenigstens der gutartige Kopfgrind, dem Wesen nach im Allgemeinen die nämliche Krankheit wie die Impetigo zu sein, nur dass das Leiden oft durch die Theilnahme der Haarzwiebeln modificirt wird und die Form der Grinde durch die Haare manchmal verändert wird. Der bösartige Grind ist sehr nahe mit der fressenden Flechte verwandt.

§. 1367.

Vorhersage. Der Kopfgrind wird nicht wohl lebensgefährlich, wenn er nicht mit den Scropheln oder der Lustseuche in Verbindung steht, in welchem Falle aber die Ursache der Gefahr mehr in diesen Krankheiten, als in dem Grinde, liegt. Meistens verliert sich die Krankheit mit der Zeit, dem Ende des Knabenalters, von selbst, doch widersteht sie oft sehr hartnäckig den gegen dieselbe in Gebrauch gezogenen Mitteln. Durch plözlichen Zurücktritt der Hautkrankheit können Blind-

heit, Taubheit, Engbrüstigkeit, Abzehrung und andere Krankheiten herbeigeführt werden.

§. 1368.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Man muss darauf dringen, dass der Kopf des Kranken rein gehalten werde, die zu langen Haare abgeschnitten werden, der Kranke nicht zu reichliche Nahrung nehme etc.; ist eine scrophulöse oder syphilitische Dyscrasie vorhanden, so muss vor Allem dieser entgegengewirkt werden.

§. 1369.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Es können die nämlichen innerlichen und äusserlichen Mittel und nach den nämlichen Anzeigen angewandt werden, welche gegen den Leibgrind und die Flechten gebraucht werden; auch sind hier dieselben Vorsichtsmassregeln nothwendig, wie dort. In den leichtern Fällen genügt unter den äusserlichen Mitteln oft das Bestreichen der kranken Hautstelle mit frischem Fette, Oele und die Anwendung anderer milder Mittel, zuweilen sind dagegen aber auch die Anwendung der weissen Präcipitat- und anderer Mercurialsalben, Sublimatwaschungen, Schwefelsalben, *Biett's* Jodschwefelsalbe (1 Scrup. bis $^1/_2$ Drachm. auf 1 Unze Fett) und Waschungen mit einer Auflösung von Schwefelleber oder mit verdünnter Schwefel-, Salpeter- oder Salzsäure, oder selbst einer Auflösung von Höllenstein etc. nothwendig. In hartnäckigen Fällen hat sich auch, nach Abschneidung der Haare und Entfernung der Krusten, ein Pflaster von Gummi Ammoniacum, mit Essig gekocht, das man auf Leder gestrichen und durch eine Müze unterstüzt 6 bis 8 Wochen liegen liess, sehr nüzlich erwiesen. Oft ist es auch nothwendig, die Haarzwiebeln auszureissen, was man vermittelst einer Pincette und auch vermittelst Streifen von Pechpflaster, die man auf die kurz ge-

schorenen Haare auflegt und nach einiger Zeit abzieht, bewirken kann; zu verwerfen dagegen ist das plözliche Ausreissen aller Haare vermittelst der Pechkappe.

§. 1370.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Bei starkem Geruch muss der Kopf durch Waschen häufig gereinigt werden; auch hat man das Aufstreichen von einer Salbe mit Kohlenpulver empfohlen. Die Läuse müssen entfernt werden, wozu man sich der in dem Kapitel von den parasitischen Thieren angegebenen Mittel bedienen kann. Ist die Hautkrankheit unter bedenklichen Zufällen zurückgetreten, so sucht man sie auf die Weise wieder zu erzeugen, welche in dem Kapitel von der Behandlung der Hautausschläge im Allgemeinen angegeben worden ist.

Dritte Ordnung der Hautausschläge.

Die specifischen, fieberlosen Ausschläge.

Die Kräze.

(Scabies, Psora.)

Wichmann (Hannov. 1791). — *Guldener von Lobes* (Prag 1795). — *Hildebrand* (Hannover 1797). — *Ackermann* (Bemerk. über die Kenntniss und Kur einiger Krankheiten. Hft. 5. Nürnberg 1798). — *Galés* (Paris 1812). — *Wenzel* (Bamberg 1825).

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 45 u. 46, *Alibert*, Tab. 55 u. 56, und *Rayer*, Pl. IV.

§. 1371.

Die Kräze ist der chronische Hautausschlag, welcher in einzeln stehenden Blätterchen und Bläschen

und zum Theil in Pusteln besteht, heftig juckt und ansteckend ist.

§. 1372.

Verlauf. Gewöhnlich brechen zuerst unter starkem, bei der Bettwärme zunehmendem Jucken und Beissen und oft unter dem vorübergehenden Gefühl von Nadelstichen, einige wenige kleine, zugespizte und an der Spize mit einer wasserhellen und oft etwas gelblichen Lymphe gefüllte Blätterchen am untern Theile und der innern Fläche der Arme, zwischen den Fingern, an der innern Fläche der Schenkel, am Bauche etc. hervor (Scabies papuliformis); meistens entstehen auch kleine, nicht zugespizte, mit einer wasserhellen oder nur durchscheinenden, gelblichen Flüssigkeit gefüllte Bläschen an dem innern Rande der Finger, an der Handwurzel etc., welche, wenn sie aufgestochen werden, die erwähnte Lymphe und zulezt etwas wässeriges Blut ergiessen und sich schnell wieder füllen (Sc. vesicularis). Besonders die Blätterchen werden allmälig zahlreicher, jedoch so, dass sie sich nicht von einer Stelle zur andern kriechend vermehren, sondern, mit Ausnahme des Gesichts, am ganzen Körper, vorzüglich aber an den Beugeseiten desselben ausbrechen; sie werden gewöhnlich durch Krazen zerstört und hinterlassen meistens keine nässende, sondern trockene, aufgekrazte und mit kleinen, röthlich-schwärzlichen Blutkrusten besäete Stellen (Sc. sicca). In einzelnen Fällen, besonders bei sehr vollsaftigen Individuen und wenn die Krankheit schon lange gedauert hat, entstehen oft von Eiter strozende Pusteln (Sc. pustulosa, humida), besonders zwischen den Fingern, welche aufplazen und oft längere Zeit eine schwächende, mit Krusten sich bedeckende und mit harten Rändern umgebene Stelle zurücklassen (das Kräzgeschwür, Ulcus scabiosum). Diese nässenden Stellen ergiessen eine scharfe Lymphe, welche den zunächst liegenden

Theil der Haut in Entzündung versezt und excorïirt; allmälig bilden sich auch Risse und Schrunden und häufig entstehen auch kleine Furunkeln.

§. 1373.

Wird die Kräze zur Heilung gebracht, so schuppt sich die Haut etwas ab und es verschwindet allmälig das Hautjucken; an den am meisten ergriffenen Stellen bleiben noch einige Zeit röthliche und bläuliche Flecken zurück, wodurch die Haut ein marmorirtes Ansehen gewinnt. — Wird die Kräze nicht geheilt, so kann zwar, auch bei einem bedeutenden Leiden der Haut, die Gesundheit im Allgemeinen lange Zeit unverlezt erscheinen, endlich aber entwickelt sich ein kachektischer Zustand, es schwellen lymphatische Drüsen an, der Körper magert ab und es soll sich selbst Wassersucht einstellen. Gelingt die Heilung der Kräze nicht vollkommen, so brechen von Zeit zu Zeit noch einzelne Bläschen aus, es stellen sich zuweilen Jucken und Beissen in der Haut ein und es bilden sich flechtenartige Ausschläge. Sehr viele, ja die meisten innerlichen Krankheiten, besonders die chronischen, sollen häufig von schlecht geheilter und unterdrückter Kräze veranlasst werden, namentlich beschuldigt *Autenrieth* diesen Ausschlag als Hauptursache der Lungenschwindsucht, doch scheint die Kräze nicht so häufig Krankheitsursache zu sein, als man in der neuern Zeit von mehrern Seiten behauptet hat.

§. 1374.

D i a g n o s e. Die Kräze kann mit dem Lichen simplex, Prurigo, Eczema (falschen Kräze, Psydracia) und, wenn sie mit Pusteln erscheint, mit Impetigo und Ecthyma verwechselt werden; doch unterscheidet sie sich von diesen Ausschlägen durch ihre Entstehung durch Ansteckung, zum Theil durch das heftige Jucken, was bei dem Eczema, Impetigo, Ecthyma und selbst bei

dem Lichen nicht oder in geringerm Grade vorkommt, durch das meistens gleichzeitige Vorkommen verschiedener Formen des Exanthems (so unterscheidet sich die Kräze von den Blätterchen des Lichen simplex und des Prurigo leicht, wenn zugleich Eiterpusteln da sind, und von dem Impetigo und dem Ecthyma, wenn neben den Pusteln die Haut mit einer Menge von Blätterchen und Bläschen besäet ist), zum Theil durch die Form des Exanthems selbst, indem zwischen den Blätterchen, Bläschen und Pusteln der Kräze und denen der genannten Ausschläge doch einiger Unterschied besteht (so z. B. ist das Kräzblätterchen zugespizter, als das des Lichen und des Prurigo und ist an der Spize mehr Bläschen, wogegen diese, insbesondere Prurigo, mehr Knötchen bleiben), durch die Dauer der Krankheit, da die Kräze immer chronisch ist und nie von selbst verschwindet, wo hingegen jene Ausschläge oft nur eine flüchtig vorübergehende Erscheinung sind, endlich durch den Siz des Ausschlags, da die Kräze vorzüglich stark zwischen den Fingern und wohl nie im Gesichte vorkommt, jene Ausschläge aber nicht vorzugsweise zwischen den Fingern, aber oft auch im Gesichte erscheinen.

§. 1575.

Anlage haben alle Individuen, besonders aber solche mit einer weichen Haut, daher mehr die jugendlichen als die ältern Personen. Die Anlage wird nicht, wie bei den fieberhaften Exanthemen, durch die Krankheit selbst aufgehoben.

Gelegenheitsursachen. Die Kräze wird, wie es scheint, immer durch einen Ansteckungsstoff hervorgebracht, der fix ist und sich durch unmittelbare längere Berührung und durch Träger, insbesondere die Kleider und das Bett, mittheilt. Die Milbe, die man in den frisch entstandenen Bläschen der Kräze fand (Krätzmilbe, Acarus exulcerans s. scabiei) und welche *Wick-*

mann, *Peter Frank*, *Gales* u. A. als die Ursache der Kräze ansehen, scheint doch wohl nicht diese Bedeutung zu haben, da sie nicht immer gefunden wurde, namentlich nicht von *Heberden*, *Lugol* und *Mouronval*. Dass die Kräze unter zusammenwirkenden, begünstigenden Umständen, namentlich durch Unreinlichkeit, schlechte Nahrungsmittel und eingeschlossene Luft, wie dieses oft in Zuchthäusern der Fall ist, ohne Ansteckung entstehen könne, ist nicht mit Bestimmtheit erwiesen.

§. 1376.

Vorhersage. Die Kräze heilt, wie es scheint, nie von selbst, sie wird aber beinahe nie gefährlich, und ist in der Regel leicht durch die Kunst zu heben; doch soll oft die Heilung nur scheinbar sein und der Krästoff im Innern des Körpers fortwirken und mancherlei Krankheiten veranlassen. Zuweilen, besonders wenn ganze Familien von der Kräze ergriffen sind, ist die Heilung schwierig, was von einer immer neu erfolgenden Ansteckung herzurühren scheint.

§. 1377.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Es ist von Wichtigkeit, von dem Körper des Kranken die von ihm selbst erzeugten Ansteckungsstoffe, so viel wie möglich, zu entfernen, daher ist es im Allgemeinen gut, den Kranken öfters baden und waschen zu lassen, besonders mit Seifenwasser, das Hemd und das Bettweisszeug öfters zu wechseln und auch die Kleider mit Schwefel oder mit Chlor zu durchräuchern; wenigstens ist es nothwendig, nach vollendeter Kur die sorgfältigste Reinigung aller Gegenstände, mit welchen der Kranke in Berührung kam, vorzunehmen, um eine neue Ansteckung zu verhüten. Nüzlich ist es auch, wenn der Kranke während der Kur alle Einflüsse vermeidet, die überhaupt schädlich auf die Haut wirken, wie z. B. stark gesalzene Speisen, geräuchertes Fleisch etc.

§. 1378.

b) *Nach dem Wesen der Krankheit.* Es glückt mit sehr verschiedenen Mittel, die Kräze zu heilen. Der alleinige Gebrauch der innerlichen Mittel möchte wohl selten zum Ziele führen; ist die Kräze neu entstanden, so hält man ihn für überflüssig, ist dieselbe schon älter, so hält man ihn für nothwendig, um innern Krankheiten vorzubeugen; es ist übrigens zweifelhaft, ob derselbe überhaupt nothwendig ist und einen wesentlichen Nuzen gewährt, doch ist es eine löbliche Vorsicht, nicht nachtheilige innerliche Mittel anzuwenden. Am besten passen die Schwefelblumen; entbehrt können aber die Antimonial- und Quecksilberpräparate werden.

§. 1379.

Den grössten Nuzen gewähren die äusserlichen Mittel und es sind dieselben in der Regel unentbehrlich.

Am meisten im Gebrauch sind die Schwefelmittel, und unter ihnen ist wohl die einfache Schwefelsalbe, mit Schweinefett oder Oel bereitet (Nro. 75), die zweckmässigste Anwendungsart. Es wird dieselbe entweder nur in kleinen Portionen, zweimal täglich, in die Handwurzel, zwischen die Finger, in die Biegungen der Gelenke, oder in grösserer Menge bis 1 Unze täglich am ganzen Körper und vorzüglich an den leidenden Stellen eingerieben. Ebenfalls sehr zweckmässig ist eine Salbe von 1 Theil Schwefel, 2 Theile schwarzer Seife und der nöthigen Quantität Wasser (*Autenrieth*). Zum Theil sehr angerühmt, aber in der Regel unnöthig, sind verschiedene Zusäze zu den Schwefelsalben, wie der des weissen Vitriols (ung. sulphur. compos. Pharm. boruss.), des weissen Vitriols und der Baccae Lauri (*Jasser*), des Salmiaks (*Hufeland* und *Alibert*), der kohlensauren Potasche (*Helmerich* und *Biett*), der Calx viva (*Valentin*), des Bleizuckers und weissen Vitriols (*Chaussier*) etc. Einen sehr schnellen Erfolg soll die in der englischen Armee

eingeführte Methode haben. Der Kranke erhält ein Seifenbad, wird in einem warmen Zimmer entkleidet, zwischen zwei wollene Decken gelegt und am ganzen Körper dreimal täglich mit einer Unze des Ung. sulphur. comp. Pharm. Lond. (Nro. 76) eingerieben.

Weniger gebräuchlich, als die Schwefelblumen, ist schon wegen ihres üblen Geruches die Schwefelleber. Man wendet sie ebenfalls in Salben an (nach *Jadelot* 4 Unz. Hepar. sulphur. calc., 2 Pf. weisse Seife, 4 Pf. Mohnöl und 2 Drach. Ol. Thymi.); ferner in Waschwassern, eine einfache Auflösung von Kalischwefelleber, oder nach *Dupuytren* eine Auflösung von 4 Unzen Kalischwefelleber in 1 ½ Pf. Wasser mit einem Zusaz von ½ Unz. Schwefelsäure, zweimal täglich zu gebrauchen, so wie auch in Bädern, vorzüglich den natürlichen Schwefelbädern zu Aachen, Töpliz, Baden in der Schweiz und bei Wien, Wiesbaden, Langenbrücken etc. Endlich hat man auch Schwefelräucherungen (schweflige Säure) nach *Gales* Methode angewandt, welche mit Hilfe der Räucherungskästen vorgenommen werden.

§. 1380.

Unter den Queksilberbereitungen wird vorzüglich der weisse Präcipitat in Salbenform gerühmt und wird zuweilen den Schwefelmitteln vorgezogen, weil er keinen üblen Geruch veranlasst, doch verdient er, wie alle Queksilberpräparate dem Schwefel nachgesezt zu werden, weil er nicht auf eine ausgebreitete Fläche eingerieben werden kann, ohne die Queksilberdyscrasie zu erzeugen. Ausser der weissen Präcipitatsalbe werden angewandt das Unguent. hydrarg. citrinum, das Unguent. hydrarg. cinereum., Waschungen mit einer Sublimatauflösung, Sublimatbäder etc.

§. 1381.

Schnell, sicher und wohlfeil ist die Heilung der Kräze durch die Schmier- oder grüne Seife (aus Oel

und Potasche bereitet), welche nach der, von der Grossherzogl. Bad. Sanitätscommission für die Hospitäler vorgeschriebenen Methode auf folgende Weise angewandt wird: Der Kranke wird sieben Tage lang Morgens und Abends am ganzen Körper, mit Ausnahme des Kopfes, des Gesichtes und der Geschlechtstheile, mit der grünen Seife überschmiert. Man nimmt nach dem Alter und der Grösse des Kranken zu den ersten zwei Einreibungen 3 bis 6, zur zweiten, dritten und vierten 1 ½ bis 3 Unzen, zu den leztern ½ bis 1 Unze. Am achten Tag, womit die Kur gewöhnlich beendigt ist, erhält er ein lauwarmes Bad.

§. 1382.

Ausser den angegebenen Mitteln sind noch empfohlen worden: einfache, fette Oele, frisches Fett, Theer, Salben mit weissem Vitriol, Salmiak, Braunstein, Graphit, Schwefelsäure, Salpetersäure (Unguentum oxygenatum), Waschungen mit einer Abkochung von rad. Helenii, Hellebori albi, Nicotianae, Lapathi acuti, cort. Betulae etc.

§. 1383.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Ist die Kräze unterdrückt worden, so gibt man die innerlichen antiscabiösen Mittel und erregt eine vermehrte Hautthätigkeit durch innerlich gegebene schweisstreibende Mittel und Bäder; auch kann man die Brechweinsteinsalbe einreiben lassen und in dringenden Fällen die Kräze einimpfen.

Der Aussaz.

(*Lepra.*)

Schilling (lat. Lugd. Batav. 1778). — *Hensler* (vom abendl. Aussaz im Mittelalter, nebst einem Beitr. z. Kenntniss u. Geschichte des Aussazes. Hamb. 1790). — *Bonorden* (Kurt. Sprengel. Halle 1794). — *Kurt. Sprengel* (in seiner Pathologie, seiner Geschichte der Med. und seinen Beiträgen zur Geschichte der Medicin). — — Ueber die Elephantiasis insbesondere: *Lawrence* und *Southey* (Med. chir. Transact. London 1815). — *Warburg* (lat. Halle 1829). — Ueber partielle Elephantiasis: *Hendy* u. *Rollo* (über d. Drüsenkrankheit in Barbadoes und über Hillary's Elephantiasis, aus d. Engl. Frankf. a. M. 1788, mit 2 K.). — *Hillary* (Lond. 1759). — *Alard* (Paris 1807—1824). — *Chelius* (Heidelberg. klin. Annal. 2. Bd.). — *Faber* (in Berend's und Moldenhavers Journ. 1830).

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 7, 8 u. 9, *Alibert*, Tab. 40—42, und *Rayer*, Pl. XI, XIII und XV.

§. 1384.

Der Aussaz ist die chronische, erbliche und ansteckende Krankheit, welche durch mehr oder weniger weisse oder dunkle, unempfindliche Flecke (die Morpheen), durch Finnen, durch meistens umschriebene Pläze, die sich mit Schuppen und Borken bedecken, und oft auch in Geschwüre übergehen, oder auch durch harte unempfindliche Knollen und durch Zeichen allgemeiner Kachexie sich auszeichnet.

§. 1385.

Verlauf. Die Krankheit beginnt mit verschiedenen Veränderungen in der Haut, die auch ohne in den Aussaz überzugehen vorkommen und oft geraume Zeit, selbst Jahre lang dem Aussaz vorhergehen, wobei sie oft zu gewissen Zeiten, besonders im Frühjahre, zunehmen. Diese Hautaffectionen, Vormäler, sind zum Theil Flecken von verschiedener Farbe und Grösse, von der Grösse

des Stiches einer Nadel oder der Grösse einer Linse (Linsenmäler, Lentigines, Lenticulae), oder ausgebreitetere Flecke (Maalpläze, Panni), Flechten und Grinde, welche eine dämmerige Farbe haben, sich oft ringförmig ausbreiten und mit fressenden Schmerzen verbunden sind, so wie auch Finnen und Kupferhandel, Spaltung und Ausgehen der Haare etc. Besonders characteristische Vormäler sind aber das weisse und das dunkle Maal. Das erstere (die weisse Morphea, Vitiligo alba) besteht in einem milchweissen Fleck der Haut, welcher etwas uneben und rauh ist, und auf welchem auch die Haare weiss werden, der wenig und zulezt gar kein Jucken mehr erregt, sich bei vollkommener Entwicklung auf das Reiben, wobei sich Schüppchen wie Kleienstaub loslösen, nicht mehr röthet, und bei einem Einstich mit der Nadel (Nadelprobe) weder Empfindlichkeit zeigt, noch blutet, sondern eine milchigte Feuchtigkeit von sich gibt. Das dunkle Maal (die dunkle Morphea, Vitiligo μέλας) hat ein dunkles, blutiges und schwärzliches Ansehen, ist ebenfalls rauh und schilfert sich ab, erregt aber mehr Stechen und Brennen und zeigt bei der Nadelprobe länger als das weisse Maal Empfindlichkeit und Blut.

§. 1586.

Entwickelt sich nunmehr die Krankheit vollständiger, so kommt oft ein Fieber hinzu, das gerne den Typus eines Wechselfiebers annimmt. Der Kranke hat das Gefühl von Taubheit in den Gliedern, er ist sehr niedergeschlagen, hat schreckhafte Träume, dabei aber oft einen starken Trieb zum Beischlafe. Die Schweisse erhalten einen Bocksgeruch, der Harn wird jumentös und das aus der Ader gelassene Blut ist sehr schwarz und soll auch zuweilen mit weisslichen Körnern vermischt sein. Es entwickeln sich unter der einen oder andern Form immer mehr die Veränderungen in der Haut und entstellen oft das Aussehen des Kranken auf eine furchtbare

Weise, dabei wird auch das Athmen beengt, die Stimme heiser, zuweilen werden die Knochen angefressen und der Körper zehrt ab.

§. 1387.

Es ist der Verlauf dieser Krankheit ganz chronisch, zuweilen von vielen Jahren. In den leichtern Graden erfolgt zuweilen Genesung unter Abschuppung der Epidermis und Ausscheidungen; der Tod wird vorzüglich durch Auszehrung herbeigeführt.

§. 1388.

Es können vier Hauptformen des Aussazes angenommen werden:

1) *Der weisse* oder *mosaische Aussaz* (Lepra alba, L. Judaeorum, Baras alba Arab.). Derselbe beginnt mit dem weissen Maal. Es entstehen hierauf Pusteln und Geschwüre, die in weissliche Krusten übergehen und oft kritisch sind. Ist dieses nicht der Fall, so breiten sich die weissen Flecken immer mehr aus und die Haut wird, wohin diese weisse Entfärbung kommt, unempfindlich. Dabei entstehen Geschwülste des Zellgewebes, die fester als gewöhnliche Wassergeschwülste sind und von Stockung einer gallertartigen Lymphe herrühren, und oft schält sich die Haut mehrmals des Jahres in grossen Stücken ab, wie es die Schlangen thun (Tyrus, daher die Benennung Lepra Tyria). Es entstehen Risse und Geschwüre in der Haut. Das Antliz wird wassersüchtig, das Zahnfleisch ist schwammig und faulig, die Haare gehen aus, die Sinne werden stumpf, das aus der Ader gelassene Blut ist weisslich und trübe und der Blutkuchen weisslich oder aschgrau. Der Tod wird durch Abzehrung und Wassersucht herbeigeführt.

§. 1389.

2) *Der schuppige* oder *räudige Aussaz* (Lepra squamosa, L. Graecorum, L. Ichthyosis, Baras nigra). Es kommt hier die dunkle Morphea vor, die Grindmäler

breiten sich in Ringen aus, und es bildet sich eine grosse Masse von Schuppen und Borken, so dass man Hände voll aus dem Bette nehmen kann. Die Haut ist zwischen den Schuppen entzündet und brennt besonders zur Nachtzeit sehr heftig, sie wird rissig, erhält Geschwüre, auf welchen weisse, speckähnliche Stellen sich zeigen, die Nägel werden kolbig, die Haare spalten sich und fallen aus, oft schwellen die Leistendrüsen an und es entstehen in verschiedenen Theilen harte Knoten. Reichliche, besonders stark bockicht riechende Schweisse stellen sich ein, Heiserkeit, Engbrüstigkeit, Abzehrung. Endlich kommen Ohnmachten und Zuckungen hinzu, unter welchen der Tod eintritt.

Eine bloss an den Beinen oder den Armen erscheinende Abart des schuppigen Aussazes, wobei missfarbige und oft schwärzliche Schorfen losgetrennt werden und der ergriffene Theil unempfindlich wird, hat man den Todtenbruch (Malmorto, Malum mortuum) genannt.

§. 1390.

3) *Der knollige Aussaz* (Lepra tuberculosa, nodosa universalis, Elephantiasis der Griechen, Lepra oder Lepra Elephantia Arab.). Es geht demselben das dunkle Maal vorher und häufig entwickelt er sich auch aus dem raudigen Aussaz. Meistens schwellen die Leisten- und Achseldrüsen zuerst an, das Antliz wird roth oder bleifarbig und angeschwollen, es bilden sich an den Augenbraunen und sodann im ganzen Gesichte harte, unempfindliche Knollen, von der Grösse einer Erbse bis zu der eines Eies, in welche man selbst Einstiche machen kann, ohne dass es der Kranke spürt, und die das Antliz furchtbar verunstalten; eben solche Knollen erscheinen an den Füssen und den Armen, und in geringerm Grade an dem Leibe. Zwischen diesen Knollen ist die Haut rissig und legt sich in Falten, insbesondere befinden sich solche Risse in den Lippen, welche auch mit über-

füllten Gefässchen durchzogen sind und leicht bluten, so wie auch das Zahnfleisch schwammig und zerfressen ist. Die Augen ragen kugelrund hervor und der Blick ist entweder stier und wild oder ganz erloschen. Die Kranken verfallen in tiefe Melancholie und selbst Wahnsinn, die Sinne werden stumpf, die Stimme heiser, und es gesellt sich Engbrüstigkeit und Auszehrung hinzu. — Zuweilen gehen auch die Knollen in krebsartige Geschwüre über, welche auf der Oberfläche ein schwammiges Aussehen haben, mit himbeerähnlichen Auswüchsen besäet sind und verdickte und knollige Ränder haben. Es kommen gewöhnlich zu diesen Geschwüren bald Knochenschäden hinzu und ganze Gliedmassen sterben ab (der knollige, geschwürige Aussaz, den man auch wegen des damit verbundenen furchtbaren Aussehens des Antlizes, das dem des Löwen gleichen soll, Lepra leonina genannt hat).

Oft ist der knollige Aussaz nur auf eine einzelne Stelle, insbesondere eine Gliedmasse beschränkt (der locale Aussaz, das Knollbein, Elephantenfuss). Es schwellen die Achsel- oder Leistendrüsen an, von welchen sich ein rother Streif nach dem Verlaufe der Saugadern herabzieht, der Fuss oder der Arm schwillt an, wird hart, glänzend und man kann keine Grube in dieselben drücken. Die Geschwulst wird unförmlich dick, völlig unempfindlich und oft mit Schuppen bedeckt. Die Nägel werden schäbig und kolbig. Das Allgemeinbefinden ist oft wenig gestört, nur dass hier leicht, wie in dem Aussaz überhaupt, ein Wechselfieber (F. quartana) vorhanden ist. So kann die Krankheit viele Jahre, ja Zeitlebens bestehen, wenn nicht das Knollbein in Verschwärung geräth.

§. 1391.

Bei den Leichenöffnungen findet man die Haut sehr verdickt, das Zellgewebe und die Muskeln oft in eine

gleichförmige, speckartige Masse verwandelt, welche oft fest an dem Knochen anliegt, die Blut- und Lymphgefässe sehr ausgedehnt und leztere zuweilen zerrissen, die Drüsen zuweilen weich und mit einer gallertartigen Flüssigkeit bedeckt, meistens aber hart und scirrhös, die Knochen ausgedehnt, oft erweicht, ohne Höhle und Mark, in verschiedenen innern Eingeweiden Verhärtungen und auch Verschwärungen, namentlich auch Geschwüre im Darmkanal, besonders an der Bauhinischen Klappe.

§. 1392.

Der rothe Aussaz (Lepra rubra). Derselbe fängt mit einer fremdartigen Röthe, besonders im Gesichte, an (Kupferhandel), welche auch oft in's Bleifarbige und in's Erdfahle spielt, dabei sind die Theile geschwollen, es erscheinen viele feine, finnenartige Knötchen und auch Blasen auf der ganzen Haut, welche in Geschwüre übergehen, die Jauche und Blut von sich geben, und oft auch die Haut und selbst die Knochen zerstören. Die Haare gehen aus, der Urin wird dick, öligt, das Zahnfleisch wird aufgelockert, Blutungen aus verschiedenen Theilen stellen sich ein und es entwickelt sich ein allgemeiner scorbutischer Zustand.

§. 1393.

Willan und *Bateman* haben den Aussaz nach der Verschiedenheit der Veränderung in der Haut in zwei Krankheitsgattungen geschieden, die in verschiedene Klassen von Exantheme eingetheilt wurden: 1) die Lepra (schuppigen Aussaz), mit den Arten Lepra vulgaris, L. alphoides und L. nigricans, und 2) Elephantiasis; es geht jedoch die Verwandtschaft beider Krankheiten daraus hervor, dass der knollige Aussaz häufig aus dem schuppigen entsteht, und der schuppige oft mit Knoten in verschiedenen Theilen des Körpers verbunden ist.

§. 1394.

Es kommt der Aussaz, ausser den angegebenen,

noch unter andern Formen vor, die übrigens als Modificationen der schon beschriebenen Arten angesehen werden können; dahin gehören:

Die *Flechte von Aleppo* [1]) (das aleppische Zeichen, aleppische Geschwür), welche übrigens kaum zu dem Aussaz gerechnet werden kann und in einer, fast alle Einwohner von Aleppo befallenden und insbesondere im Gesichte vorkommenden rothen, juckenden Blatter besteht, welche nach mehrern Monaten oder erst nach einem Jahre in eine Borke übergeht und eine hässliche Narbe zurücklässt.

Das *Pellagra* [2]) (die mailändische Rose, Pellagra, Lepra lombardica). Dasselbe äussert sich durch Röthungen an den den Sonnenstrahlen blosgestellten Theilen, insbesondere dem Gesichte und dem Rücken der Hände, welche in kleienartige Abblätterung übergehen und womit ein bedeutendes Allgemeinleiden, insbesondere das Gefühl von Taubheit der Glieder, Schwindel, Melancholie, die in den höhern Graden der Krankheit bis zum Selbstmord führt, und eine sehr übelriechende Hautausdünstung verbunden ist. Das Uebel kommt alle Frühjahre zurück und verschwindet gegen den Herbst beinahe ganz. Allmälig wird aber die Haut hart, rauh und gefurcht, die Haare borstenartig, die Nägel klauenartig, es entstehen juckende, brennende Bläschen, über den ganzen Körper verbreitete

1) *Ferriere's Sauveboeuf's* Reisen in die Türkei. — *Alexander Russel's* Naturgeschichte von Aleppo. — *Haselquist* (in den schwedischen Abhandlungen. 12ter Bd.).

2) *Frapolli* (lat. Mediolan. 1771). — *Gherardini* (Milan. 1780). — *Jansen* (lat. Lug. Bat. 1787). — *Strambio* (Mediolan. 1786 — 89). — *Franzago* (Pad. 1789 — 1816). — *Perinetti* und *Cerri* (übersezt v. Schlegel. Jena 1807). — *J. Frank* (Prax. med. univ. praecept.). — *Marzari* (Venedig 1810 — 19). — *Chiaruggi* (Firenz. 1814). — *Zecchinelli* (Pad. 1818). — *Filippi* (Neapel 1819).

flechtenartige Ausschäge, Kopfgrind, scorbutische Sugillationen und an dem Zahnfleisch bösartige aphthöse Geschwüre. Auch kommen Krämpfe, Lähmungen, der schwarze Staar, Durchfälle, Abzehrung und Wassersucht hinzu.

Die *asturische Rose*[1]) (Lepra asturica, Rosa asturica). Dieselbe kann als eine Abart des Pellagra betrachtet werden. Es entsteht hier an verschiedenen Theilen eine Hautröthe, welche in die Bildung schwärzlicher, stinkender und rissiger Krusten übergeht. Zuweilen bricht der Ausschlag am Halse aus und zieht sich vom untern und vordern Theil des Halses zu beiden Seiten des Brustbeines bis zur Mitte der Brust herab (das asturische Ordensband). Es kommen verschiedene Nervenzufälle, Melancholie, ein scorbutischer Zustand, Abzehrung und Wassersucht hinzu.

Das *Mal rouge von Cayenne*[2]). Es ist durch rothe und gelbliche Flecke, die sich immer mehr ausbreiten und Schuppen bilden, durch Verdickung der Haut, die Entstehung von Knollen an den Lippen und Ohren und Flechten und Pusteln am ganzen Körper, die in stinkende, schmuzigrothe, mit schwammigen Auswüchsen versehene Geschwüre übergehen, und durch Beinfrass und andere Knochenkrankheiten ausgezeichnet.

Die *krimmische Krankheit*[3]) (Morbus s. Lepra crimensis). Sie besteht vorzüglich in rothen Flecken, die

1) *Thiery* (phys. med. Beob. an verschiedenen Orten in Spanien gesammelt, aus d. Franz. v. Fischer, 1794, und in der Sammlung auserles. Abhandl. f. prakt. Aerzte. B. 2.). — *Townsend* (Voyage en Europe 1786 u. 87.

2) *Forster* (Reise um die Welt). — *Bajon* (mem. pour servir à l'histoire de Cayenne Paris 1777). — *Bergeron* (Paris 1824).

3) *Pallas* (Reisen. B. I. S. 502.). — *Gmelin* (Reisen. B. II. S. 160.). — *Martius* (Leipz. 1816 u. Freiberg 1819).

besonders im Gesichte ausbrechen und sich mit Schuppen bedecken, auf welchen nach Monaten oder Jahren sich harte Beulen und Knollen erheben, die endlich aufbrechen und in um sich fressende Geschwüre ausarten. Solche Geschwüre bilden sich nach 5 bis 6 Jahren auch im Innern der Nase, des Mundes, der Luftröhre, des Schlundes etc., wodurch Abzehrung herbeigeführt wird.

§. 1595.

Ursachen. Der Aussaz ist erblich und ansteckend, und wird vorzüglich durch den Beischlaf fortgepflanzt. Er entwickelt sich meistens erst zur Zeit der Mannbarkeit, kommt mehr in heissen, als in kalten Klimaten vor, und wird vorzüglich der grossen Hize, einer feuchten und mit Sumpfausdünstungen angefüllten Luft, dem Genusse des Schweinefleisches im Morgenlande, eingesalzener und faulichter Fische und anderer schlechter Nahrung, Unreinlichkeit, Stockungen im Pfortadersysteme, Verhärtungen von Unterleibseingeweiden, und vorzüglich auch der Lustseuche und entartetem Krästoffe zugeschrieben; man kennt übrigens die genügenden Ursachen des Aussazes, der noch jezt ohne Ansteckung entsteht, nicht. Die Ursachen, warum in verschiedenen Gegenden bestimmte Arten von Aussaz einheimisch sind, sind, wie es scheint, die Ansteckung und auch Eigenthümlichkeiten in der Lebensweise der Einwohner, so wie in der Beschaffenheit des Klimas und des Bodens. Der weisse Aussaz, welcher jezt sehr selten ist, kam zu Moses Zeiten in Aegypten, Arabien und Palästina häufig vor. Der räudige Aussaz war vorzüglich in Griechenland einheimisch und verbreitete sich auch über Europa, wo er unter dem Namen der argen Raude bekannt war. Der knollige Aussaz soll in Aegypten entsprungen sein und sich von da bis zum Euphrat verbreitet haben, doch kommt er auch in Europa, Afrika und Amerika vor, besonders das Knollbein. Der rothe Aussaz, welcher

für eine Verbindung des Aussazes mit dem Scorbut gehalten wird, herrschte besonders im Mittelalter im Abendlande und kommt noch jezt unter Modificationen, wie in dem Pellagra, der asturischen Rose etc., daselbst vor. Das Pellagra ist in der gebirgigen Gegend von Mailand endemisch, während an den Ufern des Po das Wechselfieber herrscht und kommt vorzüglich bei Landleuten vor. Die asturische Rose ist in den tiefen, mit Nebeln bedeckten Thälern des Oviedo, in welchen auch die Nahrungsmittel eine wässerige, kraftlose Beschaffenheit haben sollen, einheimisch. Die krimmische Krankheit ist in der Gegend um Cherson, in Astrakan und am Jaik zu Hause. Von der Flechte von Aleppo wird vorzüglich das dortige Wasser als Ursache beschuldigt.

§. 1396.

Vorhersage. Der ausgebildete Aussaz wird höchst selten gehoben, am meisten ist die Heilung noch bei dem raudigen Aussaz möglich, doch sind die angeführten Modificationen des Aussazes nicht alle in demselben Grade gefährlich, insbesondere ist die Flechte von Aleppo nur ein leichtes Uebel.

§. 1397.

Behandlung. Es ist noch am meisten Rettung möglich, wenn der Kranke bei den ersten Spuren der Krankheit seine ganze Lebensweise verändert und insbesondere, wenn er den Ort und die Gegend verlässt, in welcher der Aussaz endemisch ist. Auch soll derselbe den Beischlaf vermeiden und man hat selbst die Castration von Nuzen gefunden.

Eine einigermassen sichere Behandlung ist noch nicht bekannt. Im Allgemeinen sind dieselben Mittel, wie gegen Herpes, in Anwendung gekommen, welchen man noch, besonders bei den Modificationen, die zu dem rothen Aussaz gehören, antiscorbutische Mittel hinzugefügt hat: Antimonialien, Quecksilbermittel (besonders bei dem

schuppigen Aussaz und bei syphilitischem Ursprung der Krankheit), Schwefel, Quajak, Stipites Dulcamarae etc., auch die Kanthariden und selbst der Arsenik, so wie Brunnkresse, Sauerampfer, Meerrettig, Senf, ein gutes, bitteres Bier, Limonade und sehr verdünnte Mineralsäuren, Buttermilch, Molken, Cocusmilch, Milchdiät, Vipernfleisch und Vipernbrühe etc., sind die Kräfte gesunken, auch erregende Mittel und die China, und bei sich entwickelndem Wechselfieber die gewöhnlichen Fiebermittel. Aeusserlich: einfache Wasserbäder, Dampfbäder, Schwefelbäder, Waschwasser und Salben mit Queksilbermitteln, das Auflegen der frischen Blätter von Chenopodium bonus Henricus, ein starker Aufguss von Ledum palustre, und auch äzende Dinge, spanische Fliegen mit Senf und scharfem Essig (bei den Morpheen angewandt) und selbst Arsenik. Gegen das Knollbein hat man insbesondere Compression, vermittelst eines angemessenen Verbandes, auch die Dampfdouche und Einreibungen von Jodsalben in Anwendung gebracht und auch das leidende Glied amputirt, worauf sich aber das Uebel bald an einem andern Theile entwickelte.

Der Weichselzopf.

(*Wichtelzopf, Plica polonica, Trichoma, Godziec.*)

Hercules Saxonia (lat. Patav. 1600), — *Minadous* (lat. Patav. 1600). — *Bonfiglius* (Breslau 1712 und Krakau 1720). — *Erndtel* (Varsovia physice illustrata. Dresden 1730). — *De la Fontaine* (chir. med. Abhandl. verschiedenen Inhalts, Polen betreffend. Breslau 1792). — *Brera* (Sammlung auserles. Abhandl. B. 20.). — *Dufour* (ebendas. B. 24.). — *Schlegel* (mit 4 ill. Kupf. Jena 1806). — *Hecker* (Erfurt 1810). — *Chromy Edl. v. Rumfeld* (Freiberg 1813). — *Jos. Frank* (act. clin. ann. 3—6, auch Mémoire sur l'origine et la nature de plique polonoise. Viln. 1814, und in dessen prax. med. praecept.). — *Gadowski* (Diss. Par. 1814). — *F. Bondi* (Berlin 1828).

Abbildungen von *Schlegel* und *de la Fontaine* in den angegebenen Werken, *Alibert*, Tab. 18 bis 22, *Struve*, Tab. I. und *Rayer*, Pl. XXI.

§. 1598.

Der Weichselzopf ist die chronische, ansteckende Krankheit der behaarten, so wie der mit Nägel versehenen Theile, welche vorzüglich durch Verklebung der Haare unter einander durch eine klebrichte Lymphe, wodurch meistens dieselben zu unförmlichen Zöpfen sich gestalten, so wie auch durch eine eigenthümliche Entartung der Nägel sich auszeichnet.

§. 1599.

Verlauf. Entweder beginnt die Krankheit mit einem Leiden in andern, als den behaarten Theilen des Körpers (Vorläufer), welches viele Monate und selbst Jahre lang dauern kann, bevor der Weichselzopf sich entwickelt, oder die Krankheit fängt sogleich mit dem Leiden der behaarten Hautstellen an, was besonders der Fall ist, wenn dieselbe durch Ansteckung veranlasst worden ist (der selbstständige Weichselzopf). Die Vorläufer sind: katarrhalische, rheumatische und gichtische Beschwerden und den syphilitischen gleichende Gliederschmerzen,

Kopfschmerzen, Schwindel, Sausen in den Ohren, Triefen der Augen und Abnahme des Gehöres und der Sehkräfte, Hypochondrie, Wahnsinn und Krämpfe, auch Engbrüstigkeit, Druck in der Magengegand, Erbrechen, Hämorrhoidalzufälle, mannigfaltige chronische Hautausschläge, namentlich der Kleiengrind des Kopfes, Anschwellungen der Drüsen und der Gelenke, besonders an den lezten Phalangen der Finger, äussere Geschwüre, weisser Fluss, ein dicker Niederschlag im Urin, Bluthusten und eiteriger Auswurf aus der Lunge, selbst auch Beinfrass etc. und zulezt selbst acute Krankheiten, z. B. Lungenentzündung, Fieber etc.

§. 1400.

Nach diesen und ähnlichen Vorboten und in seltenern Fällen auch ohne dieselben, entsteht ein Gefühl von Prikeln in der Kopfhaut und auch zuweilen an andern behaarten Stellen, so wie unter den Nägeln, das Ohrenschmalz wird reichlich abgesondert und es brechen reichliche, übelriechende Schweisse am Kopfe aus, wobei oft Frostschauer und Hize vorhanden sind. Die Haarzwiebeln schwellen an und es lässt sich eine klebrichte, öligte, oft blutige und übelriechende Materie aus denselben herausdrücken, und die Haare selbst werden mit einer ähnlichen, klebrichten Materie bedeckt. Die innern Krankheitszufälle lassen gewöhnlich nach dem Ausbruch dieser Hautkrankheit nach. Indem nun die Haare durch die ausgeschwizte klebrichte Feuchtigkeit zusammengeklebt werden und immer dabei fortwachsen, bilden sie oft einen oder mehrere Zöpfe, die oft eine Länge von mehrern Ellen erhalten, oder stellen ein ausserordentlich dickes, oft nestartiges Gewirre von Haaren dar (Plica longicauda, Pl. longicaud. lateralis, Pl. l. fusiformis, Pl. l. falciformis, Pl. l. clavaeformis, Pl. caput Medusae, Pl. cap. Med. laciniata, Pl. cap. Med. cirrhata, Plica cespitosa *Alib.*). Nach mehrern Schriftstellern (*Gehema*,

Brera, *Dufour*) bluten in den höhern Graden der Krankheit die trichomatösen Massen und die Haare, wenn man sie, auch ganz entfernt von ihrer Wurzel, durchschneidet, und werden zuweilen (nach *Alibert*) sehr empfindlich, ja es sollen sich öfters diese Massen entzünden und sich wahre Abscesse bilden, aus welchen, wenn sie geöffnet werden, eine grosse Menge Eiter sich ergiesst; doch wird von Andern (*de la Fontaine* und *Jos. Frank*) das Bluten und Sensibelwerden der Haare geleugnet. Zugleich werden oft die Wurzeln der Nägel mit einer weissen, talgartigen Materie bedeckt, die Spize der Finger und Zehen wird entzündet und die Nägel werden schmerzhaft, roth, bleifarbig oder braun, dick, höckerig und oft zu unförmlichen Krallen umgebildet.

§. 1401.

Es hat die Krankheit häufig eine Dauer von mehrern Jahren. Zur Gesundheit geht dieselbe über, indem allmälig die Absonderung jener klebrichten Lymphe aufhört und gesunde Haare auf der krankhaften Stelle hervorwachsen, an welchen zulezt der Zopf hängt und abgeschnitten werden kann oder von selbst abfällt. — Wird die Entwicklung des Weichselzopfes durch voreiliges Abschneiden der Haare, Verkältung oder äussere zurücktreibende Arzneimittel gehemmt oder kommt die Krise durch die Haut aus irgend einer andern Ursache nicht zu Stande, so entstehen leicht innere Entzündungen, Eiterungen, Abzehrung, Wassersucht, Fallsucht, Schlagfluss etc.

§. 1402.

Die **Anlage** soll erblich sein; die Krankheit kommt bei jedem Alter und Geschlechte vor (auch bei Thieren), wird aber am wenigsten bei Individuen vom Kindes- und solchen vom Greisenalter wahrgenommen. Die **Gelegenheitsursachen** sind ausser der Ansteckung wenig bekannt, indem sämmtliche beschuldigte Einflüsse sonst

sehr häufig auf den Menschen einwirken, ohne diese Krankheit hervorzubringen. Hieher gehören: Unreinlichkeit, wesshalb die Krankheit vorzüglich bei Individuen aus der ärmern Volksklasse und bei Juden vorkommt, das Tragen von Pelzmüzen und das zu grosse Warmhalten des Kopfes, das Abscheeren der Haare, wodurch die durch die Haare geschehende Ausdünstung unterdrückt werde, der übermässige Genuss des Branntweins, so wie öligter Speisen, schlechter Häringe etc., die stinkenden Ausdünstungen der Weichsel und anderer Flüsse, so wie der Sümpfe in Polen, Verkältung in neblichter Luft, schlechtes Trinkwasser etc., Gemüthsbewegungen, syphilitische Ansteckung etc. Der Ansteckungsstoff des Weichselzopfes ist ein Contagium von specifischer Art, derselbe ist fix und haftet daher an festen Trägern, insbesondere den Kopfbedeckungen.

Es soll diese Krankheit im dreizehnten Jahrhundert durch die Tartaren nach Polen gebracht worden sein. Es ist die Krankheit in Polen, in der Tartarei und den angrenzenden Ländern endemisch, kommt aber auch in seltenen einzelnen Fällen in andern Ländern vor. [1])

§. 1403.

Ueber die **Natur** des Weichselzopfes ist man verschiedener Ansicht. Einige ältere und auch neuere Schriftsteller, *Hercules de Saxonia* und *Wolfram*, hielten den Weichselzopf für eine Modification der Syphilis, *Schlegel* für eine Gichtmetastase und *Jos. Frank* für eine eigene Art des Aussazes, welche leztere Meinung die gegründetere zu sein scheint.

§. 1404.

Vorhersage. Der Weichselzopf ist in vielen Fällen heilbar, oft aber auch nicht. Da immer ein bedeutendes

1) Der Weichselzopf in Deutschland. Inaugural-Abhandlung von v. Steinkühl, mit 1 Abbildung. Würzburg 1817.

Allgemeinleiden dem örtlichen zum Grunde liegt (die trichomatische Dyscrasie) und das örtliche selbst ein sehr bedeutendes ist, so ist die Krankheit auch lebensgefährlich. Oft bleiben auch Nachkrankheiten, Taubheit, Lähmungen, Drüsenkrankheiten, Beinfrass etc. zurück.

§. 1405.

Behandlung. Es ist noch kein Mittel bekannt, durch welches man den Krankheitsprozess unmittelbar zum Erlöschen bringen könnte, wie z. B. durch das Quecksilber die Lustseuche. Die beim Weichselzopf üblichen Heilverfahren sind vorzüglich solche, durch welche man bei den vorhandenen Vorboten oder bei sehr langsamer Entwicklung der Hautkrankheit die Lebensthätigkeit gegen die Haut hin zu leiten und dadurch die Krise zu beschleunigen sucht, doch mag auch hierdurch zuweilen die Krankheit in der Haut unterhalten und vermehrt werden, wie z. B. auch der Friesel durch die diaphoretische Methode. Man empfiehlt zu dem angegebenen Zwecke die Antimonialien, allein oder in Verbindung mit Mercurialien, den Schwefel (nach *J. Frank* in Verbindung mit Extr. Hellebori oder Cicut.), das Guajak, den Kampher, das *Dover*'sche Pulver und die als Volksmittel bekannte Vinca Pervinca, auch empfiehlt man Warmhalten des Kopfes und wendet reizende Fomentationen auf die behaarten Theile an, z. B. von einer Abkochung von Lycopodium Selago, Vinca minor etc., so wie auch Senfteige, Blasenpflaster und andere die Haut reizende Mittel. Bei gefährlichen Zufällen, die man von einem nicht zu Stande kommenden Weichselzopfe herleitet, wendet man selbst die Einimpfung durch das Auflegen eines vor kurzem abgeschnittenen Weichselzopfes an, doch lauft man bei einem solchen Unternehmen leicht Gefahr, den Weichselzopf ohne Noth zu erzeugen und trägt hierdurch auch zur weitern Verbreitung der Krankheit bei. — Sind mit dem

Weichselzopf eine beträchtliche Entzündung der Kopfschwarte und andere bedeutende örtliche Zufälle verbunden, so sezt man Blutegel an den Kopf, Blasenpflaster in den Nacken und wendet auch Abführungsmittel an. — Es ist Regel, den Zopf nicht eher abzuschneiden, bis er an gesunden Haaren hängt. In dem Volke soll es üblich sein, um das Wachsen des Zopfes zu beschränken, denselben zwischen zwei glatten Steinen oder Hämmern zu klopfen. Ist der Zopf entfernt, so muss man den Kopf des Kranken vor Verkältung schüzen.

§. 1406.

Einen grössern Erfolg, als die Behandlung der Krankheit, versprechen Maassregeln zur *Prophylaxis* derselben, die vorzüglich in solchen zur Verhinderung der Ansteckung bestehen müssten. So wie es geglückt ist, mehrere andere ansteckende Krankheiten, namentlich den Aussaz und die Pest aus Europa zu verdrängen, so scheint es auch möglich zu sein, den Weichselzopf auszurotten oder wenigstens sehr selten zu machen.

Die Beerschwämme.

(*Thymiosis.*)

§. 1407.

Es gibt erdbeer-, himbeer- und maulbeerartige Auswüchse der Haut, die man zu den Hautausschlägen zählt. Aehnliche Excrescenzen kommen schon in der gewöhnlichen Syphilis vor, vorzüglich stellen diese Gestalt aber jene Hautveränderungen dar, die ein Theil der Syphiloiden sind, zu welchen gewöhnlich der Scher-

lievo, die Sibbens, die Radesyge, die Marschkrankheit und das Mal de Chicot gerechnet werden, zu welchen übrigens auch noch die Yaws und Pians, die in ihrer Form und Entstehungsweise viele Aehnlichkeit mit den genannten Krankheiten haben, gehören. Ich werde diese Krankheiten, da der Ausschlag nicht allein oder vorzugsweise die Krankheitsform bildet, sondern innere Leiden, z. B. Knochenkrankheiten, wesentlich zu derselben gehören, unter den Kachexien abhandeln, wo sie am schicklichsten den Plaz neben der Lustseuche einnehmen, von der sie gröstentheils eine Modification zu sein scheinen.

Vierte Ordnung der Hautausschläge.

Die unverändert bleibenden ausschlagsartigen Hautfehler.

Die von mir als vierte Ordnung der Hautausschläge angeführten Hautfehler bilden eigentlich keine eigene Familie von Hautausschlägen, denn insofern einige derselben als Symptom einer frühern oder noch bestehenden Krankheit betrachtet werden können, müssen sie zu den symptomatischen Ausschlägen gezählt werden, und insofern sie die unmittelbare Folge von äussern, zunächst auf die Haut wirkenden Einflüssen sind, können sie eigentlich nicht zu den Ausschlägen gerechnet werden; um jedoch dem gewöhnlichen Gebrauche, diese Hautfehler unter den Ausschlägen anzuführen, folgen zu können, und da von allen hier erwähnten Formen in den meisten Fällen der symptomatische Ursprung eben so wenig als etwas Specifisches nachgewiesen werden kann, so stelle ich diese Hautfehler als eine vierte

Reihe auf, die jedoch weniger als eine eigene Ordnung von Ausschlägen, als vielmehr als Anhang zu der Lehre von den Hautausschlägen betrachtet zu werden verdient. Da diese Hautfehler, wenn sie einmal vorhanden sind, in der Regel lange Zeit oder immer unverändert stehen bleiben und daher auch nicht anzunehmen ist, dass ein fortdauerndes inneres Leiden auf dieselben wirke, so glaube ich diese Eigenschaft als das vorzüglich characteristische Merkmal dieser Reihe von Hautkrankheiten anführen zu müssen.

Die Sommersprossen.

(*Sommerflecken*, *Sonnenflecken*, *Ephelis*, *Lentigo*, *Chloasma Ephelis.*)

Abbildungen von *Alibert*, Tab. 59, und *Rayer*, Pl. XXII.

§. 1408.

Die Sommersprossen sind bräunliche, nicht juckende und nicht über die Haut erhabene, glatte Flecken von der Grösse bis zu einer Linse, welche vorzüglich im Gesichte, aber auch an andern, von den Kleidern nicht bedeckten Theilen der Haut entstehen, am häufigsten bei Individuen von zarter Haut und blonden oder rothen Haaren vorkommen und vorzüglich durch die Einwirkung der Sonnenstrahlen hervorgebracht werden. Dieselben nehmen jeden Sommer zu, indem sie deutlicher hervortreten oder auch neue sich bilden, und im Winter ab, verschwinden jedoch selten vollständig. Sie stehen mit keinen innern Störungen in Verbindung.

§. 1409.

Behandlung. Schuz gegen die Einwirkung der Sonne durch das Tragen von Schleiern. Man empfiehlt Waschwasser von Wasser mit Zusaz von Essig oder Citronen-

saft, einer geringen Menge Mineralsäure, Meerzwiebelessig, Alaun, Bleipräparate, Borax, Benzoetinktur, so wie mit einer Emulsion von bittern Mandeln, eine Masse von bittern Mandeln, Honig und Weinessig, statt der Seife gebraucht, das Bestreichen mit Campheröl, mit reiner Ochsengalle oder einer Art Salbe von Ochsengalle und Oleum Tartari per deliquium bereitet, was Abends geschehen kann, worauf am andern Morgen das Gesicht mit Seifenwasser abgewaschen wird, und auch beinahe sämmtliche gegen flechtenartige Ausschläge gebräuchlichen Mittel.

Der Leberfleck.

(*Laubfleck*, *Macula hepatica*, *Chloasma hepaticum*, *Vitiligo hepatica.*)

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 96, *Alibert*, Tab. 60, und *Rayer*, Pl. XXII.

§. 1410.

Die Leberflecken sind Flecken von gelbbräunlicher und zuweilen in's gräulich-bräunliche und schwärzliche gehender Farbe, von der Grösse einer Linse bis zu der einer Hand und darüber, welche vereinzelt stehen und meistens weder jucken noch sich verändern, sondern oft das ganze Leben unverändert stehen bleiben, doch zuweilen auch gelind juckend sind und ganz feine Schuppen bilden und in seltenen Fällen auch wiederum vergehen, namentlich die in der Schwangerschaft entstandenen. Sie kommen in den Weichen, auf der Brust, im Gesichte und an andern Theilen vor. — Häufig ist das Uebel angeboren; auch werden die Schwangerschaft,

Hämorrhoiden, Unordnungen in der monatlichen Reinigung und gestörte Gallenabsonderung beschuldigt.

§. 1411.

Behandlung. Ist ein inneres Leiden vorhanden, das mit den Leberflecken in Verbindung stehen könnte, so muss man auf dieses wirken. Die äusserlichen Mittel, die man empfohlen hat, sind dieselben Mittel, die auch gegen die Sommerflecken gebräuchlich sind.

Die Warzen.

(Verrucae.)

§. 1412.

Die Warzen sind meistens lange Zeit unverändert stehen bleibende und aus keiner bekannten Ursache entstandene oder durch eine äussere Einwirkung hervorgebrachte Veränderungen in der Haut, doch entstehen sie zuweilen, ähnlich den symptomatischen Ausschlägen, aus einem innern Leiden, vorzüglich der Lustseuche. — Da zu ihrer Behandlung meistens chirurgische Hilfe nothwendig ist, so wird ihre Darstellung auch gewöhnlich in den Lehrbüchern der Chirurgie gegeben.

Die Mollusken.

(Mollusca.)

Rayer, Pl. XV.

§. 1413.

Die Mollusken sind weiche, bewegliche, mit einer breiartigen Materie gefüllte, in der Haut sizende Bälge,

welche von der Farbe der Haut oder etwas bräunlich sind, bald flach sind und eine breite Basis haben, bald gestielt sind, allmälig sich vermehren, so dass sie zulezt in grosser Menge vorhanden sind und das Aussehen verunstalten, und in der Regel stehen bleiben. — *Bateman* nimmt ein Molluscum contagiosum an, welches sich dadurch auszeichne, dass die Geschwülste an der Spize eine kleine Oeffnung erhalten, aus welcher auf einen Druck eine milchigte Feuchtigkeit ausfliesst, die eine ansteckende Beschaffenheit besizt, und dass die grössern Geschwülste in eine langsame Verschwärung übergehen. — Einen Fall beobachtete ich, in welchem der ganze Körper, vorzüglich das Gesicht, mit Mollusken, die sich nicht öffneten, bedeckt war, und sich zulezt Brustkrebs entwickelte. Die Mollusken kamen bei drei weiblichen Personen der nämlichen Familie vor. — Es ist kein Mittel bekannt, um dieser Krankheit, die übrigens für sich nicht tödtlich wird, Einhalt zu thun.

Die Keloide.

Abbildungen von *Alibert*, Tab. 36 u. 37, *Rayer*, Pl. XV.

§. 1414.

Die Keloide ist eine von *Alibert* beschriebene, von Einigen aber in Zweifel gezogene Krankheit der Haut, welche in einer kleinen, flachen, meist ovalen oder unregelmässig geformten, harten, dunkel- oder blassrothen, glänzenden Geschwulst, mit einem kleinen Eindruck in der Mitte, besteht. Die Epidermis, die sie bedeckt, ist dünn, gerunzelt, wie Brandnarben. Es ragen diese Geschwülste 1 — 2 Linien in die Höhe, sie haben die Grösse von 1 — 2 Zollen im grössern Durchmesser, oft

aber bleiben sie auf der Grösse von 1 — 2 Linien stehen. Bei manchen Kranken sind durchaus keine Schmerzen vorhanden und die Geschwulst bleibt unverändert, bei andern stellen sich Schmerzen ein und zuweilen geht die Geschwulst in Eiterung über und hinterlässt eine harte und weisse Narbe. — Die Ursachen der Keloide sind unbekannt und ebensowenig kennt man eine erfolgreiche Behandlungsweise. Die Cauterisation und die Exstirpation haben sich nicht vortheilhaft erwiesen.

Das Hauthorn.

(*Dermoceras*, *cornua cutanea*, *ceratiasis.*)

Abbildungen in *Froriep's* Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk. Bd. VII. Nro. 3. in *Struve's* Synopsis. Tab. IV., *Rayer*, Pl. XXI.

§. 1415.

Das **Hauthorn** besteht in einer hornartigen Masse, welche an irgend einer Stelle, am häufigsten aber an einem behaarten Theile, aus der Haut hervorwächst und oft einen Durchmesser und eine Länge von mehrern Zollen erhält, es sizt nicht tiefer, als die Haut ist, und ist wie diese selbst beweglich, worin es sich von den Hörnern der Thiere unterscheidet. Oft kommt nur eine, zuweilen mehrere solcher Excrescenzen vor. — Am häufigsten entstehen die Hauthörner aus vereiterten Balggeschwülsten, aber auch zuweilen aus Warzen und exulcerirten Hautstellen, zuweilen aber wachsen sie auch aus der unverlezten Haut hervor. Die Basis derselben ist entweder von dem Belege, aus dem sie hervorwuchsen, oder von einer Verlängerung der Oberhaut

umgeben. — Man kennt den hinreichenden Grund der Entstehung dieser Hauthorne nicht, doch bemerkt man sie vorzüglich bei ältern Frauen, und glaubt, dass sie durch eine Verirrung des Bildungstriebes bedingt seien. — Das sicherste Mittel ist die Exstirpation vermittelst des Messers.

Der Fischschuppenausschlag.

(*Ichthyosis.*)

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 16 bis 18, und *Alibert*, Tab. 62 und 63, *Rayer*, Pl. XXI.

§. 1416.

Die Ichthyosis ist ein verhärteter, warzen- oder hornartiger Zustand der Haut, in grösserer oder geringerer Ausdehnung, welcher mit keinen innern Beschwerden in Verbindung steht.

§. 1417.

Willan und *Bateman* beschrieben zwei Arten von diesem Hautübel: 1) Die *Ichthyosis simplex*. Bei ihrem Beginne besteht die Krankheit blos in einem verdickten, rauhen und missfarbigen Zustand der Oberhaut; beim Fortschreiten nimmt die krankhafte Haut die Beschaffenheit kleiner Warzen an, und ist fest und schwarz und der darüber hinfahrende Finger erhält das Gefühl, als ob er über die Oberfläche einer Feile oder des rauhesten Chagrins gleite. Diese harten Hervorragungen sind oft in rautenförmige Abtheilungen getheilt, einige haben eine gleichförmige Dicke von ihrer Wurzel nach oben, andere einen kurzen, schmalen Hals und unregelmässige Köpfe. An einigen Stellen der Extremitäten und manch-

mal auch am Rumpfe, sind diese Excrescenzen schuppig, flach und breit und zuweilen übereinander liegend, wie die Schuppen der Karpfen, was jedoch wahrscheinlich von dem Drucke der Kleidungsstücke abhängig ist; in andern Fällen sind sie getrennt stehend und von weisslichen Furchen durchzogen. — Es kommt diese Entartung in grossen, fortlaufenden Flecken vor, welche bisweilen den grössern Theil des Körpers, mit Ausnahme der Beugeseite der Gelenke, des innern und obern Theiles des Schenkels und der Vertiefung längs dem Rückgrat bedecken. Das Gesicht wird in der Regel nicht ergriffen, doch ist ein Fall bekannt, in welchem nur im Gesichte die Entartung sich zeigte. Es ist meistens nicht die geringste Ausdünstung der Haut zu bemerken, dagegen bilden sich oft in einzelnen Theilen entzündete Beulen. Wenn ein Stück der schuppigen Decke hinweggenommen wird, so erzeugt sie sich nicht leicht wieder, die Haut bleibt aber hart und trocken. — 2) Die *Ichthyosis corna.* Dieses ist eine steife, hornartige, zuweilen partielle, zuweilen sich über den ganzen Körper erstreckende Beschaffenheit der Integumente. Hieher rechnen auch *Willan* und *Bateman* die einzelnen hornartigen Excrescenzen, die man jedoch gewöhnlich nicht zu dem Fischschuppenausschlag zählt. — Als eine Modification der Ichthyosis kann die Hystriciasis (Stachelschweinmenschen) angesehen werden, bei welcher, bei einer ähnlichen Beschaffenheit der Haut, wie bei dem Fischschuppenausschlag, Borsten und Stacheln auf der Haut vorkommen.

§. 1418.

Es ist der Fischschuppenausschlag meistens angeboren und zuweilen erblich; im übrigen sind die Ursachen desselben unbekannt.

§. 1419.

Die **Behandlung** ist meistens ohne grossen Erfolg.

Man empfiehlt, die Schuppen durch Bäder zu erweichen und vermittelst der Finger allmälig loszuschälen. *Plumbe* wendet die Compression vermittelst Klebpflasterstreifen und Binden an. *Bateman* glaubt von dem innerlichen Gebrauch des Pechs und des Arseniks Nuzen gesehen zu haben.

Das Muttermaal.

(*Naevus maternus.*)

Abbildungen von *Willan* und *Bateman*, Tab. 70—72, *Struve*, Tab. 1., *Rayer*, Pl. XV., XX. u. XXII.

§. 1420.

Die Muttermäler sind im weitern Wortsinne Fehler in der Farbe und Structur einzelner Hautstellen, welche Flecken von verschiedener Form darstellen und ihren Ursprung in der ersten Bildung haben.

§. 1421.

Indem man die Muttermäler dem Versehen zugeschrieben und ihre Formen mit den Gegenständen des angeblich Versehens verglichen hat, hat man nach ihrer Gestalt verschiedene Arten angenommen, wie Naevus cerasus, ribes, morus, fragarius, araneus, foliaceus etc. Diese Verschiedenheiten in den äussern Umrissen sind unwesentlich und man theilt daher besser die Muttermäler nach Verschiedenheit des krankhaften Gewebes ein, wornach zwei Hauptarten des Muttermaales angenommen werden können:

1) Das *Muttermaal* (Naevus) im engern Sinne des Wortes. Es ist dieses ein Fleck der Haut von verschiedener Gestalt, meistens bräunlich gefärbt und etwas erhaben, in welchem sich keine abnorm entwickelte Gefässe

zeigen. Entweder hat dieser Fleck eine glatte Oberfläche (glattes Muttermaal, Naevus glaber), oder er ist mit einem dichten Haarfilze bedeckt (filziges Muttermaal, Naevus tomentosus) oder mit längern starken Haaren (haariges Muttermaal, Naevus pilosus). Diese Art des Muttermaales verändert sich in der Regel im ganzen Leben nicht mehr.

§. 1422.

2) Das *Blutmaal* (Spilus). Es besteht dasselbe in einem Gewebe von äusserst reichlichen, ausgedehnten und andauernd mit Blut überfüllten feinen Gefässchen (Telangiectasia). Zuweilen sind diese Gefässchen hellroth, wie mit arteriellem Blut überfüllt (das arterielle Blutmaal, Spilus arteriosus). Zuweilen sind sie dunkel- und bläulichroth, wie mit venösem Blute überfüllt (das venöse Blutmaal, Spil. venosus). Meistens sind diese Blutmäler nicht über die Haut erhaben, oft aber auch Geschwülste von einem Convolut von Blutgefässen darstellend (das anevrysmatische Blutmaal, das mehr blutroth ist und das man von einer anevrysmatischen Ausdehnung der arteriellen Blutgefässe herleitet, und das varicöse Blutmaal, das mehr eine bläuliche und schwärzliche Geschwulst darstellt und für eine Ausdehnung venöser Hautgefässe gehalten wird). Zuweilen befinden sich zwischen den Gefässchen Zellchen oder Zwischenräume, welche oft mit einer gallertartigen Materie angefüllt sind (das zellige Blutmaal, Spil. cavernosus). — Es bleibt das Blutmaal oft das ganze Leben hindurch unverändert stehen, zuweilen trocknet es von selbst ein und verschwindet allmälig, was noch geschehen kann, wenn es einen bedeutenden Umfang und Dicke erreicht hatte. Zuweilen geht es von selbst, oder wenn Arzneimittel angewandt worden sind, in ein bösartiges krebshaftes Geschwür über oder es plazen Gefässe und geben zu Blutflüssen Veranlassung.

§. 1423.

Ursachen. Die Muttermäler sind zuweilen erblich. Dass sie durch das sog. Versehen entstehen, ist unwahrscheinlich; eben so wenig genügt es, sie von einem anhaltenden Druck auf einen Theil des Kindes herzuleiten, wiewohl die Telangiectasie in einzelnen Fällen hierdurch hervorgebracht werden kann. In der Regel ist durchaus keine Ursache von diesen Fehlern aufzufinden.

§. 1424.

Behandlung. Gegen den Naevus sind die Mittel empfohlen worden, die auch gegen die Sommerflecken gerühmt werden; sie sind aber wirkungslos. Die ebenfalls empfohlenen Aezmittel hinterlassen oft entstellende Narben; am sichersten ist die Exstirpation. — Gegen den Spilus dienen kalte Umschläge und eine angemessene Compression. Das Aezmittel kann bösartige Geschwüre veranlassen. Den sichersten Erfolg gewährt die Hinwegnahme durch das Messer, doch ist es besser, wenn die Operation für sich wegen der grossen Ausdehnung der Geschwulst gefahrvoll wäre, dieselbe zu unterlassen, da wenigstens das varicöse Blutmaal oft mit den Jahren von selbst verschwindet.

Das Ausgehen der Haare.

(*Defluvium capillorum*, *Madesis.*)

§. 1425.

Die Haare fallen oft in grosser Menge aus, so dass der Kopf beinahe kahl wird, sie wachsen aber wieder, was besonders nach hizigen Krankheiten, z. B. dem Nervenfieber und der Gesichtsrose der Fall ist, oft aber

werden sie nicht mehr ersezt. Meistens gehen die Haare zuerst an dem Vorderhaupt, vorzüglich auf beiden Seiten desselben allmälig aus, so dass die Stirne sehr hoch wird, oft aber auch auf dem Scheitel des Kopfes. Zulezt gehen oft alle Haare von der Stirne bis zum Hinterhaupte verloren (der Kahlkopf, Calvities); ja manchmal sämmtliche Kopfhaare. In manchen Fällen sind es bestimmt begränzte Pläze (Areae), auf welchen die Haare ausgehen, was man Glazmaal und wegen der Aehnlichkeit mit den abgehaarten Pläzen bei Füchsen Alopecia genannt hat. Zuweilen kriecht ein solcher kahler Fleck in schlangenförmigen Windungen zwischen den Haaren fort, was man das Streifmaal (Ophiasis) nennt. Die Haare werden oft vor dem Ausgehen blasser, dünn und zuweilen auch an ihrer Spize gespalten. Die Kopfhaut ist oft mit Schuppen bedeckt oder zeigt noch einen bedeutendern krankhaften Zustand, oft aber ist nichts Regelwidriges an ihr zu erkennen.

§. 1426.

Ursachen. Von dem gewöhnlichen allmäligen Ausgehen der Haare sind die Hauptursachen: eine angeerbte Anlage, das höhere Alter, Schwäche des Körpers, wie z. B. bei zehrenden Krankheiten, niederbeugende Gemüthsaffecte, übermässiger Beischlaf, lange Zeit gestörte Nachtruhe, anstrengende Geistesarbeiten, Kopfschmerzen, die Gesichtsrose, der Grindkopf, der Kleiengrind, die bei der Lustseuche vorkommenden Hautausschläge, der Gebrauch scharfer Haarpuder, das Brennen der Haare beim Frisiren etc.

§. 1427.

Behandlung. Der Kranke darf sich den Schlaf nicht zu sehr entziehen, den Coitus wenig ausüben, man muss genau untersuchen, ob nicht die Kopfhaut an einer ausschlagsartigen Affection leide, und muss diese mittelst geeigneter Salben, Waschwasser und den etwa nöthigen

innerlichen Mitteln behandeln etc. Kann man blos eine verminderte Ernährung der Haare als Ursache des Ausfallens derselben betrachten, so sucht man die Lebensthätigkeit zu erhöhen durch gelindes Reiben der Kopfhaut mit grober Leinwand, Zwiebeln etc., Waschungen des Kopfes mit einer Abkochung von rad. Bardanae, rad. Graminis etc. mit Wasser, Bier, oder Wasser und etwas Branntwein, Einreibungen von aromatischen Geistern, fetten Oelen mit Zusaz von ätherischen Oelen, mit der Chininsalbe, mit der aus dem Wiesbadener Wasser bereiteten Sinterseife etc., so wie auch durch öfteres Abschneiden und Abrasiren der Haare.

Siebente Krankheitsfamilie.

DIE KACHEXIEN UND DIE ÖRTLICHEN FEHLERHAFTEN BILDUNGSPROZESSE.

Erster Abschnitt.

Von den krankhaften Bildungsprozessen im Allgemeinen.

§. 1423.

Die Bildungsprozesse sind in vielen Krankheiten fehlerhaft, z. B. in den Fiebern und den Entzündungen, doch können wir dieselben, in so fern sie nur Theile einer andern Krankheit sind, hier nur gelegentlich bei der allgemeinen Untersuchung über die krankhaften Bildungsvorgänge berücksichtigen, eine besondere Betrachtung aber nur denjenigen krankhaften Zuständen der Reproduction schenken, welche eigene Krankheitsarten darstellen. Die meisten hieher gehörenden Krankheiten hat man unter dem Namen Kachexien begriffen, doch ist diese Benennung nicht für alle hier zu betrachtenden Krankheitsformen passend, da das Wort Kachexie eine Krankheit bezeichnet, die mit einem schlechten Aussehen verbunden ist, und es auch krankhafte Bildungsprozesse

in dem Gewebe einzelner Theile gibt, die in den übrigen Geweben keine Veränderung hervorbringen und daher nicht der Krankheit den Ausdruck der Kachexie geben.

§. 1429.

Wir erkennen dreierlei verschiedene Abweichungen vom normalen Zustand des Körpers, die wir einer fehlerhaften Bildungsthätigkeit zuschreiben müssen, 1) die übermässige Ernährung, 2) die verminderte Ernährung und 3) die Umwandlung der flüssigen und festen Theile in fehlerhaft beschaffene Stoffe.

§. 1430.

1) **Die übermässige Ernährung.** Eine noch so kräftige Ernährung, bei welcher alle Theile des Körpers gleichmässig zunehmen und in ihren normalen Grösse- und Formverhältnissen bleiben, kann niemals Krankheit sein, dagegen müssen wir die übermässige Ernährung als krankhaft anerkennen, in welcher einzelne Theile des Körpers, unverhältnissmässig zu den übrigen Theilen, sich vermehren. Diese unverhältnissmässige starke Ausbildung einzelner Theile ist von verschiedenen krankhaften Zufällen begleitet. Durch die übermässige Ausbildung eines Organs geschehen seine Verrichtungen mit zu vieler Kraftentwicklung, wie z. B. bei der Hypertrophie des Herzens, und eine zu schnelle Verzehrung der Kräfte und mancherlei Störungen in Theilen, auf welche das leidende Organ hinsichtlich seiner Verrichtungen einen Einfluss ausübt, sind die Folgen davon, ebenso werden andere Theile in ihren Verrichtungen durch die Volumszunahme des leidenden Organs gestört etc. Der Tod kann demnach wegen der ungleichmässigen Ernährung durch Erschöpfung der Kräfte, oder, was der häufigere Fall ist, durch Hemmung der Verrichtungen eines edlen Organs herbeigeführt werden.

§. 1431.

2) **Die verminderte Ernährung.** Dieselbe spricht sich durch Abmagerung des ganzen Körpers oder einzelner Theile desselben (Schwinden eines Gliedes, Aridura, Tabes partialis) aus. Sehr häufig tritt diese Abmagerung im Gefolge anderer, die Kräfte und Stoffe verzehrender Krankheiten auf, so z. B. in Fiebern, in welchem Falle sie aber nur vorübergehend ist und vorzüglich in langwierigen Krankheiten mit Ausscheidungen von Säften, insbesondere von Eiter (die Schwindsucht, Phthisis im engern Sinne des Wortes), oft aber sind keine solche verzehrende Krankheiten vorhanden, sondern es findet nur der gewöhnliche Wiederersaz der Stoffe nicht statt (die mangelhafte Ernährung, Atrophia, im engern Sinne des Wortes auch, jedoch nicht genügend bezeichnend, Abzehrung, Tabes, genannt), in vielen Fällen sind wohl auch zu schnelle Verzehrung (Phthisis) und mangelhafte Ernährung zugleich vorhanden. Hat die Abmagerung des Körpers einen gewissen Grad erreicht, so gesellt sich, jedoch bei der Phthisis mehr als bei der Atrophie, ein Zehrfieber (Febris hectica) hinzu, durch welches die Erschöpfung der Kräfte des Kranken sehr beschleunigt wird.

§. 1432.

3) **Die Umwandlung der Bestandtheile des Körpers in fehlerhafte Stoffe.** Diese Umwandlungen stellen sehr mannigfaltige Krankheitsformen dar. Oft bemerken wir im ganzen Körper in festen und flüssigen Theilen Veränderungen in der Farbe, in der Dichtheit der Theile, in den chemischen Bestandtheilen u. s. w., und zwar ist oft die Art der Veränderung beinahe überall die gleiche, z. B. Auflockerung und Verflüssigung in den verschiedensten Theilen des Körpers, oft ist sie in ein und derselben Krankheit sehr verschieden, so dass an der einen Stelle Verflüssigung,

Verschwärung und an einer andern Verhärtungen und Wucherungen sich bilden, wie z. B. in der Lustseuche. Man kann wohl diese über den ganzen Körper verbreiteten Entartungen, bei welchen immer mehr oder weniger eine Veränderung der Mischung der Säfte und der meisten festen Theile stattfindet, die allgemeinen Mischungsausartungen (Dyscrasiae) nennen. — In andern Fällen entstehen nur an einzelnen Stellen Veränderungen der Gewebe, es erweicht oder verschwärt das eine oder das andere Organ, oder geht in Verhärtung über, oder es werden an der einen oder der andern Stelle Aftergebilde erzeugt; es können jedoch solche Veränderungen auch im Gefolge von allgemeinen Mischungsausartungen auftreten und auch zuweilen ein allgemeines Leiden der Ernährung herbeiführen. — Diese Stoffumwandlungen sind von mancherlei Krankheitszufällen begleitet. Es sind die Organe, in welchen die krankhaften Bildungen vorzüglich stattfinden, mehr oder weniger in ihren Verrichtungen gehemmt, wodurch sehr viele Krankheitserscheinungen, z. B. Athmungsbeschwerden, unordentliche Herzbewegungen und Gehirnaffection, hervorgebracht werden, meistens leiden die Absonderungen, insbesondere ist oft der Harnabgang vermindert oder der Harn trübe, der Magensaft oft sauer und die Verdauung leidet, zuweilen begleiten heftige Schmerzen die örtlichen Entartungen, bei langer Dauer leidet auch wegen starkem Stoffverlust die Ernährung und die Kräfte werden erschöpft, häufig kommt in den höhern Graden der Krankheit ein Zehrfieber hinzu.

§. 1433.

Der Verlauf der krankhaften Bildungsprozesse ist, in so fern schon materielle Veränderungen eingetreten sind und die Krankheit nicht durch Zerrüttung eines edeln Organs schnell zum Tode führt, immer langwierig. — In Gesundheit gehen diese Krankheiten über entweder

durch Wiederherstellung der normalen Verhältnisse in Hinsicht der Stärke der Ernährung, so dass die Stoffsanlagerung der Verzehrung wiederum das Gleichgewicht hält, oder durch allmälige Umbildung der fehlerhaften Stoffe in gesunde Substanz vermittelst einer kräftigen Ernährung, oder durch Ausführung der kranken Stoffe auf dem Wege der rückschreitenden Metamorphose und durch Wiederersaz durch gesunde Stoffe, oder Aufsaugung fehlerhafter Stoffe, Aufnahme in die Wege der Circulation und Ausscheidung durch verschiedene Absonderungen, oder endlich, indem das fehlerhafte Gewebe sich von dem gesunden lostrennt und durch gesunde Fleischwarzenbildung ersezt wird. — Nachkrankheiten sind Zerstörungen einzelner Theile und daher Hemmung ihrer Verrichtung und Schwäche im Systeme der Reproduction, wodurch ein kachektischer Zustand bedingt sein kann, der von dem zuerst bestandenen verschieden ist, aber oft leicht wieder in denselben übergeht. — Zum Tode führen die krankhaften Bildungsvorgänge durch Erschöpfung der Kräfte oder durch Zerstörung zum Leben nothwendiger Organe.

§. 1434.

Die Anlage zu gewissen Krankheiten der Ernährung ist oft angeerbt und es entwickelt sich zu einer bestimmten Zeit das Leiden ohne alle erkennbare Gelegenheitsursache und unaufhaltsam. Zu manchen derartigen Krankheiten macht vorzüglich ein gewisses Alter geneigt, wie z. B. zur englischen Krankheit das Kindesalter und zur Lungenschwindsucht das Jünglingsalter, einzelne Krankheitsarten kommen vorzüglich beim männlichen, andere beim weiblichen Geschlechte vor, wie bei ersterm die Rückendarre, bei lezterm die Bleichsucht, endlich bedingt auch öfters das Temperament und die Körperconstitution eine besondere Anlage zu bestimmten Kachexien, wie z. B.

das cholerische Temperament zur Gelbsucht und ein sehr fetter Körperbau zur Wassersucht.

§. 1435.

Gelegenheitsursachen sind Fehler in dem Gebrauche der Nahrungsmittel, der Genuss einer zu grossen Menge derselben, Mangel an Nahrungsmitteln, verdorbene oder zu reizende oder in irgend einer andern Beziehung fehlerhafte Speisen und Getränke, Krankheiten des Magens, der Lymphgefässe und Drüsen, wodurch die Bereitung und die Fortleitung der aus den Nahrungsmitteln gezogenen Stoffe gehindert werden, die Aufnahme von Giften, Miasmen oder von einem Contagium, z. B. dem der Lustseuche in den Körper, fehlerhafte Umwandlung des Blutes in den Lungen, durch den Aufenthalt in einer ungesunden Luft oder durch Krankheiten der Lungen, Zurückhaltungen der Auswurfsstoffe durch Krankheiten der Leber, der Nieren etc., oder auch vermehrte Entleerungen von Säften durch fehlerhafte Milchabsonderungen, Saamenentleerungen, Blutflüsse etc., zu starke Körperanstrengungen, andauernde Geistesanstrengungen, Gemüthsaffecte, Mangel an Schlaf oder zu viel Schlaf, Entbehrung des Lichtreizes etc.

§. 1436.

Wesen der Krankheit. Die Ernährung geschieht durch eine von den Organen aus stattfindende Anziehung auf gewisse Bestandtheile des Blutes und Umwandlung derselben in bestimmte Organensubstanz durch die eigenthümliche Lebenskraft des Organs. Diese Anziehung könnte nun zwar eine rein chemische sein, so dass die Organe ernährt würden, wie ein Salzkrystall wächst, an den sich die im Wasser aufgelösten gleichartigen Salztheile anlagern; es beweist aber die zu dem ganzen Bau des Körpers passende Form der einzelnen Organe, dass diese Anziehung unter dem Einflusse des Lebens stehe, und viele krankhaften Erscheinungen thun dar, dass hiebei

das Nervensystem eine grosse Einwirkung zeige, ja die Bildungsgeschichte macht es so viel wie gewiss, dass der lezte Grund der verschiedenen Gewebebildung in der Verschiedenheit der biochemischen Wirkung liege, die das Nervensystem an verschiedenen Stellen (Polen) äussert, denn im Anfange ist kein Organ vorhanden als der Form nach das Gehirn und Rückenmark, denen sich die übrige Körperform anschliesst, und die ganze Substanz besteht aus secundären Bildungskugeln. Diese leztern wandeln sich nun um, je nachdem sie eine Stelle im Körper einnehmen, in Hirn- und Nervensubstanz, in Knochen, in die Muskeln, in die äussere Haut, in den Darmkanal, in die Leber etc. Wenigstens wird die erste Anlage dieser Theile nach der eben angegebenen Weise bewirkt, wenn auch die vollständige Ausbildung erst stattfindet, nachdem der Blutlauf zu Stande gekommen ist.

Demnach ist auch bei den Bildungsprozessen das Nervensystem immer der eine Hauptfaktor, ihm gegenüber stehen im Anfange die secundären Bildungskugeln, späterhin verschiedene Similartheile, vorzüglich aber das Blut.

§. 1437.

Untersuchen wir nun, welcher der beiden bezeichneten Factoren des Ernährungsprozesses bei den krankhaften Bildungsvorgängen primär leide, so finden wir, dass es bald der eine, bald der andere sein kann.

Von dem Nervensysteme geht die Krankheit aus: wenn Reizungen des Nervensystems die Bildung verändern, wie z. B. bei der Hypertrophie des Herzens, welche aus Gemüthsaffecten entsteht, bei der grossen Entwicklung der Muskeln der willkürlichen Bewegung durch starken Gebrauch derselben, bei consensuell erregten Veränderungen in den Geweben, wie z. B. bei der Entstehung von Phlyctänen am Munde, welche von gastrischen Reizen erzeugt sind, bei der Entstehung von

Desorganisationen in den Brüsten bei veränderter Lebensthätigkeit in der Gebärmutter u. s. w., und 2) wenn der veränderten Bildung ein Gesunkensein des Nervenlebens vorausgeht. Dieses findet z. B. bei der Abmagerung des Körpers, die aus niederbeugendem Gemüthsleiden entsteht, bei der Abmagerung der gelähmten Glieder, bei der Synchysis und Cirsophthalmie, die sich in Folge des schwarzen Staares bilden etc., statt.

§. 1438.

Das Blut ist der zuerst veränderte Krankheitsfaktor, wenn der krankhaften Ernährung ein Fehler des Blutes in Hinsicht seiner Menge oder seiner Beschaffenheit vorausgeht, insbesondere wenn es zu wenig ist, wie z. B. nach Blutflüssen, wenn es dünnflüssig ist, sich in der scorbutischen Auflösung befindet, wenn das arterielle Blut mit dem venösen gemischt ist, wie in der Blausucht, oder aus einer andern Ursache eine überwiegend venöse Beschaffenheit des Blutes sich gebildet hat, wenn wegen Unthätigkeit der Nieren, der Leber etc., Harnstoffe, gallichte Stoffe u. s. w. sich in ihm befinden, fremdartige Stoffe durch Aufsaugung in dasselbe aufgenommen worden sind, wie vielleicht in der Lustseuche das venerische Gift etc.

§. 1439.

Ist nun auf die angegebene Weise der eine oder der andere der Faktoren der Bildungsprozesse verändert, so treten die angegebenen Veränderungen in den Bildungsvorgängen auf folgende Weise ein: 1) Die *Vermehrung der Stoffbildung* geschieht von Seite des Nervensystemes aus, vorzüglich bei den Hypertrophien einzelner Organe, in welchem Falle durch erhöhte Lebensthätigkeit eine vermehrte Anziehung der ernährenden Stoffe nach einem einzelnen Theile bewirkt wird, und von Seite des Blutes aus, wenn im Verhältniss zum Verbrauche zu viele Nahrungsmittel dem Körper darge-

boten werden; es vermag übrigens in dem leztern Falle die von den Nerven ausgehende Lebensthätigkeit der Organe nicht immer eine verhältnissmässig eben so grosse Masse von normaler Organensubstanz zu bilden, sondern es bleibt zum Theil eine grössere Menge Bluts in den Gefässen, zum Theil wird ein weniger vollkommenes Gewebe, nämlich Fett, erzeugt.

§. 1440.

2) Die *Verminderung der organischen Stoffe* tritt ein, wenn die Nerventhätigkeit darnieder liegt und daher die ernährenden Stoffe weniger durch das Nervensystem angezogen werden und also die Ernährung des leidenden Theiles, im Verhältniss zu der des übrigen Körpers, zurückbleibt, wie z. B. bei Lähmung eines Gliedes, so wie auch, wenn die Stoffe nicht in gehöriger Menge vorhanden sind, aus welchen durch die Lebenskraft der Organe die für die Gewebe nothwendigen feinsten Theilchen gebildet werden können. In diesen beiden Fehlern, der verminderten Anziehung und Umwandlung der Stoffe durch verminderte Nerventhätigkeit und in Mangel des Blutes, liegt übrigens noch nicht die zureichende Ursache der Abzehrungen, denn es würde hierdurch nur der Mangel weiterer Körperzunahme, nicht aber das Schwinden der schon gebildeten Gewebe erklärt werden. Ich halte diese Verzehrung in einem doppelten Verhältnisse begründet, erstens und vorzüglich in den in den Organengeweben vor sich gehenden Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Stoffen, wodurch das Organische allmälig zu Unorganischem umgewandelt und ausgeschieden wird, welche Wechselwirkung entweder durch einen eigenen Krankheitszustand vermehrt ist, wie z. B. im Fieber, insbesondere dem Zehrfieber, oder auch in normaler Stärke vor sich geht oder selbst vermindert ist, aber wegen Verminderung der Zuführung von ernährenden Stoffen, wegen mangeln-

der Blutbereitung oder bei Lähmung eines Gliedes im Verhältniss zur Ernährung zu gross wird; und 2) in Aufsaugung von Stoffen, welche z. B. einzutreten scheint, wenn ein Theil des Körpers über einen andern überwiegend wird, wie bei der Lähmung eines Gliedes, wo vielleicht zum Theil das öfters eintretende Schwinden des Gliedes auf eine ähnliche Weise bewirkt wird, wie das Verschwinden des Schwanzes der Kaulquappen zu geschehen scheint, durch Anziehung der Stoffe nach den lebenskräftigern Centraltheilen.

§. 1441.

3) Die *krankhafte Umwandlung der Flüssigkeiten und organischen Gewebe* geschieht entweder dadurch, dass fehlerhafte Substanzen in das Blut aufgenommen und krankhafte Stoffe in das Gewebe der Organe abgelagert werden, wie z. B. lezteres bei der Wassersucht der Fall ist, wo Wasser, und in der Gelbsucht, in welcher gelbfarbige Stoffe aus dem Blute in das Gewebe abgesezt werden, oder indem nicht die gehörigen Substanzen in das Blut oder die Organengewebe gelangen, z. B. nicht die gehörige Menge von Faserstoff bereitet wird, oder dadurch, dass nicht die gewöhnlichen Ausscheidungsstoffe aus dem Blute oder aus dem Organengewebe ausgeschieden werden, z. B. Stoffe, aus denen die Galle bereitet wird, im Blute zurückbleiben, die aufgelösten oder ausgehauchten Stoffe wegen Unthätigkeit der lymphatischen Gefässe im Organengewebe liegen bleiben, wie bei der Wassersucht, oder dass zu viele Stoffe aus dem Blute und den festen Theilen auf dem Wege der Absonderungen ausgeschieden werden, wie z. B. bei der Harnruhr, oder endlich dadurch, dass durch die biochemischen Prozesse Blut und Organengewebe selbst unmittelbar umgewandelt werden. Eine durch die Lebensprozesse geschehende unmittelbare Umwandlung des Blutes scheint z. B. in hohen Graden des

Nervenfiebers, der Pest etc. statt zu finden; eine derartige Umwandlung der Gewebe aber kommt sehr häufig vor und verdient noch eine besondere Betrachtung.

§. 1442.

Es findet die erwähnte Umwandlung der Gewebe statt: 1) in der *Erweichung der Gewebe.* Oft scheinen sich nur einzelne Stoffe zu verflüssigen, wie z. B. das Fett, was in der Wassersucht der Fall zu sein scheint, oft gehen sämmtliche im Gewebe sich befindliche Stoffe, Nervensubstanz, Blut und alle andern Stoffe in den Krankheitsprozess ein und vereinigen sich zu einer gleichförmigen Masse, wie dieses der Fall ist bei der Erweichung des Magens, des Gehirnes, bei den verschiedenartigen Verschwärungen, bei den sphacelösen Auflösungen, bei der weissen und dunklen Morphea und bei der Erweichung mehrerer Verhärtungen, der Erweichung der Hepatisation, der Tuberkelerweichung, der Erweichung des Scirrhus, der Encephaloiden etc. Dass das Produkt der Erweichung ein sehr verschiedenes ist, mag zum Theil in der verschiedenartig umgeänderten Nerventhätigkeit und zum Theil in der schon vorher eingetretenen Umänderung der Stoffe, wobei oft ganz fremdartige Substanzen, z. B. ein contagiöses Gift, mitwirken, begründet sein. Zuweilen vereinigen sich auch in verschiedenen Krankheiten ganz verschiedene Stoffe zu ein und demselben Produkt, wie z. B. die hepatisirte Substanz und die Tuberkeln, welche beide in eiterige Erweichung übergehen.

§. 1443.

2) In den *Erhärtungen der Gewebe.* Hier mag oft eine plastische Ausschwizung in das Gewebe statt finden, das ursprünglich vorhandene Gewebe verändert aber in der Regel zugleich seine Beschaffenheit und es vereinigen sich die verschiedenen, dasselbe bildenden Stoffe, so wie auch zum Theil, und zwar vorzüglich bei der Entzündung,

das Blut zu einer gleichförmigen harten Masse. Diese Massen gehen sodann gerne durch weiteres Fortschreiten des bio-chemischen Vereinigungsprozesses in Eiterung über.

§. 1444.

3) Endlich in den *Afterbildungen*. Hier ist in der Regel der Lebensprozess an der ergriffenen Stelle sehr gesteigert, so dass ernährende Säfte zu derselben hingezogen werden und die Substanz wuchert, zugleich ist aber die Bildungsthätigkeit auf eine eigenthümliche, noch nicht erklärte Weise umgeändert, wodurch, statt dem gewöhnlichen Gewebe des Organs, ganz neue Bildungen hervorgebracht werden.

§. 1445.

Vorhersage. Die fehlerhaften Bildungsprozesse gehören im Allgemeinen zu den schwer heilbaren Krankheiten. So lange die Veränderungen nur in leichtern Umänderungen in der Farbe, in der Consistenz etc. bestehen, ist eher ein Erfolg der Behandlung zu erwarten, als wenn das Gewebe vollständig umgewandelt ist, doch wird auch durch solche Veränderungen nicht immer das Leben bedroht, und sie sind auch öfters noch heilbar. Am meisten hängt der Ausgang der Krankheit von der Krankheitsart ab, indem z. B. die Gelbsucht, Bleichsucht und Lustseuche in der Regel leicht zu heilende Krankheiten sind, die Lungenschwindsucht und der Krebs aber in der Regel tödtlich werden. Eine grosse Berücksichtigung verdienen auch die Wichtigkeit der ergriffenen Organe, der Kräftezustand des Kranken, die äussern Verhältnisse desselben etc. Ein Zehrfieber beschleunigt den tödtlichen Ausgang sehr.

§. 1446.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen*. Wohl in keiner Kur einer andern Krankheit ist es nothwendiger, auf die Lebensweise des Kranken

genau Achtung zu geben, als bei Behandlung der fehlerhaften Bildungsprozesse, denn in den Gewohnheiten und der Beschäftigung des Kranken liegt sehr häufig der Grund eines langwierigen Siechthums, und durch die Befolgung einer gehörigen Diät werden oft allein Kachexien geheilt. Die Nahrung muss in der Regel kräftig und auf eine lange Dauer der Krankheit berechnet sein, doch gibt es auch Fälle, in welchen eine möglichst strenge Entbehrung von Nahrung viel zur Umstimmung der Reproduction beiträgt, zuweilen ist auch eine gänzliche Umwandlung der Nahrungsweise nüzlich. Dem Kranken ist in der Regel der Genuss freier Luft, wenn sie nicht rauh ist, und der Aufenthalt an einem sonnigen Orte zuträglich. Manche Kranken erholen sich von langwierigen Leiden in einem milden Klima, wie in dem südlichen Frankreich und Italien. Das Gemüth des Kranken muss möglichst erheitert werden, weil eine frohe Stimmung viel zu einer bessern Reproduction beiträgt. Krankheiten in den Verdauungswerkzeugen müssen wo möglich gehoben, unterdrückte Absonderungen wieder hergestellt, zu starke Ausleerungen gehemmt werden etc.

§. 1447.

b) *Nach dem Wesen der Krankheit.* Auch bei der Behandlung der Krankheiten der Ernährung ist es von Wichtigkeit, stets im Auge zu behalten, dass wir sowohl durch Einwirkung auf das Nervensystem, als durch Veränderung des Blutes und überhaupt der den Nerven entgegenwirkenden Stoffe die Lebensprozesse umzustimmen vermögen.

1) *Behandlung der krankhaft vermehrten Ernährung.* Wir vermögen die zu starke Ernährung, wenn sie mehr den ganzen Körper betrifft, dadurch zu beschränken, dass wir die Verzehrung der organischen Stoffe im Gewebe der Organe durch Beschleunigung der Lebens-

prozesse vermehren, indem wir den Kranken wo möglich in eine Lebensweise zu versezen suchen, wodurch seine Körperkräfte andauernd angestrengt und sein Geist und Gemüth mehr in Anspruch genommen werden; ist aber die übermässige Ernährung nur örtlich zu stark, so suchen wir die Thätigkeit des leidenden Theiles zu beschränken, damit die Anziehung der ernährenden Säfte nicht in ihm überwiegend stark werde. Ebenso wirken wir auch auf den zweiten Factor der Lebensprozesse, indem wir die Blutmasse durch Verminderung der Nahrungsmittel oder Vertauschung der zu kräftigen Fleischnahrung mit mehr Pflanzenkost zu verringern suchen. Eine unmittelbare Entziehung des Blutes ist in dringenden Fällen bei übermässiger Blutbildung und bei Hypertrophie des Herzens oft nothwendig, doch ist es im Allgemeinen zweckmässiger, die Blutmenge auf die andere, angegebene Weise zu vermindern, indem wiederholte Blutentleerungen eine Anlage zu Entmischungskrankheiten zu gründen vermögen.

§. 1448.

2) *Behandlung der verminderten Ernährung.* Wir vermehren die Ernährung, indem wir die rückwärtsschreitende Metamorphose durch Verhinderung der starken Kräfteanstrengung, durch Mässigung des Fiebers, Hemmung von krankhaften Entleerungen etc. beschränken, und indem wir die gesunkene Lebensthätigkeit durch gelind erregende Mittel, Wein, Gewürze und aromatisch-tonische Mittel erhöhen, so wie auch dadurch, dass wir die Stoffe, die zur Ernährung der Organe dienen, vermehren durch Darreichung einer kräftigen Nahrung aus Fleisch, Eiern, Milch etc. Die Beschaffenheit der Nahrungsmittel muss übrigens nach dem Alter des Kranken, der Natur der Krankheit und zum Theil auch nach der Gewohnheit des Kranken sich richten, was bei den einzelnen Krankheitsarten näher erörtert werden wird.

§. 1449.

3) *Behandlung der krankhaften Umwandlung der Stoffe.* Die allgemeinen Mischungsausartungen können wir auf verschiedene Weise verbessern: 1) durch Erhöhung der Bildungsthätigkeit durch die im §. 1448 bezeichneten Mittel. Durch dieselbe wird oft nicht allein die Ernährung vermehrt, sondern auch der Art nach verändert, indem hierdurch die Bereitung einer fehlerhaften Lymphe beschränkt und eine normalere Stoffanlagerung herbeigeführt wird, wie z. B. in den Scropheln; 2) durch Beschränkung der Bildungsthätigkeit. Hierdurch wird nicht allein die das gewöhnliche Maass überschreitende Ernährung vermindert, sondern es wird auch oft die Erzeugung krankhafter Bildungen gehemmt, wie dieses z. B. bei der Lustseuche der Fall ist, bei welcher in den schwerern Fällen die Hungerkur einen sehr wichtigen Theil der Behandlung ausmacht. 3) Durch Darreichung von Stoffen, aus welchen ein besseres Blut gewonnen wird, wie z. B. der frischen Gemüse beim Scorbut, der Fleischspeisen, der China und des Eisens, wenn es am Blutroth und Faserstoff fehlt. 4) Durch Darreichung von Stoffen, die der Bildung gewisser Stoffe entgegen stehen und vielleicht diese Stoffe zerstören, wie z. B. der Säuren bei der vermehrten Neigung zur Gallenbildung und des Quecksilbers bei der Lustseuche. 5) Durch Vermehrung der Aufsaugung auf unmittelbarem Wege durch die auf die Resorption wirkenden Mittel, wie durch gewisse Narcotica, das Quecksilber, die Antimonialien, das Jod, oder auf mittelbarem Wege durch Vermehrung der Absonderungen, Verminderung der Nahrung etc. 6) Durch Vermehrung der einen oder der andern Absonderung, wodurch bestimmte Stoffe, die in dem Blute und den festen Theilen zurückgehalten waren, ausgeschieden werden, wie z. B. das Wasser in der Wassersucht; durch Erregung der Harnabsonderung,

gallichte Stoffe in der Gelbsucht durch Vermehrung der Gallenabsonderung u. s. w. 7) Durch allgemeine Veränderung der Mischung und der Bildungsthätigkeit, durch eine gänzlich veränderte Lebensweise, durch die sog. blutreinigenden Mittel, welche meistens Mittel sind, die mehr oder weniger auf sämmtliche Absonderungen wirken, durch den Gebrauch der Quecksilber-, der Antimonialmittel etc.

§. 1450.

Bei der Behandlung der Erweichung und der Verschwärung der Gewebe ist besonders zu untersuchen, ob dieselbe in einem entzündlichen Zustande begründet ist oder nicht, und im erstern Falle die in dem Kapitel von der Entzündung angegebene Verfahrungsweise einzuschlagen. Stehen diese Veränderungen der Gewebe mit einem Allgemeinleiden in Verbindung, so muss dieses gehoben werden; man muss suchen, die Scropheln, die Lustseuche, den Scharbock etc. zu heilen. In solchen Fällen müssen auch örtlich die der bestimmten Dyscrasie entsprechenden specifischen Mittel angewandt werden, wie z. B. bei syphilitischen Geschwüren, Salben und Auflösungen von Quecksilbermitteln.

Kommt eine Erweichung der Gewebe ohne entzündlichen Zustand vor, so möchte die örtliche Anwendung der tonischen und zusammenziehenden Mittel, so wie auch zuweilen der flüchtig erregenden Mittel passend sein. Bei schlaffen, reizlosen Geschwüren sind ebenfalls die tonischen und zusammenziehenden Mittel, wie Columbo, Alaun, Eisen etc. anzuwenden, bei solchen mit faulichtem und brandigem Character fäulnisswidrige und erregende Mittel, wie die Mineralsäuren, die China, der Campher. Bei innern Verschwärungen sind auch diejenigen Mittel anzuwenden, welche in der Haut einen ableitenden Krankheitsprozess erregen, wie die Blasenpflaster, die Brechweinsteinsalbe, Fontanelle, Haarseile und selbst

die Moxen. Bei den äusserlichen Geschwüren können die Mittel leichter, als bei den innern, unmittelbar auf die leidende Stelle gebracht werden, und werden in Form von Salben, Waschwassern, Umschlägen von befeuchteten Tüchern, Breiumschlägen, Pulvern, Pflastern angewandt, auch kann ein Druck-Verband angelegt und das Messer zu Hilfe gezogen werden.

§. 1451.

Die Verhärtung vermögen wir auf dreierlei Weise zu entfernen: 1) durch allmälige Auflösung, 2) durch Versezung derselben in Eiterung und 3) durch ihre Hinwegnahme vermittelst des Messers. — Die Auflösung kann auf zweierlei Wegen bewirkt werden, durch Vermehrung der Absonderung in dem leidenden Theile und dadurch bewirkte unmittelbare Ausführung stockender Stoffe und durch Erhöhung der Aufsaugung in dem verhärteten Organ. Viele der bekannten auflösenden Mittel wirken auf die erste Weise, wie z. B. die gegen die Leberverhärtung empfohlenen Mittel, welche beinahe sämmtlich die Gallenabsonderung vermehren. Um die Aufsaugung zu befördern, dienen sowohl Mittel, welche in andern als dem leidenden Theile die Absonderungen befördern, als auch solche, welche unmittelbar die Resorption erregen. Viele Mittel zeigen beide Wirkungen zugleich. Die erstere Wirkung zeigen die auflösenden Extracte, das Extractum Graminis, Taraxaci, Fumariae, Saponariae, Marrubii albi etc., die auflösenden Salze, das Calomel in eröffnender Gabe, die Gummiharze in absonderungsbefördernden Gaben, die Mittel, welche absondernde Stellen auf der Haut hervorbringen und unterhalten etc. Die leztere äussern vorzugsweise die Antimonial- und Mercurialpräparate in kleinen Gaben, Schierling, Belladonna, die Blausäure haltigen Mittel und andere Narcotica, die Gummiharze, die Seife, die Alkalien, der salzsaure Baryt, das Jod etc., endlich die

örtlichen Mittel, fette Einreibungen, Einreibungen der grauen Quecksilbersalbe, Bähungen mit einer Abkochung von Schierling oder Belladonna, einfache warme Bäder und Dampfbäder, Mercurial- und Schierlingspflaster, so wie auch nach Umständen Umschläge von Abkochungen aromatischer Kräuter, ein Pflaster von Gummi Ammoniacum, Einreibungen der Jodsalbe, des flüchtigen Linimentes, Seifenbäder, Schwefelbäder, Tropfbäder, trockenes Reiben, Electricität und Galvanismus. Nicht alle Verhärtungen ertragen jedoch die erregende Behandlung und man muss sich bei den scirrhösen Verhärtungen wohl hüten, durch die Anwendung solcher Mittel den Uebergang derselben in offenen Krebs zu veranlassen.

Die Versezung der Verhärtung in Eiterung wird man bei der Verhärtung ganz im Innern liegender Theile wohl niemals und auch bei den auf der Oberfläche liegenden Verhärtungen nur selten beabsichtigen. Dieselbe wird durch die Mittel bewirkt, die auch zur Beförderung einer schon begonnenen Eiterung dienen.

Die Ausschneidung der verhärteten Stelle findet bei der Verhärtung innerer Theile nur selten Anwendung.

§. 1452.

Gegen die Aftergebilde wendet man, insbesondere wenn ihnen ein allgemeines Leiden zum Grunde liegt, die im §. 1449 angegebene Verfahrungsweise, vorzüglich auflösende und specifisch mischungsändernde und umstimmende Mittel an, auch kann man den krankhaften Prozess durch Zerstörung der kranken Stelle durch Aezmittel oder durch Ausschneidung derselben auszutilgen suchen. Bei manchen Afterbildungen ist es übrigens rathsamer, nicht viel zu unternehmen, indem bei denselben die krankhafte Bildungsthätigkeit doch nicht gehemmt wird und ein starkes Eingreifen der Kunst eine schnellere Zerrüttung der Lebenskräfte herbeiführt.

§. 1453.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Die die Bildungskrankheiten begleitenden Nebenzufälle müssen so bald als möglich gehoben werden, indem durch dieselben die Ernährungsprozesse noch mehr gestört werden. Die Schmerzen sucht man durch Opium, Umschläge u. s. w. zu stillen, den Schlaf sucht man durch die bekannten Mittel zu Stande zu bringen, eine beginnende Entzündung durch einige Blutegel und besänftigende Umschläge zurückzuhalten, die edlen Organe sucht man auf jede Weise zu schüzen.

§. 1454.

Eintheilung der Bildungskrankheiten. Nach den angegebenen Verschiedenheiten der krankhaften Bildungsvorgänge glaube ich, diese Krankheitsfamilie in folgende Ordnungen eintheilen zu können: 1) Krankhaft vermehrte Bildungsvorgänge (die Hypertrophien). 2) Verminderte Bildungsprozesse (die Atrophien im engern Sinne; indem die eigentlichen Schwindsuchten in andern Kapiteln abgehandelt sind, da die Abmagerung nur Folge von andern Krankheitsprozessen, z. B. der Tuberkelbildung und Erweichung ist). 3) Die krankhaften Umwandlungen (Metamorphoses); die leztern zerfallen wieder in fünf Unterabtheilungen, 1) die allgemeine Mischungsausartung, 2) die Erweichung einzelner Gewebe, 3) die Verhärtung einzelner Gewebe, 4) die Afterbildungen und 5) die Erzeugung parasitischer Thiere.

Erste Ordnung der Bildungskrankheiten.

Die krankhaft vermehrten Bildungsprozesse.
(Hypertrophiae.)

Die Substanzvermehrung des Herzens.
(Hypertrophia cordis.)

§. 1455.

Es ist die Hypertrophie des Herzens eine solche Vermehrung der Substanz der Herzens, dass hierdurch der Herzschlag seine normale Beschaffenheit verliert und Fehler in der Blutbewegung und verschiedene Folgekrankheiten hervorgebracht werden.

§. 1456.

Die Hypertrophie besteht zuweilen in allen Theilen des Herzens, zuweilen nur in einzelnen. In den seltenern Fällen ist mit der Hypertrophie keine Vergrösserung der Höhlen des Herzens verbunden, meistens wird zugleich eine geringere oder stärkere Erweiterung der Höhlen angetroffen, und oft auch zeigen sich selbst die Höhlen zur Stärke der Wandungen zu gross, so dass diese verdünnt erscheinen, doch ist hiebei meistens die Substanz des ganzen, oft sehr vergrösserten Herzens beträchtlicher, als im gesunden Zustand, wenn gleich die Wandungen der Höhlen, im Vergleich zu dem Raume derselben, dünner als im normalen Zustand derselben sind.

§. 1457.

Die Krankheit entwickelt sich sehr langsam. Der Kranke fühlt allmälig immer mehr die eigene Herzbewegung und erhält besonders bei starker Körperbewegung ein aussergewöhnlich starkes Herzklopfen, mit welchem mehr oder weniger auch das Gefühl der Beengung verbunden ist.

Leidet die linke Herzkammer an Hypertrophie, so geben die Bewegungen derselben, wenn man sie zwischen den Knorpeln der fünften und sechsten Rippe untersucht, einen starken Stoss und ein weniger deutliches Geräusch als gewöhnlich, sie sind um so mehr verlängert, als die Hypertrophie beträchtlich ist. Das Geräusch der Vorkammern ist sehr kurz, wenig sonor und eben desshalb in den bedeutendsten Fällen kaum bemerklich. Die Herzschläge werden nur in einem kleinen Umfange gehört. — Die Hypertrophie des rechten Ventrikels hat die nämlichen Zeichen, nur ist das Geräusch der Expansion des kranken Ventrikels deutlicher. Von der Hypertrophie der linken Herzkammer unterscheidet sie sich dadurch, dass das Herz unter dem untern Theil des Brustbeines einen stärkern Stoss gibt, als zwischen den Knorpeln der fünften und siebenten Rippe. — Die Percussion gibt bei einer starken Hypertrophie des Herzens einen matten Ton.

§. 1458.

Die Erweiterung des Herzens (Anevrysma cordis) wird, wenn der linke Ventrikel davon befallen ist, durch einen hellen und geräuschvollen Ton bei der Ausdehnung des Herzens zwischen den Knorpeln der fünften und siebenten Rippe angezeigt, wobei dieser Ton in einem grossen Umfang wahrgenommen wird. Die Helle des Tones und sein Umfang sind das Maass der Erweiterung. Bei der Erweiterung des rechten Ventrikels hört

man besonders unter dem untern Theil des Brustbeines einen geräuschvollen Ton. Es bestehet bei der Erweiterung des Herzens das Herzklopfen vorzüglich in Vermehrung der Frequenz und des Geräusches, aber der Stoss ist meistens nicht verstärkt und selbst oft schwächer als gewöhnlich.

§. 1459.

Wenn Erweiterung der Kammern mit Hypertrophie derselben verbunden ist, so sind die Erscheinungen beider Krankheitszustände zugleich vorhanden. Die Ausdehnungen der Ventrikel geben einen starken Stoss und ein ziemlich deutliches Geräusch, die der Vorkammern sind stark tönend, die Herzschläge werden in einem grossen Umfange gehört. Die Percussion gibt einen matten Ton.

Die Zeichen der Erweiterung der Vorkammern vermischen sich in der Regel mit den Zeichen der Verlezung der Ventrikel oder der Klappen, aus der sie meistens entstanden sind.

§. 1460.

Die Krankheit geht zuweilen, wenn sie keinen hohen Grad erreicht hat, unter allmäliger Verminderung des starken Herzschlages in Gesundheit über. In den höhern Graden des Uebels wird der Herzschlag so stark, dass die Rippen auseinander getrieben werden, so dass man in den Zwischenräumen zwischen der fünften und sechsten oder dieser und der siebenten Rippe tief hineingreifen und die Spize des Herzens fühlen kann; diesem starken Herzschlage entspricht aber die Stärke des Pulses nicht, der zuweilen dabei sehr klein ist. Meistens ist eine mehr andauernde oder anfallsweise wiederkehrende Beengung vorhanden, und es bilden sich wassersüchtige Anschwellungen der Füsse und zulezt allgemeine Wassersucht aus. In einem Falle sah ich von Zeit zu Zeit Ecchymosen entstehen, besonders an den Füssen. Die

Verdauungskräfte bleiben meistens lange unverlezt und in mehrern Fällen beobachtete ich selbst einen krankhaft-vermehrten Appetit (Heisshunger). Der Tod stellt sich oft plözlich ein, indem die Kranken bei ihrer gewöhnlichen Beschäftigung oder bei einer stärkern Körperbewegung entseelt niedersinken, oder langsam, indem sich allmälig Wassersucht des ganzen Körpers ausbildet.

§. 1461.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Man findet das Herz bedeutend vergrössert und seine Substanz vermehrt, so dass das Gewicht desselben häufig mehr als zwei Pfunde, ja zuweilen selbst fünf Pfunde beträgt. [1]) Oft sind die Höhlen des Herzens nicht erweitert, ja zuweilen selbst enger als im normalen Zustand. In diesen Fällen, das heisst in der einfachen Hypertrophie des Herzens, ist die Substanz des Herzens auch fester als im normalen Zustand. In andern Fällen sind, neben der Verdickung der Wände, die Höhlen oft beträchtlich erweitert (Anevrysma cordis activum), oft aber sind bei Erweiterung der Höhlen die Wände desselben verdünnt (Anevrysma cordis passivum), in welchem Falle die Substanz des Herzens immer weicher als im gesunden Zustand ist. Zuweilen findet man auch eine partielle sackartige Erweiterung des Herzens.

§. 1462.

Anlage haben Individuen von erethischer Constitution und schwindsüchtiger Anlage. Zuweilen ist ein geringer Grad von Hypertrophie des Herzens angeboren. **Gelegenheitsursachen** sind vorzüglich wiederholte heftige Gemüthsaffecte, insbesondere Schrecken, Aus-

1) Beispiele sind in *Kreyssig's* Werk über die Krankheiten des Herzens. B. II. S. 319 angeführt.

schweifungen im Genusse geistiger Getränke, zu heftige körperliche Anstrengungen, alle Ursachen, die einen entzündlichen Zustand des Herzens herbeiführen können' z. B eine rheumatische Metastase, und solche, welche den Ausfluss des Blutes aus dem Herzen mehr oder weniger hemmen, wie z. B. Fehler der Klappen.

§. 1463.

Vorhersage. Geringere Grade der Krankheit sind heilbar, höhere Grade in der Regel unheilbar und lebensgefährlich.

§. 1464.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Der Kranke muss einer magern Kost sich bediener, von den geistigen Getränken sich gänzlich enthalten, alle Veranlassungen zu Gemüthsbewegungen möglichst meiden, dagegen mässige Körperbewegungen vornehmen, wodurch ohne Erhizung der nöthige Verbrauch der Stoffe von statten geht etc.

§. 1465.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* In der Hypertrophie werden als das Hauptmittel von Zeit zu Zeit wiederholte allgemeine und örtliche Blutentziehungen angesehen. Zugleich werden in Anwendung gebracht, Nitrum und kühlende, gelind abführende Salze, wie auch die die Herzbewegung beschränkenden narkotischen Mittel, insbesondere Digitalis und Blausäure. Von Nuzen sind auch längere Zeit fortgeseztc kalte Umschläge auf die Brust, insofern der Kranke dieselben erträgt, so wie auch ableitende Mittel, wie Blasenpflaster, Fontanelle etc. — Die nämlichen Mittel werden auch gegen das Aneurysma cordis gebraucht, wo sie aber, da die Reaction weniger kräftig als bei der Hypertrophie des Herzens ist, nur in geringerm Maasse in Anwendung gebracht werden dürfen.

§. 1466.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Bei beginnender Wassersucht müssen sogleich die diuretischen Mittel, unter welchen vorzüglich die Digitalis passt, angewandt werden. Wird die Entkräftung bedenklich, so muss von dem oben angegebenen Verfahren abgegangen und zuweilen selbst die stärkende Methode zu Hilfe gezogen werden.

Vergrösserung der Brustdrüse.

(*Asthma thymicum nach Kopp.*)

Kopp (Denkwürdigkeiten in der ärztlichen Praxis. Frankf. 1830. B. I.). — *Caspari* (Heidelberger klin. Annal. 1831. B. VII.). — *Pagenstecher* (Heidelberger klin. Annal. B. VII.). — *A Cooper* (the anatomy of the Thyme Gland. Lond. 1832.).

§. 1467.

Eine Vergrösserung der Thymusdrüse bis zu einem gewissen Grade besteht häufig, ohne dass sie Krankheitszufälle in ihrer Begleitung hat. Dieses beweisen insbesondere die Leichenöffnungen von *A. Cooper*; auch erinnere ich mich, schon öfters bei Leichenöffnungen Vergrösserungen der Thymus gefunden zu haben, ohne dass ein Krankheitszustand vorhanden war, der hiermit in ursächlichem Verhältniss stand. Zum Theil dieser Umstand, zum Theil meine bisherigen Wahrnehmungen am Krankenbette, die mich die der Thymusvergrösserung zugeschriebenen Zufälle mehr oder weniger bald von dieser, bald von jener, vermittelst des Stethoscops erkannten Veränderung in den Athmungsorganen und zum

Theil auch von einem reinen Nervenleiden herrührend erkennen liessen, veranlassen mich zu glauben, dass die Vergrösserung der Brustdrüse selten die Ursache der von ihr abgeleiteten Zufälle sei. Demungeachtet verdient das öftere Zusammentreffen von asthmatischen Zufällen mit Vergrösserung der Thymusdrüse, auf welches zuerst *Kopp* hingewiesen hat, unsere Aufmerksamkeit, und die von mehrern Aerzten gegebene, so ziemlich übereinstimmende Darstellung dieser Zufälle einen Plaz in der speciellen Pathologie.

Es geht der stärkern Brustaffection oft 8 bis 14 Tage ein katarrhalisches Leiden vor, oft aber stellt sich diese sogleich in ihrer vollkommenen Gestalt ein. Gewöhnlich zuerst im Schlafe stellen sich leichte Erstickungsanfälle ein, welchen eine mit einem jauchzenden Tone verbundene Inspiration folgt, die einer von einem krähenden Tone begleiteten Exspiration Plaz macht, wobei es den Anschein hat, wie wenn die Luft gewaltsam, aber mit Unterbrechung herausgepresst würde. Nach dem Erwachen am Morgen zeigt sich eine Engbrüstigkeit. Allmälig werden die Anfälle häufiger und drohender, und erscheinen auch am Tage, das Gesicht wird dabei roth und blau, die Glieder werden ausgestreckt, die Daumen eingeschlagen, die Zunge blau und tritt zwischen den Lippen hervor, und es gesellen sich allgemeine Krämpfe und zuweilen auch Fieber hinzu. Der Tod tritt gewöhnlich unter einem solchen Erstickungsanfall ein.

§. 1468.

Man fand bei Leichenöffnungen häufig, jedoch nicht immer, Vergrösserung der Thymusdrüse, die zu einem Gewicht von 300 bis 400 Granen gewachsen war, da sie bei Neugebornen nur 120 bis 140 Grane beträgt, auch in einzelnen Fällen die Thymusdrüse knorpelartig, und die Art. innominata von ihr wie durch einen Knorpelring eingeschlossen (*Ulrich*). Ausserdem fand man

übrigens meistens zugleich Blutunterlaufungen in der Lunge, das foramen ovale offen, Blutüberfüllung im Gehirne etc.

§. 1469.

Ursachen. Die Krankheit befällt vorzüglich Kinder im ersten Lebensjahre bis zu 15 Monaten, besonders in der Periode des ersten Zahndurchbruches, und kommt vorzüglich bei rhachitischen und scrophulösen und solchen von phthisischer Abstammung vor; sie ist häufiger bei Knaben als bei Mädchen.

§. 1470.

Behandlung. Man hat empfohlen: Blutegel, Calomel, Calomel mit Sulphur auratum antimonii, Vesicatorien auf die Brust, die Pustelsalbe hinter die Ohren, — Moschus, Klystiere von Asa foetida, Zincum hydrocyanicum, — Einreibungen von Jodsalbe, — die antirhachitischen und antiscrophulösen Mittel.

Die Substanzvermehrung der Leber.

(*Hypertrophia hepatis, Physconia hepatis.*)

Die Literatur der Leberentzündung und die der Leberkrankheiten überhaupt.

§. 1471.

Die Kranken, welche an Substanzvermehrung der Leber leiden, haben gewöhnlich eine erdfahle, in's Gelbliche spielende Gesichtsfarbe, und sind meistens etwas eingefallen im Gesichte. Die Lebergegend und der ganze Unterleib sind aufgetrieben und man fühlt oft sehr deutlich, zuweilen tief unten im Leibe und bis zur Milzgegend herübergehend den untern Rand der Leber. Der

Kranke hat das Gefühl von Druck und Schwere und zuweilen auch von Schmerz in der Lebergegend, besonders beim Umwenden des Körpers von der rechten auf die linke Seite, auch empfindet er zuweilen einen drückenden Schmerz unter dem rechten Schulterblatt oder in der rechten Wade. Das Zwerchfell wird hinaufgedrückt und dadurch die Respiration erschwert. Die Verdauung ist mehr oder weniger gestört, es sind die Zeichen des gallichten Zustandes und oft der krankhaften Magensäure und oft Magenweh vorhanden (was zum Theil von den fehlerhaften Absonderungen, zum Theil vom Druck der Leber auf den Magen bedingt sein kann). Die Stuhlentleerungen sind oft vermindert, zuweilen vermehrt. Der Kranke leidet oft an Hämorrhoiden und zuweilen auch an der schwarzen Krankheit des *Hippokrates*. Es entwickelt sich ein allgemeiner gelbsüchtiger Zustand, Abzehrung, zuweilen aber auch Fettsucht und meistens zulezt Wassersucht. — Es kann übrigens das Uebel im mässigen Grade auch viele Jahre bestehen, ohne bedeutende Störungen der Gesundheit zu veranlassen. — Bei den Leichenöffnungen findet man gröstentheils die in dem Kapitel von der Leberentzündung angegebenen Veränderungen.

§. 1472.

Anlage zur Vergrösserung der Leber haben Leute von zornmüthigem Character. **Gelegenheitsursachen** sind öfters wiederkehrende Gemüthsaffecte, der fortgesezte Missbrauch geistiger Getränke, der Aufenthalt in einer sumpfigten Gegend, langwierige Wechselfieber und die meisten Ursachen, die auch Entzündung der Leber oder eine Plethora abdominalis hervorzubringen vermögen. [1])

1) Vergl. §. 710 und §. 948.

§. 1473.

Vorhersage. Eine wirkliche Hypertrophie der Leber, das heisst eine Vergrösserung der Leber, die nicht blos von einer Ueberfüllung des Parenchyms derselben mit Säften abhängt, sondern in einer Vermehrung der Organensubstanz beruht, bildet sich nicht leicht wieder zurück, die Gefahr für das Leben hängt übrigens von der Grösse der Hypertrophie, von der etwa vorhandenen Verbindung mit Erhärtung oder Erweichung des Gewebes oder mit Afterbildungen, und vorzüglich von den Folgekrankheiten des Leberleidens ab.

§. 1474.

Behandlung. Vorzüglich hat man hier auf die Entfernung der Ursachen zu wirken, insbesondere Alles, was die Leber reizt und Stockungen im Pfortadersystem veranlassen kann, zu entfernen. Ist die Vergrösserung der Leber die Folge eines Wechselfiebers, so ist das Chininum sulphuricum das Hauptmittel. Sind Stockungen im Pfortadersystem vorhanden, so passen die in den §§. 953 und 954 angegebenen Mittel. Ist die Leber zugleich verhärtet, so sind die auflösenden Mittel anzuwenden, welche auch bei der Physconie, wenn sie ohne deutliche Verhärtung besteht, einigen Nuzen gewähren mögen.

Die Substanzvermehrung der Milz.

(*Hypertrophia lienis, Physconia lienis.*)

§. 1475.

Die Substanzvermehrung der Milz entwickelt sich meistens allmälig und ist mit einem kachektischen Zu-

stand verbunden, oft entsteht aber eine Vergrösserung der Milz, welche übrigens oft mehr in einer andauernden Blutüberfüllung, als in einem vermehrten Wachsthum des Gewebes begründet ist, auch ziemlich schnell in Folge von Entzündung und Congestion, oder ist selbst nur, wie manche Aerzte annehmen, ein Symptom eines schleichenden Entzündungsprozesses. — Die Symptome und die Folgen dieses krankhaften Zustandes, so wie die Ursachen und die Regeln der Behandlung desselben sind aus dem Kapitel von der Milzentzündung zu entnehmen.

Zweite Ordnung der Bildungskrankheiten.

Krankhaft verminderte Bildungsprozesse.

Die Darrsucht der Kinder.

(*Atrophia neonatorum*, *Paedatrophia*, *Scrophula mesenterica*, *Atrophia glandularis*, *Febris hectica meseraica.*)

Fr. Hoffmann (lat. Halle 1702). — *Chüden* (lat. Soltquel. 1726 und Göttingen 1746). — *Russel* (lat. Oxon. 1751). — *Gattenhof* (lat. Heidelberg 1775). — *Keiser* (Lemgo. 1775—84). — *Gruner* (lat. Jena 1792). — *Baumes* (Paris 1805). — *Barth* (lat. Halle 1821). — Ausserdem die Schriftsteller über Kinderkrankheiten.

§. 1476.

Die Darrsucht der Kinder ist die Abzehrung des Körpers, welche von einem krankhaften Zustand

des Lymphsystems, insbesondere der Gekrösdrüsen, ausgeht.

§. 1477.

Die Kinder sind sehr gefrässig und lieben besonders den Genuss von Mehlspeisen und Kartoffeln, und haben dagegen Abneigung vor Fleischspeisen; meistens leiden sie an Säure, haben zuweilen Durchfälle, oft aber auch mehr feste, gräuliche und thonartige Stuhlentleerungen. Hierbei magern die Kinder auffallend ab, ihr Gesicht wird eingefallen, runzlich, eingeschrumpft und stellt im verkleinerten Maassstabe das eines alten Mütterchens dar, wobei auch der Blick etwas Ernstes hat. Die Arme und Füsse werden ebenfalls mager und zulezt so abgezehrt, wie wenn sie nur aus Haut und Knochen bestünden, ebenso ist die Brust mager, so dass die Rippen beinahe so deutlich wie beim Skelette zu sehen sind, dagegen ist der Bauch sehr gross, er treibt die falschen Rippen weit hervor, meistens ist er etwas gespannt und oft kann man in demselben verhärtete Gekrösdrüsen fühlen. Die kleinen Kinder weinen sehr viel, werden auch häufig von Kolikschmerzen geplagt, sie leiden viel an leichten Gichtern. Viele Kinder haben die sogenannten Mitesser in grosser Zahl. In dem höhern Grade der Krankheit gesellt sich ein hektisches Fieber hinzu.

§. 1478.

Diese Krankheit hat einen chronischen Verlauf. In Gesundheit geht sie bei besserer Pflege des Kindes unter allmäliger Zunahme des Körperumfanges über, in den Tod durch Schwäche unter der höchsten Abmagerung des Körpers. Oefters beschliessen auch Anfälle tödtlicher Zuckungen den Verlauf der Krankheit.

§. 1479.

Bei den Leichenöffnungen findet man die Gekrösdrüsen oft bis zu der Grösse eines Tauben- oder Hühnereies angeschwollen, violettroth oder auch im

Innern in eine speck- oder käseartige Masse verwandelt, zuweilen jedoch findet man die Gekrösdrüsen, auch bei sehr grossem Unterleibe und der vollkommensten Abmagerung, nur wenig angeschwollen, doch sind sie meistens hiebei etwas violett gefärbt. Zuweilen ist auch die Leber vergrössert, die Gallenblase ist mit einer blassen und dünnen Galle angefüllt. Manchmal kommen Geschwüre im Darmkanal vor.

§. 1480.

Anlage. Diese Art der Darrsucht kommt beinahe nur bei Kindern und zwar in den ersten Lebensmonaten vor, doch gibt es auch zuweilen Fälle, in welchen Erwachsene an Gekrösdrüsenverhärtung und dadurch bedingter Abmagerung leiden. Scrophulöse Kinder sind vorzüglich zu dieser Krankheit geneigt.

Gelegenheitsursachen sind vorzüglich Ueberfütterung, besonders mit schlecht bereitetem Mehlbrei, Kartoffeln etc., Mangel an Reinlichkeit, eine feuchte und dunkle Wohnung etc., wesshalb auch diese Krankheit vorzüglich in der ärmern Volksklasse angetroffen wird. Ausserdem vermögen aber auch bei Kindern und bei Erwachsenen alle Ursachen, die Entzündung des Gekröses zur Folge haben können, die Krankheit zu erzeugen, insbesondere bemerkte man Entzündung, Anschwellung und Verhärtung von Gekrösdrüsen in Folge der Syphilis, der Bleivergiftungen, der Blattern, des Scharlaches, des Typhus, des Nervenfiebers etc., worin auch theilweise der Grund der langsamen Reconvalescenz nach diesen Krankheiten liegen mag.

§. 1481.

Das Wesen der Pädatrophie wird gewöhnlich in der Anschwellung und Verhärtung der Gekrösdrüsen gesucht, wodurch die Fortbewegung und allmälige Umwandlung des Chylus gehemmt werde, und es ist nicht zu läugnen, dass durch den bezeichneten Zustand der

Gekrösdrüsen Abmagerung herbeigeführt werden kann; doch ist der nächste Grund der Krankheit in der schlechten Bereitung des Chylus selbst anzunehmen, da die Krankheit vorkommt, ohne dass die Gekrösdrüsen, oft nur einzelne wenige ausgenommen, vergrössert oder erhärtet sind.

§. 1482.

Vorhersage. Der Ausgang der Krankheit richtet sich vorzüglich nach den äussern Verhältnissen, in welchen der kleine Patient sich befindet. Ist eine sorgfältige Pflege zu erwarten, so darf die Hoffnung zur Genesung auch bei sehr weit gekommenem Uebel nicht aufgegeben werden, findet das Gegentheil statt, so ist der Kranke verloren.

§. 1483.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Wurde das Kind künstlich ernährt, so ist es meistens sehr zuträglich, ihm eine gesunde Amme, die nicht viel früher, als die Mutter des Kindes, geboren hat, zu halten. Der Mehlbrei muss gut bereitet oder an die Stelle desselben Zwiebackbrei gesezt werden, es kann frühzeitig etwas Eigelb und Fleischbrühe gegeben werden; niemals darf aber dem Kinde zu reichlich Nahrung gereicht werden. Eine eigentliche Wasserkost, das heisst eine Bereitung der Speisen, z. B. des Zwiebackbreies mit Wasser und Darreichung von alleinigem Zuckerwasser zum Getränk ist nachtheilig und die Darreichung von gekochter Milch und eines Breies mit Milch gekocht viel zweckmässiger. Das Kind muss fleissig gewaschen, gebadet, in die frische Luft und an das Sonnenlicht gebracht werden etc.*)

§. 1484.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krank-*

*) Vergl. d. Behandl. der Scropheln.

heit. Insofern Anschwellungen der Gekrösdrüsen vorhanden sind, passen die bei der Behandlung der Scropheln angegebenen auflösenden Mittel, die auflösenden Extracte, der Aethiops antimonialis (Nro. 78), die *Plummer*'schen Pulver, die Terra ponderosa salita etc. (Nro. 79), die Hauptanzeige bleibt aber immer die Erregung einer kräftigen Verdauung, zu welchem Zwecke, ausser den gehörigen Nahrungsmitteln, erregende und tonische Mittel angewandt werden können, aromatische und gewürzhafte Mittel, wie z. B. das schon von *Kämpf* und neuerlich wieder von *Gölis* empfohlene Pulver von gleichen Theilen Baccae Lauri (vorher in Brodteig gebacken), Nux moschata und C. C. ust. und zwei Theilen Süssholzpulver, zweimal täglich zu einem Theelöffel voll, der Eichelkaffe, die wässerigte und geistige Rhabarbertinktur, leicht bittere Extracte und mit gewisser Vorsicht China und Eisen (Nro 88 u. 89). Hiermit werden aromatische Bäder, Salz-, Stahlbäder etc., so wie geistige und aromatische Einreibungen und Reibungen mit Tüchern, die mit aromatischen Stoffen durchräuchert sind, verbunden.

§. 1485.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Hier, wie bei den Scropheln, muss man suchen, die Säure der ersten Wege zu tilgen, Würmer zu entfernen, Durchfälle zu stillen, eine etwa vorhandene entzündliche Reizung der Eingeweide durch besänftigende Mittel zu mässigen etc.

Die Nervenschwindsucht.

(*Tabes nervosa, Atrophia nervosa.*)

G. G. Richter (lat. Gött. 1744). — *Truka de Krzowitz* (hist. febr. hect. Wien 1783). — *Sachtleben* (Versuch einer med. clin. oder praktischen Pathologie und Therapie der auszehrenden Krankheiten. 2 Bde. Danzig 1792).

§. 1486.

Unter *Nervenschwindsucht* versteht man die Abzehrung des Körpers, welche von einem Allgemeinleiden des Nervensystems ausgeht.

§. 1487.

Sind die Individuen, welche von dieser Krankheit befallen werden, Frauenzimmer, so leiden sie meistens an hysterischen Zufällen, sind es Männer, an Hypochondrie. Die Kranken fühlen sich über ihre Lage unglücklich, eine unbefriedigte Sehnsucht, Kummer, Aerger, irgend eine Leidenschaft zehrt in ihrem Innern, ihr Schlaf ist unruhig und kurz, leicht tritt Herzklopfen ein, meistens fehlt der Appetit, die Verdauungskräfte liegen darnieder und hiebei zehrt der Körper immer mehr ab und schwinden die Kräfte. Ist diese Abmagerung bis zu einem gewissen Grade gediehen, so zeigen sich nun Spuren des hektischen Fiebers. Es stellen sich zuweilen Hize der Wangen und der Handflächen und Morgenschweisse ein. In einem spätern Zeitraum der Krankheit macht das Fieber oft zwei Exacerbationen, die eine und stärkste gegen Abend, die andere am Mittag oder in den Nachmittagsstunden (*Haase*). Sodann erreicht die Körperschwäche den Grad, dass der Kranke das Bett nicht mehr verlassen kann, die Schweisse werden schmelzend, es stellen sich auch Durchfälle ein

und Schwämmchen im Munde, der Kranke wird heiser, zuweilen gehen die Haare aus, es bilden sich Oedeme, dabei fällt der Kranke in ein Irrereden und zulezt bilden sich auch noch Lähmungen aus.

§. 1488.

Die Krankheit hat einen ganz langwierigen, oft mehrere Jahre sich hinziehenden Verlauf. Noch nicht zu weit entwickelt, geht sie, besonders bei veränderten Verhältnissen des Kranken, oft ziemlich schnell in Gesundheit über. Der Tod wird durch Erschöpfung der Kräfte herbeigeführt.

§. 1489.

Anlage haben mehr Individuen weiblichen Geschlechts, als Männer, besonders solche mit sehr reizbarem Nervensysteme. Gelegenheitsursachen sind vorzüglich unbefriedigte Sehnsucht, häufiger Verdruss, gekränktes Ehrgefühl, Nahrungssorgen, übermässige Geistesanstrengung, Nachtwachen, der Missbrauch geistiger Getränke und des Kaffee's, vorhergegangene Nervenfieber, andauernde schmerzhafte Krankheiten, Krampfkrankheiten etc.

§. 1490.

Das Wesen der Krankheit ist allmälige Verzehrung der Nervenkraft, mit zugleich statt findender Reizung des Nervensystems und das hiedurch bedingte Darniederliegen des Prozesses der Reproduction.

§. 1491.

Vorhersage. Der Erfolg der Behandlung hängt vorzüglich von der Gestaltung der äussern Verhältnisse des Kranken ab, immer aber gehört dieses Leiden zu den gefährlichern Zuständen und führt oft unerwartet schnell eine tödtliche Erschöpfung herbei.

§. 1492.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Der Arzt suche die unglückliche Lage des

Kranken nach Kräften zu verbessern, er suche bei den Umgebungen desselben eine möglichst freundliche Behandlung des Kranken zu bewirken, bezeige sich selbst, je verlassener der Kranke in der Welt steht, desto theilnehmender und aufmerksamer gegen ihn, er suche ihn in angemessene Gesellschaft zu bringen, er rathe ihm eine erheiternde Lectüre, den Aufenthalt an einem freundlichen Badeorte oder eine Reise an. Zuweilen ist die Verehelichung das einzige Rettungsmittel. Auch bekämpfe man auf's kräftigste die etwa schon bestehenden, das Nervensystem zerrüttenden Krankheiten, wie z. B. heftige Schmerzen etc.

§. 1493.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Der krankhafte Zustand im Nervensystem, der dem Leiden zum Grunde liegt, ist zugleich Erregung und Schwäche, und es ist daher die besänftigende und die stärkende Methode angezeigt. Zur Beruhigung des Nervensystems werden hier vorzüglich die Mittel, die gegen Hysterie im Gebrauch sind, empfohlen, die Chamillen, Valeriana, Asa foetida, das Castoreum, der Moschus etc., einen entschiedenen Nuzen bringen bei grosser Reizung des Nervensystems das Opium und das Morphium aceticum hervor, welche Mittel jedoch nicht anhaltend fortgesezt werden dürfen. Ist das Herz und das Gefässsystem sehr beweglich, so dienen die Digitalis, das *Haller*'sche Sauer etc. Um zu stärken, ist eine gut nährende Kost, mit etwas gutem, altem Weine, so wie der Aufenthalt in einer gesunden Wohnung und gesunden Gegend nothwendig. Dabei verordnet man dem Kranken Milch- und Molkenkuren, den Gebrauch des isländischen Mooses und anderer bitterer Mittel, der China, des Chininum sulphuricum, Eisenpräparate und insbesondere den Gebrauch der eisenhaltigen Mineralwasser, z. B. dessen von *Pyrmont* an der Quelle getrunken.

§. 1494.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Den Schlaf sucht man durch angemessene Körperbewegung, insbesondere durch Fahren, durch Vermeidung alles dessen am Abend, was den Geist oder das Gemüth erregt, und im Nothfalle durch Opium zu Stande zu bringen. Durchfälle, Blutflüsse und andere schwächende Zufälle müssen ohne Verzug gehoben werden.

Die Rückendarre.

(*Rückenmarkschwindsucht, Tabes dorsalis.*)

Die in dem Kapitel über den Saamenfluss angegebenen Schriftsteller. Ausserdem *Brendel* (lat. Göttingen 1749). — *W. Horn* (mit einer Vorrede von E. Horn. Berlin 1827).

§. 1495.

Die Rückendarre ist die Art von Abzehrung, die mehr oder weniger deutlich mit einem Rückenmarksleiden in Verbindung steht und durch übermässige Geschlechtsreizungen und Saamenentleerungen erzeugt wird.

§. 1496.

Die Kranken, bei welchen sich die Rückendarre auszubilden beginnt, fühlen die gewöhnlichen Folgen zu häufiger Saamenausleerungen in höherm Grade; insbesondere fühlen sie eine ungewöhnliche Schwäche in den Füssen und ihr Gang wird so zu sagen kreuzlahm, der Körper magert immer mehr ab und es stehen insbesondere die Dornfortsäze der Rückenwirbel stark hervor. Die Kranken haben nun häufig das Gefühl, wie wenn Ameisen den Rücken herunter kröchen, oder laues oder kaltes Wasser an demselben herunter riesle, ihr Kopf ist ein-

genommen, sie leiden oft an Schwindel, das Gedächtniss und überhaupt die Geisteskräfte werden, so wie die Sinne, insbesondere der des Gesichtes, schwach. Oft leiden dabei die Kranken an mancherlei Krämpfen, die Hoden werden krampfhaft gegen den Bauchring gezogen, sie leiden an asthmatischen Zufällen, zuweilen kommen selbst bei männlichen Individuen Krämpfe vor, die ganz den hysterischen gleichen, manchmal die Fallsucht. Die Kranken sind sehr niedergeschlagen und oft der Verzweiflung nahe. Die Verdauungskräfte liegen darnieder, der Appetit fehlt, die Stuhlentleerungen sind fest. Allmälig stellt sich auch ein trockenes Hüsteln und sodann Schleim- und Eiterauswurf ein. Ein hektisches Fieber mit colliquativen Schweissen und Durchfällen gesellt sich hinzu, oft auch Lähmungen, besonders der untern Gliedmassen.

§. 1497.

Diese Krankheit entwickelt sich gewöhnlich erst im Verlaufe von mehrern Jahren bis zu ihrem höchsten Grade, doch kann sie auch in wenigen Monaten zu einer bedenklichen Höhe sich steigern. In Gesundheit geht sie über nach dem Aufhören der Saamenentleerungen durch allmälige Zunahme der Kräfte, in den Tod durch Auszehrung und zuweilen auch, nachdem noch ein wassersüchtiger Zustand sich ausgebildet hat.

§. 1498.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Man findet nicht immer Veränderungen im Rückenmark, doch oft auch das Rückenmark theilweise, besonders an der cauda equina, geschwunden und mehr oder weniger erweicht, die Gefässe in den Häuten des Rückenmarkes oft überfüllt. Meistens sind zugleich die Veränderungen, die die Lungenschwindsucht characterisiren, vorhanden.

§. 1499.

Die alleinige Ursache dieser Krankheit sind über-

mässige Geschlechtsreizungen, besonders bei männlichen Individuen, und die damit verbundenen Saamenentleerungen, vorzüglich wenn dieselben in früher Jugend stattfinden. Die gewöhnlichste Veranlassung zu diesem Leiden gibt die Onanie, oft auch zu häufig gepflogener Beischlaf. — Andere auf das Rückenmark und das Nervensystem einwirkende Krankheitseinflüsse, z. B. Metastasen auf das Rückenmark, können wohl ein ähnliches Leiden, doch nicht leicht ganz dieselbe Krankheitsform hervorbringen.

§. 1500.

Wesen. Es scheint die erwähnte Gelegenheitsursache der Rückendarre auf zweifache Weise diese Krankheit hervorbringen zu können, 1) durch Schwächung des Nervensystems und des Rückenmarkes insbesondere, und 2) durch andauernde Reizung desselben. Die Schwächung wird herbeigeführt sowohl durch den häufigen Verlust des Saamens, durch dessen Bereitung ein grosser Aufwand von Nervenkraft erfordert zu werden scheint, als auch durch die Geschlechtsreizung und besonders in dem Moment der Saamenentleerung selbst, in welchem viel Nervenkraft verloren geht. Hierdurch scheint zuerst das feinere in den Nerven wirkende Agens vermindert zu werden und sodann auch die Substanz selbst zu leiden, wenigstens schwindet oft der untere Theil des Rückenmarkes, zu welchem die Geschlechtstheile in besonderer Beziehung stehen. Neben dieser wahren Nervenschwäche besteht zugleich Reizung, die vorzüglich auch auf das Rückenmark zu wirken scheint und vielleicht manchmal einen schleichenden Entzündungszustand in demselben veranlasst. Durch diese Nervenschwäche ist die Schwäche aller Verrichtungen des Körpers und namentlich auch der Ernährung bedingt, da aber zugleich Reizung vorhanden ist, so entstehen Krämpfe, Husten, schleichende Entzündungen; Vereiterungen etc.

§. 1501.

Vorhersage. Die Rückendarre ist eine sehr gefährliche Krankheit; der Ausgang derselben hängt von dem Grade, den sie erreicht hat, und vorzugsweise von der Möglichkeit und Unmöglichkeit, die Saamenentleerungen zu hemmen, ab.

§. 1502.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Da Alles davon abhängt, die Geschlechtsreizung nicht mehr eintreten zu lassen und den Saamenfluss zu heilen, so müssen vor Allem mit Nachdruck und Beharrlichkeit die Mittel in Anwendung gebracht werden, die gegen die bezeichnete Ursache der Krankheit gerichtet und in den §§. 1144 — 45 angegeben sind.

§. 1503.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Befindet sich das Nervensystem in einem sehr gereizten Zustande, so dienen besänftigende Mittel, der vorsichtige Gebrauch des Opiums und des Morphium aceticum, auf den Rücken angewandte Mittel, selten möchten Blutegel oder Schröpfköpfe wegen der allgemeinen Schwäche passen, eher Einreibungen, Reibungen des Rückens mit durchräucherten Tüchern, das Sezen von Fontanellen etc. In einem sehr weit gediehenen Falle bewirkte ich Heilung durch die zweimalige Anwendung von 6 *Larrey*'schen Moxen längs dem Rücken hinunter gesezt, nebst dem innerlichen Gebrauch von Morphium aceticum und stärkenden Mitteln. Um die Reproduction zu unterstüzen, dienen gut nährende Nahrungsmittel und stärkende Arzneimittel, insbesondere China und Eisen, doch muss die Anwendung derselben stets in der Art statt finden, dass durch dieselbe keine zu kräftige Erregung hervorgebracht und die Saamenentleerungen nicht vermehrt werden.

§. 1504.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Die Durchfälle müssen möglichst gehemmt werden, die Schweisse durch *Haller*'sches Sauer etc. gemässigt werden, damit durch diese Zufälle die Erschöpfung nicht allzuschnell überhand nehme.

Die Darrsucht der Greise.

(*Das Austrocknen der Greise, Auszehrung aus Altersschwäche, Marasmus senilis.*)

Farr (lat. Bristol 1773). — *Nagel* (Altona 1829).

§. 1505.

Die Darrsucht der Greise ist die Abzehrung des Körpers mit Erschöpfung der Kräfte, welche die natürliche Folge des hohen Alters ist.

§. 1506.

Etwas früher oder später nimmt im hohen Alter der Umfang des Körpers allmälig ab und zulezt wird der Kranke sehr mager, so dass die Knochen im Gesichte hervorstehen und die Flechsen an den Händen deutlich zu sehen sind. Die Haut wird runzlig, verliert das Weiche, wird pergamentartig, die Epidermis spröde, häufig trifft man dunkelrothe Flecken von ergossenem Blute, besonders an dem vordern Theil der Arme an (Purpura senilis *W.*). Die Arterien zeigen sich stellenweise verknöchert. Die Glieder sind schwer beweglich, die Gelenke wie steif, die Knochen aber leicht zerbrechlich. Der Kranke wird durch geringe Körperbewegung erschöpft oder ist selbst beständig genöthigt im Lehn-

stuhle oder im Bette zu verweilen, sein Gehör und sein Gesicht sind schwach, seine Geisteskräfte gesunken, insbesondere leidet das Gedächtniss oft sehr und es entwickelt sich selbst ein ganz stupider Zustand. — Dabei leidet der Kranke oft noch an verschiedenen besondern Beschwerden, an dem Hautjucken, Harnzwang und unwillkürlichen Abgange des Harnes, Verschleimung der ersten Wege und der Lunge, Engbrüstigkeit, zuweilen schwellen die Füsse wassersüchtig an oder es stellt sich von selbst der Brand an denselben ein (Gangraena senilis). Zuweilen verfällt der Kranke zulezt in ein Fieber mit Irrereden und einem soporösen Zustand, mit trockener brauner Beschaffenheit der Zunge etc., das im Ganzen den Ausdruck eines nervösen Fiebers mit vorherrschender Kopfaffection hat und gewöhnlich in 7 bis 14 Tagen tödtet (Febris soporosa senum Burser).

§. 1507.

Es kann der beschriebene Zustand sich wieder bis auf einen gewissen Grad vermindern, so dass die Alten wieder etwas kräftiger und auch im Geiste freier werden und das Leben noch eine geraume Zeit gefristet wird; meistens aber führt derselbe, ohne dass noch ein besserer Zustand mit ihm wechselt, zum Tode.

§. 1508.

Die Ursache der erwähnten Beschaffenheit des Körpers und der Kräfte ist das Greisenalter, doch tritt dieser Zustand bald früher, bald später ein, zuweilen schon mit dem 70sten Jahre, häufiger mit dem 80sten, oft erst mit dem 90sten und selbst erst mit dem 100sten und noch später. Eine schwächliche Constitution des Individuums, eine frühere nachtheilige Lebensweise, namentlich Geschlechtsausschweifungen noch im vorgerückten Alter und noch fortgesezte schädliche Einflüsse, z. B. eine niedergebeugte Gemüthsstimmung und schlechte

Nahrung, befördern den frühern Eintritt dieser Art von Darrsucht.

§. 1509.

Die nächste Ursache der Darrsucht der Greise liegt in dem Uebergewicht, welches im höhern Alter nach und nach die dem Nervensysteme entgegenwirkenden Similartheile im ganzen Organismus über das Nervenagens erhalten, und in den hiedurch bedingten Veränderungen und geringern Verwandtschaft dieser Theilchen zum Nervenagens. Es wechselt nämlich das Verhältniss des Nervensystems zu den demselben entgegenstehenden Stoffen andauernd in der Art, dass sogleich nach der Entstehung des Thieres die Masse des Nervensystems zu der der übrigen Theile des Körpers am grössten ist und sodann bis zur Vollendung des Wachsthums nach bestimmten Gesezen abnimmt. Nach meinen Messungen ist bei einem menschlichen Foetus von 9 Wochen die Masse des Gehirns und Rückenmarkes der $4^{14}/_{15}$ Theil des ganzen Körpers, bei dem neugebornen Kinde der $7^{97}/_{153}$ Theil und bei einem erwachsenen, schlank gebauten jungen Manne nur der $44^{5}/_{18}$ Theil. Auf eine ähnliche Weise nimmt auch, so weit meine Messungen gehen, die Masse der Centraltheile des Nervensystems im Verhältniss zur Masse der übrigen Stoffe in der ganzen Thierreihe mit dem Alter ab. Ist das Wachsthum in der Längenachse vollendet, so nimmt noch in der Regel das in der Breite und Dicke einige Zeit zu, so dass auch hierdurch das Verhältniss der Nerven zu den übrigen Stoffen ungünstiger wird. Zugleich nehmen aber auch die Stoffe allmälig eine andere Beschaffenheit an, es nimmt das Flüssige und Weiche ab, das Feste, Harte, Erdige wird vorherrschend, selbst in der Nervensubstanz, wodurch die Nerventhätigkeit geschwächt und hierdurch, wie bei Lähmung, die Stoffanlagerung gehemmt wird, während die rückschreitende Metamorphose

nicht still steht. Die dem Nervenagens entgegenwirkenden Stoffe werden diesem immer mehr fremdartig, die Wechselwirkung zwischen beiden Factoren der Lebensprozesse immer mehr beschränkt, bis zulezt diese erlöschen.

§. 1510.

Behandlung. Wir suchen, die Nerven zu beleben durch Erheiterung des Gemüthes, passende Erregung der Geistesthätigkeit, die mässige Darreichung eines guten Weines und nach Umständen durch innerlich gegebene erregende, besonders auf das reproductive System wirkende Arzneimittel, so wie auch durch Waschungen und Bäder, und den Wiederersaz der Stoffe zu befördern durch eine sehr nahrhafte und mehr flüssige als feste Kost, z. B. durch Brühen von Bouillontafeln und Eigelb bereitet, frischgemolkene Milch, aber auch gutes Fleisch etc.

Dritte Ordnung der Bildungskrankheiten.

Krankhafte Umwandlungen der flüssigen und festen Theile.

(*Metamorphoses.*)

Erste Gruppe:

Die allgemeinen Mischungs-Ausartungen.

(Dyscrasiae.)

Die Scropheln.

(Die Scrophelkrankheit, die Drüsen, Scrophulae, Morbus scrophulosus.)

Kortum (lat. Lemgo 1789—90, deustsch ebend. 1793. 4 Bde.) — *Hamilton* (Lond. 1791, a. d. Engl. Lpz. 1793). — *Hufeland* (Jena 1795—97. 3te Aufl. Berlin 1819). — *Carmichael*, *Henning* und *Goodland* (a. d. Engl. v. Choulant. Lpz. 1818). — *Fare* (Lond. 1818, a. d. Engl. v. Becker. Leipzig 1820). — *v. Vering* (Wien 1829). — *Lugol* (Mémoire sur l'emploi de l'iode dans les maladies scrophuleuses. Paris 1829, mit Fortsezungen 1830 u. 31).

§. 1511.

Die **Scropheln** sind die Kachexie, welche sich durch den weiter unten beschriebenen eigenthümlichen Habitus und, bei völliger Ausbildung der Krankheit, vorzüglich durch Anschwellung von lymphatischen Drüsen zu erkennen gibt.

§. 1512.

Die noch nicht vollständig entwickelte Krankheit nennt man auch die scrophulöse Anlage oder den ersten

Grad der Scropheln. Haben die Kinder eine erethische (arterielle) Constitution, so ist die scrophulöse Anlage oft schwer zu erkennen. Die schönen blonden und blauäugigen Kinder haben eine krankhaft zarte Haut, das Fleisch ist zu schlaff, die Röthe der Wange ist einigermassen umschrieben, die Kinder sind lebhaft und leicht angegriffen; bei etwas deutlicher Anlage zeigt sich auch die Oberlippe und die Nase etwas dick. Haben Kinder mit tropider (venöser) Constitution die scrophulöse Anlage, so sind die Kinder meistens hässlich, von bleicher und erdfahler Gesichtsfarbe, dickem Kopf, dicker Oberlippe und Nase, breiten Kinnladen, kurzem Halse, schwammigem Fleische, dickem Bauche, träge und zuweilen simpelhaft. Oft zeigen sich schon sehr frühe leichte Krankheitszufälle, welche auf die Scropheln hindeuten, die Hizblätterchen, die Milchborke oder die Crusta serpiginosa; ihr Urin ist häufig trübe, sie haben leicht Würmer, Säure des Magensaftes, Gefrässigkeit, einen dicken Leib, sie zahnen spät und die Zähne werden gerne schwarz, sie lernen spät gehen und zeigen eine Hinneigung zur englischen Krankheit.

§. 1513.

Bei der ausgebildeten Form der Krankheit zeigen sich Anschwellungen der lymphatischen Drüsen, besonders am Halse, aber auch unter den Achseln, in den Weichen, wodurch ein ungegründeter Verdacht des Bestehens venerischer Bubonen erregt werden kann, so wie im Gekröse, wodurch die Darrsucht der Kinder erzeugt wird. Diese Drüsen haben oft nur die Grösse von Erbsen, es können aber auch dieselben bis zu der einer Nuss oder eines Hühnereies wachsen und bei deren Vereinigung mehrere grosse Geschwülste am Halse sich bilden. Mit denselben dürfen die nur zufälligerweise durch Verkältung, das Auflegen von Blasenpflastern etc. entstandenen, gewöhnlich nur einzeln vorkommenden und bald auch

wieder verschwindenden Anschwellungen lymphatischer Drüsen (Hagedrüse, Scrophula fugax) nicht verwechselt werden. Die scrophulösen Drüsengeschwülste werden oft sehr hart, sind aber unschmerzhaft, sie nehmen zuweilen nach gewissen Perioden zu und ab, oft entzünden sie sich, vereitern theilweise, brechen auf und bilden die scrophulösen Geschwüre. Nebst dem bilden sich oft auch an andern Stellen der Haut, z. B. über dem Brustbein, Entzündungen, die den Furunkeln nicht unähnlich, aber weicher als dieselben sind, aufbrechen, einen dünnen Eiter von sich geben und ebenfalls Geschwüre zurüklassen. Die scrophulösen Geschwüre haben harte, ungleiche Ränder, welche unterhöhlt sind; sie sind schmerzlos, ihre Umgegend zeigt eine blasse oder violette, glänzende Röthe, ihr Grund ist mit etwas Lymphe oder dünnem Eiter bedeckt; wenn sie heilen, hinterlassen sie hässliche, vertiefte und harte Narben. Manchmal erkranken auf ähnliche Weise, wie die lymphatischen Drüsen, auch die Speicheldrüsen, die Mandeln und die Brustdrüsen. Häufig bilden sich hierbei Augenentzündungen aus und zwar vorzüglich eine schleichende Entzündung der *Meibom*'schen Drüsen und die eigentliche scrophulöse Augenentzündung, bei welcher so leicht sich auf der Hornhaut Bläschen und Geschwüre bilden, zu welchen sich strickförmige Gefässbündel hinziehen, die dieselben umkränzen, und wobei heftige Lichtscheue und Augenliederkrampf statt findet. Seltener kommen Entzündungen der Nase vor. Die Kranken leiden an Ausschlägen, besonders im Gesichte, die mehr oder weniger den herpetischen Character haben. Die Schleimhäute sind oft ergriffen, der Kranke hat viel den Schnupfen, einen Ohrenfluss (Otorrhoea scrophulosa), einen Schleimfluss aus den Geschlechtstheilen (scrophulöser Tripper); sehr häufig werden in den höhern Graden der Krankheit die Knochen angegriffen, es entstehen der Knochenfrass, der Winddorn, Gelenksleiden, insbe-

sondere Gliedschwamm. Oft entwickelt sich aus den Scropheln die englische Krankheit und langwierige Gehirnwassersucht, und gerne bilden sich Lungenknoten aus und es entsteht daher, besonders in dem Jünglingsalter, Lungenschwindsucht.

§. 1514.

Der Verlauf der Scropheln ist sehr langwierig. Es kann sich die Krankheit, besonders wenn das erkrankte Individuum noch im Kindesalter oder im Alter der Entwicklung der Mannbarkeit begriffen ist, allmälig verlieren, doch bleibt meistens eine scrophulöse Anlage zurück. Den Tod führt die Krankheit langsam herbei durch Mangel der Ernährung, besonders bei Anschwellung der Gekrösdrüsen, und durch Verzehrung der Kräfte durch die bei dem Knochenfrass vor sich gehende Vereiterung und Schmerzen, wo immer noch ein Zehrfieber sich hinzugesellt, durch die sich zuweilen ausbildende Lungenschwindsucht, durch Gehirnwassersucht, durch Geschwülste, die sich im Gehirn bilden und Epilepsie und Lähmungen hervorbringen, und durch schleichende innere Entzündungen in verschiedenen Theilen.

§. 1515.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Man findet die erhärteten Drüsen in eine weisslich gräuliche, mehr oder weniger speckartige und oft beinahe knorpelartige Masse verwandelt, in manchen Fällen sind sie in die käseartige Masse übergegangen, die auch in den Lungentuberkeln vorkommt, und oft ist diese käseartige Masse in der Mitte erweicht und zu Eiter umgewandelt. Ausserdem trifft man die in der Darstellung des Verlaufes der Krankheit angegebenen Knochenaffectionen und die andern erwähnten Entartungen an.

§. 1516.

Anlage. Die Scrophelkrankheit ist oft angeerbt und angeboren, oder es hat, wenn auch die Eltern nicht

an der nämlichen Krankheit litten, dieselbe doch in der Zeugung ihren lezten Grund, indem eines oder beide Eltern schwächlich, zu alt oder zu jung waren, oder an Schwindsucht, Lustseuche, Gicht, Nervenübeln etc. litten. Die Krankheit entwickelt sich meistens schon in dem Kindes- und Knabenalter, sehr selten erst in dem Mannesalter; bei Individuen weiblichen Geschlechts soll dieselbe häufiger vorkommen, als bei dem männlichen Geschlechte.

Gelegenheitsursachen sind vorzüglich der Genuss fehlerhafter und besonders zur Säureerzeugung Veranlassung gebender Nahrungsmittel, z. B. schlecht bereiteter Mehlspeisen, der zu reichliche Genuss von Kartoffeln, ferner der Aufenthalt in einer feuchten Wohnung, wo weder das Sonnenlicht, noch die frische Luft gehörigen Zutritt haben, grosse Unreinlichkeit des Körpers, Mangel an Bewegung, zu frühe Geistesanstrengung, der Missbrauch von Abführungsmitteln etc. Auch scheinen zuweilen die Lustseuche, der Keuchhusten, die Blattern und auch wohl manchmal die Kuhpocken die lezte Veranlassung der Entwicklung der Scropheln zu werden.

§. 1517.

Ueber das Wesen der Krankheit besizen wir keine zuverlässige Kenntniss, als die, dass das lymphatische System und besonders die lymphatischen Drüsen der vorzugsweise und wie es scheint primäre Siz der Krankheit sind. Man glaubt, dass eine Stockung und Entartung der Lymphe statt finde und hierdurch die Reproductionsprozesse im Gewebe der Organe ebenfalls leiden. Die ältern Aerzte haben eine eigenthümliche scrophulöse Schärfe (Miasma scrophulosum) angenommen. *Schäfer* [1]) ist der Meinung, dass eine Anhäufung der

1) Kinderkrankheiten. S. 414.

nicht gehörig ausgeleert werdenden Phosphorsäure statt finde. Neuere glauben, dass der Chylus unvollkommen bereitet sei, namentlich ist *Sundelin* [1]) der Ansicht, dass der Eiweissstoff in demselben im Uebermaas vorherrsche. *Willis* leitet die Krankheit von verdorbenem Magensaft, *van Helmont* von Säure in den ersten Wegen ab, und *Hausmann* und *Hecker* glaubten, dass sie aus der Lustseuche entsprungen sei. [2])

§. 1518.

Vorhersage. Die Scropheln werden in der Mehrzahl der Fälle nicht unmittelbar lebensgefährlich, sie sind aber schwer zu heilen, wenn der Kranke schon in dem Jünglings- oder Mannesalter sich befindet. Am gefährlichsten ist die Krankheit, wenn sich Knochenleiden entwickeln, wiewohl auch ein solches zuweilen geheilt wird, und wenn in den Lungen und andern edlen Theilen sich Entartungen bilden.

§. 1519.

Behandlung der Scropheln. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Vor Allem muss darauf gesehen werden, dass in dem Verhalten des Kranken nichts störend auf die Ernährung wirke. Werden Kinder von einer Amme gesäugt, so muss dafür gesorgt werden, dass man sich keiner Amme bediene, die viel früher geboren hat, als das Kind zur Welt kam, indem in diesem Falle die Milch zu nährend und zu fett ist. Die Amme oder die Mutter darf, wenn sie das Kind stillen soll, auch nicht selbst an Scropheln, Schwindsucht, weissem Flusse, Flechten etc. leiden. Wird das Kind künstlich ernährt, so sorge man, dass die Milch stets gut, der Mehlbrei gut gekocht und von feinem und guten Mehl bereitet sei, oder lasse an die Stelle desselben den

1) *Berend's* Vorlesungen. B. V. S. 220. — 2) S. *Richter*. B. V. S. 439.

Zwiebackbrei sezen, oder einen Brei von Arrowmehl geben. Auch suche man zu verhüten, dass das Kind nicht überfüttert werde. Bei etwas ältern Kindern dienen Eigelb und Fleischspeisen, Gallerten von Kalbsfüssen, Sago, in Fleischbrühe gekocht, gebratenes Kalbfleisch, und sodann leichte Gemüse, auch kann den ältern Kindern etwas weniges Wein und gutes Bier gegeben werden; zu vermeiden sind dagegen der viele Genuss von Kartoffeln, schwerem Brode etc. Nebst einer geeigneten Nahrung ist für den scrophulösen Kranken seine Wohnung das Wichtigste. Dieselbe sei wo möglich gegen Süden gerichtet, so dass Licht und Wärme sie gehörig durchdringen können, die Schlafstätte sei geräumig, werde fleissig gelüftet und sei nicht feucht. Der Kranke halte sich viel im Freien auf, besonders an sonnigen Orten, er mache sich viele körperliche Bewegung, oder werde viel im Freien herumgetragen und gefahren. Die scrophulösen Kinder müssen fleissig gewaschen und öfters in ein lauwarmes Bad gesezt werden, wobei es zuträglich ist, den Körper mit Flanell zu reiben.

§. 1520.

Nebst der Anordnung der zuträglichsten Lebensweise ist es von Wichtigkeit, diejenigen Schädlichkeiten, die etwa im Körper selbst liegen und auf die Ernährung nachtheilig wirken, zu entfernen. Dieses sind insbesondere durch die Krankheit selbst hervorgebrachte Stoffe, Säure im Magen, Verschleimung der ersten Wege und Würmer. Es ist daher oft zuträglich, den Anfang der Kur mit einem Brech- oder Abführungsmittel zu machen, zu welchem leztern man nicht leicht die schwächenden, sondern die mehr erregenden Abführungsmittel wählt, vorzüglich die Rhabarber, etwas mit Zusaz von Tartarus tartarisatus, Tartarus natronatus etc., bei sehr zähem Schleime Calomel mit Jalappe, jedoch das Calomel mit besonderer Vorsicht. Diese Mittel müssen nach Um-

ständen von Zeit zu Zeit wiederholt werden, so wie es auch meistens sehr zuträglich ist, öfters säuretilgende und zuweilen auch Wurmmittel gebrauchen zu lassen.

§. 1521.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Es ist die doppelte Aufgabe: 1) die vorhandenen Anschwellungen der Drüsen aufzulösen und im allgemeinen mischungsändernd auf die schon gebildete Lymphe und die festen Theile zu wirken, und 2) eine bessere Bereitung des Chylus zu bewirken. Dem erstern Zwecke entspricht bald mehr die auflösende, bald mehr die mischungsändernde Methode. Häufig geschieht beides durch die nämlichen Mittel zugleich. Insbesondere werden angewandt: die Antimonialmittel, wie der rohe Spiessglanz (Nro. 77), der Goldschwefel, der Mineralkermes, mehr vorübergehend auch der Brechweinstein, ferner die Merkurialmittel und insbesondere dieselben in Verbindung mit Antimonialien und Schwefel, wie in dem *Plummer*'schen Pulver (Nro. 69), in dem Aethiops antimonialis (Nro. 78), in dem Aethiops mineralis etc., die salzsaure Schwererde (Terra ponderosa salita) (Nro. 79), der salzsaure Kalk, die flüchtigen und die festern Alkalien, der gebrannte Schwamm, das vorzüglich von *Lugol* mit grossem Erfolg angewandte Jod (Nro. 80 — 87), das salzsaure Gold, ferner frisch ausgepresste Kräutersäfte von Lactuca sativa, Taraxacum, Marrubium album, Fumaria, Chaerefolium, Beccabunga etc., zu 1 — 4 Unzen jeden Morgen in Melissenthee oder schwacher Fleischbrühe, ein Aufguss von Herba Tussilaginis, so wie die auflösenden Extracte, die auflösenden narkotischen Mittel, wie die Dulcamara, die Digitalis, die Cicuta, die Blausäure haltenden Mittel, Aconit, die Belladonna etc., die Gummiharze, insbesondere das Gummi Guajacum und die Asa foetida, leztere vorzüglich bei Knochenleiden. Endlich sind auch bei eingewurzeltem Uebel und bedeu-

tenden Entartungen noch durchgreifendere, den ganzen Körper umstimmende Heilmethoden in Anwendung gebracht worden, wie die Hunger- und Schmierkur, das *Zittmänn*'sche Decoct etc.

§. 1522.

Dem zweiten Zwecke, der Verbesserung der Bereitung der Lymphe und des Blutes entsprechen Mittel, die die Verdauungskräfte und überhaupt auch die vegetative Thätigkeit erregen und vielleicht auch zur Bereitung eines guten Chylus und Blutes, insbesondere zur Bereitung des Blutrothes und des Faserstoffes Bestandtheile hergeben, was vorzüglich die erregenden und tonischen Mittel sind. Hieher gehören gute Weine und geistige Tinkturen, Fenchelsaamen, Sternanis, Melisse, Mentha piperita, der Eichelkaffee, Calamus aromaticus, Absinthium, Cortices Aurantiorum, rad. Caryophyllatae, die bittern Extracte, die Rhabarber, die China, das Chininum sulphuricum, und die Eisenpraeparate (Nro. 88 und 89).

§. 1523.

Bald mehr auflösend, bald mehr stärkend und erregend wirken auf das lymphatische System und den ganzen Körper die Bäder, einfache warme Bäder, Seifenbäder, Schierlingsbäder, Weinbäder, Bäder mit Krausemünze, Bäder von Abkochungen von Wermuth, von Calamus aromaticus, China, Lohbäder, See- und Soolebäder, Stahlbäder, Jodbäder etc. Auch sind Reibungen des ganzen Körpers mit Flanell und geistigen Dingen zweckmässig.

§. 1524.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Gegen die örtlichen, mit der scrophulösen Kachexie in Verbindung stehenden Leiden wendet man die erwähnten antiscrophulösen Mitel an, und behandelt sie ausserdem

noch auf verschiedene Weise, nach Verschiedenheit ihrer Beschaffenheit.

Zur Zertheilung der Anschwellung und Verhärtung einzelner Drüsen legt man das Emplastrum mercuriale, Cicutae, Gummi ammoniaci auf, lässt graue Quecksilbersalbe, Linimente mit Ochsengalle (Nro. 90), das flüchtige Liniment, das Linimentum saponato camphoratum, den Liquor ammonii causticus, das Petroleum, in schicklichen Verbindungen, oder Jodsalbe einreiben, und lässt auch die Dämpfe von heissem Wasser oder Essig an dieselben gehen. Ist die Geschwulst schmerzhaft und entzündet, so macht man Bähungen von Cicuta, lässt die graue Quecksilbersalbe einreiben und einige Blutegel sezen. Bildet sich ein Abscess, so befördert man dessen Reifung durch erweichende Breiumschläge und überlässt in der Regel die Oeffnung der Natur, wenn derselbe nicht in der Nähe eines Knochens liegt, so dass hierdurch Beinfrass entstehen könnte, oder wenn nicht eine andere Anzeige zur Oeffnung desselben vorhanden ist.

Die Geschwüre, die gewöhnlich eine schlaffe Beschaffenheit haben, verbindet man mit Abkochungen von Eichenrinde, China, grünen Nussschalen etc., welchen man Cicuta- oder Belladonna-Extract zusezt, oder mit Auflösungen von Sublimat und Höllenstein mit denselben Zusäzen, mit rother Präcipitatsalbe, betupft sie mit Höllenstein und nimmt die unterhöhlten Hautränder hinweg. Sind die Geschwüre entzündet, so macht man besänftigende Umschläge. [1])

Scrophulöse Hautausschläge sind oft wohlthätig und ihre Heilung vermehrt zuweilen das innere Scrophelleiden; es ist daher besonders in der Anwendung äusserer Mittel grosse Vorsicht nothwendig.

1) Vergl. *Chelius* Chirurgie.

Was die Behandlung der scrophulösen Augenentzündung, der Knochenleiden, der Schleimflüsse, der Säurebildung im Magen etc. betrifft, so verweise ich auf die Augenheilkunde, die Chirurgie und auf die betreffenden Kapitel dieses Handbuches der Pathologie.

Die englische Krankheit.

(*Die doppelten Glieder, der Zweiwuchs, Rhachitis.*)

Glisson (lat. London 1650). — *Trnka de Krzowitz* (lat. Wien 1787, deutsch 1789). — *Veirac* (aus d. Holländ. v. Keup. Stendal 1794). — *Portal* (Paris 1797, aus d. Franz. Weissenfels 1798). — *Ficker* (lat. Berlin 1821). — *Seibold* (Würzburg 1827).

§. 1525.

Die **englische Krankheit** ist eine beinahe nur bei Kindern vorkommende Kachexie, die sich mehr oder weniger durch den scrophulösen Habitus und durch Verbiegungen der Knochen äussert.

§. 1526.

Das Aussehen der Kinder, bei welchen sich die Rhachitis auszubilden droht, ist entweder das der an Darrsucht leidenden Kinder, das Gesichtchen ist runzlicht, die magere Brust auf beiden Seiten eingedrückt, mit Ausnahme der falschen Rippen, welche durch den grossen Bauch hervorgetrieben sind, die Füsse und Arme sind mager, zuweilen ist hierbei der Kopf sehr gross und selbst ein wahrer Wasserkopf vorhanden; oder die Kinder sind im Gesichte, am Körper und selbst an den Gliedmassen ziemlich dick, das Fleisch ist aber schlaff und die Glieder doch im Verhältniss zu dem starken Kopf und Rumpfe zu schmächtig. Oft leiden die Kinder

an Säure im Magen, saurem Aufstossen und Durchfällen und sind dabei sehr gefrässig, die Schweisse riechen säuerlich, der Urin ist oft trübe, milchigt und es sollen oft Pflanzensäuren, wie Benzoe- und Sauerkleesäure in ihm hervorstechen, und nach *Bolba* und *Malfatti* viele phosphorsaure Kalkerde durch ihn ausgeführt werden. Die Kinder zahnen spät und die Zähne werden leicht cariös, schwarz und fallen aus. Manche an der Rhachitis leidenden Kinder, besonders diejenigen, die einen Wasserkopf haben, sind simpelhaft, bei vielen dagegen zeigen sich hervorstehende Geisteskräfte, sie lernen viel schneller sprechen, als die Versuche zum Stehen oder Gehen einigen Erfolg haben, und sind frühzeitig altklug.

Bei vielen, besonders den mit einem darrsüchtigen Zustand behafteten Kindern, kommt es nicht einmal zu Versuchen zu gehen, sondern dieselben liegen beständig auf dem Rücken, mit hinaufgezogenen Füsschen, an denen sich nun, so wie an dem übrigen Körper, immer mehr die eigenthümliche Knochenkrankheit offenbart, andere beginnen zu gehen, aber spät, so dass sie z. B. mit zwei Jahren noch nicht laufen können, sie führen einen wackelnden Gang, einer Ente ähnlich, und werden sehr schnell müde. Zuweilen entwickelt sich die Krankheit erst, nachdem die Kinder schon einige Zeit gehörig gehen konnten, dieselben wollen nun von neuem wieder getragen sein und weinen, wenn man sie auf die Füsse stellt. Man findet nunmehr, dass die Enden der Röhrenknochen an dem untern Fussgelenke etwas angeschwollen sind und die Füsschen oberhalb dieser Anschwellung eine leichte Biegung zeigen und nimmt auch in geringerm Grade eine ähnliche Beschaffenheit der Knochen an dem Handwurzelgelenke wahr. Durch diese Auftreibung der Knochenenden gewinnen zuweilen die bezeichneten Gelenke einigermassen das Aussehen, wie wenn zwei Gelenke

über einander vorhanden wären, woher die Krankheit auch den Namen doppelte Glieder erhalten hat.

§. 1527.

Entwickelt sich das Uebel zu einem höhern Grade, so werden allmälig die Knochen oft auf eine furchtbare Weise verbogen, die Unterschenkel werden sichelförmig, die Vorder- und selbst die Oberarme gebogen und verdreht, und zeigen zuweilen bei ganz jungen Kindern eine Ecke, wie wenn der Knochen gebrochen wäre, der Kopf senkt sich gegen das Brustbein, die Wirbelsäule wird nach vorn, nach hinten oder zur Seite gekrümmt (Lordosis, Kyphosis und Scoliosis), die eine Achsel steht höher, als die andere, die Schlüsselbeine sind gekrümmt, die Rippen auf der einen Seite einwärts gebogen, so dass diese Seite enger als die andere wird, die eine Hüfte steht höher, wie die der entgegengesezten Seite. Diese Verbiegungen entwickeln sich meistens sehr langsam, so dass die Kranken, wiewohl nur mit Anstrengung und baldiger Ermüdung und zuweilen mit längern Unterbrechungen, ihre Gliedmassen gebrauchen können; oft aber verlieren sie das Vermögen zu gehen ganz und können nicht einmal stehen und sizen. Häufig bildet sich auch an den Händen, den Füssen, an dem Rückgrathe etc. Beinfrass aus, es entstehen hierdurch Abscesse, Nerven werden zusammengedrückt, Lähmungen erzeugt und auch, so wie durch die Anschwellung der Gekrösdrüsen, die höchste Abmagerung und hectisches Fieber herbeigeführt.

§. 1528.

Die Krankheit hat einen Jahre lang dauernden Verlauf. In den günstigern Fällen werden die Knochen allmälig wieder hart und es können auch die Verbiegungen der Knochen durch eine geeignete Behandlung um vieles vermindert werden, doch bleiben oft grosse Verunstaltungen des Körpers zurück, das Gehen ist oft

nur mit Krücken möglich, durch die Verengerung der Brusthöhle sind Athmungsbeschwerden bedingt, und es stellt sich oft späterhin noch Lungenschwindsucht oder Brustwassersucht ein, die Verbiegungen des Beckens erschweren die Geburten und machen sie oft unmöglich. Den Tod führt die Krankheit durch das hektische Fieber in Folge des Beinfrasses und der Anschwellung der Gekrösdrüsen und zuweilen auch durch Kopfwassersucht oder eine sich hinzugesellende Lungenschwindsucht oder Brustwassersucht herbei.

§. 1529.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Die Knochen sind sehr weich und zuweilen theilweise mehr knorpelartig, so dass man sie manchmal selbst mit dem Messer durchschneiden kann, das Mark in denselben ist flüssiger. In einem Falle fand ich bei einem etwa dreivierteljährigen Kinde sechs Knochenbrüche an verschiedenen Knochen, ohne dass die Eltern von diesem Zustande des Kindes oder von einer Gewalt, die auf dasselbe gewirkt hätte, etwas wussten. Der eine dieser Brüche war frisch entstanden, die Knochenenden noch blutig und das eine neben das andere hingezogen, ein anderer, bei welchem die Knochenenden ebenfalls neben einander standen, bildete eine Art falsches Gelenk, die übrigen waren wiederum ziemlich fest vernarbt. Das Fleisch solcher Leichen ist sehr weich, das Blut soll mehr dünnflüssig sein, meistens sind die Gekrösdrüsen angeschwollen und zuweilen mit einer kreidenartigen Masse ausgefüllt, die Lunge ist oft mit Tuberkeln angefüllt, die Leber ist oft vergrössert, die Gallenblase enthält eine eiweissartige Flüssigkeit, im Gehirne trifft man häufig Wasser an, wenn auch kein eigentlicher Wasserkopf vorhanden ist, die Leichen sollen erst spät erstarren.

§. 1530.

So weit die **Ursachen** der Rhachitis bekannt sind, sind sie ganz dieselben, die die Scropheln zu erzeugen vermögen. Die Krankheit kommt ebenfalls bei Kindern, die von rhachitischen, scrophulösen, syphilitischen, zu alten oder zu jungen Eltern erzeugt sind, vor, und ihr Entstehen wird durch Ueberfütterung und den Genuss unpassender Nahrung, namentlich schlechten Mehlbrei und schlechtes Brod, viele Kartoffeln etc., so wie durch eine dunkle, feuchte Wohnung, Unreinlichkeit und Mangel an Bewegung begünstigt.

§. 1531.

Das Wesen dieser Krankheit, die schon *Hippokrates* und *Celsus* gekannt zu haben scheinen, aber erst *Reusner* in Holland (1582), *de Boat* in Irland (1648) und vorzüglich *Glisson* deutlicher beschrieben haben, suchte man vorzüglich in einer Verderbniss der Säfte, und zwar nahm man eine eigenthümliche Schärfe an und hielt dieselbe zum Theil für ein umgeändertes, venerisches Gift, zum Theil leitete man sie von der Säure der ersten Wege ab. Andere (*Cullen*) suchten ihren Grund im Nervensystem, in einer fehlerhaften Beschaffenheit des Nervensaftes u. s. w. *Heine*[1]) und *Sömmering*[2]) in krankhaft verstärkter Thätigkeit der Lymphgefässe, wodurch dieselben die kalkartige Materie in den Knochen in sich aufnehmen, *Walther*[3]) in Entzündung der Knochen, *Jörg* in schwacher Oxydirung des Blutes durch die Lungen und durch die Haut, *Fourcroy*[4]) in zu lange im Körper zurückgehaltener Phos-

1) Diss. de vasor. absorbent. ad rhachitid procreand. potentia Goett. 1792. — 2) De morb. vasor. absorbent. Frankf. 1795. — 3) Anatom. Museum. Berl. 1796. — 4) Memoires de la soc. roy. de Med. 1782.

phorsäure, *Renard* [1]) in einer Umwandlung des Blutes in den Gefässen der Beinhaut, wodurch das Eisen von der Phosphorsäure sich scheide, diese frei werde und die phosphorsaure Kalkerde der Knochen zu einem flüssigen Kalkphosphat umwandle. Die Neuern haben grösstentheils eine fehlerhafte Ernährung des Körpers und insbesondere der Knochen, durch Krankheit des lymphatischen Systems angenommen, wobei die Knochenmasse verändert und die phosphorsaure Kalkerde in die aufsaugende Gefässe aufgenommen werde.

Am genügendsten scheint mir *Haase's*, [2]) im Wesentlichen mit *Renard's* Ansichten übereinstimmende Erklärung zu sein. Derselbe sucht die nächste Ursache der Rhachitis in dem doppelten Grund: 1) in dem scrophulösen, unthätigen Zustand des Lymphsystems, wodurch eine mangelhafte Zuführung der ernährenden Stoffe, zu den Knochen, bedingt werde, und 2) in dem bei scrophulösen und rhachitischen Kindern vorkommenden Vorherrschen von freier Säure, wodurch auch die gewöhnlich in der Beinhaut abgesondert werdende Phosphorsäure im Uebermaass gebildet und die Kalkerde in den Knochen in zu grosser Menge gelöst werde.

§. 1532.

Vorhersage. Die englische Krankheit wird zuweilen lebensgefährlich und stört durch zurückgelassene Verunstaltung des Körpers, Unfähigkeit des Gebrauches einzelner Gliedmassen, Unvermögen zu gebären, zurückgebliebene Athmungsbeschwerden etc., das Lebensglück der Individuen, die an dieser Krankheit gelitten haben.

§. 1533.

Behandlung. Diese Krankheit kann beinahe ganz

1) Versuch, die Entstehung und Ernährung etc. der Knochen zu erklären. Lpz. 1803. — 2) Chron. Krankh. B. III. S. 429.

nach denselben Grundsäzen und mit denselben Mitteln behandelt werden, wie die Scropheln.

Es sind dieselben Ursachen zu vermeiden und es ist daher dasselbe Verhalten zu befolgen, welches zur Heilung der Scropheln nothwendig ist, es sind daher dieselben Nahrungsmittel, wie dort, zu wählen; es sind der Aufenthalt in einer sonnigen Wohnung mit gesunder Luft, häufiger Aufenthalt im Freien, grosse Reinlichkeit etc. nothwendig. Unter den innern schädlichen Einflüssen ist besonders auf die Säure im Magen Rücksicht zu nehmen und dieselbe durch die bekannten Mittel zu bekämpfen.

§. 1534.

Was die Anzeige aus dem Wesen der Krankheit betrifft, so sind hier ebenfalls, wie bei den Scropheln, häufig die auflösenden Mittel angezeigt, wenn nämlich Drüsenanschwellungen vorhanden sind; die vorzüglich entsprechenden und in der That sehr heilsamen Mittel sind aber die erregenden und tonischen Mittel. Unter denselben stehen in vorzüglichem Rufe die Wurzel von Calamus aromaticus, Caryophyllata, die Rubia tinctorum (Nro. 91), die China, das Chininum sulphuricum und besonders das Eisen, welchem man, ausser seiner tonischen Kraft, auch die Wirkung zuschreibt, die überflüssige Säure zu bilden. Hiemit verbindet man dieselben Bäder, Reibungen des Körpers mit durchräuchertem Flanell und die andern äussern Mittel, die bei den Scropheln gebräuchlich sind.

§. 1535.

Ausser den Zufällen, welche auch bei den Scropheln vorkommen und deren Behandlung in der Darstellung dieser Krankheit angegeben wurde, verdient hier besonders die Verbiegung der Knochen Berücksichtigung. Um diese Verunstaltung zu vermeiden, darf man die zur Rhachitis geneigten Kinder nicht früher zum Stehen

und Gehen anhalten, als bis sie sich hierzu kräftig genug zeigen, den Kindsmädchen muss empfohlen werden, die Kinder abwechselnd auf beiden Armen zu tragen, die Lage der Kranken im Bett muss öfters gewechselt werden, und es ist gut, dieselben mehr in ausgestreckter Richtung auf Rosshaarmatrazen auf den Rücken liegen zu lassen; anhaltendes Sizen mit schiefer Richtung des Körpers, wie z. B. beim Sticken, muss vermieden werden, das frühe Anlegen der Schnürbrüste ist höchst nachtheilig, dagegen ungezwungene Bewegung und angemessene körperliche Uebung sehr vortheilhaft. Um gebogene Knochen wieder grad zu strecken, bedient man sich auch verschiedener Maschinen, deren Darstellung der Chirurgie überlassen werden muss.

Die Gelbsucht.

(*Icterus, Aurigo, Morb. regius, arquatus s. arcuatus, bilis suffusio.*)

Brünnig (Lips. 1775). — *Marcerd* (med. Versuche. Thl. 1. Lpz. 1778). — *Vogler* (Wetzlar 1791).

§. 1536.

Die Gelbsucht ist die Krankheit, in welcher die Haut sich gelb färbt.

§. 1537.

Diese Färbung der Haut kommt in Fiebern, namentlich in Gallenfiebern und dem gelben Fieber vor, und es bildet sodann der gelbsüchtige Zustand ein Symptom dieser Krankheiten, sie ist aber auch häufig die Haupterscheinung einer fieberlosen, mehr oder weniger chronischen Krankheit. Dieser Zustand ist es vorzüglich, den man mit dem Namen Gelbsucht belegt.

§. 1538.

Die Gelbsucht entsteht oft sehr schnell und beinahe plözlich, z. B. auf einen heftigen Verdruss, oft bildet sie sich aber auch langsamer aus und es gehen ihr Erscheinungen vorher, die auf ein Leberleiden und Störungen in den Verdauungswegen hinweisen, wie das Gefühl von Spannung, Druck und selbst lebhaftem Schmerz in der Lebergegend und dem Magen, Aufgetriebenheit dieser Stellen, Neigung zum Erbrechen, übles Aufstossen, Aufblähung des Leibes, Verstopfung, Eingenommenheit des Kopfes, Mattigkeit, mürrische Gemüthsstimmung, zuweilen auch Brustbeklemmung, Trockenheit der Haut und ein schwaches Gefühl von Jucken und Fressen in derselben.

Die ersten Spuren der gelben Färbung zeigen sich im Weissen des Auges, sodann werden die zarten Stellen der Haut um die Augen herum, zur Seite der Nase, am Halse etc. gelb, endlich erscheint der ganze Körper gelb. Die Farbe spielt vom blass Citrongelben bis in's Orange und Safrangelbe, besonders an den sonst rothen Stellen der Wangen, und wird auch zuweilen selbst grünlich (Icterus viridis) und in's Schwärzliche gehend (Melas icterus, Icterus niger). Der Harn erhält eine dunkle, safrangelbe und selbst in's Schwärzliche gehende Farbe, er hat einen gelblich-grünlichen Schaum und färbt hineingetauchte Leinwand gelb, zuweilen zeigt auch der Schweiss und der Auswurf eine gelbliche Farbe und man hat selbst Fälle beobachtet, in welchen die wässerigte Flüssigkeit des Auges gelb gefärbt war und dem Kranken daher alle weissen und hellen Gegenstände in gelber Farbe erschienen. Meistens fehlt dabei in dem Darmkanal die Galle, die Stuhlentleerungen sind mehr oder weniger unterdrückt, der Koth fest und grau. Die Kranken leiden dabei an schlechter Verdauung, Magenweh, bitterm Geschmacke, Aufstossen, gallichtem

Erbrechen, und haben in der Regel grosse Abneigung vor Fleischspeisen, sie haben Kopfschmerz, werden sehr matt und der Puls ist in der Regel träge und klein.

§. 1539.

Diese Krankheit ist oft sehr langwierig, doch kann sich auch die gelbe Hautfarbe unter günstigen Umständen sehr schnell verlieren. In Gesundheit geht die Gelbsucht über, nachdem die Stuhlentleerungen wieder ihre gehörige Farbe erhalten haben oder auch gallichte Durchfälle oder gallichtes Erbrechen eingetreten sind. Auch kommen dabei oft wohlthätige Schweisse zu Stande, ein röthlicher Bodensaz im Urin, zuweilen Nasenbluten, ein frieselartiger Ausschlag, ein Rothlauf, Hämorrhoiden etc.

Den Tod führt die Krankheit durch Schwäche oder auch Zerstörung edler Organe herbei, nachdem vorher Fieber, Abzehrung, ein scorbutischer Zustand, Blutflüsse oder auch Wassersucht hinzugetretten sind.

§. 1540.

Bei Leichenöffnungen hat man alle Theile, selbst Knochen, Knorpel, das Gehirn etc. gelb gefärbt angetroffen und mancherlei Veränderungen in der Leber und den dazu gehörigen Theilen gefunden, insbesondere Verhärtungen in derselben und Gallensteine in der Gallenblase und dem Ductus choledochus.

§. 1541.

Die *Gelbsucht der Neugebornen* (Icterus neonatorum) tritt gewöhnlich zwischen dem dritten und siebenten Tage, selten erst in der zweiten oder dritten Woche nach der Geburt ein. Es wird zuerst die Haut dunkelroth und sodann gelb, und oft beinahe kupferfarbig, wobei man aber keine Störungen im Allgemeinbefinden der Kinder wahrnimmt. Die Krankheit verschwindet in 4 – 7 Tagen in der Regel von selbst.

§. 1542.

Anlage zur Gelbsucht gibt das cholerische Temperament. — **Gelegenheitsursachen** sind alle diejenigen Ursachen, welche Reizung, Krampf, Entzündung oder Verhärtung der Leber, Verschliessung der Gallengänge und Ueberfüllung des Blutes mit gewissen Stoffen veranlassen können, daher Zorn, Verkältung, besonders durch schnell eingetretene Kälte nach sehr heisser Witterung, der Missbrauch geistiger Getränke, der häufige Genuss von Stoffen, die, wie es scheint, zur übermässigen Bereitung gallichter Stoffe geneigt machen, des Fettes, ranziger Speisen etc., der Aufenthalt in einer sehr heissen Atmosphäre, Unterdrückung der Hämorrhoiden, der Missbrauch drastischer Mittel, bösartige Wechselfieber, der Biss der Scorpionen, gewisser Schlangen etc.

§. 1543.

Als Ursachen der Gelbsucht der Neugebornen werden beschuldigt: die Verschliessung der Gallengänge durch Kindspech und Schleim, der ungewohnte Reiz der ersten Nahrung auf den Darmkanal und auf die Leber, die Gewalt, die das Gehirn bei der Geburt erleidet und die consensuelle Einwirkung desselben auf die Leber, die mit der Geburt eintretenden Veränderungen im Blutlaufe, der Consens und die Wechselwirkung des Darmkanals nebst der Leber mit der Haut, der ungewohnte Eindruck der Luft auf die Haut und die veränderte Funktion der Haut, welche mit der Geburt von einem rein einsaugenden, zu einem zugleich ausscheidenden Organ wird.

§. 1544.

Das **Wesen** der Gelbsucht besteht in Ablagerung von gallichten Stoffen in die Haut und oft in alle Gewebe und in alle abgesonderten Stoffe des Körpers. Dass die gelbe Farbe wirklich von gallichten Stoffen

herrühre, dafür sprechen der Ursprung der Krankheit aus Störungen in der Gallenabsonderung und die Untersuchungen von *Fourcroi* und *Clarion*, welche die wesentlichen Bestandtheile der Galle im Blute und von *Fourcroy*, *Vauquelin*, *Orfila* und *Cruikschank*, welche sie im Harne fanden.

Diese Bildung gallichter Stoffe in der Haut und andern Theilen kann wie in dem Gallenfieber erregt werden, sowohl auf dem Wege des Nervensystems durch antagonistische Thätigkeit der Haut, als auch durch das Blut, indem gallichte Stoffe resorbirt, oder die Bestandtheile der Galle nicht durch die Leber ausgeschieden werden, oder das Blut durch Einwirkung einer schlechten Atmosphäre auf dasselbe oder durch fehlerhafte Nahrungsstoffe mit gewissen zur Gallenerzeugung geneigten Stoffen überladen wird. Der Unterschied zwischen Gelbsucht und Gallenfieber ist aber der, dass bei der Gelbsucht mehr die Absonderungen verändert sind, bei jener aber eine allgemeine Gefässreizung erzeugt wird, was wohl in der Verschiedenheit der Krankheitsanlage und der erregenden Ursachen, insbesondere der Verschiedenheit des diesen Krankheiten zum Grunde liegenden krankhaften Zustandes der Leber zu suchen ist, indem z. B. eine entzündliche Reizung der Leber leichter Gallenfieber, eine einfache Hemmung der Gallenabsonderung eher die gewöhnliche Gelbsucht zur Folge hat.

§. 1545.

Die Vorhersage ist aus der Beschaffenheit der Leber zu entnehmen, ist dieselbe von der Art, dass die Absonderung von Galle durch dieses Organ nicht wieder hergestellt werden kann, wie z. B. meistens bei Leberverhärtungen, so ist ein schlimmer Ausgang zu erwarten, bei mehr dynamischen Leiden dagegen in der Regel ein guter. Ein leichter Zufall ist in der Regel die Gelbsucht der Neugebornen.

§. 1546.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Die Kranken müssen die zur Gallenbereitung geneigt machenden Speisen möglichst vermeiden, daher wenig Fleischnahrung, Butter etc. geniessen und sich mehr an Pflanzennahrung, besonders säuerliches Obst, halten, zum Getränke aber kühlende säuerliche Mittel wählen; Gemüthsbewegungen müssen möglichst vermieden werden. Bei grosser Hize der Atmosphäre muss für eine kühle Temperatur der Wohnung gesorgt werden, nach einem Biss eines giftigen Thiers muss die Wunde ausgeschnitten, gebrannt oder durch stark reizende oder äzende Mittel in Eiterung versezt werden, und die Hautausdünstung und Harnabsonderung durch starke Gaben von Spiritus Mindereri, Hirschhorngeist, Campher, das *Dower*'sche Pulver etc. erregt werden.

Der zu den entferntern Ursachen der Gelbsucht gehörende, ihr zum Grunde liegende krankhafte Zustand der Leber und der dazu gehörigen Theile verdient stets die grösste Berücksichtigung. Nach Verschiedenheit desselben dienen bald Blutentleerungen nebst Umschlägen von Cicuta, bald allein krampfstillende Mittel, wie Oelemulsionen, Opium, Hyoscyamus, Ipecacuanha in kleinen Gaben und nach Umständen auch die Valeriana, Asa foetida, Castoreum etc., bald Mittel um die Verhärtungen der Leber aufzulösen, Gallensteine zu beseitigen, Würmer hinwegzuschaffen, bei veränderter Lebensthätigkeit der Leber, wenn dieselbe durch den dem Wechselfieber zum Grunde liegenden krankhaften Zustand der Leber bedingt ist, vermag das Chininum sulphuricum in kurzem die Gelbsucht zu beseitigen. Ist eine grosse Menge Galle in der Gallenblase und zugleich im Magen angehäuft, so dass man erkennen kann, dass der Ausfluss der Galle in die Gedärme nicht gehemmt ist, so ist es vortheilhaft, dieselbe durch Brechmittel oder auch durch

Abführungsmittel auszuleeren, um ihre Resorption zu verhindern. Bei Kindern leert man das Kindspech durch Rhabarbersaft aus.

§. 1547.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Es ist hier die Aufgabe, die Ablagerung von galligten Stoffen auf die Haut zu verhindern und die Resorption der schon abgelagerten Stoffe zu befördern. Beides geschieht durch Erregung der Gallenabsonderung in der Leber, wenn etwa nicht schon eine erhöhte Thätigkeit in diesem Organe vorhanden ist und durch Ausführung der Stoffe nach aussen. Zu den leichtern Mitteln gehören die mildern Salze, wie Tartarus tartarisatus, natronatus etc., die auflösenden Extracte, insbesondere von Graswurzel, Taraxacum, Herb. Fumariae, Marrubii albi, Chelidonii, die Ochsengalle, Eidotter, auch die Seife, das Gummi Ammoniacum in nicht zu grossen Gaben; die wirksamsten Cholagoga sind aber das Calomel, die Rhabarber und die Aloë, von welchen man sich vorzüglich der beiden leztern bedient. Auch bewirken Brechmittel, besonders aus dem Tartarus emeticus, nicht allein die Ausleerung der schon angesammelten Galle, sondern vermögen auch, besonders wenn sie wiederholt gegeben werden, die Absonderung selbst zu erhöhen. Die *Kämpf*schen Visceral-Klystiere sind ebenfalls anwendbar.

§. 1548.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Das diese Krankheit zuweilen begleitende Erbrechen ist oft heilsam; wird es zu heftig, so sucht man es durch die gewöhnlichen Mittel zu stillen. Bei Entkräftung und Abmagerung dient vorzüglich das Eigelb als Nahrungsmittel. Im Uebrigen wendet man gegen besondere Zufälle die Mittel an, die nach ihrem Character angezeigt sind.

Die Bleichsucht.

(Das weisse Fieber, die weisse Gelbsucht, Chlorosis, Febris alba, Icterus albus, und in so fern sie bei Mädchen zur Zeit der Mannbarkeit vorkommt, Pallor virginum, Cachexia virginea, Febris amatoria.

Fr. Hoffmann (Diss. Hall. 1731). — *Brandis* (Erfahrungen über die Wirkung der Eisenmittel im Allgemeinen und des Driburger Wassers insbesondere. Hannov. 1803). — Ausserdem die Schriftsteller über Frauenzimmerkrankheiten.

§. 1549.

Die **Bleichsucht** bestimmt man gewöhnlich als eine bei Mädchen zur Zeit der Mannbarkeit und zuweilen auch bei jungen Wittwen vorkommende Dyscrasie, wobei die Gesichtsfarbe sehr blass, das Fleisch schlaff und die Muskelkräfte schwach sind, und welche mit Störungen in den Geschlechtsverrichtungen, insbesondere Fehlern in der Menstruation in Verbindung steht; da jedoch derselbe Fehler in der Reproduction, welcher dem beschriebenen Aussehen zum Grunde liegt, auch bei Männern vorkommt, so muss das Wort Bleichsucht in einem ausgedehntern Begriffe genommen und die erwähnte Beschaffenheit des Körpers verstanden werden, mag sie bei dem einen oder dem andern Geschlecht vorkommen und von dieser oder von jener Ursache hervorgebracht sein.

§. 1550.

Zuweilen im Gefolge eines andern langwierigen Leidens, oft aber ohne ein solches und vorzüglich bei Mädchen zur Zeit, in welcher die Mannbarkeit gewöhnlich eintritt, bildet sich zuweilen eine eigene Beschaffenheit des Körpers aus. Die Gesichtsfarbe wird andauernd

blass, entweder mehr kreideweiss oder mehr wachsgelb, insbesondere werden auch die Lippen und das Zahnfleisch blass, es zeigen sich dunkle Ringe um die Augen, die gewöhnlich etwas tief liegen, die Augenlieder haben meistens eine bräunliche Farbe, und sind nach dem Schlafe etwas aufgedunsen, der ganze Körper zeigt eine schlaffe Structur und es bilden sich selbst öfters wässerigte Geschwülste um die Knöchel aus. Dabei sind die Muskelkräfte sehr schwach, so dass auf Körperbewegung sehr bald Ermüdung folgt, wobei auch leicht Herzklopfen eintritt, das Athmen ist erschwert, die Temperatur des Körpers vermindert, die Verdauung ist schlecht, oft haben aber die Kranken besondere Gelüste, zuweilen stellt sich saures und schleimiges Erbrechen ein, der Urin ist blass und schleimig, oft ist weisser Fluss vorhanden, die monatliche Reinigung fehlt meistens, oder sie ist sparsam und mit Beschwerden verbunden. Der Geschlechtstrieb kann sowohl erhöht als auch sehr gering sein und ganz mangeln. Meistens haben die Kranken eine traurige und oft eine schwärmerische Gemüthsstimmung, häufig sind sie hysterisch.

§. 1551.

Es kommt nicht selten eine Form von Bleichsucht vor, die man mit *Graf**) Chlorosis arterioso-sanguinea nennen könnte, da ihr Hauptcharacter in einem Ueberwiegen des arteriellen Blutes, und in einer ungleichen Circulation besteht. Ausser den gewöhnlichen Zeichen der Bleichsucht, welche alle vorhanden sind, mit Ausnahme der Gesichtsfarbe, bilden arterielle Congestionen nach der Brust das hervorstechendste Symptom. Die Gesichtsfarbe der an dieser Form leidenden Mädchen ist bis auf eine umschriebene, aus fein in

*) In der Recension meiner spec. Pathologie. *Salzb.* med. chirurg. Zeitung 1836. 2ter Bd.

einander sich verästenden sichtbaren Gefässchen (wie bei der Phthisis florida) bestehende umschriebene Röthe gleich der übrigen Hautfarbe blendend weiss. Grosse Herzbeklemmungen nach geringen Bewegungen mit schnellem, zitterndem Herzschlag und darauf folgendem neckendem Husten, mit kleinen, sehr schnellen Pulsen, bilden mit der grossen Abgeschlagenheit, dem Mangel oder der qualitativen Veränderung der Menstruation, den wässerigten Infiltrationen an den Knöcheln und der schwammigen Beschaffenheit des Fleisches, die Hauptsymptome.

§. 1552.

Die Dauer der Krankheit kann sowohl nur einige Monate als auch mehrere Jahre betragen. In Gesundheit geht die Krankheit allmälig über, wobei die Menstruation gehörig zu Stande kommt, oft auch nach geschehener Verehlichung und nach einer stattgefundenen Schwangerschaft. Bei sehr weit gekommenem Uebel kann sich Wassersucht und Lungenschwindsucht aus demselben entwickeln und auch heftige Krampfzufälle, wie die Fallsucht oder der Veitstanz, so wie auch eine Seelenstörung sich hinzugesellen, doch liegen der Ausbildung dieser Uebel meistens noch andere Ursachen zugleich mit zum Grunde.

§. 1553.

Bei den **Leichenöffnungen** hat man Mangel an Blut, nicht gehörig ausgebildete Gebärmutter und Eierstöcke, Desorganisationen in denselben, so wie auch in der Milz und Leber, Erweiterung des Herzens und seröse Ergiessungen in der Brust- und Unterleibshöhle gefunden.

§. 1554.

Anlage zur Bleichsucht haben vorzüglich Mädchen zur Zeit der Mannbarkeit, besonders erethische, mit lebhaftem Geiste und Gefühle, so wie auch an scrophulöser Dyscrasie leidende.

Gelegenheitsursachen sind eine sizende Lebensart, Kummer, besonders unglückliche Liebe, Aufreizung und besonders zu frühe Erregung des Geschlechtstriebes durch die Phantasie oder durch Onanie, Nichtbefriedigung des gewohnten Geschlechtsgenusses, schlechte Nahrungsmittel, der Missbrauch erschlaffender Getränke, eine feuchte Wohnung, zu vieles Schlafen, öfterer Blutverlust, chronische Durchfälle, Schleimflüsse, andauernde Störungen in der Verdauung, Unterdrückung des Monatflusses, und verschiedene Entartungen von Organen, besonders Krebs.

§. 1555.

Als nächste Ursache der Bleichsucht wird gewöhnlich verminderte Menge des Faserstoffes und Blutrothes im Blute und der ihnen entsprechenden Stoffe in den festen Theilen beschuldigt, wodurch die Energie in der Blutbewegung vermindert, die Wärmebildung verringert, die Muskelbewegung kraftlos wird etc. Dass dieser Fehler in der Reproduction, vorzüglich bei Mädchen zur Zeit der Pubertätsentwicklung hervortritt, kann durch verschiedene Verhältnisse bedingt sein. Oft ist der Körper vorher schon schwach, scrophulös, und seine Kräfte und die bessern Bestandtheile der Säfte werden durch das, um die bezeichnete Periode eintretende schnellere Wachsthum des Körpers, die Anstrengung der Natur zur Ausbildung der Brüste und der Zeugungsorgane und durch Verlust des in der, wenn auch nur sparsam eintretenden Menstruation abgehenden Blutes zu sehr verbraucht, häufig wird zugleich das Nervensystem durch zu frühzeitige Aufregung des Geschlechtstriebes, durch die Phantasie oder Onanie geschwächt. Das Ausbleiben der Menstruation ist wohl in der Regel nur Folge, nicht leicht alleinige Ursache der Bleichsucht, doch mag es dieses auch mittelbar werden, indem durch Unterdrückung des Monatsflusses die Verrichtung der Organe auf ver-

schiedene Weise gestört und dadurch Siechthum veranlasst werden kann. Gewöhnlich leitet man die Bleichsucht, die man der Hemmung der Menstruation zuschreibt, von Beeinträchtigung der Bewegung des Blutes und dadurch verminderten Lebensprozessen her, und *Puchelt* theilt die Bleichsucht, je nachdem sie durch Verminderung des Blutes und insbesondere seines Cruors oder durch Hemmung in der Blutbewegung entstehe, ein, in die anämische und in die venöse Chlorose.

Auf die bezeichnete Weise kann auch bei Männern und bei Weibern in einem andern als dem angegebenen Alter die bleichsüchtige Dyscrasie sich entwickeln, wenn durch Kummer, Onanie, wiederholten Blutverlust, andere Säfteentleerungen etc. die Nerventhätigkeit geschwächt und die Blutmasse vermindert ist, wo sodann der chlorotische Zustand häufig der Anfang der Wassersucht wird. Ein höchst blasses aber meistens kein aufgedunsenes Aussehen kommt bei dem Krebse vor. Zuweilen nähert sich das scorbutische Aussehen dem der Bleichsucht (Chlorosis atrophica et scorbutica nach *Harless)* und zuweilen steht auch die Krankheit zwischen Bleichsucht und Blausucht in der Mitte (die von organischen Herzfehlern entstehende Bleichsucht, Chlorosis cardiaca nach *Harless*).

§. 1556.

Vorhersage. Die Bleichsucht ist in der Regel keine lebensgefährliche Krankheit und wir sind im Besize wirksamer Mittel gegen dieselbe. Nur wenn sie schon einen sehr hohen Grad erreicht hat oder eine unheilbare Krankheit ihr zum Grunde liegt, hat sie zuweilen einen unglücklichen Ausgang.

§. 1557.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Von grösster Wichtigkeit ist die Anordnung einer geeigneten Lebensweise, wo diese fehlerhaft war.

Die Kranke halte sich viel in der freien Luft auf, besonders an sonnigen Tagen, mache sich Körperbewegung, so viel die Kräfte es gestatten, geniesse eine kräftige Kost, besonders Fleischnahrung und etwas Wein, gestatte der Phantasie keine zu grosse Gewalt über sich, sondern beschäftige sich mit Arbeiten. Ist bei unbefriedigtem Geschlechtstriebe dieser durch die Phantasie andauernd erregt, so ist oft das beste, schon von *Hippokrates* vorgeschlagene, Mittel die Verehlichung. Auch suche man den krankhaften Zustand einzelner Organe oder Systeme, welcher die entfernte Ursache der Bleichsucht sein oder sie vermehren könnte, zu heben, verbessere bei Säure im Magen die Absonderung des Magensaftes, suche die Scropheln zu mässigen, beschränke Schleimflüsse, suche Stockungen im Pfortadersysteme zu heben, die Menstruation, insofern in ihrer Unterdrückung ein ursächliches Moment der Krankheit liegt, wieder herzustellen oder dieselbe im Nothfalle durch eine künstliche Blutentleerung zu ersezen, unterlasse es aber, treibende Mittel anzuwenden oder Blut zu entleeren, wenn die ausbleibende Reinigung nur Folge der Schwächung der Körperkräfte ist.

§. 1558.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Sind die Hindernisse, welche der Erregung einer kräftigern Reproduction im Wege stehen, wie etwa eine venöse Plethora es sein könnte, hinweggeräumt, so ist es unsere Aufgabe, sowohl die Prozesse der Blutbereitung, als auch die productiven Prozesse im Organengewebe des ganzen Körpers zu erhöhen. Hiezu dienen ausser einer angemessenen Diät die geistigen und aromatischen und die tonischen Mittel, besonders beide in Verbindung, von welchen die erstern die Lebensthätigkeit mehr zu erregen, die leztern mehr Stoffe zur Bereitung eines kräftigen, an Faserstoff und Blutroth reichen Blutes

herzugeben scheinen. Hieher gehören Wein, Melissen, Pfeffermünze, Zimmt, Flavedo corticum Aurantiorum, das Extractum corticum Aurantiorum, der Calamus aromaticus, Absinthium, das Extractum Trifolii Fibrini, Gentianae, Quassiae etc. und vorzüglich die China, nebst dem Chininum sulphuricum, und die Eisenpräparate. Unter diesen gibt man gerne zuerst die Tinktur. Ferr. acet. aether, die Tr. Ferr. pom., die Tr. Ferr. muriatici, und geht zu den Flor. Sal. ammoniac. martiales und zu der Limatura martis über. Auch können die eisenhaltigen Mineralwasser, vorzüglich das zu Pyrmont und Driburg gebraucht werden.

§. 1559.

In der oben beschriebenen zweiten Form der Chlorosis ist die gewöhnliche Behandlung der Bleichsucht durch Tonica, insbesondere Martialia, nach *Graf's* richtiger Bemerkung nicht anwendbar und kann selbst die Phthisis chlorotica herbeiführen. Eine kühlende, leicht antiphlogistische Behandlung, blausäurehaltige Mittel, vorzüglich aber Digitalis, so wie selbst kleine, in 6 — 12 wöchentlichen Zwischenräumen wiederholte Aderlässe und später auflösende, die Gallensecretion befördernde Mittel führen zur Heilung. Nur zulezt dürfen Eisenmittel und am passendsten der Eisensalmiak angewandt werden. In der Regel wird auf den Zustand der Leber in der Bleichsucht nicht genug Rücksicht genommen. Diese ist fast immer aufgetrieben und beim Druck schmerzhaft; auch fehlt die Gallenabsonderung, woher die hartnäckigsten Verstopfungen der Bleichsüchtigen. Lange Zeit fortgesezte auflösende Mittel sind am zweckmässigsten. Die tonischen, insbesondere die Eisenmittel, sollen erst dann ihre Anwendung finden, wenn durch die eben genannten Mittel die Thätigkeit der Unterleibsorgane mehr geregelt erscheint.

§. 1560.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Bei grosser Beweglichkeit des Gefässsystems werden die Mineralsäuren, besonders in dem Elixir acidum Halleri, empfohlen, doch dürfen diese Mittel nicht zu lange fortgebraucht werden, da sie die Verdauung schwächen. — Bei grosser Beweglichkeit des Nervensystems wendet man mehr oder weniger die gegen Hysterie empfohlenen Mittel an. — Den in Folge der Bleichsucht zuweilen sich einstellenden weissen Fluss sucht man durch die bekannten Mittel zu beseitigen, ebenso die andern angegebenen Folgeübel, und zwar ist dieses um so nothwendiger, als sie ihrer Seits wiederum zur Vermehrung des bleichsüchtigen Zustandes beitragen können.

Die Blausucht.

(*Die blaue Krankheit, Morbus coeruleus, Cyanosis, Cyanopathia, Coerulosis.*)

Lentin (Beiträge z. ausübenden Arzneiwiss. B. II.). — *Meckel* (über die Bildungsfehler d. Herzens, in Reil's Archiv f. Physiologie. B. VI. und in s. deutsch. Archiv f. d. Physiol. B. I.). — *Nasse* (üb. d. Einfl. d. rothen Blutes auf die Entwickl. u. Verricht. des menschl. Körpers in Reil's Archiv f. d. Physiol. B. X.). — *Farre* (on Malformations of the human heart. Lond. 1814). — *Kreysig* (über d. Krankh. d. Herzens). — *Hein* (Diss. Gött. 1816). — *Gintrac* (Par. 1824). — Ausserdem die Schriftsteller über pathologische Anatomie.

§. 1561.

Unter Blausucht versteht man die Kachexie, deren Hauptausdruck in einer bläulichen Färbung der Lippen, Wangen und anderer Körpertheile liegt.

§. 1562.

Wenn ein solches bläuliches Aussehen mit einem Herzfehler in Verbindung steht, wodurch das arterielle Blut mit venösem gemischt wird, so nennt man dieses vollkommene oder wahre Blausucht (auch Cyanosis cardica), wenn dagegen eine ähnliche Färbung von venösen Stockungen wegen Hemmungen in dem Athemholen entsteht, unvollkommene Blausucht. Leztere wird als Symptom in den Kapiteln von der Brustwassersucht und andern Krankheiten der Athmungsorgane beschrieben, sie ist übrigens oft sehr bedeutend, so dass die Wangen und vorzüglich die Lippen und die Zunge oft ein ganz schwärzlich-violettes Aussehen erhalten, wobei man gewöhnlich viele überfüllte venöse Gefässchen, besonders an den Wangen erkennen kann, und wobei die Theile kalt anzufühlen sind.

§. 1563.

Bei der wahren Blausucht zeigt sich eine mehr oder weniger blaue Färbung im Gesichte, besonders an den Lippen, den Wangen und auch an den Augenliedern, so wie an den Fingerspizen, den Zehen etc., der Körper zeigt selbst für das Thermometer eine geringe Temperatur, die Kranken frieren leicht, sie fühlen sich sehr matt, sind schlecht genährt (der Körper schlank und die Finger an ihrem vordern Gliede kolbig und mit gebogenen Nägeln), und leiden zuweilen an Blutflüssen, wobei das Blut sehr dunkel gefärbt ist. Auf rasche Körperbewegung, und selbst auch ohne diese, treten leicht Herzklopfen und Unordnungen in der Herzbewegung ein, so wie Angst und das Gefühl von Beklemmung, wobei aber das Athmen in der Regel nicht wirklich gehemmt ist. In solchen Anfällen nimmt die blaue Färbung noch mehr überhand, der Körper wird kalt und es entstehen selbst Ohnmachten und zuweilen auch Zuckungen.

Ist die Blausucht durch angeborne und sehr bedeu-

tende Herzfehler erzeugt, so sterben meistens die Kinder in der ersten oder zweiten Woche nach der Geburt unter Zuckungen und Ohnmachten. Zuweilen entwickelt sich aber die Krankheit erst im zweiten und dritten Lebensjahre deutlicher, wo sie sodann bis zur Zeit der Mannbarkeit andauern kann, um diese Zeit aber in der Regel tödtet, doch hat man sie auch bis zum 40sten Jahre dauern gesehen. In den Tod geht das Leiden über unter einem Anfall von Erstickung oder Ohnmacht, zuweilen durch einen Blutsturz aus der Lunge, einen Schlagfluss, oder auch durch Abzehrung oder Wassersucht.

§. 1564.

Die Fehler des Herzens und der Gefässe, die dieser Krankheit zum Grunde liegen, sind: Offenbleiben des foramen ovale, eine schiefe Durchbohrung der Scheidewand zwischen den Vorkammern, was jedoch oft ohne die Blausucht vorkommt; Offenbleiben des Ductus arteriosus Botalli; theilweiser Mangel der Scheidewand zwischen den beiden Herzkammern; Mangel der Scheidewand sowohl in den Vor- als in den Herzkammern. Bei diesen Fehlern bestehen oft zugleich: Ursprung der Aorta aus beiden Herzkammern, Verengung der Lungenarterie, welche aber auch ohne Herzfehler vorkommen und erst in spätern Jahren durch Entzündung entstehen kann, Ursprung der Lungenarterie aus der Aorta, Oeffnung der untern Hohlvene in den linken Vorhof und Ursprung der Aorta aus der rechten Kammer und der Lungenarterie aus der linken.

§. 1565.

Die nächste Ursache der Blausucht besteht darin, dass das arterielle Blut durch die Beimischung von venösem einen Theil seiner Kraft verloren hat, mit der Organensubstanz und vorzüglich mit dem Nervensystem in Wechselwirkung zu treten; es sind daher alle Lebens-

prozesse, insbesondere die Wärmebildung und die Ernährung gesunken.

§. 1566.

Die **Behandlung** dieser unheilbaren Krankheit kann sich nur auf die Linderung der Zufälle beschränken. Gemüths- und zu starke Körperbewegungen müssen auf's sorgfältigste vermieden werden, um nicht die beschriebenen, von dem Herzen ausgehenden Anfälle zu veranlassen. Zur Minderung dieser Anfälle hat man auch kleine Blutentleerungen, kühlende Abführungsmittel, die Digitalis, das *Haller*'sche Sauer und eine nicht reizende Kost empfohlen. Sehr wohlthuend ist für die Kranken die künstliche Erwärmung der Glieder.

Der Scorbut.

(*Scharbock, Scorbutus.*)

Lind (Edinb. 1752, a. d. Engl. v. Petzold. Riga u. Lpz. 1773). — *Ch. L Hoffmann* (Münster 1782). — *Milman* (Lond. 1782, aus d. Engl. v. Lindemann. Berlin 1795). — *Trotter* (Edinb. 1786, aus dem Engl. v. Michaeis. Leipz. 1787). — *Bacheracht* (St. Petersburg 1786). — *Blane* (Beobacht. über d. Krankh. der Seeleute, aus dem Engl. Marb. 1788). — *Bulme* (Montpell. 1805 u. Paris 1819). — *v. Schraud* (Pesth 1804). — *Kéraudren* (Paris 1804). — *Köchlin* (med chirurg. Zeitung 1822).

§. 1567.

Der Scorbut ist die Kachexie, welche besonders durch ein schwammiges, leicht blutendes Zahnfleisch, Petechien, Blutflüsse und in den höhern Graden der Krankheit auch durch Schmerz und Steifigkeit der Gelenke und durch Athmungsbeschwerden sich ausspricht.

§. 1568.

Es scheint der Scorbut in der ausgebildeten Form, in welcher er auf Schiffen öfters herrscht, den Alten nicht bekannt gewesen zu sein, dagegen findet man in *Hippokrates* Werken Schilderungen von Krankheiten mit dem faulicht-scorbutischen Charakter. Nachdem im 13ten Jahrhundert der Compass auf den Schiffen eingeführt war, zeigte sich der Scorbut immer deutlicher, und als im 16ten Jahrhundert immer grössere Seefahrten unternommen wurden, so wurde der Scorbut so häufig beobachtet, dass er die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zog; man schrieb jedoch (besonders *Eugalenus*) dem Scorbut sehr viele Krankheiten zu, die nicht aus ihm entspringen. Zu den bessern, frühern Schriftstellern über den Scorbut gehören *Ronsseus*, *Wyer*, *Dodonaeus* und *Brucaeus*. Ein klassisches Werk lieferte später *Lind*.

§. 1569.

Man theilt den Verlauf des Scorbutes gewöhnlich in drei Zeiträume, doch ist diese Eintheilung mehr eine künstliche als natürliche, da die Krankheit keine deutliche Abschnitte zeigt, sondern ein ganz allmäliger Uebergang von den leichtesten zu den schwersten Graden der Krankheit statt findet.

Erster Zeitraum. Die Kranken fühlen ihre Kräfte geringer werden und haben desshalb eine Abneigung zu Muskelanstrengung, zuweilen fühlen sie dabei eine Art Steifigkeit in den Knieen, sie sind niedergeschlagen, ihre Gesichtsfarbe wird bleich und erdfahl, sie haben dunkle Ringe um die Augen, oft zeigt sich an den Wangen und den Lippen eine dunkelbläuliche Röthe, welche, genau betrachtet, aus einem feinen, varikösen Gefässneze besteht, das Zahnfleisch ist aufgelockert, schwammig, blutet leicht und ist oft selbst geschwürig (die Mundfäule, Stomacace), der Kranke riecht aus dem

Munde, die ganze Haut des Körpers hat eine schmuzige Farbe, das Oberhäutchen ist wie abgestorben und schuppt sich oft auch ab; mehr oder weniger zahlreiche Petechien und grössere Ecchymosen, dunkle Flecken und Striemen darstellend, entstehen nach und nach, vorhandene Geschwüre und Wunden erhalten ein schwammiges Ansehen, die Kranken bluten leicht aus der Nase und leiden auch an andern Blutflüssen, der Urin ist braun und trübe, der Puls ist klein und schwach. Oft schwellt die Haut um die Knöchel etwas ödematös an. Die Kranken haben Abneigung vor Fleischspeisen und dagegen Verlangen nach säuerlichen Dingen und frischen Gemüsen.

Zweiter Zeitraum. Alle die erwähnten Zufälle nehmen zu, insbesondere aber wird die Steifigkeit der Gelenke grösser; diese Theile, vorzüglich die Kniee, werden schmerzhaft und schwellen an, oft wie bei dem Gliedschwamm; auch stellen sich oft Schmerzen in den Knochen selbst ein, und es bilden sich auch Geschwülste in den muskulösen Theilen. Die Kranken empfinden Stiche in der Brust, leiden an Schwerathmigkeit und husten oft Blut aus; auch werden dieselben oft von Kolikschmerzen befallen, es wird zuweilen Blut durch Erbrechen und die Stuhlentleerungen ausgeleert und die andern, gewöhnlich schon früher vorgekommenen Blutergiessungen aus dem Zahnfleische, der Nase, der Gebärmutter etc. wiederholen sich gerne von neuem. Häufig bilden sich, besonders an den mit Blut unterlaufenen Stellen der Haut, so wie an alten Narben, Geschwüre. Es werden nämlich solche Stellen bläulich-roth, schmerzhaft, schwellen an, brechen auf und ergiessen eine mit Blut gemischte Jauche. Der Grund des hierdurch gebildeten Geschwüres ist schlaff und es wachsen schwammige Auswüchse hervor, die Ränder desselben sind ebenfalls schwammig, aufgetrieben, dunkelblau und oft

ödematös. Bei längerer Dauer solcher Geschwüre werden zuweilen die unter ihnen liegenden Knochen angegriffen und von Beinfrass befallen, das Zahnfleisch wird oft brandig und die Zahnfächer von Beinfrass ergriffen, ebenso werden die aufgelegenen Stellen brandig.

Dritter Zeitraum. Der Kranke sinkt nun, indem die erwähnten Zufälle, besonders die Blutflüsse, immer heftiger werden, in die höchste Erschöpfung, so dass er leicht in Ohnmacht verfällt. Gewöhnlich gesellt sich ein fieberhafter Zustand hinzu, wodurch die Krankheit einem hohen Grade vom Faulfieber gleicht, kalte, klebrige und zuweilen selbst blutige Schweisse brechen aus. Häufig wird der Kranke nunmehr auch gelbsüchtig und wassersüchtig, die untern Gliedmassen werden oft lahm und es sterben selbst ganze Glieder durch den Brand ab. Das entleerte Blut soll oft schwarz wie Tinte, aufgelöst und oft auch etwas gelblich sein.

§. 1570.

Es ist der Verlauf dieser Krankheit im Ganzen langwierig. Schneller und oft schon in wenigen Wochen wird der s. g. Seescorbut tödtlich, viel schleichender ist der Verlauf bei dem Landscorbute. In Gesundheit geht die Krankheit allmälig ohne besondere Krisen über, in den Tod durch Erschöpfung der Kräfte.

§. 1571.

Als verschiedene Arten des Scorbutes hat man den See- und den Landscorbut angenommen. Der Unterschied zwischen beiden besteht jedoch nur in verschiedenen Graden der Krankheit, indem der leztere gewöhnlich einen mildern Verlauf als der erstere hat, insbesondere kommen bei ihm nur selten die Schmerzen und Geschwülste der Gelenke und die Brustbeschwerden vor.

§. 1572.

Ausser den genannten Verschiedenheiten kommen noch folgende Modifikationen des Scorbutes vor:

1) Die *Werlhof'sche Blutfleckenkrankheit* (Morbus maculosus haemorrhagicus Werlhofii, Haemorrhoea petechialis). *)

Werlhof (opp. Tom. III. pag. 540 u. 748). — *Behrens* (Diss. Brunsvig. 1735 u. rec. in Werlh. opp. p. 587 und 615). — *Wichmann* (Ideen z. Diagnost.). — *Acrel* (Diss. Upsal. 1797). — *Havinga* (lat. Gröening. 1799). — *Harless* (in Hufelands Journ. B. 10). — *Hergt* (Hannover 1829).

Es zeigen sich linsengrosse, und auch grössere, rothe und bläulich rothe Flecken auf der Haut (Petechien), wobei zuweilen (wie auch ich in einem Falle beobachtet habe) sich so viel Blut unter die Epidermis ergiesst, dass diese von dem unter ihr liegenden Schleimneze getrennt wird und ein kleines Blutbläschen darstellt. Das Zahnfleisch wird missfarbig, schwammig, im ganzen Umfange der Mundhöhle bilden sich rothe, braune und selbst schwärzliche Flecken, welche bei leichter Berührung stark bluten, so dass oft ein wahrer Blutfluss daraus entsteht, sie bedecken sich mit einer Art Schorfe, aus welcher ebenfalls viel Blut aussickert. Zuweilen ergiesst sich auch Blut aus andern Theilen, ja man hat selbst die Thränen blutig gesehen. Bei längerer Dauer der Krankheit, welche bei richtiger Behandlung sehr abgekürzt werden, aber auch Monate und Jahre betragen kann, werden die Kranken sehr schwach, blass und schwellen zulezt wassersüchtig an.

§. 1573.

2) Die *Mundfäule und der sogenannte Wasserkrebs.*

*) Es ist die *Werlhofische* Blutfleckenkrankheit wohl nicht immer scorbutischen Ursprungs; wenigstens beobachtete ich einen Fall, in welchem die erwähnte Krankheit bei einer sehr kräftigen Person in Folge der unterdrückten Reinigung plözlich entstand und durch eine Aderlässe schnell geheilt wurde. Ich hielt die Krankheit für eine Blutcongestion nach der Haut.

Amman (lat. Lpz. 1681). — *van Lil* (Samml. auserles. Abhandl. B. 2.). — *Berthe* (ebend. B. 2.). — *Ploucquet* (lat. Tübing. 1794). — *Michaelis* (in Hufeland's u. Himly's Journal. 1809). — *Mende* (ebend.). — *Siebert* (Hufel. Journ. 1818). — *Klaatsch* (Hufel. Journ. 1823). — *Angelot* (Revue méd. 1827). — *A. L. Richter* (Berlin 1828, ein Nachtrag hiezu 1832). — *F. J. Wiegand* (Erl. 1830). — Ausserdem die Schriftsteller über Kinderkrankheiten.

Beide Uebel, von denen das leztere blos eine bösartige Form des erstern zu sein scheint, sind mehr oder weniger den Entartungen des Zahnfleisches, die im Scorbute vorkommen, ähnlich oder gleich, doch werden sie auch ohne andere Zeichen des Scorbutes angetroffen.

Die gewöhnliche Mundfäule (Stomacace), welche oft zur Zeit des Zahnwechsels, zuweilen in Verbindung mit gastrischen Unreinigkeiten oder einem kachektischen Zustand vorkommt, gibt sich durch ein leichtes Gefühl von Brennen des Zahnfleisches, durch Anschwellung und Schwammigwerden desselben, so wie auch zum Theil des übrigen Theiles der Schleimhaut, die die Mundhöhle überzieht, zu erkennen. Es entstehen sodann weisse Bläschen, welche bersten und in Geschwüre von der Grösse einer Linse bis zu einem Groschen, welche einen speckigen Grund und etwas erhöhte, entzündete Ränder haben, übergehen. Oft erkennt man auch an diesen Stellen nur eine weisse, schwielige Haut. Dabei fliesst der Speichel stark, der Kranke riecht übel aus dem Munde und es schwellen oft die Speichel- und auch zuweilen die lymphatischen Drüsen etwas an. Die Geschwüre heilen übrigens, besonders bei richtiger Behandlung, leicht und die Krankheit geht oft schon in einigen Tagen in Gesundheit über, seltener dauert sie bis zu zwei Wochen.

§. 1574.

Der s. g. Wasserkrebs oder, richtiger bezeichnet, die bösartige Mundfäule (Stomacace maligna, gangraenosa, Cancer aquaticus, Noma) entwickelt sich zuweilen

allmälig aus der gutartigen Mundfäule oder es entsteht, nachdem acht bis vierzehn Tage grosse Unruhe, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Durchfälle etc. angedauert haben, auf dem Zahnfleische oder an einer andern Stelle im Munde ein Bläschen, das mit einer schmerzhaften Entzündungsröthe umgeben ist und schnell in ein um sich fressendes Geschwür übergeht, oder es überzieht sich das geröthete und schmerzhafte Zahnfleisch mit einem weissen Fleck, der sich bald als eine Brandschorfe darstellt, worauf entweder die Brandschorfe sich losstosst und das hierdurch entstandene Geschwür heilt oder diese Stelle in ein immer mehr um sich fressendes, brandiges Geschwür übergeht. Es fliesst eine übelriechende Jauche aus dem Munde, die Zähne werden locker und fallen aus, selbst Stücke des Kiefers sondern sich ab und die Nasenbeine werden zerstört, wobei sich leicht Blut aus dem Munde oder der Nase ergiesst. Häufig entzündet sich auch die Lippe und die äussere Seite der Wange, es entstehen schwarze und bleifarbene Bläschen auf denselben, die aufbrechen und um sich fressen und einen aashaften Geruch verbreiten. Zulezt werden alle Absonderungen scharf und übelriechend, Durchfälle stellen sich ein, die Füsse schwellen ödematös an und ein heftiges Fieber verzehrt vollends die Kräfte des Kranken.

§. 1575.

Bei den Leichenöffnungen der am Scorbute Gestorbenen, fand man das Blut schwarz und aufgelöst, das Herz sehr welk, einzelne Eingeweide brandig, namentlich auch zuweilen die Lungen, serös-blutige Flüssigkeit in die Höhlen ergossen, die Milz weich, die Gekrösdrüsen angeschwollen, einzelne Muskeln mit schwarzem Blute angefüllt und zuweilen auch brandig, eine gräuliche Flüssigkeit, statt der Synovia, in den Gelenkhöhlen, in einzelnen Knochen Beinfrass.

§. 1576.

Die Ursachen des Scorbutes sind vorzüglich eine feuchte und kalte Atmosphäre, wie sie auf den nördlichen Meeren und an den nördlichen Seeküsten beschaffen ist, oder auch (nach *Trotter*) eine sehr heisse Luft, wie unter den heissen Himmelsstrichen, und der fortgesezte Genuss unpassender Nahrung, insbesondere bei Entbehrung von frischem Gemüse, der Genuss von gesalzenem, geräuchertem oder eingepöckeltem Fleische, halb verdorbenem Fleische oder halb verdorbenen Fischen etc. Ausserdem der Aufenthalt in einer feuchten Wohnung, in welcher die Luft nicht gehörig erneuert wird, Mangel an Bewegung, niederbeugende Gemüthsaffecte, Mangel an Nahrung, grosse Unreinlichkeit, schwächende Krankheiten, z. B. das Nervenfieber und Blutflüsse, dyscrasische Krankheiten, wie z. B. die Lustseuche, auch vermag das Quecksilber einen dem Scorbute ähnlichen Zustand hervorzubringen.

§. 1577.

Als Ursachen der *Werlhof*'schen Blutfleckenkrankheit hat man ähnliche Einflüsse beschuldigt, namentlich eine ungesunde Nahrung, ungesunde Wohnung, Traurigkeit etc.; ausserdem leitet man sie auch von Scharlach, Kräze, Stockungen im Pfortadersysteme etc. her.

Die gutartige Mundfäule wird öfters von dem Zahnreiz und von gastrischen Reizen hervorgebracht, und kommt auch zuweilen bei rheumatischer oder catarrhalischer Krankheitsconstitution epidemisch vor. — Die bösartige Mundfäule kommt bei kachektischen Kindern unter Einwirkung einer feuchten Wohnung mit Mangel an frischer Luft, bei dem Gebrauche schlechter Nahrungsmittel, bei grosser Unreinlichkeit etc. vor, und wird daher in der Regel nur bei Kindern der ärmsten Volksklasse angetroffen.

§. 1578.

Die Ansichten über das W e s e n der Krankheit weichen vorzüglich darin von einander ab, dass viele Aerzte dasselbe in den flüssigen, andere in den festen Theilen suchen. Wohl die meisten Aerzte nehmen eine faulichte Auflösung des Blutes an. *Boerhave* glaubte, dass verschiedenartige Verderbnisse der Säfte, eine saure, kochsalzartige, ammoniakalische und ranzige, stattfinden können. *L. Hoffmann* nahm eine alkalische Schärfe an, *Jakson* übermässige Anhäufung des Phlogistons, mehrere Aerzte Mangel an Sauerstoff, *Mackride* Mangel an Kohlenstoff, *Puchelt*, neben einer schlaffen Faser, überwiegende Venosität, *Harless* sucht den nosochemischen Character der Blutausartung in Zersezung des Blutes mit Verminderung seines Cruors und vorzüglich seines Faserstoffes und der Gallerte, auch mit Zersezung seines Albumens und zugleich mit Verminderung seines Sauerstoffgehaltes, so wie selbst seines Stickstoffes, dagegen mit Vermehrung des Wässerigten und des Kohlenstoffes. Aus einem Leiden der festen Theile, insbesondere aus Schwäche der Lebensthätigkeit, wovon der Fehler der Säfte nur die Folge sei, erklärten *Lind*, *Sprengel*, *Dreyssig* u. A. die Krankheit.

Es scheint sowohl auf dem einen, als auf dem andern Wege die Krankheit entstehen zu können, und wohl meistens die Krankheitseinflüsse auf beide bezeichneten Krankheitsfactoren zugleich zu wirken. Das Blut leidet primär, indem ein Mangel derjenigen Stoffe vorhanden ist, die zur Bereitung eines gesunden, lebenskräftigen Blutes nothwendig sind, und indem dagegen andere Stoffe, z. B. salzige Theile, die zur Auflösung des Blutes beitragen, in die Blutmasse gelangen; die festen Theile und das Nervensystem insbesondere leiden dagegen durch Anstrengung, deprimirende Gemüthsaffekte etc. Ist nun das Blut das zuerst Krankhafte, so wird eine

krankhafte Wechselwirkung zwischen den festen Theilen und dem Blute eintreten, die Kräfte werden sinken, die Ernährung fehlerhaft, und sind scharfe Bestandtheile, wie z. B. salzige Theile im Blute vorhanden, so werden sie in den Capillarrinnen als Reiz auf die Nervenmasse wirken und werden daher Entzündungen veranlassen. Ist dagegen das Nervensystem geschwächt, so sinkt auch die Lebenskraft im Blute und den übrigen Stoffen des Körpers, und diese gerathen in einen aufgelösten Zustand, wie man dieses bei hohen Graden des Nervenfiebers und bei Lähmungen deutlich wahrnimmt.

§. 1579.

Die Vorhersage richtet sich zum Theil nach dem Grade des Uebels, und vorzüglich nach der vorhandenen Möglichkeit, die schädlichen Einflüsse hinwegzuräumen. Kann dem Scorbutischen eine gesunde Nahrung dargeboten werden, kann er einen gesunden Aufenthalt wählen, so sind selbst hohe Grade des Scorbutes heilbar; auch besizen wir wirksame Arzneimittel gegen diese Krankheit.

In der *Werlhof*'schen Blutfleckenkrankheit bilden sich, mit Ausnahme der Blutungen, die schwerern Zufälle des Scorbutes nicht aus und es wird daher diese Krankheit selten tödtlich.

Die gutartige Mundfäule ist für sich nicht gefährlich, dagegen wird der sogen. Wasserkrebs meistens tödtlich.

§. 1580.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Es muss möglichst dafür gesorgt werden, dass die Wohnung der scorbutischen Kranken, insbesondere die Schiffsräume, gut ausgelüftet und trocken erhalten werden, die Kranken müssen sich warm und trocken kleiden, ihre Zeit mehr auf den Verdecken, als in den untern Räumen des Schiffes zubringen; leben sie auf dem Lande, so müssen sie, wo möglich, eine

hoch gelegene, trockene und warme Gegend zu ihrem Aufenthalte wählen. Es muss für gutes Trinkwasser Sorge getragen werden und es werden mit Vortheil die unten anzugebenden antiscorbutischen Getränke gereicht. Zur Nahrung bediene man sich, unter möglichster Vermeidung des geräucherten, des eingesalzenen Fleisches etc., vorzüglich frischer Gemüse, besonders von den unten anzugebenden Pflanzen, des Sauerkrautes, des Salates und Speisen mit Meerrettig, Senf etc., frischen Fleisches etc. Von Wichtigkeit ist es auch, so viel als möglich, eine muthige und frohe Gemüthsstimmung bei dem Kranken zu erhalten und ihn zu einer mehr thätigen Lebensweise anzuhalten.

§. 1581.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Wir besizen eine Reihe von Mitteln, die beinahe specifisch dieser Dyscrasie entgegenwirken. Sie scheinen grösstentheils dadurch zu wirken, dass Theile derselben in die Blutmasse aufgenommen werden und dadurch die Mischung des Blutes verbessert wird, zum Theil auch dadurch, dass sie die Lebensthätigkeit erhöhen und dadurch eine kräftigere Blutbereitung bewirken, und den Organismus zur Ueberwältigung der nachtheiligen Einflüsse fähiger machen. Hieher gehören säuerliche Stoffe, die Limonade, Wasser mit Pomeranzensaft, Berberizen, Johannisbeeren, saure Kirschen, Sauerampfer, Sauerklee, der Essig, ein säuerlicher Wein, z. B. Rheinwein, und in den hohen Graden des Scorbutes die Mineralsäuren, ferner die Buttermilch, die Kohlensäure haltenden Getränke, wie die kohlensauren Mineralwasser, ein musierendes Bier, der Malztrank, der Champagner, sodann die eigentlichen antiscorbutischen, ein scharfes Princip enthaltenden Pflanzen, wie Nasturtium aquaticum, Cochlearia, Beccabunga, Rettig, Meerrettig, Senf, z. B. als Senfmolken, endlich erregende und tonische Mittel

wie Wein, etwas Arack unter das Getränke, gewürzhafte und bittere Tinkturen, das Extractum Absinthii, Trifolii fibrin., Cortic. Aurant., die Wurzel von Calamus aromaticus, die Chinarinde und zulezt das Eisen.

Hiermit werden mit Nuzen äusserliche Mittel verbunden, Waschungen des Körpers mit frischem Wasser, kühle Bäder, Waschungen mit Wasser und Essig, oder mit einem Zusaz von aromatischem Essig oder mit etwas Mineralsäure, so wie mit Wein, Branntwein, Spiritus camphoratus etc.

§. 1582.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Die Behandlung des schwammigen, leicht blutenden Zahnfleisches wird weiter unten, bei der Darstellung der Kur der Mundfäule angegeben werden. — Die Blutflüsse sucht man stets zu stillen und behandelt sie wie passive Blutflüsse. — Die geschwollenen und schmerzhaften Gelenke bäht man mit Abkochungen von antiscorbutischen Kräutern. — Die Geschwüre verbindet man mit Abkochungen von Eichen-, Weiden- und Chinarinde, mit Zusaz von Mineralsäure, mit verdünnter brenzlicher Holzsäure, mit *Thedens* Schusswasser, mit rothem Wein, mit Gummikino, mit Alaunauflösung, mit Chinapulver, Kohlenpulver, Kampher, Myrrhen, Storax etc. Auch wird empfohlen, das Glied, an welchem das Geschwür sich befindet, mit Binden, die mit stärkenden Mitteln befeuchtet sind, einzuwickeln.

§. 1583.

Bei der Behandlung der *Werlhof*'schen Blutfleckenkrankheit soll man, nach *Kreysig*, [1]) besonders suchen, die etwa vorhandenen Blutanhäufungen in dem Pfortadersysteme zu heben und daher kühlende Abführungsmittel anwenden. Im Uebrigen sind die gegen den scorbuti-

1) Die Krankh. d. Herz. Thl. I. S. 178.

schen Zustand und die Blutflüsse wirksamen Mittel anzuwenden, wie verdünnte Mineralsäuren und das Elixir acidum Halleri, die China etc., so wie Waschungen des Körpers mit frischem Wasser, Wasser mit Essig, Mineralsäuren etc. — Ist die Krankheit durch Unterdrückung eines Blutflusses entstanden, so möchte wohl die Aderlässe das Hauptmittel sein.

§. 1584.

Um die Mundfäule und den s. g. Wasserkrebs zu heilen, muss der Krankheitszustand, in deren Verbindung sie vorkommen, gehoben werden, die wichtigsten Mittel sind übrigens in beiden Krankheitsformen die örtlichen. Gegen die gewöhnliche Mundfäule dienen: Mundwasser von Abkochungen von Eichen-, Weiden-, Chinarinde, von Salbei, mit Zusäzen von Essig, Mineralsäuren, Alaun, Spiritus Cochleariae, Myrrhentinctur und Honig, oder Rosenhonig mit denselben Zusäzen. — Gegen den Wasserkrebs können dieselben Mittel gebraucht werden, vor Allem ist aber von *van Swieten* und Andern die Salzsäure, mit Wasser vermischt oder in Verbindung mit Rosenhonig (20 bis 30 Tropfen auf eine halbe Unze) und selbst unvermischt auf die kranke Stelle gebracht, empfohlen worden.

Die Fettsucht.

(*Hyperpiaenesis, Polypionia, Polysarcia, Obesitas nimia.*)

Jansen (lat. Leyden 1784, übersezt von Jonas. Halle 1786). — *Lorry* (a. d. Franz. v. Lindemann. Berlin 1797).

§. 1585.

Die **Fettsucht** ist die Krankheit, in welcher eine solche Menge Fett gebildet wird, dass hierdurch die

Verrichtungen der Organe mehr oder weniger gehemmt werden *).

§. 1586.

Die von der Fettsucht befallenen Individuen werden oft ausserordentlich dick und schwer, so dass man Beispiele hat, dass ihr Gewicht 400, ja 630 Pfunde betrug. Die Umrisse der Muskeln, der Sehnen etc. sind bei fetten Personen nicht mehr sichtbar, alle Theile sind rund und weich, die Bewegung der Muskeln geschieht meistens sehr langsam und auch gewöhnlich nicht mit der Kraft, als der oft colossale Bau des Körpers erwarten liesse, jede stärkere Körperbewegung geschieht unter keuchendem Athem und dem Ausbruch von reichlichem Schweisse, wobei einzelne Theile leicht wund werden (das Frattsein). Meistens ist auch der Geist träge, die Kranken haben eine grosse Neigung zum Schlafe, besonders nach dem Essen, ihre Zeugungskraft ist gering, dagegen vermögen dieselben oft länger der Kälte zu widerstehen und Nahrung zu entbehren. Zuweilen haben die Kranken, wenn in den Körperhöhlen die Fettansammlung sehr bedeutend ist, sehr bedeutende Zufälle, namentlich einen unordentlichen und schwachen Herzschlag mit Angst und Erstickungsanfällen, anhaltend erschwertes Athmen, häufige Schwindel etc. Der Urin ist oft sehr trübe und soll zuweilen wie Seifenauflösung sein, und auch einen rothen Bodensaz, und Fettaugen und ein schillerndes Häutchen auf der Oberfläche zeigen. — Oft ist der Körperumfang nicht so sehr bedeutend, die Zufälle der innern Fettanlagerung aber so stark, dass selbst der Tod hiedurch erfolgen kann.

*) Von den Fettgeschwülsten (Lipoma) und der Umwandlung der Muskeln, Knochen etc. in eine speck- oder fettwachsähnliche Substanz, wird in dem Abschnitte von den örtlichen Desorganisationen die Rede sein, so weit diese Veränderungen nicht Gegenstand der Chirurgie sind.

§. 1587.

Die Fettsucht ist ein langwieriges und oft habituelles Leiden, doch verliert sie sich zuweilen auch allmälig, besonders im höhern Alter. Sie geht oft in Wassersucht über, und kann sowohl durch diese, als auch ohne dieselbe, durch Erstickung, Hemmung der Herzbewegung und auch durch Schlagfluss tödten.

§. 1588.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Das Fettlager in der Bauchwandung und an andern Theilen des Körpers ist oft mehrere Zolle dick, wo dagegen die Muskeln als ganz dünne, oft kaum bemerkbare Schichten erscheinen. Im Innern des Körpers ist das Fett am meisten am Neze und dem Gekröse, und nebst diesem am Herzbeutel angelagert. Die Leber ist zu gross. Meistens ist etwas seröse Flüssigkeit in den Höhlen des Körpers enthalten. — In einem Falle, in welchem der nicht besonders dicke Kranke, unter Zufällen, welche der Brustwassersucht glichen, gestorben war, fand ich die Brusthöhle so sehr mit Fett ausgepolstert, dass die Lunge sich kaum bewegen konnte; das Herz, welches wenig Muskelsubstanz, aber viel Fett besass, lag in einer Kapsel von Fett, das sich um den Herzbeutel angelagert hatte. Ebenso war die Unterleibshöhle von Fett gleichsam ausgepfropft und die Gedärme lagen zu dünnen Stricken eingeschrumpft in einer Masse von Fett, das sich am Gekröse angelagert hatte und die ganze Bauchhöhle ausfüllte.

§. 1589.

Anlage zur übermässigen Fettbildung gibt vorzüglich das phlegmatische und in geringerem Grade auch das sanguinische Temperament, so wie das Alter zwischen 30 und 50 Jahren; auch ist dieselbe oft erblich.

Gelegenheitsursachen sind der Genuss reichlicher und stark nährender Speisen, vielen Fleisches, Bieres etc.,

wiewohl Individuen, die wenig essen, bei vorhandener Anlage fett werden können, ferner zu geringer Verbrauch der Kräfte und Stoffe, daher eine sizende Lebensart, langes Schlafen, grosse Geistes- und Gemüthsruhe, Hemmung naturgemässer Absonderungen, z. B. der Milch bei unterlassenem Stillen, Enthaltung vom Beischlafe etc., ferner der reichliche Genuss gewisser Stoffe von besonderer Wirkung auf den Körper, z. B. der zu starke Genuss von geistigen Getränken, endlich auch zuweilen überstandene Blutungen und andere nicht mehr fortdauernde schwächende Einflüsse, wie z. B. frühere Ausschweifungen in der Liebe, Merkurialkuren etc.

§. 1590.

Wesen. Man glaubt, dass bei der zu starken Fettbildung, Kohlenstoff und Wasserstoff in dem Blute überwiege, und dagegen Sauerstoff in zu geringer Menge vorhanden sei, woher es denn auch komme, dass die zur Ausscheidung unbrauchbarer Stoffe bestimmte Leber so gross werde. Mit der Wasserbildung scheint die krankhafte Fettbildung einige Verwandtschaft zu haben, da sie oft auf dieselben Gelegenheitsursachen eintritt, z. B. auf den Missbrauch geistiger Getränke, auf Blutflüsse etc., da sie ferner, wie jene oft mit einem Leberleiden in Verbindung steht, da auf sie die Wassersucht oft folgt, und in den in beiden Krankheiten gebildeten Stoffen der bei andern Erzeugnissen dei productiven Prozesse vorkommende Stickstoff fehlt. Die Fettbildung, welche also zu den unvollkommenern Vegetationsprozessen gehört, scheint sowohl dadurch eintreten zu können, dass mehr Nahrungsstoffe, als die Natur zu den vollkommenern Gebilden umzuschaffen vermag, dem Körper dargeboten werden, was theils in der absolut zu grossen Menge von Nahrungsmitteln, theils in einer zu langsamen Verzehrung der organischen Stoffe und theils in Schwäche

des reproductiven Systems begründet sein kann, als auch dadurch, dass solche Stoffe in das Blut hineinkommen oder nicht gehörig durch die Ausscheidungen aus demselben entfernt werden, welche vielleicht nicht zur Erzeugung höherer Gebilde, aber zur Fettbildung tauglich sind.

§. 1591.

Vorhersage. Die Fettsucht wird, so lange nicht eine andere Krankheit hinzukommt, nur sehr selten lebensgefährlich, doch erreichen sehr fette Leute, besonders wenn die zu grosse Fettbildung schon in früher Jugend eintrat, selten ein hohes Alter. Die Kunst vermag gegen diese Krankheit nicht viel.

§. 1592.

Behandlung. a) Die Erfüllung der *Anzeigen aus den Ursachen* ist in der Regel der einzige Weg, wodurch das Uebel gemildert werden kann, der Kranke schlafe wenig, unterziehe sich andauernd anstrengenden Arbeiten und sei sehr mässig im Genusse der Speisen und der geistigen Getränke.

§. 1593.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Man hat folgende Mittel empfohlen: den reichlichen Genuss von Salz und gesalzenen Speisen, den reichlichen Genuss von Meerzwiebelessig, die Seife (von *P. Frank* empfohlen), wiederholt angewandte Abführungsmittel, die Jodtinctur (*Gräfe*) etc., welche Mittel jedoch selten ihrem Zwecke entsprechen und die Gesundheit oft noch mehr zerrütten möchten. Eher sind die ebenfalls empfohlenen Sauerbrunnen, kalte Bäder, Stahlbäder und trockene Frictionen anzuwenden.

§. 1594.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Gegen den häufig eintretenden Schwindel und gegen die Beengungsanfälle können die gewöhnlichen Mittel, z. B.

Ableitungsmittel und Blutentleerungen angewandt werden, doch leztere nur bei dringender Nothwendigkeit, indem sie bei der Fettsucht selten gut ertragen werden.

Die Wassersucht.

Don. Monro (Lond. 1755, a. d. Engl. v. Krause, Altenb. 1777). — *Milman* (Lond. 1799, a. d. Lat. v. Seger, Braunschw. 1782). — *Bachers* (a. d. Franz., Berl. u. Stettin 1781). — *Sachtleben* (Danzig 1795). — *Camper* (Samml. auserles. Abhandl. B. 16). — *Lentin* (Beiträge zur ausüb. Arzneiw.). — *Blackall* (Lond. 1814, a. d. Engl. v. Radius, Lpz. 1821). — *Eggert* (Lpz. 1817). — *Chrestien* (Paris 1817). — *Portal* (2 Tom. Par. 1824).

§. 1595.

Wassersucht im weitesten Sinne des Wortes ist jede krankhafte Ansammlung einer wässerigen Flüssigkeit im Zellgewebe oder den Höhlen des Körpers.

§. 1596.

Die allgemeinen Zeichen der Wassersucht sind: Zunahme des Umfangs in den ergriffenen Theilen, wenn sie nämlich einer Ausdehnung fähig sind; teigicht anzufühlende Substanz des ergriffenen Organs, welche durch einen Druck mit dem Finger einen nicht sogleich verschwindenden Eindruck erhält; verminderte Wärme und blasses Aussehen der ergriffenen Theile; unter gewissen Umständen das Gefühl und das Geräusch vom Schwappen des Wassers; Störungen in den Verrichtungen des leidenden Organs, nicht mit dem Character der Reizung, sondern mit dem der Hemmung der Function; sparsame Absonderung des Harnes und Verminderung der Absonderungen überhaupt; Zeichen der Wassersucht

in andern Theilen, als den zuerst ergriffenen, namentlich ödematöse Anschwellung der Füsse und der Augenlieder; Abnahme der Kräfte.

§. 1397.

Der Verlauf der Wassersucht ist selten acut, meistens chronisch. Ist er acut, so beginnt die Krankheit gewöhnlich mit den Zeichen einer Entzündung besonders einer solchen der serösen Häute, oft auch als Rheumatismus, Rose etc., der Puls ist oft sehr voll und fieberhaft gereizt, und es entwickeln sich sodann die Zeichen der örtlichen und der allgemeinen Wassersucht mit reissender Schnelligkeit, oder es bilden sich auch ohne die genannten Krankheitszustände mit oder ohne Zeichen eines primären Nierenleidens die Zufälle der Wassersucht in wenigen Tagen aus.

Ist der Verlauf langwierig, so entwickelt sich die Krankheit oft aus einem andern chronischen Leiden, oft auch ohne dieses und ganz allmälig, nachdem in der Regel schon längere Zeit das Aussehen des Kranken blass oder erdfahl war und die Kräfte desselben geschwächt erschienen, wobei gewöhnlich kein Fieberzustand vorhanden ist. Die Krankheit kann in diesem Falle Monate und Jahre lang anhalten und verschiedene Grade der Stärke zeigen.

In Gesundheit geht die Krankheit gewöhnlich über unter reichlichem Abflusse des Harnes, welcher dabei meistens seine braune Farbe und sazige Beschaffenheit verliert, und eine gelbe Farbe und ein beinahe wasserhelles Aussehen erhält. Seltener und vorzüglich nur bei acutem Verlaufe entscheidet sich die Wassersucht unter Schweissen, manchmal auch unter Durchfällen. Auch hat man die Geschwulst aufbrechen und das Wasser sich mit günstigem Erfolg nach Aussen entleeren gesehen und auch Entscheidung der Krankheit unter dem Eintritt

eines Speichelflusses, der Hämorrhoiden, der monatlichen Reinigung, eines Rothlaufes etc. beobachtet.

In den Tod geht die Wassersucht grösstentheils durch Hemmung der Verrichtungen edler Organe, namentlich der Herzbewegung, des Athmens, der Gehirnthätigkeit über; öfters auch durch Erschöpfung der Kräfte, nachdem oft noch ein hektisches Fieber hinzu gekommen ist.

§. 1598.

Es zeigt die Wassersucht mancherlei Verschiedenheiten in ihrem Bilde: manchmal ist sie, wie schon bemerkt worden ist, acut (H. acutus), in den meisten Fällen chronisch (H. chronicus), zuweilen besteht neben der Wasserergiessung ein entzündlicher Zustand, wie dieses namentlich bei der aus einer Affection einer serösen Haut entspringenden Wassersucht oft der Fall ist (H. inflammatorius); das in den Höhlen des Körpers enthaltene Wasser befindet sich bald frei in denselben (H. diffusus), bald ist es in besondere Säcke eingeschlossen (H. saccatus), die ergossene Flüssigkeit ist bald rein wässerig, bald mit weissen Flocken gemengt und bald wie mit Eiter oder wie mit Blut gemischt. Die chemische Untersuchung zeigt besonders häufig einen grossen Reichthum von Eiweiss. Endlich zeigt die Krankheit Verschiedenheiten nach der Verschiedenheit des Theiles des Körpers, in welchem das Wasser sich befindet, wornach es folgende Arten von Wassersucht giebt:

§. 1599.

Die Hautwassersucht (Hydrops anasarca, Aqua intercus, der geringere Grad desselben Leucophlegmatia, die wassersüchtige Anschwellung einzelner Theile Oedema). Dieselbe beginnt gewöhnlich mit einer Anschwellung der Weichtheile um die Knöchel herum, wobei diese Theile blass bleiben, eher eine kältere als vermehrte Temperatur haben und bei dem Druck mit dem Finger eine Delle

erhalten. Die Geschwulst breitet sich sodann bis zu den Zehen hin und gegen die Kniee hinauf aus, während welcher Zeit auch das Gesicht einige Spuren von Aufgedunsenheit erhält und die Augenlieder wässerigt anschwellen, doch kann das Gesicht in diesem Zeitraum auch seine gewöhnliche Beschaffenheit behalten. Die Geschwulst der Füsse steigt im weitern Verlauf der Krankheit bis an den Bauch, es schwellen sodann auch die Bauchbedeckungen an, der Hodensack schwillt auf und unterscheidet sich in diesem Zustande von der Hydrocele dadurch, dass nicht erst unter der Haut eine Geschwulst zu fühlen ist, sondern die Haut selbst, nebst dem zunächst unter ihr liegenden Zellgewebe angeschwollen, sehr gespannt, dünn, zart, glänzend und meistens etwas geröthet ist. Am spätesten schwellen gewöhnlich die Hände an, die sodann auf ihrer Rückseite von der ödematösen Geschwulst wie von einem Bäuschchen bedeckt sind, doch kann auch die Anschwellung eines Armes, besonders wenn der Kranke darauf lag, viel früher eintreten. Im höchsten Grade der Hautwassersucht schwellen die Lippen, die Augenlieder, das ganze Gesicht unförmlich an und die Geschwulst breitet sich auch auf die Weichtheile des Halses aus, so dass der Kranke kaum die Augenlieder öffnen kann und unter einem schnarchenden Geräusche athmet. Ist die Geschwulst sehr gross, so wird die Haut ganz gespannt, glänzend und kalt, dabei aber werden einzelne Stellen, besonders über den Knöcheln, roth, heiss und schmerzhaft (das Erythema leve W.), es entstehen an denselben Risse und kleine zerplazende Bläschen, aus welchen eine grosse Menge Wasser aussickert und welche in flache Verschwärungen sich verwandeln. Zuweilen werden diese Stellen auch bläulich und gehen in wirklichen Brand über.

In Gesundheit geht die Hautwassersucht unter den gewöhnlichen Entscheidungen der Wassersucht über,

manchmal auch, jedoch selten durch den Aufbruch der oben beschriebenen Stellen, in den Tod durch Erschöpfung der Kräfte und, was der häufigere Fall ist, durch Hinzukommen einer Bauch-, Brust- und Herzbeutelwassersucht.

§. 1600.

Die Kopfwassersucht (Hydrocephalus) im weitesten Sinne des Wortes ist jede krankhafte Ansammlung einer wässerigten Flüssigkeit unter den Bedeckungen des Schädels oder innerhalb der Schädelhöhle.

§. 1601.

Die Kopfwassersucht wird eingetheilt in die äussere und in die innere Kopfwassersucht, oder den äussern und den innern Wasserkopf, welche leztere Bezeichnung aber von Manchen nur für die Arten der Kopfwassersucht gebraucht wird, bei welchen eine Vergrösserung in dem Umfang des Kopfes wahrgenommen wird. Ausserdem nehmen Einige noch als dritte Art die gemischte Kopfwassersucht an, bei welcher ein äusserer und ein innerer Wasserkopf zugleich bestehen.

Unter der Benennung innere Kopfwassersucht versteht man im weitesten Begriffe jede Ansammlung von Wasser innerhalb der Schädelhöhle, mag sie zwischen den Gehirnhäuten oder in den Hirnhöhlen stattfinden, in einem engern Sinne aber nur die Ansammlung von Wasser zwischen den Gehirnhäuten, wo man sodann nach dem verschiedenen Size des Wassers drei Arten von Kopfwassersucht annimmt, 1) den äussern Wasserkopf, 2) die innere Kopfwassersucht und 3) die Gehirnhöhlenwassersucht. Auch hat man den Ausdruck innere Kopfwassersucht für die Wassersucht der Gehirnhöhlen, und den Ausdruck äussere Kopfwassersucht für die Ansammlung von Wasser zwischen den Gehirnhäuten und dem Schädel gewählt, und die leztere Bezeichnung für die Ansammlung von Was-

ser unter den Schädelbedeckungen, welche nicht zum Hydrocephalus gehöre, verworfen [1]). Die Bezeichnung innerer Wasserkopf gebraucht man zum Theil für gleichbedeutend mit innerer Kopfwassersucht und zum Theil für die chronische innere Kopfwassersucht, welche mit Ausdehnung des Schädels verbunden ist, mag sie ihren Siz zwischen den Gehirnhäuten oder in den Gehirnhöhlen haben.

Von grösserem praktischen Werthe möchte die Eintheilung der Kopfwassersucht von *Gölis* u. A. sein, wornach dieselbe in 3 Arten getrennt wird: 1) die Ansammlung von Flüssigkeiten ausser dem Cranio, 2) den innern chronischen Wasserkopf und 3) die hizige Gehirnhöhlenwassersucht, wobei jedoch die acute seröse Ausschwizung zwischen den serösen Häuten, welche oft ohne Verbindung mit der hizigen Gehirnhöhlenwassersucht angetroffen wird, nicht übergangen werden darf. Hiernach müssen zwei Arten der hizigen Gehirnwassersucht angeführt werden, 1) die Ausschwizung zwischen den Gehirnhäuten und 2) die weit wichtigere und mehr als selbstständige Krankheit vorkommende hizige Gehirnhöhlenwassersucht.

§. 1602.

1) Die äussere Kopfwassersucht (Hydrocephalus externus).

Gölis (Abhandlung über die vorzüglicheren Krankheiten des kindlichen Alters. 2ter B. vom innern chronischen Wasserkopfe und von den verschiedenen Arten des äuss. Wasserkopfes, Wien 1815—18. 2te Aufl. 1820—24).

Das Wasser befindet sich hier nach *Peter Frank* [2]) und *Gölis* [3]) entweder im Zellgewebe zwischen der Kopfhaut und der Schädelhaube, der zelluläre Wasserkopf, oder zwischen der leztern und der Beinhaut, der

1) Chelius Chirurg. II. pag. 204. — 2) Epitom. Lib. VI. — 3) In a. W. II. pag. 157.

aponevrotische, oder zwischen der Beinhaut und den Schädelknochen, der periostische Wasserkopf. Ausserdem theilt *Gölis* den äussern Wasserkopf ein in den allgemeinen und örtlichen und führt an, dass der partielle äussere Wasserkopf mit dem allgemeinen gleichzeitig vorkommen könne, indem sich nämlich über die allgemeine Geschwulst eine zweite, örtlich begrenzte erhebe, in welcher das Wasser in einem häutigen Sack eingeschlossen sei und somit in keiner Verbindung mit dem Wasser der allgemeinen Kopfwassersucht stehe.

Der *zelluläre äussere Wasserkopf* stellt eine kalte, bei dem Drucke unschmerzhafte Geschwulst von natürlicher Hautfarbe dar, welche sich über den ganzen behaarten Theil des Kopfes, und oft auch über die Stirne und die Augenlieder und den Nacken hinab ausbreitet, auf den Druck mit dem Finger eine Grube zurücklässt und dem Lichte gegenüber halb durchsichtig ist. Diese sog. Kopfwassersucht ist nichts Anderes als ein Oedem der Haut.

Der *aponevrotische äussere Wasserkopf* ist eine mehr begrenzte Geschwulst, welche nie bis über die Augenlieder reicht, sich härter und elastischer anfühlt, auf den Druck mit dem Finger, welcher dem Kranken empfindlich ist, keine Grube zurücklässt, und dagegen das Schwappen zeigt.

Der *periostische Wasserkopf*, welcher höchst selten vorkommt, ist kaum mit Gewissheit von dem aponevrotischen zu unterscheiden. Von grosser Wichtigkeit ist, zu erkennen, ob der äussere Wasserkopf für sich allein bestehe, oder die äussere Geschwulst mit einer Wasseransammlung innerhalb der Schädelhöhle in Verbindung stehe. Nach *Gölis* entdeckt man dieses vermittelst des Gesichtes, indem man in dem Zustande der Erschlaffung des Kranken bei aufmerksamer Betrachtung wahrnehmen kann, ob die Umkleidung der Geschwulst nur aus den

allgemeinen Bedeckungen des Schädels, oder zugleich auch aus der äussern und innern Beinhaut, welche an solchen Stellen noch mit Knochenmassn durchschossen ist, oder selbst auch aus den Häuten des Gehirnes zusammengesezt sei. Hiebei ist genau zu untersuchen, ob die allgemeinen Zeichen des innern Wasserkopfes vorhanden sind oder fehlen, doch wird meistens schon der Ausdruck in der Physiognomie des Kranken hierüber Aufschluss geben.

§. 1603.

2) Die innere chronische Kopfwassersucht (Hydrocephalus chronicus internus). Dieselbe ist eine langsam sich bildende Ansammlung von wässerigter Flüssigkeit entweder zwischen den Gehirnhäuten und auch zwischen ihnen und dem Schädel, oder in den Hirnhöhlen oder an diesen verschiedenen Orten zugleich.

Hiebei können, was den Umfang des Schädels betrifft, drei verschiedene Verhältnisse stattfinden, entweder ist derselbe grösser als gewöhnlich, oder hat die gewöhnliche Grösse, oder ist selbst kleiner als im normalen Zustand.

§. 1604.

Es kann sich die innere chronische Kopfwassersucht schon im Embryo zu bilden anfangen und der Kopf schon vor der Geburt einen solchen Umfang annehmen, dass die Geburt äusserst schwierig wird und selbst die Enthirnung vorgenommen werden muss, oft nimmt die Entwicklung der Krankheit, zu welcher die Kinder meistens die Anlage mit auf die Welt bringen, sogleich nach der Geburt ihren Anfang, oft aber erfolgt sie erst nach einem oder mehreren Jahren, höchst selten beginnt sie erst in höherem Alter.

§. 1605.

Bei denjenigen, die die Kopfwassersucht mit auf die Welt bringen, bemerkt man zwar in der Regel einen

vermehrten Umfang des Schädels, in seltenen Fällen aber einen verminderten, bei welchem die Kranken mit geschlossenen und verknöcherten Näthen, oft schon todt zur Welt kommen, oder bald nach der Geburt unter Convulsionen sterben. Wenn sie, was selten der Fall ist, ein Alter von mehreren Wochen oder Monaten erreichen, so zeigt sich bei ihnen noch in höherem Grade als es bei den Wasserköpfen mit grossem Umfange des Schädels gewöhnlich der Fall ist, ein Mangel der geistigen Kräfte und selbst ein solches Stumpfsein der Sinne, dass ihr Auge selbst nicht von einem flammenden Licht afficirt wird, und nur Kneipen und Stechen eine automatische Bewegung der äussern Gliedmassen veranlasst.

§. 1606.

Bei Kindern, bei welchen der Wasserkopf sich erst nach der Geburt entwickelt, bemerkt man gewöhnlich, bei zugleich bestehenden andern rhachitischen Erscheinungen, ein allmäliges Hervortreten der Stirnknochen, wo besonders die Verknöcherungspunkte hervorstehen und der Kopf dadurch etwas viereckiges erhält. Durch dieses starke Hervortreten der Stirne ragt dieselbe nebst den Augenbraunen weit über die tiefer liegenden Augen hervor, und der Umfang des Schädels, welcher zulezt die Grösse von 30 Zollen erreichen kann, steht in keinem Verhältniss zu dem kleinen sehr magern Gesichtchen. Gewöhnlich schliessen sich die Fontanellen und die Näthe nicht, werden im Gegentheil breiter und oft von dem andringenden Wasser zu Wülsten ausgedehnt, dabei sind sie fluctuirend und beim Lichte durchscheinend. Manchmal werden auch die Knochen ganz dünne und durchscheinend, ja *Gölis* führt einen Fall an [1]), in welchem die ganze Knochensubstanz, vorzüglich des Hinterhauptbeines, sich verlor und das Gehirn wie unter einer

1) A. a. O. II. pag. 13.

gespannten Blase sich anfühlte. In selteneren Fällen verknöchern die Näthe, während die Schädelknochen dünne werden und sich ausdehnen, wo sodann an den Stellen der Fontanellen und Näthe nicht wie im vorhergehenden Falle Wülste, sondern Vertiefungen wahrgenommen werden. Der Kopf sinkt seiner Schwere wegen etwas auf die eine oder die andere Seite, oder kann gar nicht aufrecht getragen werden. Bei der beginnenden Entwicklung dieses Uebels zeigt sich bei den Kindern eine auffallende Veränderung des Gemüths, sie werden mürrisch und eigensinnig, dabei geben sie manchmal Kopfschmerz zu erkennen, sind viel schläfrig, das Auge ist schwach und matt, die Kranken stemmen den Kopf gerne an einen festen Gegenstand an. — Immer magert der Körper sehr stark ab. Die Kranken lernen spät gehen und ihr Gang ist auf eine eigene Art schwankend und stolpernd, und ist in der Periode der vollendeten Ausbildung der Krankheit nur noch mit Unterstüzung möglich. Sind auch im Anfange die Seelenäusserungen nicht getrübt, so werden sie es doch immer mehr. Die Kranken werden blödsinnig und erhalten auch einen solchen Ausdruck in der Physiognomie, wobei auch die Sprache lallend wird und der Speichel aus dem Munde läuft; doch gibt es auch Fälle, in welchen die eine oder die andere Seelenthätigkeit wach bleibt, z. B. die Fähigkeit zum Rechnen vorhanden ist. — Im lezten Zeitraum der Krankheit verschwinden die noch vorhandenen Aeusserungen der Thätigkeit einer menschlichen Seele, die Kranken liegen Monate lang in beständiger Betäubung, meistens auf der Seite mit zurückgezogenem oder vorwärtshängendem Kopfe, gradgestreckten Armen und gerungenen, zwischen die an den Bauch gezogenen Beine eingekeilten und krankhaft an die Symphisis Pubis angepressten Händen (*Gölis*); sie sind blind, taub, sprachlos, oft theilweise gelähmt und vegetiren blos.

Doch auch die vegetativen Prozesse gehen schlecht von statten, der Körper ist im höchsten Grad abgemagert, der Stuhlgang verstopft, der Urin sparsam, gewöhnlich blass und ohne Bodensaz, das Schlucken mühsam, zulezt wird der Puls schwach und aussezend, die Hände und Füsse werden kalt und der Kranke stirbt entweder an Schwäche in Folge eines noch hinzugetretenen Zehrfiebers und der äussersten Abmagerung, oder unter Zuckungen und den Folgen eines Schlagflusses, oder unter Erstickungszufällen. Häufig sollen sich im leztern Zeitraum der Krankheit zu den Zufällen des chronischen, innern Wasserkopfes die der acuten Hirnhöhlenwassersucht hinzugesellen, indem sich von Neuem Kopfschmerz einstellt, und Fieber, ein weisser Bodensaz im Urin etc. und andere Erscheinungen des Hydrocephalus acutus eintreten.

§. 1607.

Die Dauer der Krankheit ist sehr verschieden. Der angeborne Wasserkopf, besonders der mit nicht vergrössertem Schädel und verknöcherten Näthen, tödtet gewöhnlich bald nach der Geburt. Der sich nach der Geburt erst entwickelnde kann Monate, so wie auch Jahre lang dauern, und es gibt selbst Fälle, in welchen die Kranken ein Alter von 10, 20 ja selbst 50 Jahren erreichen. Die im spätern Alter entstandene chronische innere Kopfwassersucht kann auch mehrere Jahre andauern.

§. 1608.

Bei den Leichenöffnungen findet man in den oben bezeichneten Orten, innerhalb der Schädelhöhle, das Wasser oft zu mehrern, ja bis zu etlich und zwanzig Pfunden und zwar meistens frei, oft auch zum Theil in Hydatiden eingeschlossen. Das Gehirn ist dabei, wenn sich das Wasser zwischen den Gehirnhäuten befindet, zusammengepresst, so dass es oft nur die Grösse eines

Apfels hat; ist aber das Wasser in den Gehirnhöhlen angesammelt, so ist es oft so ausgedehnt, dass die Hemisphären zu einem hautartigen Gebilde umgeschaffen sind. Nach *Meckel*[1]) ist hiebei das Gehirn auf einer frühern Bildungsstufe stehen geblieben und der Hirnbildung der Fische ähnlich. Nach *Hartell* sind die Sehnerven im Verhältniss zum Gehirne zu dick, was ebenfalls bei den frühern Bildungsstufen des Embryos vorkommt. Die Zirbeldrüse ist angeschwollen, die einsaugenden Gefässe sind erweitert. Oft ist zugleich Wassersucht des Rückgrathes vorhanden. Die Schädelknochen sind dünn, zum Theil knorpelartig und häutig; von den Verknöcherungspunkten breiten sich die Knochenfasern strahlenförmig aus.

§. 1609.

3) Die acute Kopfwassersucht.

a) Die *acute Wassersucht der Gehirnhäute.* (Hydrocephalus meningeus.)

Es wird unter dieser Bezeichnung hier nur die Wasseransammlung zwischen den Gehirnhäuten, so weit dieselben die Oberfläche des Gehirns überziehen, und nicht jene begriffen, welche von einer Ausschwizung aus den Plexus choroidei herrührt und in den Gehirnhöhlen sich befindet. Es kommt diese Art der Kopfwassersucht in der Regel nicht als ein für sich bestehendes Leiden und als eine eigene Krankheitsform vor, sondern entweder in Verbindung mit der hizigen Gehirnhöhlenwassersucht, oder als ein Ausgang der Encephalitis manifesta oder derjenigen Gehirnaffection, welche mit dem Nervenfieber und dem Typhus verbunden ist, so wie auch beim Schlagfluss etc. Die Haupterscheinung dieser Wasserergiessung scheint der Schwindel zu sein, wiewohl derselbe auch im Nervenfieber vorkommt, in

1) Handb. d. pathol. Anal. B. I. S. 260.

einem Zeitraum, in welchem diese Wasseransammlung noch nicht statt zu finden scheint. Die Menge des angesammelten Wassers ist in der Regel unbedeutend, so dass dieselbe nicht leicht die zureichende Todesursache wird, doch habe ich schon öfters, nach tödtlich abgelaufenem Nervenfieber, eine das gewöhnliche Quantum stark überschreitende Menge Wasser gefunden. Ueber die Ausschwizung, welche die Folge der Encephalitis manifesta ist, vergleiche das über die Gehirnentzündung Gesagte.

§. 1610.

b) Die *hizige Gehirnhöhlenwassersucht.* (Hydrocephalus acutus, Hydrops ventriculorum cerebri, Febris hydrocephalica).

Odier (aus d. Franz. Lpz. 1785). — *Quin* (Lond. 1790, aus dem Engl. v. Michaelis. Lpz. 1792). — *Bader* (Frankf. u. Lpz. 1794). — *Hopfengärtner* (Stuttg. 1802). — *Cheyne* (Lond. 1809 u. 1819, aus dem Engl. v. Müller. Bremen 1809). — *Formey* (Berlin 1810). — *v. Portenschlag-Ledermeyer* (Wien 1812). — *Gölis* (im angef. Werke, 1r Bd., von der hizigen Gehirnhöhlenwassersucht). — *Yeats* (London 1815, a. d. Engl. v. Kaufmann. Hannov. 1816). — *Coindet* (Paris 1817). — *Matthey* (Genf 1820, a. d. Franz. v. Wendt, mit einer Vorrede v. Cerutti. Leipzig 1821). — *Bricheteau* (Paris 1829). — *Charpentier* (Par. 1829). — *C. Krebs* (Osnabrück 1835). — Ausserdem die Schriftsteller über Kinderkrankheiten.

Der Verlauf dieser Krankheit wird verschieden eingetheilt, von Manchen, wie z. B. von *Peter Frank*, in zwei Zeiträume, den entzündlichen und den der Ausschwizung, von Andern in drei Zeiträume, den der Entzündung, der Ausschwizung und der Lähmung. Den wichtigsten Abschnitt in der Krankheit bildet der Uebergang von der Entzündung zur Ausschwizung, und es ist zwischen dem Stadium der Turgescenz und der Entzündung keine bestimmte Gränze, so wie auch die Lähmung nur die Folge der Ausschwizung ist und sich Krämpfe und Lähmung allmälig entwickeln; es ist daher die

Eintheilung in zwei Hauptstadien gerechtfertiget, und es ist dieselbe auch in Hinsicht auf Prognose und Therapie die wichtigste; doch sind in der Regel die von *Gölis* angenommenen Zeiträume in der Natur wohl zu erkennen, und sie mögen daher als Unterabtheilungen der zwei Hauptperioden gebraucht werden.

§. 1611.

1) Der *entzündliche Zeitraum.* — a) Die Periode der Turgescenz. Die Kinder verlieren ihre Munterkeit, sie werden schwerfällig, mürrisch und selbst auffallend böse, sie sind viel schläfrig, aber schlafen nicht ruhig, sondern schrecken im Schlafe zusammen, träumen viel und ächzen (grunzen nach *Gölis* Ausdruck), ältere Kinder klagen über Schwindel und oft auch über Kopfweh, und der Gang derselben ist strauchelnd, wobei sie auf ebener Erde die Füsse hoch aufheben. Die Kinder verlieren die blühende Gesichtsfarbe, die Völle der runden Wangen und die Esslust und haben eine allgemeine Abspannung der Kräfte, oft werden sie aber auch roth im Gesichte und heiss am Kopfe. Die Haut ist trocken, der Stuhlgang träge, der Harn ist sparsam, nach *Odier* und *Formey* trübe, ganz molkenartig (was aber nicht immer der Fall ist), die Kranken empfinden oft rheumatische Schmerzen im Nacken, in den Armen und Füssen, nach *Formey* erscheint in diesem Zeitraum, und gehört zu den wesentlichen Merkmalen der Krankheit, ein ganz feiner, trockener Ausschlag an den Oberarmen, den Wangen und zuweilen an den Lippen, welcher dem sogen. Zahnausschlag ähnlich ist; es ist jedoch zweifelhaft, ob er wirklich dieser Krankheit eigenthümlich ist, da er bei dieser Krankheit sehr häufig nicht vorkommt und Strophulus ähnliche Exantheme bei Kindern ohnehin öfters angetroffen werden. Am Ende dieses Zeitraumes stellen sich oft Schauder und fliegende Hize ein, im Puls scheint kaum eine constante Veränd-

erung vorhanden zu sein, nach *Gölis* ist er zuweilen aussezend.

Die Dauer dieser Periode beträgt oft nur wenige Stunden, zuweilen bis 14 und mehr Tage.

§. 1612.

b) Die Periode der ausgebildeten Entzündung. Die Kranken werden nun sehr unruhig, werfen sich im Bette hin und her, nehmen aber dabei gewöhnlich gerne wieder eine solche Lage ein, dass sie mehr oder weniger gegen den Bauch gewendet im Bette liegen, wobei sie die Stirne gegen das Kopfkissen andrücken und die Augen mit demselben bedecken, sie ächzen viel und klagen über Schmerz, meistens in der Stirne, zugleich auch manchmal in den Gliedern, bei kleinen Kindern erkennt man den Schmerz durch ihr vieles Wimmern und durch ihr Hinauffahren mit den Armen nach der Stirne. Nimmt man die Kinder empor, um ihre Augen zu untersuchen, so werden sie unwillig und suchen die gewöhnliche Lage wieder zu gewinnen, dabei ist in ihren Augen etwas wildes und scheues und die Pupille gewöhnlich klein, nur in den seltenern Fällen ist die Bindehaut des Augapfels geröthet, der behaarte Theil des Körpers und die Stirne sind heiss, aber nicht roth, so wie auch die Wangen meistens blass sind und die Augen tief in der Höhle liegen und oft mit einem dunkeln Ringe umzogen sind, wobei aber meistens die Carotiden stark klopfen. Die Nase und die Lippen sind trocken und die Kinder bohren viel in der erstern; nach *Gölis* machen sie oft mit dem Munde die Bewegung des Kauens und Schnalzens, sie sind oft schläfrig, können aber zu keinem Schlafe gelangen, oder schrecken in demselben auf und knirschen zuweilen mit den Zähnen. In dem Schlafe sind die Augenlieder nur halb geschlossen und die Augen stehen etwas nach oben, so dass man nur das Weisse derselben wahrnimmt. Es stellt sich ein öfters wiederholtes Er-

brechen ein, wodurch Speisen, Schleim und Magensaft und zuweilen gallichte Stoffe ausgeleert werden, welche Ausleerungen einen eigenen, widrigen, fauligten Geruch haben sollen.[1]) Es kommt dieses Erbrechen in manchen Fällen so häufig und geschieht so gewaltsam, dass dadurch leicht die Erscheinungen, die unmittelbar auf das Gehirnleiden hindeuten, versteckt werden, wesshalb bei schwächerm Hervortreten der zuerst genannten Symptome, namentlich bei ganz jungen Kindern, die Diagnose zwischen einer primären Magenaffection und einer Gehirnentzündung nicht immer ohne Schwierigkeit ist. Meistens ist dabei Verstopfung vorhanden und der Bauch fällt ohne vermehrte Darmausleerungen zusammen, was nach *Gölis*[2]) ein vorzügliches pathognomonisches Zeichen ist. Gewöhnlich ist kein Fieber vorhanden, der Puls ist sehr verschieden und veränderlich, nach *Gölis*[3]) meistens langsam, ungleich und auslassend.

Es sind die hier angegebenen Erscheinungen nicht immer alle vorhanden, so wie hingegen auch andere hinzutreten und namentlich Zuckungen schon in diesem Zeitraume vorkommen können. Diese Periode kann in wenigen Stunden vorübergehen, dauert jedoch gewöhnlich 2 — 3 und mehrere Tage an.

§. 1613.

2) Der *Zeitraum der Ausschwizung.* a) Die Periode der beginnenden Durchschwizung. Das Kind wird nunmehr viel ruhiger, so dass dieses den Eltern und dem weniger erfahrnen Arzte oft neue Hoffnung gibt; es wählt von nun an die Rückenlage, und zwar so, dass es gerne den Kopf etwas zurückbeugt. Hebt man das Kind in die Höhe, was immer langsam geschehen muss, so widerstrebt dasselbe sehr und sucht die Ruhe und

1) Henke. II. 132. — 2) Im a. W. I. 32. — 3) Im a W. I. 33.

seine bisherige Lage wieder zu erhalten. Im Anfange von diesem Zeitraume geben die Kinder auf die an sie gestellten Fragen noch Antwort, klagen in der Regel nicht über Schmerz, stöhnen aber von Zeit zu Zeit und nehmen an dem, was um sie vorgeht, wenig oder keinen Antheil. Die Augen sehen klar aus, die Pupillen sind aber etwas weit und man wird bald zweifelhaft, ob die Kinder Lichtempfindung haben. Hält man ihnen etwas entgegen und bringt sie dazu, darnach zu greifen, so geschieht dieses nicht mit gehöriger Bestimmtheit und sie verfehlen leicht den Ort, wo der Gegenstand sich befindet. Bald darauf bemerkt man auch, dass die Augen viel nach einer Seite hingedreht werden, und es ist nicht möglich, den Blick des Kindes auf die andere Seite hinzuleiten. Dabei sind die Augenlieder empfindlich, und wenn man dieselben anfasst, um sie zu öffnen, so wird in der Regel das Kind ungeduldig. Das Gehör ist unverlezt, die Nase sehr trocken, die Kleinen krübeln viel in der Nase, so dass sie oft blutet, oder schlagen auch mit den Händen auf dieselbe. Die Kinder nehmen nun oft wieder eher Nahrung, nachdem das Erbrechen aufgehört hat. Der Stuhlgang ist gewöhnlich verstopft, der Urin sparsam und geht oft unwillkürlich ab, der Puls ist meistens langsam und unregelmässig. Gegen das Ende dieses Zeitraums wird das Kind immer mehr schlafsüchtig, für die meisten Eindrücke unempfindlich und die Erscheinungen des lezten Zeitraumes treten allmälig immer deutlicher hervor. Die Dauer dieser Periode ist gewöhnlich mehrere Tage.

§. 1614.

b) Periode der Zuckungen und der Lähmung. Man bemerkt allmälig, dass das Schlingen sehr erschwert ist, und selbst, dass der Unterkiefer fest an die obere Kinnlade angepresst ist (Trismus), das Kind wird von halbseitigen Zuckungen und Verdrehungen einzelner

Glieder befallen, oft auch wird der ganze Körper durch einen tonischen Krampf nach rückwärts gebogen (Opisthotonus), die Augen sind gewöhnlich nach einer Seite und nach oben gedreht, oft stehen sie auch so, dass beide Augen ungleiche Axen haben, die Pupillen sind gewöhnlich erweitert, oft die eine grösser als die andere und manchmal auch oval gezogen, die Kinder sind dabei gänzlich unempfindlich für das Licht, sie liegen gewöhnlich ohne alle Zeichen des Bewusstseins, doch kehrt dieses nach *Gölis* Beobachtungen oft auf kurze Zeit vollkommen zurück, so dass eine trügerische Hoffnung dadurch erregt wird, und in einem Falle bemerkte ich, dass ein Kind in diesem Stadium bis kurz vor dem Tode auf die an dasselbe gestellten Fragen leicht mit dem Kopfe nickte, ja die Aermchen, von denen eines vom Krampfe ausgestreckt war, gegen die eine Seite, wo die Mutter desselben sass, hinzuwenden sich bemühte, während die Augen auf die entgegengesezte Seite krampfhaft verdreht waren. Während der Krämpfe wird der Puls gewöhnlich sehr häufig und schnell, die Haut heiss und die Stirne von Schweiss triefend. Oft hinterlassen die Krampfanfälle halbseitige Lähmung oder Lähmung einzelner Glieder. Allmälig wird auch der Athem erschwert, die Athemzüge werden im Anfange sehr häufig und kurz, später immer seltener und mühsamer, bis die jammervolle Scene zu Ende geht.

Die Dauer dieses Zeitraumes kann sehr kurz sein und auch mehrere Tage betragen.

§. 1615.

Der Verlauf der Krankheit weicht oft von dem eben gegebenen Krankheitsbilde bedeutend ab. Oft sind die Zeichen der Entzündung nicht so deutlich ausgesprochen, es bleibt zweifelhaft, ob das Kind Kopfschmerz habe, das Erbrechen fehlt oft ganz etc., oft wird der Zeitraum der Vorboten übersprungen oder er ist so kurz und

unmerklich, dass er übersehen wird, und die Krankheit beginnt sogleich mit den Zeichen der zweiten Periode oder selbst mit Zuckungen und heftigem Fieberanfalle, wobei die Zeichen der Gehirnentzündung noch mehrere Tage fortdauern oder auch bälder die Zeichen der Ausschwizung eintreten, oder endlich die Krankheit hat im Ganzen nur eine Dauer von wenigen Stunden, die erste und zweite Periode scheinen oft ganz übersprungen zu werden und die zweite und dritte fliessen zusammen, so dass die ganze Krankheit nur in einem schnell tödtenden Anfall von heftigen Zuckungen und tetanischen Krämpfen, Bewusstlosigkeit und Lähmung besteht. Diese Form nennt man mit *Gölis* den Wasserschlag (Apoplexia hydrocephalica).

§. 1616.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Meistens findet man unzweifelhafte Zeichen der Entzündung, nämlich die zweigartige, so wie auch zum Theil die haargefässförmige, entzündliche Gefässinjection in den Gehirnhäuten, eine grünlich-gelbliche, gallert- und eiterartige Ausschwizung zwischen denselben und viel Blutpunkte auf den Durchschnittsflächen des Gehirns; zuweilen jedoch fehlen diese Veränderungen und das Gehirn bietet, ausser einer etwas weichen Beschaffenheit seiner Substanz, Nichts vom gesunden Zustande abweichendes dar, als die Wasseransammlung. Das Wasser befindet sich nur zum geringern Theil zwischen den Gehirnhäuten oder ist auch daselbst gar nicht in abnormer Menge vorhanden, und füllt dagegen die Gehirnhöhlen, besonders die Seitenventrikel oft so sehr an, dass dieselben selbst von dem Wasser stark ausgedehnt sind. Das Wasser ist meistens hell, oft auch weisslich trüb oder geröthet, die Plexus choroidei sind meistens blass und mit Hydatiden besezt. Die Wandungen der Gehirnhöhlen sind

manchmal ganz erweicht. Zuweilen ist auch in der Wirbelhöhle viel Wasser angesammelt.

§. 1617.

Die Wassersucht des Rückgrathes (*Hydrorrhachia, Hydrorrhachis.*)

Hochstetter (de spin. bifid. Altdorf 1703). — *Gild* (de spin. bifid. Vienn. 1754). — *Murray* (de spin. bifid. Goett. 1779). — *Büsser* (auct. Sprengel. Halle 1795). — *Möckel* (lat. Leipz. 1822). — Auch die Schriftsteller über Kinderkrankheiten.

Die Wassersucht des Rückgrathes ist eine die gewöhnliche Menge überschreitende Ansammlung von Wasser in der Höhle der Wirbelsäule, wobei sich das Wasser in der Regel zwischen den Häuten des Rückenmarkes befindet.

§. 1618.

Als eine eigene Krankheitsart kennt man nur die mit dem gespaltenen Rückgrath auftretende und angeborne Hydrorrhachis genauer, obgleich abnorme Wasserergiessungen, in Folge verschiedener Krankheitszustände des Rückenmarkes und seiner Häute, zu jeder Periode des Lebens vorkommen.

Die als ein Morbus acquisitus sich darstellende Hydrorrhachis hat man vorzüglich im Gefolge folgender Krankheiten beobachtet und ihre Existenz bei Leichenöffnungen zum Theil nachgewiesen: 1) bei wirklicher Rückenmarksentzündung, Myelitis manifesta, 2) bei dem Hydrocephalus acutus, 3) beim Schlagfluss, 4) bei heftigen rheumatischen Affectionen, 5) bei bösartigen, in's Nervöse übergehenden Fiebern und 6) bei Verlezungen durch äussere Gewalt.

Steht die Ausschwizung in der Wirbelhöhle in Verbindung mit einem Gehirnleiden, so ist die Erkennung derselben sehr schwierig und oft unmöglich, ist dieses nicht der Fall, so bleibt dennoch oft ein Zweifel über das Vorhandensein der Ausschwizung, indem ähnliche Zufälle, welche das Exsudat hervorbringt, auch ohne dasselbe durch rein dynamische Störung in dem Nervenleben hervorgebracht werden können, so z. B. habe ich bei Nervenfieberkranken, bei welchen die Zeichen einer krankhaften Ausschwizung in der

Wirbelhöhle ziemlich deutlich waren, doch nicht immer bei der Leichenöffnung eine solche gefunden. Die wesentlichen Erscheinungen der erworbenen Wassersucht des Rückgrathes sind folgende: Eine verminderte Beweglichkeit und eine Steifigkeit in den Füssen, welche von dem Kreuze ausgeht, reissende Schmerzen und das Gefühl von Taubheit in denselben, oft wirkliche Lähmung, paralytische Harnverhaltung, Verstopfung, manchmal Athmungsbeschwerden und Beschwerden im Schlingen, wie es scheint auch der Status nervosus.

§. 1619.

Es ist bei der Leichenöffnung oft schwer zu bestimmen, ob eine Wasseransammlung in der Wirbelhöhle krankhaft sei oder nicht, da sich regelmässig etwas Wasser vorzufinden scheint, welches nach *Magendie's* Behauptung, mit Einschluss des zwischen den Hirnhäuten und in den Hirnhöhlen befindlichen Wassers, die Menge von zwei Unzen beträgt.

§. 1620.

Die mit der Rückenspalte (Spina bifida) verbundene Wassersucht des Rückgrathes ist immer angeboren und gibt sich durch eine Geschwulst zu erkennen, welche meistens in der Gegend der Lendenwirbel ihren Siz hat, von den äussern Bedeckungen oder auch nur von den Häuten des Rückenmarkes überzogen ist, von Anfang oft nur die Grösse einer Erbse hat, aber allmälig wächst bis zur Grösse einer Faust oder selbst eines Kopfes, entweder flach aufsizt oder gestielt ist, und apfel- oder birnförmig ist, sich elastisch anfühlt, manchmal schwappt und etwas durchscheinend ist, bei dem Drucke keinen Schmerz erregt, sich dabei verkleinert, aber leicht Zuckungen und selbst Lähmungen veranlasst, und dagegen beim Schreien des Kindes zunimmt und gespannter wird. Bei diesem Uebel ist Schwäche, Abmagerung und selbst Lähmung der untern Gliedmassen vorhanden, und es bilden sich in manchen Fällen selbst brandige Stellen an denselben. Ebenso sind die Urinblase und

der Mastdarm in einem lähmungsartigen Zustande, wesshalb eben sowohl Verhaltung, als unwillkürlicher Abgang des Urins und des Kothes vorhanden sind. Gewöhnlich kommt allgemeine Abmagerung hinzu und die Kranken sterben im kindlichen Alter. Zuweilen entzündet sich auch die übermässig ausgedehnte Geschwulst, wird brandig und berstet, was schnell den Tod zur Folge hat. Selten erreichen die Kranken ein Alter von mehrern Jahren, doch sah man solche von 20 und mehr Jahren. — Zuweilen kommt diese Art der Wassersucht mit dem chronischen, innern Wasserkopfe in Verbindung vor.

§. 1621.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Nach *Fleischmann* [1]) gibt es drei Grade von gespaltenem Rückgrathe, der niederste Grad besteht darin, dass die vollkommen gebildeten Bogenhälften der Wirbelbeine sich nicht berühren, oder nur eine kleine Oeffnung im Knochen ist, wodurch die Geschwulst hervortritt, der zweite in mehr oder weniger bedeutendem Mangel der Bogenhälften, der dritte in Spaltung des ganzen Wirbels, selbst des Körpers. Es ist dieser Fehler als ein Stehenbleiben der Bildung der Wirbelbeine auf einer niedern Stufe anzusehen, indem man an jungen Foetusskeletten an den Wirbelbeinen immer eine Furche findet, welche die Zusammensezung derselben aus zwei Knochenkernen beweisst. [2]) Hiermit stimmen auch meine Untersuchungen über die Entwicklung der Thiere im Ei überein, wornach das Rückenmark und seine Hüllen bei seiner Entstehung paarig erscheinen. Diese Spaltung der Wirbel wird bald nur an einem Wirbelknochen gefunden, bald dehnt sie sich über mehrere aus, ja man hat sie in allen 24 Wirbeln des Rückgrathes gefunden. [3]) Das Wasser befindet sich auch bei dieser Art der Hydrorrhachis zwi-

1) De vitiis congenitis circa thoracem et abdomen. Erlangen 1810. p. 11. — 2) Vergl. *Meckel's* Handb. d. path. Anat. I. S. 360. — 3) *Richter's* chirurg. Bibliothek. B. IX. S. 187.

schen den Häuten des Rückenmarks, und dieses ist gewöhnlich an der Stelle, an welcher das Wasser angesammelt ist, erweicht. *Brandis*[1]) fand einen Kanal von der Dicke eines Federkiels, der aus der Geschwulst hoch ins Rückenmark hinauf sich erstreckte, und *Portal*[2]) eine Höhle, die durch die Mitte des ganzen Rückenmarkes ging und mit der vierten Hirnhöhle in Verbindung stand.

§. 1622.

Die Brustwassersucht (*Hydrothorax*).

Camper (de morb. chron. pulm. in ej. diss. Vol. I.). — *de Haen* (de hydrope pect. in rat. med. P. 5 und 6). — *Laennec* (de l'auscult. med.).

Die Brustwassersucht ist die Ansammlung wässerigter Flüssigkeit in einem oder beiden Säcken des Brustfells, oder was der seltenere Fall ist, in den Mediastinis. Auch hat man unter dieser Benennung zugleich das Oedem der Lunge begriffen, und diese verschiedene Krankheitszustände unter ein Krankheitsbild zusammengefasst. Es unterscheidet sich aber das Oedem der Lunge sehr wohl von der gewöhnlichen Brustwassersucht, und muss daher von ihr getrennt werden.

§. 1623.

Die Ergiessung von Wasser in die Brusthöhle tritt oft im Gefolge der Brustfellentzündung auf, wo sie sich oft sehr rasch bildet und pleuritisches Extravasat genannt wird [3]).

Die gewöhnliche, als chronische Krankheit sich darstellende Brustwassersucht beginnt unter allmälig sich ausbildender Schwerathmigkeit, wobei nur in manchen Fällen den rheumatischen ähnliche schmerzhafte Empfindungen im Rücken und den Schulterblättern wahrgenommen werden. Die Kranken bemerken die Beschwerde im Athmen im Anfange nur bei stärkern Körperbewegungen, z. B. dem Berg- oder Treppensteigen, wobei sie ausserordentlich stark keuchen müssen. Allmälig nehmen sie dieselbe auch wahr im

1) In *Abernethy's* physiol. u. chir. Vers., übers. v. Brandis. 1r Th. Lpz. 1795, S. 69. — 2) Mémoir. de l'Acad. d. scienc. à Paris 1771, p. 238. — 3) Vergl. das über die Pleuritis Gesagte.

Bette, wo sie eine niedere Lage nicht ertragen und manchmal in der Nacht von etwas stärkern Beengungsanfällen beunruhigt werden. Später erreichen die Athmungsbeschwerden noch einen viel höhern Grad, so dass die Kranken nur in aufrechter Lage oder selbst nur mit vorwärts gebeugtem Körper und nur in kurzen Zügen Luft schöpfen können, und bei geringer Bewegung des Körpers der Athem auszugehen droht. Oft können die Kranken leichter auf der einen als auf der andern Seite liegen, und zwar in der Regel mehr auf der Seite des Körpers, auf welcher sich die Wasseransammlung befindet. Hiebei zeigt die Percussion an der Stelle, wo das Wasser angesammelt ist, einen matten Ton, und das Stethoscop bei starker Wasseransammlung Abwesenheit des Respirationsgeräusches, und bei einer dünnen Schichte von Wasser die Aegophonie.*). Nach *Hippokrates* soll man, wenn man den Kranken an beiden Schultern fasst und etwas rüttelt, das Schwappen des Wassers wahrnehmen, was aber nach *Laennec* nur dann der Fall ist, wenn mit dem Hydrothorax der Pneumothorax verbunden ist. Nur höchst selten wird der Brustkasten ausgedehnt, was auch nur dann wahrgenommen werden kann, wenn die Ausdehnung auf der einen Seite stärker als auf der andern ist. Hiebei bekommen die Kranken einen Husten mit etwas Schleimauswurf, das Gesicht derselben erhält früher, als es bei den andern Arten der Wassersucht, mit Ausnahme der Hydrocardia, der Fall ist, den hydropischen Ausdruck, nämlich ein aufgedunsenes Aussehen und insbesondere ödematöse Augenlieder; späterhin erhalten oft die Mitte der Wangen, die Lippen und die Zunge eine dunkelbläulich-rothe Färbung und man erkennt an der erstern feine, mit venösem Blute überfüllte Gefässchen, die Füsse schwellen ödematös an, zuweilen der Arm der vorzüglich leidenden Seite, welcher auch zuweilen taub und gelähmt wird, der Urin ist meistens braun und sazig, und die ganze Symptomengruppe

*) Vergleiche das über das pleuritische Extravasat Gesagte.

des hygropischen Zustandes ist vorhanden. Der Puls ist sehr verschieden, im Anfange oft härtlich, später in der Regel sehr klein.

§. 1624.

Der Uebergang in Genesung geschieht gewöhnlich unter reichlichem Abgang eines blassgelben, nur wenig getrübten Urines, der Tod erfolgt nach Ablauf von mehreren Monaten oder Jahren, entweder unter einem Erstickungsanfall, oder unter allmälig überhandnehmender Schwäche, oder unter einem soporösen und schlagflussähnlichen Zustande, wobei die oben schon erwähnte dunkle Färbung der Wangen, der Lippen und der Zunge wahrgenommen wird.

§. 1625.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Das Wasser befindet sich meistens frei in der Brusthöhle, in seltenen Fällen findet man Hydatiden; die Menge des Wassers ist sehr verschieden, $\frac{1}{2}$ bis 12 und mehrere Pfunde; dasselbe ist meistens farblos, etwas trübe, oft mit weisslichen Flocken und gallertartigen Massen untermengt, häufig auch röthlich gefärbt, und zuweilen von einem urinösen Geruch. Die Lungen sind oft sehr zusammengedrückt und fest, so dass sie im Wasser untersinken. Das Brustfell hat manchmal die Merkmale früher bestandener Entzündung.

§. 1626.

Das Oedem der Lunge. (*Oedema pulmonum, Anasarca pulmonum Darwin, Hydrops pulmonum cellulare nach P. Frank.*)

Laennec (de l'auscult. med.).

Diese Krankheit spricht sich, ähnlich der Lungenentzündung, durch andauernde Beengung, ziemlich starken Husten und durch eine Art knisterndes Geräusch aus, welches vermittelst des Stethoscops wahrzunehmen ist, das Gesicht des Kranken hat aber den hydropischen Ausdruck, die Füsse schwellen ödematös an, und es sind die übrigen Zeichen des hydropischen Zustandes mehr oder weniger ausgebildet; auch

hat der Kranke nicht den pneumonischen, sondern den serös-pituitösen Auswurf. Die Krankheit wird nur durch das Stethoscop mit Sicherheit von der Brustwassersucht unterschieden und hat auch im Ganzen mit ihr den gleichen Verlauf.

§. 1627.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Die Lungen sinken nach der Oeffnung der Brusthöhle nicht zusammen und verhalten sich in Hinsicht ihrer Schwere und Festigkeit, wie die Substanz der Lunge im ersten Grade der Lungenentzündung, sie sind aber nicht, wie diese, dunkelbläulich-roth, sondern blass, gräulich und geben nicht wie diese bei der Durchschneidung eine Menge Blutes von sich, sondern eine schaumige, seröse Flüssigkeit, welche beim Zusammendrücken der Lunge in sehr reichlicher Menge von den Schnittflächen herunterträuft.

§. 1628.

Die Herzbeutelwassersucht (*Hydrops pericardii, Hydrocardia*).

Fr. Hoffmann (Diss. Halle 1697). — *Westring* (Samml. auserl. Abhandl. B. 14.) — *Mazzi* (ebend. B. 15). — Ausserdem die Schriftsteller über Herzkrankheiten (vergl. B. I. S. 466).

Die Wassersucht des Herzbeutels ist eine schwer zu erkennende Krankheit, selbst wenn sie nicht mit Brustwassersucht verbunden ist, indem andere Herzkrankheiten ähnliche Erscheinungen darbieten, und die Zufälle der Krankheit, so bedeutend sie in der Regel sind, doch auch sehr schwach sich aussprechen können, ja es Fälle gibt, in welchen nur die Leichenöffnung eine, oft beträchtliche, Wasserergiessung in dem Herzbeutel als Ursache des oft plözlich eintretenden Todes nachweiset.

Die Kranken haben ein Gefühl von Beängstigung, oft in Verbindung mit dem Gefühle von unordentlicher Herzbewegung, und zuweilen von wirklichem Herzklopfen, sie haben die Empfindung von Druck und Schwere in der Präcordialgegend, nach *Lancisi* wie von einem enormen Ge-

wicht, und zuweilen auch die Empfindung, wie wenn das Herz in Wasser schwämme. Diese beängstigenden Gefühle sind bei ausgebildeter Krankheit mehr oder weniger anhaltend vorhanden, steigern sich aber besonders bei Körperbewegungen, bei dem Sprechen und dergleichen oft zu einem hohen Grad, wobei der Kranke oft den Anblick eines an Erstickungsanfällen Leidenden darbietet. Die Kranken empfinden hiebei oft Schwindel, wobei sie zuweilen wähnen, dass ihnen von dem Herzen etwas gegen das Gehirn aufsteige, und werden zugleich von grosser Muskelschwäche, ja von wirklicher Ohnmacht befallen. Solche Anfälle oder wenigstens eine Steigerung der Beschwerden werden oft schon durch eine niedere Lage hervorgebracht, so dass die Kranken genöthigt sind, beständig aufrecht oder selbst vorwärts gebeugt zu sizen. Man nimmt sowohl vermittelst der Hand als mit dem Stethoscop die Herzschläge, welche sehr unordentlich und hastig sind, in einem weiten Umfange wahr, und fühlt sie bald besser an diesem Punkte, bald an jenem, was oft jeden Augenblick wechselt. Nach *Corvisart* soll man zuweilen die Fluctuation durch Berührung wahrnehmen, und nach *Senac* in den Zwischenräumen zwischen der dritten, vierten und fünften Rippe die Wellen der ergossenen Flüssigkeit sehen können. Die Percussion gibt einen matten Ton, der Puls ist klein, häufig und unregelmässig, zuweilen ist ein trockener Husten vorhanden, die Stimme ist zuweilen heiser und matt, ein eigenthümlicher Schmerz soll in dem Magen und dem ganzen Unterleibe vorkommen, die Glieder sind meistens kalt. Die Augenlieder und die Füsse schwellen ödematös an und es bildet sich die allgemeine Wassersucht aus.

Die Krankheit tödtet unter Erstickungsanfällen oder auch ohne diese, und oft plözlich, wie durch einen Nervenschlag, zuweilen kommen ein Blutsturz und Zuckungen hinzu, und oft gehen ein schlummerartiger Zustand und die höchste Schwäche dem Tode voraus.

§. 1629.

Bei den Leichenöffnungen findet man, ausser verschiedenen andern Veränderungen am Herzen und dem Herzbeutel, z. B. weissen Flecken, lymphatischen Ausschwizungen und Verwachsungen, eine grössere oder geringere Menge wässerigter, meistens gelblicher und oft auch röthlicher Flüssigkeit in dem Herzbeutel angesammelt. Nach *Sömmering* beträgt die im normalen Zustande in dem Herzbeutel vorhandene Flüssigkeit nur wenige Tropfen, etwas mehr Wasser kann sich wohl bei jeder Krankheit, während eines langen Todeskampfes, sammeln, bei der Herzbeutelwassersucht findet man aber ½, 1 oder mehrere Pfunde, *Corvisart* hat in einem Falle 8 Pfund Wassser angetroffen *).

§. 1630.

Die Bauchwassersucht (*Hydrops abdominalis*, *H. ascites*).

R. A. Vogel (lat. Goett. 1761). — *de Haen* (rad. med. T. IV.).

Es ist bei dieser Krankheit das Wasser entweder frei in der Bauchhöhle enthalten, oder in eigenen Blasen und Säcken eingeschlossen.

Die *freie Bauchwassersucht* (Hydrops ascites diffusus oder Hydrops ascites) äussert sich in ihrem Entstehen durch Störungen in den Verrichtungen der Unterleibsorgane, welche aber viel häufiger ohne Wassersucht vorkommen, gestörte Verdauung, Verstopfung, den rheumatischen ähnliche Schmerzen im Unterleibe, so wie in den Lenden und den Füssen, und zuweilen ist der Leib tympanitisch ausgedehnt; hiebei fühlt sich auch ohne Tympatites der Leib bald etwas voll an, die Füsse schwellen an den Knöcheln etwas ödematös an, und der Harn wird braun und sazig. Allmälig erreicht die Wasseransammlung im Unterleibe den Grad, dass sie mit Bestimmtheit erkannt werden kann. Der Leib schwillt gleichförmig an, und zwar von unten nach oben;

*) in a. W. obs. X. pag. 53.

hält man die flache Hand auf die eine Seite desselben und schlägt auf der andern gelinde an, so fühlt man ein Schwappen (die Fluctuation) des Wassers, welches auch der Kranke bei schneller Wendung des Körpers wahrnimmt; bei Veränderung der Lage des Körpers senkt sich die Geschwulst nach dem Geseze der Schwere. Oft erreicht der Unterleib eine ausserordentliche Ausdehnung, und zwar oft eine beträchtlichere, als dieselbe im lezten Monat derSchwangerschaft ist, wobei die leiseste Berührung der Bauchdecken mit dem Finger das Anschlagen des Wassers an die Bauchwandung erzeugt und der aufgelegten Hand fühlbar macht. Hiebei ist die Verdauung oft sehr gestört und die geringste Menge von Speisen erregt das Gefühl von Völle, der Stuhlgang ist meistens verstopft, das Athmen, auch ohne hinzugetretene Brustwassersucht, mehr oder weniger erschwert, die Körperkräfte schwinden, das Gesicht, so wie überhaupt die obern Theile des Körpers werden mager, wenn sie nicht ödematös angeschwollen sind. Der Durst ist bei dieser Art der Wassersucht quälender, als bei den übrigen Arten derselben, zulezt bildet sich in der Regel allgemeine Wassersucht aus, wobei oft zugleich ein Zehrfieber hinzutritt und sich manchmal auch Gelbsucht entwickelt.

In die Gesundheit geht die Krankheit vorzüglich durch reichlichen Urinabgang, aber auch durch andere Krisen, namentlich Durchfälle, über, doch sind diese nicht immer wohlthätig. Der Tod wird durch Schwäche, durch die hinzugekommene Brust- und Herzbeutelwassersucht und zuweilen auch durch Schlagfluss herbeigeführt.

§. 1631.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Ausser häufig vorkommenden Desorganisationen in den Organen des Unterleibes, Physconie der Leber und Milz, Entzündung und Vereiterung der Nieren, Scirrhen des Pancreas etc., welche zuweilen die Ursachen der Wassersucht sind, und ausser Verdickung und Verwachsungen des Bauchfells, kleinen,

weisslichten, körnigten, lymphatischen Ausschwizungen auf der Oberfläche der Gedärme etc., welche die Folge des die Wassersucht bedingenden krankhaften Prozesses in dem Peritoneum sind, findet man oft eine ausserordentliche Menge von Wasser, häufig 30 bis 40 Pfunde, frei in der Bauchhöhle enthalten. Die Flüssigkeit ist mehr oder weniger wasserhell oder gelblich, durch weissliche Flocken getrübt, zuweilen auch blutig, bald ohne, bald von einem übeln Geruch. Manchmal findet man in derselben auch grössere Gerinnsel von einer gallertartigen Masse.

§. 1632.

Die freie Bauchwassersucht könnte verwechselt werden mit der Sackwassersucht, einer starken, ödematösen Anschwellung der Bauchbedeckungen, der Wassersucht der Gebärmutter und der Eierstöcke, der Zurückhaltung des Harnes in der Blase, den Harnleitern und dem Nierenbecken, der Trommelsucht, der Vergrösserung von Eingeweiden, dem Fettbauche und der Schwangerschaft. Von lezterer unterscheidet sich die Bauchwassersucht sowohl durch die ihr eigenthümlichen Zeichen, namentlich das Schwappen des Wassers und die allgemeinen Zeichen der Wassersucht, doch kann ersteres auch bei der Bauchwassersucht undeutlich sein und leztere zum Theil auch bei der Schwangerschaft vorkommen, namentlich Oedeme der Füsse, als auch durch den Mangel gewisser, der Schwangerschaft eigenthümlichen Erscheinungen. Hieher gehören der bestimmte Zeitraum, in welchem die allmälige Ausdehnung statt findet, das Ausbleiben der monatlichen Reinigung, welche aber auch bei der Wassersucht sehr häufig fehlt, die fühlbare Vergrösserung des Uterus, die Bewegung des Kindes, die Anschwellung der Brüste, die Veränderung am Muttermunde, und das deutlich fühlbare Vorliegen eines Kindestheiles. Wo die Untersuchung der Geschlechtstheile nicht zulässig ist, kann man sich auch des Stethoscopes bedienen, das nach *Ker-*

*garadec's**) Entdeckungen, deren Richtigkeit ich nach eigenen Untersuchungen bezeugen kann, ganz sichere Unterscheidungszeichen zwischen der Schwangerschaft und der Bauchwassersucht, so wie der Wassersucht der Gebärmutter giebt. Man vernimmt nämlich durch das Stethoscop, so wie auch durch das unmittelbare Auflegen des Ohres bei vorgerückter Schwangerschaft, zweierlei Geräuscharten: Erstens ein so häufig erfolgendes Pulsiren, dass die Zahl der Schläge ungefähr das Doppelte von den Pulsschlägen der Mutter beträgt. Hört man die Schläge sehr deutlich, so erkennt man, dass die Schläge Doppelschläge sind, und es unterliegt keinem Zweifel, dass sie die Pulsationen des Herzens vom Kinde sind. Sie werden meistens auf der linken Seite des Bauches wahrgenommen. Zweitens Schläge, welche mit einem blasenden Geräusch verbunden und ganz isochronisch mit den Pulsschlägen der Mutter sind und von der Stelle herrühren sollen, an welcher der Mutterkuchen aufsizt. Sind beide Geräuscharten oder wenigstens jene häufigen Doppelschläge wahrzunehmen, so unterliegt das Vorhandensein der Schwangerschaft durchaus keinem Zweifel, doch erfordert es, um sie zu erkennen, eine grosse Uebung im Gebrauche des Stethoscops, und es gibt auch Momente, in welchen das kurz vorher wahrgenommene Geräusch nicht mehr zu erkennen ist, wovon wahrscheinlich eine Veränderung in der Lage des Kindes die Schuld trägt.

§. 1633.

b) Die *Sackbauchwassersucht* (Hydrops abdominalis saccatus) wird diejenige Wassersucht des Unterleibes genannt, in welcher das Wasser in eigenen, krankhaft gebildeten Behältern, am gewöhnlichsten in einer Höhle in dem Zellgewebe zwischen dem Bauchfell und den Bauchmuskeln eingeschlossen ist.

*) Mémoire sur l'auscultation, appliquée à l'étude de la Grossesse etc. par *M. J. A. Lejumeau de Kergaradec.* Paris 1822. Auch in *Froriep's* Notizen Nro. 55 und 58, u. a. dens. besond. abgedr. Weim. 1822.

Die hauptsächlichste und oft beinahe allein bestehende Krankheitserscheinung ist die Geschwulst. Es bildet sich nämlich nach vorhergegangenen Schmerzen oder auch ohne diese, blos unter dem Gefühl von Druck und Spannung eine Geschwulst, die bei dem Hydrops peritonaealis dicht unter den Bauchbedeckungen liegt, nicht verschiebbar ist, über welche auch die Bauchbedeckungen, mit Ausnahme der Haut, gewöhnlich nicht in eine Falte gelegt werden können, und welche gespannt und zuweilen härtlich sich anfühlt, schmerzlos und meistens umschrieben ist, keine Schwappung zeigt und auch nicht bei dem Umwenden des Körpers auf eine andere Seite nach dieser sich senkt. Die Geschwulst hat oft nur die Grösse eines Eies oder einer Faust, oft nimmt sie aber den grössten Theil des Unterleibes ein und treibt, wenn sie in der Nabelgegend ihren Siz hat, den Nabel bruchartig heraus. Es bildet sich hiebei oft gar nicht oder nur sehr spät und verhältnissmässig in geringem Grade ein allgemeiner hydropischer Zustand aus, auch ist die Verdauung oft ziemlich gut, das Aussehen nicht kachektisch, so wie oft überhaupt lange Zeit keine bedeutende Störung in der Gesundheit wahrgenommen wird; öfters sind jedoch Schmerzen im Unterleibe und Störungen in den Verrichtungen der Unterleibsorgane vorhanden, wovon in einem von mir beobachteten Falle eine mit der Sackwassersucht zugleich entstandene Verwachsung und Umschlingung der Gedärme durch das Nez die Schuld trug. Die Krankheit kann viele Jahre dauern. Bei dem höchsten Grade bilden sich Verdauungsbeschwerden, mehr oder weniger allgemeinere hydropische Zufälle und oft auch Zehrfieber aus. Zuweilen bricht der Sack nach innen auf und veranlasst freie Bauchwassersucht, und in seltenen Fällen sah man ihn auch nach Aussen sich öffnen.

§. 1634.

Bei den **Leichenöffnungen** findet man einen oder mehrere krankhaft entstandene Säcke, welche entweder durch die Lamellen des Bauchfells oder durch Zerreissung der Zellen des Gewebes zwischen dem Bauchfell und den Bauchmuskeln oder des Gewebes zwischen diesen und ihren Scheiden, oder durch Verwachsungen des Nezes und des Bauchfells oder auch im Gekröse sich gebildet haben, wobei diese Theile verdickt und oft mit Hydatiden besezt sind. Die eingeschlossene Flüssigkeit ist wasserhell, oft eiterartig und oft eine sehr consistente Lymphe.

§. 1635.

Die Wassersucht der Gebärmutter (*Hydrops uteri*, *Hydrometra*).

Gregorini (lat. Halle 1795, mit 1 illum. K.). — *Lindner* (lat. Sulzb. 1823). — Auch die Schriftsteller über Weiberkrankheiten.

Die Gebärmutterwassersucht ist in dem einen Falle ein Oedem des Uterus, in andern frei in der Gebärmutterhöhle angesammeltes Wasser, und öfter sind es auch in der Gebärmutter befindliche Hydatiden.

Das *Oedem der Gebärmutter* soll nach *v. Siebold* *), zum Kennzeichen eine ungewöhnliche Dicke der Wandungen des Uterus haben, an welchem bisweilen ein mit dem Finger gemachter Eindruck, wie beim gewöhnlichen Oedem, eine Zeit lang fühlbar zurückbleibe. Wo dieses Zeichen nicht vorhanden ist, möchte das Oedem des Uterus wohl niemals erkannt werden können.

§. 1636.

Die *freie Gebärmutterwassersucht* (Hydrometra im engern Sinne) wird als eine solche Wassersucht angegeben, bei welcher das Wasser, ohne in Blasen enthalten zu sein, in der Gebärmutter eingeschlossen ist,

*) Frauenzimmerkrankheiten, 2r Theil S. 521.

indem der Muttermund auf irgend eine Weise verstopft oder geschlossen ist. *Kerkring*[1]) und *Neumann*[2]) leugnen die Möglichkeit der Existenz dieser Wassersucht. Ich habe zwar die Hydrometra cystica, aber noch nie die freie Gebärmutterwassersucht zu beobachten Gelegenheit gehabt. Als Zeichen derselben werden angegeben: eine kalte, harte, etwas schwappende Geschwulst in der Gegend der Gebärmutter, zuweilen eine durch das angesammelte Wasser veranlasste, wellenförmige Bewegung, welche nicht mit der Kraft und Schnelligkeit erfolgt und auch nicht auf einer so beschränkten Stelle wahrgenommen wird, wie die Bewegung des Kindes sich zeigt, ein dünner, gespannter und zusammengezogener Muttermund, zuweilen beständiges Abtröpfeln von Wasser oder auch ein zu wiederholten Malen stromweisses Abfliessen des Wassers (was mir jedoch eher bei Hydrometra cystica, als bei der freien Gebärmutterwassersucht statt finden zu können scheint), Welkwerden der Brüste (wovon aber nach *P. Frank* Ep. Lib. VI. P. I. p. 302 das Gegentheil der Fall sein soll), lange Zeit ungestörte Verrichtung der Verdauungs- und der meisten übrigen Organe, und daher keine bedeutende Störung in dem Wohlbefinden, zulezt jedoch, wenn die Menge des Wassers sehr bedeutend wird (wovon in einem Falle *Vesal* 180 römische Pfunde in dem Uterus fand, was aber *Burns* für eine Verwechslung mit der Wassersucht in dem Ovarium hält[3])), Störungen in der Verdauung, allmälig sich entwickelndes kachektisches Aussehen, hektisches Fieber und allgemeine Wassersucht.

§. 1637.

Die *Hydatiden in der Gebärmutter* oder die falsche

1) Vergl. *Burn's* Handbuch der Geburtshilfe. Bd. I. S. 203. — 2) Spec. Pathologie u. Therapie. B. II. S. 734. — 3) Geburtshilfe. B. I. S. 204.

Schwangerschaft (Hydrometra hydatica, cystica), ist in ihrem Entstehen von der wirklichen Schwangerschaft nicht wohl zu unterscheiden, und es geht auch öfters die wirkliche Schwangerschaft durch Entartung des Eies in diese Art der Wassersucht über. Es stellen sich die gewöhnlichen Zeichen der Schwangerschaft, Ausbleiben der monatlichen Reinigung, Anschwellen des Leibes, Eckel und Erbrechen ein, sodann werden aber die Brüste welk, was den Zeitpunkt bezeichnen soll, wenn das Ei völlig desorganisirt ist, und die so eben bezeichneten consensuellen Beschwerden der Schwangerschaft verschwinden wieder, wiewohl sie auch fortdauern und auch Leibschmerzen und ähnliche krankhafte Zufälle vorhanden sein können. Von nun an nimmt der Uterus in der Regel nur sehr wenig und langsam an Umfang zu, die Frau empfindet keine Kindesbewegungen und es stellen sich überhaupt die Veränderungen nicht ein, die der Periode der Schwangerschaft gemäss erfolgen sollten. Statt derselben nimmt die Kranke zuweilen einen Abgang von Wasser oder, was häufiger der Fall ist, von Blut wahr, welcher in der Regel sich sehr häufig wiederholt, so dass die Kranke entkräftet und blass wird, und die Füsse wassersüchtig anschwellen. Endlich stellen sich in einer unbestimmten Zeit, oft im fünften Monat, Wehen ein, wodurch die krankhafte Masse gewöhnlich unter starkem Blutflusse ausgestossen wird.

An dem Ausgestossenen erkennt man oft deutlich das Ei, von dem zuweilen nur ein kleiner Theil mit Hydatiden besezt ist. Oft ist das ganze Ei krankhaft umgewandelt und ein bedeutender Massenzuwachs bemerkbar, wobei die Zahl der Hydatiden oft ausserordentlich gross ist. Selten kommt nur eine grosse Hydatide vor, welche meistens mit einer wahren oder einer Molenschwangerschaft verbunden ist.

§. 1638.

Zuweilen kommt die Gebärmutterwassersucht in Verbindung mit der Schwangerschaft vor, was durch folgende Zeichen erkannt wird: Uebermässige Ausdehnung des Unterleibes, ohne dass die Ungleichheit an demselben wahrgenommen wird, die die Schwangerschaft mit Zwillingen veranlasst, und zeitweiser erleichternder Abgang von Wasser, unter Erscheinungen des bevorstehenden Abortus, ohne dass aber dieser erfolgt. Zuweilen findet der Wasserabgang nur kurz vor der Geburt statt, so dass man denselben leicht für das Kindeswasser hält, worauf aber dasselbe erst nachfolgt. Das Kind ist meistens klein und abgezehrt. In diesem Falle ist das Wasser in einer grossen oder in mehreren kleinen Hydatiden eingeschlossen, oder es ist zwischen den Eihäuten und dem Uterus in Zellen angesammelt, oder es besteht nur in zu reichlichem Fruchtwasser.

§. 1639.

Die Wassersucht der Eierstöcke (*Hydrops ovariorum*).

Peyer (Diss. Basil. 1718). — *Schacher* (Diss. Lipz. 1725). — *Röderer* (Göttingen 1762). — *Hunter* (med. Bemerk. u. Beobacht., herausg. v. Kuhn. 2 Bde.). — *Engelmann* (Diss. Berlin 1818). — *Seymour* (illustrat. of some of the principal diseases of the overia. Lond. 1830.)

Diese Wassersucht kommt in der Regel in Verbindung und in Folge des Scirrhus der genannten Organe vor, und beginnt daher gewöhnlich mit den Zeichen dieser Krankheit, nämlich mit einem Gefühl von spannendem und druckendem Schmerz in der Weiche und der Tiefe des Beckens, am häufigsten auf der linken Seite, bei welchem die Kranke von Zeit zu Zeit auch in dem leidenden Theil durchfahrende Stiche empfindet. Allmälig bemerkt man am Rande des Darmbeines in der Tiefe des Leibes, eine Geschwulst, die sich härtlich

anfühlt, zuerst von der Grösse einer Wallnuss oder eines Eies ist, langsamer wächst, als die Gebärmutter in der Schwangerschaft sich ausdehnt, zulezt oft den ganzen Unterleib einnimmt, und wenn sie eine bedeutende Grösse erreicht hat, mehr oder weniger schwappt. Hiebei schwellen die Brüste nicht an, sondern welken im Gegentheil, und die Vaginalportion der Gebärmutter zeigt nicht die in der Schwangerschaft gewöhnlichen Veränderungen, sondern steht oft nur etwas schief. Durch den Druck auf die Nerven stellt sich eine Taubheit in dem Fuss der leidenden Seite ein, die Kranke empfindet ein Ziehen im Kreuze, zuweilen wehenartige Schmerzen, Blähungsbeschwerden, Eckel und Erbrechen und hat häufig hysterische Zufälle; doch geht hiebei die Ernährung lange Zeit hinreichend von statten und, die Localaffection abgerechnet, scheint die Gesundheit nicht sehr gefährdet zu sein. Endlich magert der Körper dennoch immer mehr ab, das Gesicht wird mager und zeigt etwas Leidendes und die Füsse schwellen an. Oft erst nach 20 — 30 Jahren endet die Krankheit unter allgemeiner Wassersucht und Zehrfieber.

§. 1600.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Der kranke Eierstock ist meistens scirrhös, die in ihm angesammelte Flüssigkeit, die selbst die Menge von 100 und mehr Pfunden betragen kann, und meistens eine etwas dicklichte, gallertartige Beschaffenheit hat, ist entweder in Zellen oder in mehreren Säcken, die für Erweiterungen der Bläschen (Eierchen des) Ovariums gehalten werden, oder auch nur in einem einzigen Sacke, zu welchem das Ovarium ausgedehnt ist, eingeschlossen. Zuweilen findet man auch in dem kranken Eierstock Haare und Knochen mit Zähnen, die meistens in einer Speckgeschwulst enthalten und von einer gelatinösen Masse umgeben sind, und welche selbst in Fällen vorgekommen sein sollen,

in welchen man in der Leiche die Zeichen der unbefleckten Jungfrauschaft vorfand *).

§. 1641.

Ausser den angegebenen Arten der Wassersucht gibt es noch Ansammlungen in einzelnen andern Theilen des Körpers, deren Darstellung aber dem Gebiete der chirurgischen Nosologie und der Augenheilkunde angehört; diese sind der Wasserbruch (Hydrocele), die Gelenkwassersucht (Hydarthrus), die Wassersucht der Schleimbeutel (Hydrops bursarum mucosarum), die Wasserbalggeschwulst (Cystis serosa, Hygroma), so wie auch die hydatidösen Geschwülste äusserer Theile und die Augenwassersucht (Hydrophthalmus).

§. 1642.

Anlage zur Wassersucht haben sowohl Individuen, die zu Congestionen und entzündlichen Reizungen gewisser Theile, z. B. des Gehirnes, geneigt sind, als auch solche, die an Schwäche leiden und einen schlaffen Körperbau haben, insbesondere fettsüchtige Personen. Die Anlage ist oft auch erblich und pflanzt sich zuweilen durch mehrere Geschlechter fort.

§. 1643.

Gelegenheitsursachen sind: *a)* solche Einflüsse, welche wiederholte Congestionen, Entzündung oder eine für eine Secretion vicariirende Thätigkeit in dem kranken Organ veranlassen können, wie insbesondere der anhaltende und übermässsige Genuss geistiger Getränke, rheumatische und gichtische Entzündung, besonders solche mit entzündlicher Anschwellung der Glieder, und Fieber mit entzündlichem Character, das Erysipelas, gewisse contagiöse Krankheiten, insbesondere das Scharlachfieber, unterdrückte Urinabsonderung durch Nierenentzündung

*) S. Meckel in dess. deutsch. Archiv f. d. Physiologie. 1815 B. I. Hft. 4. S. 580 u. d. f.

und andere Krankheiten der Nieren veranlasst, unterdrückte Hautausdünstung, schnell geheilte Fussgeschwüre und Ausschläge, so wie unterdrückte Blutflüsse, und überhaupt beinahe jede fortgesezte Reizung eines Organes, und besonders eines solchen, das zur serösen Absonderung geneigt ist. *b*) Solche Einflüsse, welche die Lebensthätigkeit in dem ganzen Körper oder einem Organe schwächen, alle schwächenden Krankheiten, insbesondere die Nervenfieber, Lähmungen, Schwindsuchten, Blutflüsse und lange dauernde Wechselfieber, eine feuchte Luft, schlechte Nahrung, der Missbrauch erschlaffender Getränke, andauernde Störungen in der Verdauung, Druck auf die Venen und Lymphgefässe, z. B. bei der Schwangerschaft. Endlich *c*) diejenigen Einflüsse, die die reproductive Thätigkeit qualitativ umstimmen und Bleichsucht, Fettsucht, Krebs, Verhärtung der Leber und anderer Organe veranlassen.

§. 1644.

Pathogenie der Wassersucht. Als nächste Ursache der Wassersucht nimmt man gewöhnlich ein Missverhältniss zwischen der Aushauchung und der Einsaugung der serösen Stoffe an und glaubt, dass entweder die Aushauchung krankhaft vermehrt oder die Einsaugung krankhaft vermindert sei oder beides zugleich statt finde. Die vermehrte Aushauchung beruhe in einer vermehrten Thätigkeit der aushauchenden Gefässe, die verminderte Einsaugung entweder, und zwar in der Regel, in Schwäche der resorbirenden Gefässe oder in einem Krampfe derselben, (Hydrops spasticus), oder auch in Verstopfung derselben durch Geschwülste, welche die lymphatischen Gefässe drücken.

Diese Erklärungsweise ist ziemlich befriedigend und praktisch, doch möchte eine nähere physiologische Würdigung der hier stattfindenden Krankheitsvorgänge wohl erlaubt sein.

Die Krankheitsprozesse, deren Product die Wasseransammlung ist, sind sehr verschiedenartig und können in folgenden Reihen aufgeführt werden.

1) Krankheitsvorgänge in den Capillargefässen, mit dem Character erhöhter Lebensthätigkeit. Hieher gehören: *a*) solche entzündliche Reizungen oder Entzündungen, die den Character der Verflüssigung haben. Sie erhalten gern einen solchen, wenn sie in einem Organ ihren Siz haben, dessen Funktion Verflüssigung (Ausdünstung) ist, daher vorzugsweise die Entzündung der serösen Häute, und wenn sie durch Hemmung einer Verflüssigung entstanden sind, wie dieses meistens bei den rheumatischen Entzündungen der Fall ist. *b*) Ein ohne Merkmale der Entzündung bestehender, der blosen Secretion vergleichbarer Verflüssigungsprozess in den Capillargefässen der wassersüchtigen Organe. Dieser kann auf polarische Weise durch Unterdrückung von Absonderungen, insbesondere der Hautausdünstung und vorzüglich der Urinabsonderung entstehen. In beiden Fällen wird in den Capillargefässen des leidenden Organs eine Menge Serum gebildet, welches nach und nach das die Gefässwandung bildende Parenchym des Organs durchdringt und sich im Zellgewebe anhäuft, oder auch sich in Höhlen ergiesst. *c*) Starker Andrang des Blutes nach einem Theile, wodurch seröse Stoffe aus den Gefässen herausgedrängt werden und sich in das Zellgewebe oder eine Höhle ergiessen, wie dieses manchmal bei dem Schlagfluss der Fall ist.

2) Krankheitsvorgänge in den Capillar- und Lymphgefässen, mit dem Character gesunkener Lebensthätigkeit. Diese sind: *a*) die aus gesunkener Nerventhätigkeit verminderten Lebensprozesse in den Capillargefässen, wodurch die Ausscheidung der serösen Stoffe in Dunst- und Gasform nicht gehörig bewirkt wird, der Blutlauf in denselben und wie es scheint, vorzüglich der des

serösen Theiles nicht mit der nothwendigen Kraft vollführt wird und daher das Serum die Capillargefässe anfüllt und zulezt das Parenchym der Organe durchdringt. Dieselbe Ursache (die darniederliegende Nerventhätigkeit) hindert auch die Zurückführung der ausgetretenen Stoffe in den lymphatischen Gefässen, das ist die Resorption. Das deutlichste Beispiel dieser Entstehungsart der Wassersucht giebt das Oedem der gelähmten Glieder. *b*) Durch einen Fehler des Blutes bedingte verminderte Lebensthätigkeit in den Capillargefässen. Hieher gehört die Dünnflüssigkeit des Blutes, die auf einen Blutverlust, wahrscheinlich durch Auflösung von Blutkügelchen, entsteht. Ein solches, an Blutkügelchen armes Blut, ist weniger geneigt mit der, ohnehin auch geschwächten Nervenkraft in kräftige Wechselwirkung zu treten, auch wirkt, da die Blutsäule oft sehr dünn ist, die Stosskraft des Herzens weniger auf dieselbe und es wird daher, besonders in den Theilen, in welchen der leichte Rückfluss der Säfte auch noch die Schwerkraft vermindert, sich leicht eine Anfüllung der Capillargefässe und zulezt Durchdringung des Parenchyms der Organe mit serösen Theilen bilden. Vielleicht wirkt auch auf diese Weise die Unterdrückung der Harnabsonderung, indem hier das Blut mit wässerigten Theilen überfüllt wird; doch kann auch hier, wie oben schon angedeutet wurde, eine antagonistisch-erhöhte Thätigkeit mit dem Character der Verflüssigung statt finden. Eben so kann eine andauernde passive Anfüllung der Capillargefässe mit Blut, durch Druck auf die Venen und andere Ursachen erzeugt, zum Austritt wässerigter Theile in das Parenchym der Organe Veranlassung geben, so wie auch diese Stoffe nicht resorbirt werden können, wenn ein Druck auf die Lympfgefässe statt findet. Alle Arten der Wassersucht, die aus Schwäche entstehen, scheinen sich auf die hier angegebene Weise, entweder

durch verminderte Nerventhätigkeit, oder durch eine, die Wechselwirkung zwischen der belebten Organenwandung und dem Blut in den Capillargefässen nicht gehörig unterhaltende Beschaffenheit des Blutes zu bilden. Auf diese Weise kann auch die von Manchen als Ursache der Wassersucht angenommene überwiegend venöse Beschaffenheit des Blutes wirken, doch möchte eine Hinneigung zur Venosität in dem arteriellen Blute nur höchst selten nachgewiesen werden können.

3) Gesunkene und qualitativ veränderte Reproductionsthätigkeit im Parenchym der Organe. Bei der Ernährung lagern sich niemals ganze Blutkügelchen an die Substanz der Organe an, sondern es wird ohne Zweifel aus der ganzen Masse der die Capillargefässe durchlaufenden Blutkügelchen ein flüssiger Theil ausgeschieden, der das Parenchym der Organe durchdringt und von diesen in seine eigene Substanz umgewandelt und zum Theil auch ausgeschieden wird. Liegt nun die Reproductionsthätigkeit des Organs darnieder und geht die Resorption nicht gehörig vor sich, so wird hieraus eine Ansammlung flüssiger Theile im Parenchym entstehen. Ausserdem scheint es, wie wenn durch eine eigenthümliche Umstimmung in den biochemischen Prozessen der Reproduction nicht allein eine vermehrte Menge von Wasser aus dem Blute gebildet, sondern auch solches in der Substanz der Organe durch Umwandlung festerer Stoffe, namentlich des Fettes, erzeugt werden könne. Diese eigenthümliche Umstimmung in der Reproductionsthätigkeit scheint am meisten mit der übermässigen Fettbildung selbst verwandt zu sein, indem die Fettbildung leicht in Wasserbildung übergeht, das Fett, so wie das Wasser Substanzen sind, die keinen Stickstoff enthalten*), und Fettsucht, so wie

*) Hierauf weist auch Sprengel hin. Inst. med. Tom. I. §§. 13. 77. 81.

Wassersucht, sehr häufig mit dem Leiden eines Organs, nämlich der Leber, in Verbindung stehen, das auf die Blutbereitung und überhaupt die biochemischen Prozesse im Körper einen Einfluss ausübt und eine, ebenfalls den Stickstoff entbehrende Substanz absondert. Die Wassersucht entspringt oft aus Physconie der Leber, und bei Fettsüchtigen (im höchsten Grade bei gestopften Gänsen) ist die Leber oft sehr gross.

§. 1645.

Was die Ursachen der einzelnen Arten der Wassersucht betrifft, so verdienen bei denselben folgende besonders hervorgehoben zu werden.

Hautwassersucht. Anlage: schwammiger Körperbau, das weibliche Geschlecht. Gelegenheitsursachen: der Rothlauf, das Scharlachexanthem, Rheumatismus, Schwächekrankheiten, besonders bei zu frühem Aufenthalt ausser Bett, Schwangerschaft, innere Wassersuchten.

Aeusserer Wasserkopf. Ist meistens angeboren und in diesem Falle entweder ein Bildungsfehler oder durch erlittene Gewalt während der Geburt entstanden; auch kann er durch zurückgetretene Kopfausschläge, Verkältung etc. erzeugt werden.

Der *chronische innere Wasserkopf.* Ist in der Regel angeboren und ursprünglicher Bildungsfehler, wozu Kachexien und Körperschwäche oder Blödsinn der Eltern, ein berauschter Zustand des Vaters oder der Mutter während des Coitus, oder häufige Trunkenheit der leztern während der Schwangerschaft öfters Gelegenheit geben sollen. Der nach der Geburt erworbene chronische innere Wasserkopf wird durch ähnliche Ursachen, wie die hizige Gehirnhöhlenwassersucht erzeugt.

Die *hizige Gehirnhöhlenwassersucht.* Anlage haben Kinder bis zum 6. und 8. Jahre (wegen der Entwick-

lung des Gehirns, und des, während des Zahnens nach den obern Theilen gehenden Triebes der Säfte) und scrophulöse, so wie auch sehr blühende und mit sehr guten Geistesanlagen begabte Kinder. Manchen Familien ist die Krankheit eigenthümlich, so dass oft mehrere Kinder, wenn sie in ein gewisses Alter kommen, von derselben befallen werden. Gelegenheitsursachen sind: *a*) idiopathisch wirkende Kopfverlezungen, heftige Einwirkung der Sonnenhize, z. B. bei abgeschorenem Kopfe, zu frühe und starke Anstrengung der Geisteskräfte. *b*) Consensuell wirkende: der Zahnreiz, gastrische Reize, namentlich Würmer, Säure, Galle im Magen, andauernde Flatulenz, der Missbrauch der narkotischen Mittel, namentlich des Opiums und der Belladonna, so wie auch der erregenden Mittel, des Weines etc. *c*) Antagonistisch wirkende: Verkältung, besonders des Kopfes, daher das zu starke Abscheeren der Haare, die Hinwegnahme des Gneises am Kopfe (nach *Gölis*), zurückgetretene Hautausschläge, namentlich des Kopfgrindes, des Scharlachexanthems (welches übrigens zuweilen auch ohne Zurücktritt des Ausschlages durch die Heftigkeit des Fiebers, so wie auch, und besonders im Stadium der Abschuppung, durch Unterdrückung der Hautausdünstung, den Hydrocephalus veranlassen kann), unterdrückte Harnabsonderung, schnell gestillte Durchfälle etc.

Wassersucht des Rückgrathes. Die mit Spina bifida verbundene Hydrorhachis ist angeboren und ein Bildungsfehler, zu welchem Scropheln oder früher bestandene Rhachitis bei den Eltern Veranlassung geben sollen. Die erworbene Hydrorhachis ist der Ausgang verschiedener Krankheiten, die oben schon bezeichnet worden sind.

Die *Brustwassersucht.* Anlage: das Mannes- und das höhere Alter. Gelegenheitsursachen: die Brustfells-

entzündung, der Missbrauch geistiger Getränke, welcher die Lunge zum Theil durch die andauernde Erregung des Gefäss-Systems, wie es scheint, aber auch dadurch krank macht, dass die Lunge ein Hauptausscheidungsorgan ist, wodurch die spirituösen Stoffe wieder entfernt werden, verschiedene Leiden der Lunge, wie Verhärtungen, Asthma etc.

Das *Oedem der Lunge* kann durch dieselben Ursachen hervorgebracht werden, und ist häufig ein Ausgang der Lungenentzündung.

Die *Herzbeutelwassersucht.* Gelegenheitsursachen: Herzbeutelentzündung, welche zuweilen bei dem Rheumatismus mit entzündlichem Fieber, bei contagiösen Fiebern etc. im Verborgenen sich ausbildet, andauerndes Gemüthsleiden etc.

Freie Bauchwassersucht. Anlage: das Mannes- und hohe Alter. Gelegenheitsursachen: Entzündung des Bauchfells, Anschwellungen und Verhärtungen der Leber, der Milz, des Pankreas, langwierige Wechselfieber, Unterdrückung der Hämorrhoiden.

Sackbauchwassersucht: zu starke Ausdehnung des Bauchfells während der Schwangerschaft, heftige Anstrengung der Bauchmuskeln während der Geburt, ein Stoss auf den Unterleib etc.

Wassersucht der Gebärmutter. Verschliessung des Muttermundes, als ursprünglicher Bildungsfehler oder in Folge von Entzündung, unterdrückte monatliche Reinigung, langwieriger weisser Fluss, Verhärtungen und Geschwülste der Gebärmutter, schwere Geburten und Missfälle, vorzüglich aber eine, in einem frühen Zeitraum der Schwangerschaft durch äussere Gewalt erfolgende Verlezung des Eies.

Wassersucht der Eierstöcke. Anlage: das höhere Alter, besonders die Zeit des Ausbleibens der monatlichen Reinigung. Gelegenheitsursachen: Entzündung

der Eierstöcke, Fehler in den Geschlechtsverrichtungen und zwar sowohl Ausschweifungen in denselben, als auch niemals eingetretene Erfüllung der Bestimmung der Geschlechtsorgane, Missfälle, äussere Verlezungen.

§. 1646.

Vorhersage. Die Wassersucht gehört im ganzen zu den schwer heilbaren und einzelne Arten derselben zu den unheilbaren Krankeiten; auch kehrt sie leicht wieder zurück. Die Prognose ist ausser von den Krankheitszufällen selbst vorzüglich abhängig: von den Ursachen der Krankheit, so ist z. B. eine nur in Folge einer schwächenden acuten Krankheit entstandene Wasseranhäufung in der Regel weniger gefährlich, als eine durch Verhärtung von Eingeweiden bedingte Wassersucht; von der Dauer der Krankheit, eine frisch entstandene und bei einem Individuum zum erstenmal sich zeigende Wassersucht ist eher zu heilen als eine lang bestehende oder zum zweiten- und drittenmal sich zeigende Wasseransammlung; und von dem Size der Krankheit. Am wenigsten gefährlich und am leichtesten zu heilen ist die Hautwassersucht. — Der zelluläre äussere Wasserkopf ist in der Regel nicht gefährlich und wird selbst von der Natur allein geheilt; der aponevrotische Wasserkopf wird bei richtiger Behandlung meistens geheilt, der periostische ist schlimm, indem hier meistens Beinfrass der Schädelknochen vorhanden ist. — Der chronische innere Wasserkopf ist zwar immer sehr gefährlich, aber nach *Gölis* Zeugniss [1]) in seiner ersten Entwicklung häufig und in seiner vollkommenen Ausbildung, wenn diese erst später nach der Geburt und langsam geschehen ist, zuweilen noch heilbar, doch bleiben in diesem Falle beinahe immer Geistes- und Körperschwäche

1) A. a. O. II. 105.

zurück. — Die hizige Gehirnhöhlenwassersucht ist im Stadium der Turgescenz und der Entzündung heilbar, doch immer sehr gefährlich, indem auch bei der besten Behandlung Ausschwizung erfolgen kann; im Zeitraum der geschehenen Ausschwizung scheint die Krankheit unheilbar und immer tödtlich zu sein. — Weniger gefährlich ist die acute Ausschwizung von Wasser zwischen den Gehirnhäuten. — Die mit Spina bifida verbundene Hydrorhachis ist beinahe immer tödlich, die ohne gespaltene Wirbel vorkommende krankhafte Ansammlung von Wasser in der Wirbelsäule ist nicht so höchst gefährlich. — Die von einer acuten Krankheit bedingte Wasserergiessung in die Brusthöhle ist zwar gefährlich, doch verschwindet sie meistens wieder, die mit allgemeiner Kachexie in Verbindung stehende Brustwassersucht ist selten auf die Dauer heilbar. — Die Herzbeutelwassersucht ist höchst gefährlich und tödtet oft unerwartet schnell, doch ist sie, wenn sie auf eine acute Krankheit entstanden ist, heilbar; ist sie in Folge der wassersüchtigen Dyscrasie entstanden, so wird sie in der Regel nicht geheilt. — Die freie Bauchwassersucht kann eine lange Zeit andauern und wird erst in ihrem höchsten Grade nach langer Dauer tödtlich; sie ist übrigens schwer auf die Dauer heilbar. — Die Sackbauchwassersucht wird in der Regel nur in ihrem höchsten Grade gefährlich, doch entscheidet sie sich beinahe nie von selbst und ist selten heilbar. — Die Hydatiden in der Gebärmutter werden zwar öfters durch Blutungen gefährlich, doch werden sie wohl immer durch Zusammenziehungen der Gebärmutter ausgestossen. — Die Wassersucht der Eierstöcke wird erst nach Jahren gefährlich, doch vermögen in der Regel weder die Kräfte der Natur noch die Hilfe der Kunst, ausser durch den sehr gefährlichen operativen Eingriff, das Uebel zu beseitigen.

§. 1647.

Behandlung der Wassersucht. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Hier verdient folgendes besonders hervorgehoben zu werden. Immer ist genau zu untersuchen, ob die unterdrückte oder sparsame Harnabsonderung die Folge oder die Ursache der Wassersucht und welches der Krankheitszustand der Nieren ist, der die Absonderung des Urins hindert; denn liegt z. B. ein entzündlicher Zustand der Nieren der Entstehung der Wassersucht zum Grunde, so schaden die gewöhnlich in Gebrauch gezogenen harntreibenden Mittel im höchsten Grade, und es sind dagegen oft Blutentleerungen angezeigt, und einhüllende Getränke und besänftigende Mittel von augenscheinlichem Nuzen. Ebenso dienen die leztern bei einem krampfhaft gereizten Zustande der Nieren. — Dessgleichen ist der Zustand der Gedärme, der Leber und des ganzen Pfortadersystems zu berücksichtigen, und bei Verstopfungen und Stockungen die auflösende Methode zu Hilfe zu ziehen. — Trinkern müssen die geistigen Getränke so weit entzogen werden, als auf die Verminderung oder gänzliche Entziehung dieser Reize nicht das Reactionsvermögen des Körpers zu sehr sinkt. An die Stelle des Branntweins sezt man eine mässige Quantität eines guten alten Weines. — Ist die Wassersucht durch unterdrückte Hautausdünstung oder zurückgetretene Ausschläge hervorgebracht, so ist eine starke Erwärmung des Körpers im Bette und der innere Gebrauch der schweisstreibenden Mittel dienlich, welches in der Regel die beste Heilmethode der Hautwassersucht ist, die auf das Scharlachfieber und bei der Kräze der Kinder entstehen. — Gegen die in Folge des Wechselfiebers entstandene Wassersucht ist die China oder das Chininum sulphuricum ein wahres Specificum.

§. 1648.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krank-*

heit. Die genannte Anzeige zerfällt in zwei Anzeigen: a) die der Beschränkung der Wasserbildung, das ist des Krankheitsprozesses, der die Wasseransammlung zur unmittelbaren Folge hat; b) die der Entfernung des schon vorhandenen Wassers. Hier entsteht die Frage, welcher von beiden Anzeigen zuerst entsprochen werden müsse. Ist die Wasserbildung erst in ihrem Beginne, so verdient in der Regel die erste Anzeige die Hauptberücksichtigung, ist aber schon eine Menge Wasser vorhanden, so ist es öfters eine Lebensanzeige, das Wasser zu entfernen und man muss in diesem Falle, wenn etwa die Anwendung der Mittel, die der ersten Anzeige entsprechen, der Erfüllung der zweiten hinderlich sein würde, der zweiten Anzeige zuerst Genüge leisten; in den meisten Fällen jedoch wird sich die Behandlung so einrichten lassen, dass beiden Anzeigen zugleich entsprochen wird.

§. 1649.

a) *Beschränkung der Wasserbildung.* Ist der Krankheitsprozess, der die Wassererzeugung bedingt, eine Entzündung, so trete die antiphlogistische Methode ein, Blutentleerungen, die kühlende Salze, Calomel. Ist er nur eine krankhafte Reizung, so dienen einhüllende und besänftigende Mittel und da doch häufig der Wasserbildung, ohne dass man deutliche Zeichen davon hat, ein gereizter Zustand in den Capillargefässen zum Grunde liegen und auch ein verborgener Reiz auf die Nieren wirken kann, so verdienen die einhüllenden Getränke einen ausgedehntern Gebrauch in derselben. Ich bediene mich zu diesem Zwecke gerne eines Thees von Rad. Althaea, Rad. Gramin. und Rad. Liquiritiae, den ich neben den übrigen Mitteln in der Regel gebrauchen lasse. In Beziehung auf die gegen einen gereizten Zustand ebenfalls empfohlenen antagonistisch wirkenden Mittel ist zu bemerken, dass die Blasenpflaster nur mit Vorsicht angewandt werden dürfen, da sie eine etwa bestehende

Reizung der Nieren vermehren und dadurch eine Unterdrückung der Harnabsonderung veranlassen können. Zu den antagonistisch wirkenden Mitteln gehören übrigens auch die der zweiten Anzeige entsprechenden ausleerenden Mittel. Zuweilen ist ein deutlicher Krampfzustand im Körper zu bemerken, wo sodann ebenfalls die besänftigende Methode und zwar oft die wirklichen krampfstillenden Mittel, selbst das Opium, in Anwendung gebracht werden müssen. Diese Mittel, welche gegen Entzündung, Reizung und Krampf angewandt werden, gestatten in der Regel den gleichzeitigen Gebrauch der urintreibenden Mittel, doch müssen die scharfen und erregenden Diuretica vermieden werden.

§. 1650.

Hat der Krankheitsprozess, durch welchen das Wasser sich bildet, den Character der Schwäche und besteht in fehlerhafter Blutbereitung und darniederliegenden Lebensprozessen in den Capillargefässen, so sind gelind erregende und stärkende Mittel von grossem Nuzen, eine stärkende Diät, Fleischkost, ein guter Wein, der Aufenthalt in einer trockenen Luft und unter den Arzneimitteln die bittern Mittel in Verbindung mit den aromatischen, die China und vorzüglich das Eisen. Die China wirkt unter solchen Verhältnissen oft selbst diuretisch, indem sie durch andauernde Erregung der Lebensthätigkeit die darniederliegenden Absonderungen wieder in Gang bringt; in andern Fällen hemmen aber auch die tonischen Mittel die Absonderungen und man muss daher bei ihrem Gebrauch ein beständiges Augenmerk auf die Urinabsonderung haben und mit diesen Mitteln aussezen, sobald jene gehemmt wird. Die stärkende Methode passt vorzüglich, wenn die Wasserbildung erst im Beginne oder schon grösstentheils verschwunden ist, selten bei einem hohen Grade der Wasseransammlung; mit ihr lassen sich sehr schicklich die Harntreibenden Mittel verbinden.

§. 1651.

Die angegebenen Mittel sind vorzüglich wirksam, wenn man sie unmittelbar auf das Organ wirken lässt, in welchem der Prozess der Wasserbildung geschieht. Wir wenden daher örtlich bald Blutentleerungen, besänftigende Einreibungen und antagonistisch wirkende Mittel, bald erregende und stärkende Mittel an, um die Lebensthätigkeit in dem leidenden Theile umzustimmen.

§. 1652.

b) *Ausleerung des schon vorhandenen Wassers.* Dieselbe geschieht in der Regel auf dem Wege der Absonderungen und zwar vorzüglich der des Urins, wobei zugleich die Resorption in dem leidenden Theile erhöht werden muss; ausserdem durch unmittelbare Entleerung des Wassers durch mechanische Mittel.

§. 1653.

Um die Absonderungen im Allgemeinen zu befördern, dient vorerst eine hinreichende Menge von Getränk. Es wurde dieses in frühern Zeiten dem Kranken entzogen, es ist aber zuverlässig im Ganzen besser, dem Kranken dasselbe zu gewähren. Ich sah sehr häufig auf den Genuss von reichlichem Getränk eine Urinabsonderung eintreten, wodurch nicht allein das genommene Wasser, sondern auch die im Körper angesammelte Flüssigkeit ausgeleert wurde. Nur wenn der Harnabgang, z. B. wegen Desorganisation der Nieren, nicht mehr zu Stande zu bringen ist, muss sich der Kranke so viel wie möglich des Trinkens enthalten. Am schicklichsten sind im allgemeinen indiffirente, einhüllende und gelind auflösende Getränke, wie z. B. die oben angeführte Abkochung von Graswurzel etc., indem sie in jeder Art der Wassersucht genommen und in ziemlich reichlichem Maasse getrunken werden dürfen; wählt man aber Getränke mit stärkerer Arzneiwirkung, wie z. B. diuretische oder erregende Getränke, so muss ihre Menge mehr beschränkt

und ihre Wirkung bei der Anwendung der übrigen Arzneimittel mit in Rechnung gebracht werden. Gibt man Getränke, um auf die Harnabsonderung zu wirken, so lässt man sie mehr kühl nehmen, will man aber die Hautausdünstung erregen, warm.

§. 1654.

Der schicklichste Weg, um das Wasser auszuleeren, ist in der Regel die Harnabsonderung. Durch sie kann am schnellsten viel Wasser entfernt werden, die ausgeleerte Flüssigkeit führt meistens auf diesem Wege keine oder wenig ernährende Bestandtheile mit hinweg, die Ausleerung selbst erfordert keine grosse Anstrengung der Natur und die Anwendung der Heilmittel zerrüttet nicht so leicht, wie z. B. die der abführenden Mittel, die Verdauung.

Es können die diuretischen Mittel in folgenden Reihen aufgeführt werden:

a) Die kühlenden diuretischen Mittel: Der Cremor Tartari, Kali nitricum, insbesondere beide in Verbindung mit einander, Kali aceticum, Tartarus boraxatus und andere Salze, die kohlensauren Wasser, namentlich das Fachinger, das Selterser, das Rippoltsauer Wasser, die vegetabilischen und die Mineralsäuren, namentlich die verdünnte Schwefelsäure, so wie das Elixir acidum Halleri. Von Manchen wird auch das Calomel zu den diuretischen Mitteln gezählt. Diese Mittel sind vorzüglich in der entzündlichen Wassersucht passend, können jedoch auch mit einer gewissen Beschränkung im Hydrops frigidus neben den andern Mitteln gebraucht werden.

b) Die weder kühlend, noch erregend wirkenden (indiffirenten) harntreibenden Mittel. Hier verdient vorzüglich die Digitalis purpurea (Nr. 92) erwähnt zu werden, welche zwar allerdings eine vorübergehende erregende Wirkung zeigt und sodann die Herzthätigkeit vermindert, aber in der kleinen Gabe, in welcher sie schon diuretisch

wirkt, weder die eine, noch die andere Folge hat oder nur in unbedeutendem Grade äussert, so dass sie sowohl in der entzündlichen, als in der sog. kalten Wassersucht gebraucht werden kann. Auch kann man sie mit Mitteln in Verbindung geben, die die Gesammtwirkung des gegebenen Mittels mehr der einen oder der andern Art der Wassersucht anpassen, so z. B. verbindet man die Digitalis im Hydrops inflammatorius mit Calomel und im Hydrops frigidus mit Squilla, aromatischen Wassern, dem Spiritus nitrico aethereus etc. Viele Aerzte geben eine halbe oder eine ganze Drachme in Aufguss; ich finde, dass diese Gabe in der Regel nicht lange ertragen wird, und dass dagegen 12—15 Grane im Aufguss von 6 Unzen, alle 2 St. 1 L. v., schon wirksam sind und längere Zeit anhaltend fortgebraucht werden können. — Hieher gehören auch die Wurzeln von Ononis spinosa, die Spargeln, gelbe Rüben, Pastinakwurzel etc.

c) Die erregenden, die scharfen und die tonischen harntreibenden Mittel. Oft sind mehrere dieser Wirkungen in einem Mittel vereinigt und sie finden auch sämmtlich ihre Anwendung in dem Hydrops frigidus, so dass sie hier zusammengefasst werden können. Man wählt übrigens nach dem Zustand der Lebenskräfte und nach andern Anzeigen, welchen durch die Nebenwirkung der nunmehr anzuführenden harntreibenden Mittel entsprochen wird, bald das eine, bald das andere derselben. Mehr in die erste Reihe gehören die Herba Petroselini, Baccae Juniperi, Turiones Pini, Herba Sabinae, Rad. Senegae, Rad. Levistici, die versüssten Säuren, namentlich Spiritus nitrico aethereus, Terpenthin und Terpenthinöl und die übrigen balsamischen Mittel. In die zweite Reihe können gesezt werden die Selleriewurzel, Meerrettig, Squilla, (Nro. 93), (nach der Digitalis wohl das vorzüglichste Mittel in der Wassersucht), das Colchicum autumnale, der Tabak, die Coloquinten, so wie auch andere Drastica

in kleinen, nicht abführenden Gaben, die Laugensalze, die Canthariden, so wie die Kellerwürmer etc. In die dritte Reihe endlich gehören die Pyrola umbellata, die Ballota lanata, die Radix Caincae, die Folia Uvae ursi.

Man wendet auch die urintreibenden Mittel äusserlich an und lässt z. B. das Terpenthinöl in Spiritus Juniperi aufgelöst oder die Cantharidentinktur mit Weingeist verdünnt in die Nierengegend einreiben.

§. 1655.

Ein anderer Weg, um das Wasser auszuleeren, ist die Erregung von Durchfällen; man wählt denselben in der Regel, wenn die Urinabsonderung nicht mehr zu Stande gebracht wird, in hohem Grade der Wassersucht, und gibt die abführenden zwischen den harntreibenden Mitteln. Man wählt weniger die Salze, als die drastischen Mittel, das Calomel, in Verbindung mit Jalappenwurzel, die Senna, Aloë, Coloquinten, Gratiola, Scammonium, Gummi Guttae, Krotonöl.[1]) Diese Mittel schwächen übrigens sehr die Verdauung und die Kräfte und vermögen auch Gelbsucht zu veranlassen.

§. 1656.

Die schweisstreibenden Mittel schaden nicht so leicht, als die so eben angeführten, und wirken, wo sie Plaz finden können, vortrefflich; es lässt sich aber ein solcher Erfolg nur in wenigen Fällen von ihnen erwarten, da die Haut in der Regel durchaus nicht zum Schweisse geneigt ist. Sie sind angezeigt, wenn die Haut eine Neigung zur Ausdünstung zeigt, und sind oft in der Hautwassersucht, die in Folge von Rheumatismen, Rothlauf, Scharlachfieber, Kräze etc. entstanden ist, sehr wirksam. Man wählt die gewöhnlichen schweisstreibenden Mittel,

1) Viele dieser Mittel sind in den sehr zusammengesezten Pilul. hydragog. Janini enthalten, wovon die Formel in Selle Med. clin. zu finden ist.

den Liquor Ammonii acetici, den Brechweinstein in kleinen Gaben, das *Dover*'sche Pulver, schweisstreibende Thee, das Schweissbad etc.

§. 1657.

Die Brechmittel werden nicht angewandt, um durch das Erbrechen Flüssigkeit zu leeren, wiewohl auch schon die Krise auf diesem Wege geschah, sondern um durch die Erschütterung des Nervensystems sowohl eine Umstimmung in der Thätigkeit der resorbirenden Gefässe, als in den aussondernden Organen zu bewirken, und dadurch die Absonderungen wieder in Gang zu bringen.

§. 1658.

Indem man die Absonderungen erregt, wirkt man mittelbar, auf antagonistischem Wege, auch auf die Resorption der ausgetretenen Flüssigkeiten; es scheinen aber auch manche der angegebenen Mittel unmittelbar auf die Resorption zu wirken, ja es scheint zum Theil ihre, die Absonderungen befördernde Eigenschaft nur secundär zu sein. Die vorzüglichsten, bei der Wassersucht gebräuchlichen, auf die Resorption wirkenden Mittel sind die Antimonialien, vorzüglich der Tartarus emeticus in kleinen Gaben, die Mercurialien, vorzüglich das Calomel, die Digitalis, die Flores Arnicae und die Rad. Senegae, das Jod, von welchem ich übrigens bis jezt noch keinen grossen Erfolg in der Wassersucht gesehen habe. — Dieses Mittel unterstüzt man mit äusserlichen: Einwicklung der wassersüchtigen Theile in erwärmte und mit aromatischem Rauche, z. B. von Wachholderbeeren oder Bernstein, durchdrungene Tücher; Compression durch Einwicklung, das Auflegen von erwärmten Sand-, Asche-, aromatischen Kräutersäckchen, erregende Einreibungen, z. B. von Spiritus Juniperi, mit Zusaz von Liquor Ammonii causticus oder der Tinctura cantharidum, Meerzwiebelessig etc., Einreibungen

von erwärmten fetten Oelen, Hautreize, Senfteige, Blasenpflaster, selbst Moxen.

§. 1659.

Ausser dem Wege der Absonderung kann auch das Wasser unmittelbar durch Scarification und die Paracentese entleert werden.

§. 1660.

Was die in der Wassersucht zu befolgende Diät betrifft, so wurde schon oben das Nöthige über den Genuss des Getränkes angegeben. Bei der entzündlichen Wassersucht ist übrigens die antiphlogistische Diät und bei jener, die als wahre Kachexie erscheint, eine leicht verdauliche und gut nährende Kost zu wählen und das gesunkene Wirkungsvermögen durch den Genuss einer mässigen Portion Wein zu unterstüzen. Auch ist dem Kranken eine trockene Luft und, so lange ihn es nicht zu stark angreift, eine mässige active oder passive Körperbewegung im Freien zuträglich.

§. 1661.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Unter den lästigen Zufällen der Wassersucht verdient die Verstopfung erwähnt zu werden, welche um so mehr durch leichte, die Verdauung nicht störende oder die Körperkräfte schwächende Mittel gehoben werden muss, als sie und die hiedurch veranlassten Stockungen im Pfortadersystem eine mitwirkende Ursache der Wassersucht werden können. — Die manchmal vorkommenden Harnbeschwerden sind zuweilen durch den Gebrauch der diuretischen Mittel selbst erzeugt, es muss sodann mit ihnen ausgesezt und schleimigtes Getränk gegeben werden; sind Canthariden die Ursache, so dienen Emulsionen mit Kampher. — Den Husten, bei der Brustwassersucht, sucht man durch besänftigende Mittel, die Verdauungsbeschwerden bei der Bauchwassersucht durch Stomachica zu heben u. s. w.

§. 1662.

Die Regeln der Behandlung der Wassersucht, wie sie so eben angegeben worden sind, finden ihre Anwendung bei allen einzelnen Arten dieser Krankheit, doch ist in Beziehung auf dieselben noch besonders zu bemerken:

Die *Hautwassersucht* darf, wenn sie mit innerer Wassersucht in Verbindung steht, nur mit besonderer Vorsicht mit den örtlichen, auf die Resorption wirkenden Mitteln, wie sie oben angegeben worden sind und wozu man sich bei dem Oedem der Füsse auch des Schnürstrumpfes bedienen kann, behandelt werden, indem zuweilen bei Verminderung der Wasseransammlung in der Haut die innern Beschwerden zunehmen. Man darf dieselben nur in dem Falle fortsezen, wenn auf ihren Gebrauch das Leiden der innern Theile nicht zunimmt und das Wasser reichlich fliesst. — Bei dem Oedem der Füsse ist eine horizontale Lage zu empfehlen. — Auf Scarificationen entleert sich manchmal nur wenig Wasser, so dass die Operation ohne Erfolg ist, oft aber auch eine ausserordentlich grosse Menge von Flüssigkeit, so dass hierdurch allerdings die Wassergeschwulst zusammensinkt, aber auch eine tödtliche Erschöpfung der Kräfte eintreten kann. Auch gehen zuweilen die scarificirten Stellen in den Brand über. — Durch Blasenpflaster wird in der Regel nur wenig Wasser entleert und es kann durch dieselben zu brandigen Hautstellen Veranlassung gegeben werden.

§. 1663.

Bei dem durch Quetschungen bei der Geburt entstandenen *äussern Wasserkopf*, dienen, insofern er sich nicht, wie die gewöhnliche Kopfgeschwulst, von selbst vertheilt, warme, aromatische Umschläge oder Umschläge von Salmiakauflösung, Bleiwasser, adstringirenden Abkochungen, und wenn die Geschwulst auf

diese Weise nicht weicht und im Gegentheil mehr gespannt wird und die Wärme sich vermehrt, erweichende Breiumschläge und nach *Gölis*[1]) ein auf den höchsten Gipfel der Geschwulst geseztes Kaustikum, welches nur die Oberhaut verlezen darf und in einer geringen Eiterung erhalten werden muss; bildet sich Eiterung in der Geschwulst, so muss dieselbe geöffnet werden.

Die bei Neugebornen vorkommenden umschriebenen Geschwülste, welche als partieller, aponevrotischer oder periostischer Wasserkopf oder als eine Blutgeschwulst (Cephalaematoma neonatorum), welche beide Krankheitszustände wohl nicht vor der Oeffnung der Geschwulst unterschieden werden können, erkannt werden, können mit aromatischen Umschlägen und dem Compressivverband 7 — 14 Tage hindurch behandelt werden und müssen sodann nach der ältern und von den meisten Neuern angenommene Methode mit der Lanzette geöffnet werden; nach *Gölis*[2]) jedoch werden sie passender mit dem Causticum behandelt. Nach demselben wird an dem höchsten Punkte der Geschwulst, die Haut mit Lapis infernalis, bis zur Verlezung des Oberhäutchens, leise gerieben, oder eine Pasta von Aezstein und lebendigem Kalk, mit einigen Tropfen Weingeist bereitet, so lange auf die angegebene Stelle aufgelegt, bis gleichfalls Verlezung der Epidermis erfolgt, oder es wird durch ein Stückchen Vesikatorpflaster ein kleines Bläschen hervorgebracht. Die Verwundung durch das Causticum oder durch das Vesikatorpflaster darf nicht grösser als ein Silberkreuzer sein und wird durch Digestivsalbe in Eiterung erhalten.[3])

1) A. a. O. II. 195. — 2) A. a. O. II. 198. — 3) Gegen diese Behandlungsweise hat *Zeller* in seiner Inaugural-Dissertation (de Cephalaematomate recens nat. Heidelb. 1822. Praes. Naegele) Einwendungen erhoben, welche *Gölis* (in s. a. W. II. S. 201.) zu

Entsteht der partielle äussere Wasserkopf in Folge von Metastasen, in welchem Falle aber die Flüssigkeit meistens Eiter ist, oder in Folge der Zerreissung eines lymphatischen Gefässchens, oder bildet sich eine Wasserbalggeschwulst, oder eine Ansammlung von jauchigter Flüssigkeit in Folge von Gichtstoff, Scropheln oder venerischem Gifte, oder entsteht eine ähnliche, jedoch in der Regel Eiter enthaltende Geschwulst in Folge des Stiches eines Insectes, des Sonnenstiches etc., so ist in der Regel die Geschwulst zu öffnen und weiterhin chirurgisch zu behandeln. Hängt das Leiden, wie namentlich die erwähnte Ansammlung von Jauche unter der Beinhaut, mit einer Kachexie zusammen, so ist diese zu heben und in dem erwähnten Fall in der Regel die stärkende Methode passend. Bei dem allgemeinen äussern Wasserkopfe, welcher oft auf Unterdrückung von Ausschlägen und nässenden Stellen am Kopfe oder auch durch Metastasen von andern Theilen entsteht, sucht man die unterdrückte Absonderung wieder in Fluss zu bringen und öffnet die Geschwulst an der am meisten hervorragenden Stelle. Zertheilende Umschläge sind hier zu verwerfen, indem sie eine Metastase nach innern Theilen veranlassen können. Als Nachkur empfiehlt *Gölis* das Tag und Nacht fortgesezte Tragen von Flanellhauben, welche von Zeit zu Zeit getrocknet, durchräuchert und mit Campher bestrichen werden müssen, oder Müzen, mit aromatischen Kräutern gefüllt, aufgesezt.

§. 1664.

Der *innere chronische Wasserkopf*, welchen die

widerlegen sucht, und dabei anführt, dass von 91, von ihm auf seine Weise behandelten Kindern keines Gichter bekam und keines starb, während die Incisionen öfters Gichter veranlassen und bei der Behandlung mit Incisionen gewöhnlich der Zehnte starb.

meisten Aerzte für unheilbar erklären, wird nach *Gölis* Versicherung durch seine Heilmethode [1]) oft gründlich geheilt. Die Kopfhaare müssen kurz abgeschnitten werden und der Kopf einmal täglich mit einer Salbe von 6 Drachm. Ung. Juniperi und 3 Drachm. bis $\frac{1}{2}$ Unz. Ung. neapolitanum, in der Menge von 1 bis höchstens 2 Quentchen, gut durchschmiert werden, worauf eine genau passende Haube von Flanell oder dichtem feinem Tuch aufgesezt wird. Ist der Kranke zu Durchfällen geneigt, so erhält er $\frac{1}{4}$ Gran, ist er hartleibig $\frac{1}{2}$ Gran Calomel ein- bis zweimal täglich; treten aber stärkere Durchfälle ein, so wird mit diesem Mittel ausgesezt und nur mit den Einreibungen fortgefahren. Bei Spuren von Speichelfluss, so wie auch bei eintretender Besserung, werden beide Mittel in etwas längern Zwischenräumen in Anwendung gebracht, die Haube aber immer sorgfältig beibehalten. Hiebei werden von Zeit zu Zeit gelind reizende Laugenbäder angewandt, die Diät auf's Sorgfältigste geordnet, wobei insbesondere, während des Gebrauches des Calomels, Säuren verhütet werden müssen, und die Kinder viel in's Freie gebracht. — Bemerkt man binnen 6 oder 8 Wochen keine Veränderung der Krankheit und geht der Urin sparsam, so werden leichte diuretische Mittel verordnet, z. B. die Terra foliata Tartari und das Oxymel squilliticum und Fontanelle zu beiden Seiten des Hinterhauptsloches oder auf beide Oberarme gesezt. — Zuweilen thun bei der Anwendung dieser Heilmethode örtliche Blutentleerungen vorzügliche Dienste, wenn sich nämlich ein Entzündungszustand der Gehirnhäute oder Congestionen nach dem Kopfe zu dem chronischen Wasserkopf hinzugesellen. — Leidet der Kranke, neben dem chronischen Wasserkopfe, an einer Dyscrasie, z. B. Scropheln und Rhachitis, so verbindet

1) A. a. O. II. 128 u. d. f.

man mit den oben angegebenen Heilmitteln die gegen diese Kachexien gebräuchlichen Mittel, die meistens wohl zusammen passen, nur sind bei der Rhachitis reichlichere Gaben von Calomel weniger zuträglich, und es muss daher die Gabe auf $^1/_2$ oder $^1/_3$ Gran alle zwei Tage beschränkt werden. Bei der scorbutischen Dyscrasie kann obige Methode gar nicht in Gebrauch gezogen werden und es muss daher ihrer Anwendung die Heilung des scorbutischen Leidens vorhergehen.

Ausser den bei dieser Methode angegebenen Mitteln sind sehr vielfache Heilmittel gegen den chronischen Wasserkopf empfohlen worden, schon von *Hippokrates* die Cauterien, von Andern Einschnitte, Blasenpflaster, Haarseile, aromatische Umschläge auf den Kopf, allmälige Compression des Schädels und verschiedene drastische, diuretische, schweisstreibende und stärkende Mittel. In der neuesten Zeit hat man wiederum die Punction in Vorchlag gebracht.

§. 1665.

In der *hizigen Gehirnhöhlenwassersucht* müssen im Zeitraum der Turgescenz vor Allem Blutentleerungen und zwar in reichlicher Menge vorgenommen werden. *Gölis* bestimmt die Quantität derselben dahin, dass bei vollsaftigen Kindern in den ersten sechs Monaten 2, 3 und auch in dringenden Fällen, bei dem heftigsten tumultuarischen Eintritte, 4 Unzen Blut entleert werden sollen, von diesem Alter bis zu einem Jahre 3, 4, auch 5 Unzen; im zweiten, dritten und vierten Jahre erfordert die Heftigkeit der Zufälle oft eine Blutlassung von 4, 5 — 6 Unzen und in höherm kindlichen Alter könne noch mehr entleert werden. Die hier angegebenen grössern Quantitäten von Blut sind gewiss nur mit grosser Vorsicht und nur bei dem heftigsten Grade der Entzündung zu entziehen.

§. 1666.

Nebst den Blutentleerungen wende ich gewöhnlich, wenn die Krankheit noch im Beginne ist, ein und selbst mehrere Brechmittel an. Oft glückt es, die Krankheit hierdurch beinahe plözlich zu beendigen (was vermittelst des Calomels beinahe nie geschieht). Wendet man übrigens dieses Mittel an, so muss man mit der Blutentziehung etwas sparsam sein, weil beide Mittel zusammen einen hohen Grad der Erschöpfung bewirken können. Nach dem Brechmittel genügt es in der Regel kalte Umschläge auf den Kopf und eine einhüllende Mixtur (Oelmixtur) zu verordnen. Entwickelt sich die Krankheit ungeachtet dieser Mittel weiter, so nehme ich nun zu dem gewöhnlichen, sogleich zu beschreibenden Verfahren meine Zuflucht.

§. 1667.

Die gegenwärtig beinahe allgemein angenommene Behandlungsweise des Hydrocephalus acutus ist die, in welcher neben den Blutentleerungen das Calomel die Hauptrolle spielt. Man wendet dieses Mittel am besten, nach *Gölis*, an, Kindern von 1 — 5 Monaten $^1/_4$ Gran, und solchen von 6 Monaten bis zu 1 und 2 Jahren $^1/_2$ Gran Calomel alle zwei Stunden. Bei hartleibigen Kindern kann man diese Gabe alle Stunde reichen und auch ein Paar Grane geröstete Jalappenwurzel zusezen. Andere Aerzte geben 2, 3 und mehrere Grane Calomel pro dosi. Gut ist's, nebenbei einhüllend-besänftigende Mittel zu geben, eine Abkochung von Eibischwurzeln, die arabische Emulsion, dünne Oelmixturen. Hauptmittel sind hierbei in dieser Periode kalte Umschläge von Wasser oder von gestossenem Eis, in eine Schweinsblase gehüllt, auf den Kopf, oder die, vorzüglich von *Formey* und *Heim* empfohlenen kalten Begiessungen des Kopfes, welche Tag und Nacht hindurch häufig wieder-

holt werden müssen. — Ausserdem sind empfohlen worden und können mit zu Hilfe gezogen werden Einreibungen von grauer Quecksilbersalbe am Halse und in den Weichen, warme Bäder, Fussbäder und Bähungen der Füsse mit Senfmolken, so wie Senfteige auf dieselben gelegt, und Blasenpflaster in den Nacken, welche übrigens nur nach gebrochener Heftigkeit der Entzündung und im Zeitraum der beginnenden Ausschwizung passend sein möchten. *Cullen* und *Monro* liessen ein grosses Blasenpflaster auf den abgeschorenen Kopf legen.

§. 1668.

Im Zeitraum der erfolgenden Ausschwizung kann diese Behandlung, mit Ausnahme der Blutentleerungen, fortgesezt werden; insbesondere empfiehlt *Formey* die kalten Begiessungen des Kopfes, die nach demselben noch in diesem Stadium zuweilen Heilung bewirken sollen. Man verbindet nun gewöhnlich mit dem Calomel die Digitalis, lässt Einreibungen von Meerzwiebelessig und Cantharidentinktur am Unterleibe vornehmen und gibt, wenn Lähmungen sich einstellen, Arnica, Campher, Moschus. Nach *Gölis*, mit dessen Erfahrungen auch bis jezt die meinigen übereinstimmen, ist in diesem Zeitraum Rettung unmöglich, und er gibt daher den Rath, sich auf die Palliativkur zu beschränken, wo er besonders als ein nervenberuhigendes Mittel einen Aufguss der Digitalis empfiehlt.

§. 1669.

Um bei der, mit *Spina bifida* verbundenen Rückgrathswassersucht das Wasser zu entleeren, hat man die Punktion der Geschwulst, insbesondere durch Nadeleinstiche, empfohlen; es sind jedoch nur sehr wenige Fälle von geglückter Heilung bekannt. *A. Cooper* empfiehlt durch eine Bandage, welche fortdauernd liegen gelassen werden muss, die Geschwulst zurückzuhalten.

§. 1670.

Die Behandlung der *Brustwassersucht* ist nach den oben angegebenen Regeln der Behandlung der Wassersucht im Allgemeinen einzurichten. Oft muss man mit den harntreibenden Mitteln die Expectorantia verbinden, in welchem Falle man auch gerne solche Diuretica wählt, die zugleich den Schleimauswurf befördern, wie z. B. die Squilla und die Senega. Als Radicalmittel wird die Paracentese der Brust nur in seltenen Fällen anwendbar sein, indem bei der als Kachexie auftretenden Wassersucht die Heilung dadurch nicht erreicht wird und bei der als pleuritisches Extravasat erscheinenden Wasseransammlung in der Brusthöhle dieselbe in der Regel nicht nothwendig ist, da auch sehr bedeutende derartige Extravasate wieder aufgesogen werden; doch kann durch die Paracentese in dringenden Fällen die Erstickungsgefahr beseitiget und dadurch Zeit zur Heilung gewonnen werden.

§. 1671.

Die *Herzbeutelwassersucht* macht wegen der dadurch plözlich eintretenden Gefahr die sorgfältigste Vermeidung der Gemüthsbewegungen und rascher Körperbewegung nothwendig. — Die von *Skielderup* [1]) empfohlene Trepanation des Brustbeins und Oeffnung des Herzbeutels wurde auch von *Laennec* vorgeschlagen, doch die Operation nicht von ihm ausgeführt.

§. 1672.

Bei der *freien Bauchwassersucht* ist, wenn die innerlichen Mittel nicht mehr wirken und der Leib gespannt und die Schwappung deutlich ist, die Entleerung des Wassers durch den Bauchstich angezeigt. Es ist

1) De trepanatione sterni et apertura pericardii, in Act. nov. Societat. Havniens. Vol. I. 1818. pag. 130.

diese Operation nicht allein ein Palliativmittel, sondern zuweilen selbst ein Radicalmittel; auch hat man bemerkt, dass nach der Vornahme derselben die Arzneimittel wieder wirksamer werden. Man räth gewöhnlich, den Bauchstich wiederholtermalen vorzunehmen, bevor sich das Wasser in bedeutendem Grade ansammelt; dieser Rath scheint mir die Beschränkung zu verdienen, es nur dann zu thun, wenn die Ansammlung des Wassers nicht zu rasch geschieht, denn ist dieses der Fall, so hat die häufige Entleerung des Wassers, wegen der stets erneuerten und in sehr bedeutender Menge erfolgenden Absonderung in der entleerten Höhle, eine schnelle Verzehrung der Kräfte des Körpers zur Folge, wo hingegen bei der einmal vorhandenen Wasseransammlung der Krankheitsprozess oft lange stehen bleibt oder nur langsam vorrückt.

Die *Bauchsackwassersucht* kann nicht wohl durch innerliche Mittel geheilt werden und es ist hier immer chirurgische Hilfe nothwendig.

§. 1673.

Gegen die *Wassersucht der Gebärmutter* werden die gewöhnlichen innern Mittel empfohlen; ausserdem werden gegen die Verschliessung des Muttermundes aus Krampf erweichende Dämpfe, Bäder und besänftigende Einsprizungen, bei Verschliessung des Muttermundes durch Lymphpfröpfe u. s. w., das Einbringen eines weiblichen Catheders in denselben, bei Verwachsung desselben, ihre Trennung durch schneidende Instrumente, oder bei deren Unmöglichkeit die Paracentese des Uterus angewandt.

§. 1674.

Die *Wassersucht der Eierstöcke* wird nicht leicht durch innerliche Mittel gehoben. Die Punction gewährt nur palliative Hilfe, wesswegen verschiedene andere chirurgische Verfahrungsweisen angegeben worden sind,

von denen aber bei der gewöhnlich gleichzeitig vorhandenen scirrhösen Entartung des Eierstockes nur die Exstirpation desselben radicale Heilung bewirkt.

Die Windsucht.

(*Pneumatosis.*)

Combalusier (Paris 1747). — *Delius* (a. d. Lat. 1759, Nürnberg 1762). — *Trnka de Krzowitz* (lat. Wien 1788). — *Ackermann* (Alt. u. Nürnb. 1800). — *Fodéré* (Strasb. 1829).

§. 1675.

Die zur Bezeichnung der krankhaften Gasansammlung gebräuchlichen Wörter haben eine verschiedene Bedeutung, indem die einen, wie Luftgeschwulst und Emphysema, blos das Vorhandensein von Luft in einem Theile, die andere aber, wie Windsucht und Pneumatosis, nicht sowohl das Vorhandensein von Gas, welches auch von aussen in das Zellgewebe oder die Höhlen des Körpers eingedrungen sein kann, als vielmehr einen krankhaften Zustand des Körpers bezeichnet, in welchem sich auf eine krankhafte Weise Gas entwickelt, und in welchem derselbe gleichsam die Sucht, Gas zu bilden, zeigt.

Nur der leztere Krankheitszustand gehört eigentlich hieher, doch ist es zweckmässig, auch die Luftansammlung zu betrachten, in welchen das Gas nicht durch einen Krankheitsprozess im Körper erzeugt, sondern in denselben auf irgend eine Weise hineingekommen ist.

§. 1676.

Im Allgemeinen gibt sich die Gasansammlung im Körper durch eine Geschwulst, die gespannt und elastisch ist, einen hohlen Schall oder ein knisterndes Geräusch

beim Anschlagen oder Drücken derselben, mehr oder weniger gehemmte Verrichtung des leidenden Organs, und die eigentliche Windsucht noch ausserdem durch ein kachektisches Aussehen des Kranken und Abmagerung des Körpers zu erkennen.

§. 1677.

Die abnorme Gasansammlung hat ihren häufigsten Siz im Unterleib (die Trommelsucht, Tympanites, Hydrops siccus et flatulentus) und zwar findet dieselbe entweder in dem Magen und den Gedärmen statt (Darmwindsucht, Tympanites intestinalis, Pneumatosis intest.), oder in der Bauchhöhle (Bauchwindsucht, Tympanites oder Tympania abdominalis).

Geringe Gasansammlungen (Blähungen, Flatulenz) kommen häufig in dem Magen und dem Darmkanal, oft bei sehr gutem Befinden vor und gehören nicht wohl zur eigentlichen Windsucht, indem sie nichts anderes zu sein scheinen, als Entwicklung von Luft aus den in dem Darmkanal enthaltenen Stoffen. Die Gasansammlung im Magen gibt sich durch Auftreibung in der Herzgrube, Neigung zum Aufstossen und Austreiben von Blähungen (Ructus), welche geruch- und geschmacklos, aber auch sauer und von üblem Geruche sein können, so wie durch ein Gefühl von Spannung und zuweilen auch durch Magenkrämpfe, welche durch das Aufräupsen gemildert werden, zu erkennen. — Findet eine solche leichte Gasanhäufung in den Gedärmen statt, so äussert sich dieses durch ein Gurren und Kollern im Leibe, zuweilen durch kolikartige oder auch dem Seitenstich ähnliche Schmerzen, manchmal durch theilweise Auftreibung des Leibes und durch erleichternden Abgang von Blähungen.

§. 1678.

Bei Kindern ist die Flatulenz eine sehr häufige Erscheinung. Gewöhnlich veranlasst dieselbe Kolikschmerzen,

wesshalb die Kinder oft stark schreien und mit den Füssen zappeln, bis Blähungen abgehen, worauf gewöhnlich der Schmerz nachlässt. Oft leiden sie zugleich an saurem Aufstossen, Erbrechen, Verstopfung oder Durchfall mit grünlichen, wie gehackt aussehenden, Stuhlentleerungen. Bei stärkerer Luftansammlung wird der Leib aufgetrieben und gespannt, besonders ist dieses in der Herzgrube der Fall und das Athmen wird hiebei kurz und ängstlich (das Herzgespann oder Angewachsensein). Zuweilen kommen selbst Zuckungen hinzu.

§. 1679.

In der ausgebildeten Windsucht des Unterleibes scheint in der Regel Darm- und Bauchwindsucht mit einander verbunden zu sein, und es lässt sich wohl auch selten die eine von der andern mit Sicherheit unterscheiden, wenn nicht die Geschichte der Entstehung den Siz der Krankheit bestimmter anzeigt.

Bei der Darm-Bauchwindsucht schwillt der Leib oft ausserordentlich an, selbst wie im lezten Monate der Schwangerschaft, er ist meistens gleichförmig ausgedehnt, zeigt jedoch auch manchmal an einzelnen Stellen stärkere Auftreibungen als an andern, er ist sehr gespannt, elastisch und gibt bei dem Anschlagen einen starken Schall. Es fehlt das Schwappen und bei dem Umwenden von einer Seite auf die andere sinkt nicht die Geschwulst auf diese Seite hin, wie dieses bei der Bauchwassersucht der Fall ist. Das Athmen ist mehr oder weniger erschwert, die Verdauung gestört, der Stuhl verstopft, der Kranke leidet an Erbrechen, Schluchzen, Brennen im Leibe, kolikartigen Schmerzen und findet vorübergehend Erleichterung, wenn Blähungen abgehen. Der Harn geht wie bei der Wassersucht sparsam ab und ist auch, wie in dieser Krankheit, meistens braun und trübe. Allmälig zehrt der Kranke ab und es bildet sich ein hektisches Fieber aus, oft

aber gesellt sich zu der Trommelsucht die Bauchwassersucht hinzu oder es geht vielmehr die Windsucht in die Wassersucht über.

§. 1680.

Nicht selten bildet sich im Verlaufe von Nerven- und Faulfiebern, Darm- und Bauchfellsentzündung, dem Kindbettfieber etc. eine hizig verlaufende Darm- und Bauchwindsucht (Meteorismus) aus, welche die Gefahr der schon bestehenden Krankheit erhöht, und zuweilen von Perforation der Gedärme herrührt.

§. 1681.

Eine seltene Art der Windsucht ist die Luftansammlung in der Gebärmutterhöhle (Physometra). Es kann sich dieselbe bilden, wenn auf irgend eine Weise der Muttermund verschlossen wird. Die Gebärmutter wird hiebei wie in der Schwangerschaft ausgedehnt und ist als eine elastische Geschwulst in der untern Bauchgegend fühlbar. Zuweilen wird ein Theil der angesammelten Luft durch den Muttermund und die Scheide ausgetrieben (Flatus uterini). Auch sollen sich manchmal in der Schwangerschaft an den Eihäuten häutige Luftblasen bilden (Molae aereae, ventosae), welche zuweilen plazen.

§. 1682.

Häufiger ist die Luftansammlung in der Brusthöhle und in dem Lungengewebe.

Die Ansammlung von Luft in der Brusthöhle (Pneumothorax) hat als beständige Erscheinung einen gewissen Grad von Schwerathmigkeit, dagegen ist der Husten kein wesentliches Symptom. Die Erkennung dieses Zustandes kann übrigens allein mit Sicherheit durch die Vergleichung der Resultate geschehen, welche man durch die Untersuchung mit dem Stethoscop und durch die Percussion gewinnt. Wenn die eine Seite der Brust besser tönt als die andere, wobei sie zugleich

auch ausgedehnt sein kann, und man dabei auf dieser Seite durchaus kein Respirationsgeräusch wahrnimmt, während es auf der andern, weniger gut tönenden Seite vorhanden ist, so ist es sicher, dass auf der, einen stärkern Schall gebenden Seite der Brust ein Pneumothorax vorhanden ist. Eine Täuschung kann hier eintreten, wenn die Lunge an einer Stelle mit der Brustwandung verwachsen ist, wo man sodann an dieser Stelle das Respirationsgeräusch wahrnimmt; man muss daher, um sicher zu sein, den Kranken an mehrern Stellen der Brust untersuchen. — Ist zugleich neben dem Pneumothorax ein wässerigtes, eiteriges oder blutiges Extravasat vorhanden, so erkennt man dasselbe, so wie seinen Siz daran, dass bei Abwesenheit des Respirationsgeräusches an beiden Stellen, die Percussion an dem Size des Extravasates einen sehr matten Ton gibt, während dieselbe an der Stelle, wo Gas angesammelt ist, einen starken Schall zeigt; auch nimmt man, wie schon *Hippokrates* beobachtete, ein schwappendes Geräusch wahr, wenn man den Kranken an beiden Schultern fasst und etwas schüttelt. Dieses Geräusch bemerken die Kranken auch zuweilen selbst bei Bewegung des Körpers. — Ist Gas und tropfbare Flüssigkeit zugleich angesammelt und steht die Pleuralhöhle mit einem Luftröhrenast in Verbindung, wo sodann bei dem Athmen die eindringende atmosphärische Luft mit dem Extravasat in Berührung kommt, so hört man das metallische Klingen oder ein klingendes Geräusch, wie wenn man in einen Krug bläst.

§. 1683.

Bei der **Leichenöffnung** ist es, um den Pneumothorax zu erkennen, nothwendig, dass man den Thorax zuerst mit einem feinen Einstich öffne, damit man die Entweichung der Luft wahrnehmen kann. Die Lunge ist in den hintern Theil der Brusthöhle zurückgedrängt.

§. 1684.

Die Ansammlung der Luft in ausgedehnten Lungenbläschen, so wie der Austritt derselben in das Gewebe der Lunge oder des Pleuralüberzuges ist das Lungenemphysem. *Laennec* nimmt zwei Arten desselben an:

1) Das *Bläschen-* oder *eigentliche Lungenemphysem*. Die Kranken leiden an einer habituellen Engbrüstigkeit, welche sich beim Gehen, Treppensteigen, nach starken Mahlzeiten, Gemüthsbewegungen etc., und vorzüglich bei dem Hinzutritt eines hizigen Katarrhes zu stärkern asthmatischen Anfällen steigert. In den leichtern Graden des Uebels bietet der Anblick des Kranken nichts Besonderes dar, in den höhern Graden aber hat derselbe eine erdfahle, an einzelnen Stellen in's Violette gehende Farbe, besonders an den Lippen, welche auch dick und aufgeblasen scheinen. Es ist wohl immer ein trockener oder auch von Schleimauswurf begleiteter Husten vorhanden. Wenn das Emphysem nur eine Seite einnimmt, oder auf einer Seite in einem höhern Grade als auf der andern besteht, so hat diese Seite einen grössern Umfang, die Zwischenräume zwischen den Rippen sind breiter und die ergriffene Seite gibt einen stärkern Ton bei der Percussion, obgleich auch die andere gut wiedertönt. Wenn beide Seiten leiden, gibt die Brust überall einen sehr klaren Ton und hat eine beinahe cylindrische oder halb kugelförmige Gestalt, nach vorn und hinten gewölbt, statt der mehr eingedrückten Form, die ihr eigen ist. Bei Anwendung des Cylinders hört man in dem grössten Theil der ergriffenen Seite das Athmungsgeräusch nicht, obgleich die Percussion einen sehr guten Ton gibt, und an den Stellen, wo man es wahrnimmt, ist es sehr schwach. Ausserdem hört man von Zeit zu Zeit durch das Athmen oder den Husten, wie bei dem trockenen Katarrh, ein leichtes pfeifendes Rasseln oder das Ventilklappen, das bei der Hin- und Herbewegung des ge-

ballten Auswurfs vorkommt. Auch kommt, jedoch sehr selten, ein trockenes, knisterndes Geräusch mit grossen Blasen vor, welches aber nur vorübergehend ist und nur an wenig ausgebreiteten Stellen gehört werden kann.

Diese Krankheit, welche sich schon im Kindesalter einstellen kann, hindert den Kranken oft nicht, ein hohes Alter zu erreichen, doch gibt die andauernde Respirationsbeschwerde eine böse Complication bei andern, sich zufällig einstellenden Krankheiten und die fortgesezten, oft sehr bedeutenden Anstrengungen beim Athmen vermögen auch endlich eine Hypertrophie oder Erweiterung des Herzens hervorzubringen.

§. 1685.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Es ist in dieser Art des Lungenemphysems die Grösse der Lungenbläschen viel beträchtlicher, als gewöhnlich, und weniger gleichförmig; die meisten haben die Grösse eines Hirsekornes, einige erreichen die vom Hanfsamen und selbst von einem Kirschkerne oder einer Bohne. Diese leztern sind wahrscheinlich durch die Vereinigung mehrerer Luftzellchen, in Folge der Zerreissung ihrer Scheidewände hervorgebracht, doch gibt es auch solche, die durch Erweiterung einer einzigen Zelle gebildet zu sein scheinen. Oft reichen die ausgedehnten Bläschen über die Oberfläche der Lunge nicht hervor, anderemal bilden sie leichte Vorsprünge, wo sodann das Lungengewebe Aehnlichkeit mit den blasigten Lungen der Batrachier gewinnt. Manchmal sind auch einige wie gestielt. Wenn man sie einschneidet, so sinkt der hervorragende Theil zusammen, unter ihm bleibt aber eine Höhlung zurück, in welcher man kleine Oeffnungen wahrnimmt, durch welche die erweiterten Luftzellchen mit den benachbarten Luftzellchen und mit Luftröhrenästchen in Verbindung stehen. Wenn die Ausdehnung der Lungenbläschen

zu gross wird, so zerreissen manchmal dieselben und es bildet sich in dem die Lunge umgebenden Zellgewebe eine wahre Infiltration der Luft, derjenigen ähnlich, welche in dem Hautemphysem statt hat. Man findet sodann auf der Oberfläche der Lunge unregelmässige Blasen, welche man mit dem Finger verschieben kann und welche die Grösse eines Hanfsaamens und selbst die einer Nuss oder eines Eies haben. — Manchmal sind auch einzelne Luftröhrenäste erweitert. — Mann erkennt die Charactere des Emphysems am Besten, wenn man die Lunge aufblaset, trocknet und mit einem Rasirmesser durchschneidet. — Das Emphysem kann beide Lungen oder nur eine oder nur einzelne Stellen ergreifen. Wenn das Emphysem eine sehr grosse Ausdehnung hat, so sinken die Lungen bei Oeffnung der Brusthöhle nicht zusammen, wie gewöhnlich, sondern entschlüpfen ihr gleichsam und bilden einen Vorsprung. Drückt man die Lunge in einem solchen Zustand mit den Fingern, so scheint ihr Gewebe fester als gewöhnlich zu sein und es ist schwerer, sie durch den Druck platt und schlaff zu machen. Wirft man eine emphysematöse Lunge in ein Gefäss mit Wasser, so senkt sie sich weniger, als eine gesunde Lunge ein. Das Lungengewebe ist weniger feucht, als im gesunden Zustand.

§. 1686.

2) Das *Emphysem zwischen den Lungenlappen* gibt sich durch eine, nach einer heftigen Lungenanstrengung plözlich eintretende oder nach dem Croup, dem Catarrhus suffocativus etc. zurückbleibende, mehr oder weniger starke Schwerathmigkeit und vorzüglich durch das knisternde, trockene Geräusch mit grossen Blasen, welches in dieser Art von Emphysem sehr deutlich und andauernd ist, zu erkennen. Nebst diesem Geräusche erhält man gewöhnlich die Empfindung, wie wenn ein

oder mehrere Körper mit Reibung gegen das Rippenbrustfell, oder gegen das Zwerchfell oder das Mediastinum oder die Lungenlappen herauf- und herabsteigen würden, so dass die aufsteigende Reibung bei dem Einathmen, die absteigende bei dem Ausathmen stattfindet. Diese Zeichen, welche das Stethoscop gibt, sind manchmal von einem Knistern, welches durch die Hand wahrgenommen werden kann, begleitet. Manchmal kann man das knisternde Geräusch erregen, indem man mit dem Finger an der leidenden Stelle den Raum zwischen den Rippen drückt. Die Brust gibt einen guten Wiederhall an derselben Stelle, wenn nicht zu gleicher Zeit eine Lungenentzündung oder eine andere Verstopfung der Lunge vorhanden ist. Besteht zu gleicher Zeit ein äusseres Emphysem, so trägt dieses zur Sicherheit der Diagnose bei.

§. 1687.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Dieses Emphysem besteht in einer Infiltration von Luft in dem zelligen Gewebe der Scheidewände der Lungenlappen. Diese Scheidewände erhalten eine Dicke von 1 bis 5 oder 6 Linien und manchmal beinahe von einem Zoll, und bilden auf der Oberfläche der Lunge und vorzüglich an ihren Rändern durchscheinende und genau umschriebene Streifen, welche sehr von der dunkeln Lungensubstanz abstehen. Manchmal laufen mehrere solche Streifen paralell neben einander und lassen zwischen sich Inseln von gesunder Lungensubstanz. Oft bemerkt man am Rande von Gefässen und auch sonst unter dem Brustfelle Luftblasen, welche in grösserer Anzahl und viel gewöhnlicher vorhanden sind, als bei dem eigentlichen Lungenemphysem. Wenn dieses Emphysem an der Wurzel der Lunge sich befindet, so gewinnt es leicht das Mediastinum und verbreitet sich von da auf den Hals und in das Zellgewebe des ganzen Körpers. — Um die

anatomischen Charactere gut zu unterscheiden, muss man die Lunge aufblasen, um den emphysematösen Theil eine Ligatur anlegen und sodann dieses Stück trocknen.

§. 1688.

Die *Ansammlung von Gas im Zellgewebe unter der Haut* (Emphysema telae cellularis, der Hydrops siccus des *Hippokrates*) ist entweder nur auf einzelne Stellen beschränkt (Emph. tel. cell. partiale) oder über den ganzen Körper verbreitet (Emph. tel. cell. universale). Es äussert sich dieselbe durch eine elastische Geschwulst, wobei die Haut weder eine Veränderung der Farbe, noch der Temperatur zeigt. Beim Anschlagen an dieselbe tönt sie einigermassen und beim Drucken und Streichen nimmt man ein knisterndes Geräusch wahr, was nur in dem Falle nicht stattfindet, wenn zugleich Eiter, Wasser oder eine andere Flüssigkeit in der Geschwulst enthalten ist. Manchmal erreicht das Emphysem einen ausserordentlichen Umfang, wo sodann Erstickungsanfälle sich damit verbinden können.

§. 1689.

Die Ursachen der Gasanhäufungen im Körper sind das Eindringen von Luft in das Gewebe oder die Höhlen des Körpers und Ansammlung von Stoffen, die zur faulichten Zersezung oder zur Gährung geneigt sind, so wie verschiedenartige Zustände der belebten Theile selbst.

Die Aufblähung der Gedärme, so wie die eigentliche Darm- und Bauchwindsucht, insbesondere werden veranlasst durch den Genuss schwer verdaulicher und blähender Nahrungsmittel, wie z. B. bei Kindern der Milch von einer Amme, welche schon lange gestillt hat, der Milch von einer im Gemüthsaffecte begriffenen Mutter, eines schlecht bereiteten Mehlbreies, in Uebermass gereichte Nahrung, bei Erwachsenen der reichliche Genuss blähender Gemüse, vieles Wassertrinken etc.,

Verstopfung, eine sizende Lebensart, Schwächung der Verdauung, Verkältung des Unterleibes, Durchfälle, Ruhren, entzündliche und krampfhafte Affectionen im Unterleibe, Unterdrückung der Hämorrhoiden, der monatlichen Reinigung, schnelle Unterdrückung von Durchfällen, die Hypochondrie, die Hysterie, Nerven- und Faulfieber etc. Die Bauchwindsucht wird noch ausserdem zuweilen hervorgebracht durch Verlezung der Gedärme, Zersezung von in der Bauchhöhle befindlichem Wasser, Eiter, Blut, und durch Brand bewirkte Perforation der Gedärme.

Die Gebärmutterwindsucht kann veranlasst werden durch zufälliges Eindringen von Luft bei Ausdehnung der Gebärmutter, ferner durch das Dasein faulender Stoffe in derselben, z. B. von Resten der Nachgeburt, durch Verkältung etc.

Den Pneumothorax hat man durch Verwundung der Brustwandung und der Lunge, durch Oeffnung eines Eitersackes oder eines erweichten gangränösen Schorfes in die Brusthöhle, wodurch Luftröhrenäste mit der Brusthöhle in Communication gesezt wurden und daher die Luft bei dem Einathmen in die Brusthöhle gelangen konnte, durch Zersezung eines Extravasates in der Brusthöhle, und in Folge einer Brustfellsentzündung entstehen gesehen.

Das eigentliche Lungenemphysem wird vorzüglich durch einen heftigen, trockenen Katarrh hervorgebracht, ferner durch das Blasen von Instrumenten und überhaupt alle Anstrengungen, wobei die eingeathmete Luft längere Zeit in den Lungen zurückgehalten wird, durch das Einathmen von irrespirabeln Gasarten und durch Geschwülste, welche die Luftröhrenäste zusammendrücken. Die Windgeschwulst zwischen den Lungenlappen ist ebenfalls häufig die Folge der gewaltsamen Zurückhaltung der eingeathmeten Luft, z. B. bei der Entbind-

ung, bei dem Heben schwerer Lasten etc.; bei den Kindern kommt diese Affection öfters nach dem Croup vor, bei Erwachsenen in Folge des Catarrhus suffocativus.

Die Ursachen der Windgeschwulst im Zellgewebe sind oft Verlezung der Athmungswege, z. B. der Luftröhre, auch die Luftgeschwulst zwischen den Lungenlappen, wodurch Luft aus den Athmungswegen in das Gewebe der Haut tritt, ferner Nerven- und Faulfieber, allgemeine Krämpfe, der Rothlauf, das Scharlachexanthem etc.

§. 1690.

Das Wesen dieser Krankheit scheint, abgesehen von den Gasansammlungen, welche durch eingedrungene Luft oder durch Zersezung im Körper angesammelter faulender oder gährender Stoffe hervorgebracht sind, zuweilen in einer wirklichen, durch die Lebensprozesse selbst geschehenden Gasbildung zu bestehen, indem nämlich bei der, auch im gesunden Zustande ununterbrochen stattfindenden, Verwandlung fester und flüssiger belebter Theile in anorganische Stoffe (die rückwärtsschreitende Metamorphose) Gas im abnormen Verhältniss erzeugt und an fehlerhaften Stellen ausgeschieden wird. Die Krankheitszustände, bei welchen diese Gasbildung statt findet, sind verschieden, vorzüglich sind es Schwächezustände, wie bei dem Meteorismus in Nervenfiebern und dem eigentlichen Tympanites, oft auch Krampf und selbst Entzündung, wenigstens kommt bei der Brustfell- und Darmentzündung ein Meteorismus häufig vor. Das angesammelte Gas ist nach Verschiedenheit seines Ursprunges bald atmosphärische Luft, bald mehr kohlensaures Gas, Stickgas, Schwefelwasserstoffgas etc.

§. 1691.

Die Vorhersage kann im Allgemeinen günstig gestellt werden, wenn die angesammelte Luft nur von

aussen eingedrungen ist, indem sie oft leicht entleert werden kann und auch resorbirt wird, ebenso ist in der Regel keine Gefahr vorhanden, wenn die Luft sich aus den von aussen aufgenommenen Stoffen entwickelt, wie bei Darmblähungen, dagegen ist die Gasentwicklung eine sehr schlimme Erscheinung, wenn sie von einem krankhaften Zustand der belebten Theile abhängig ist, so ist der Meteorismus in den bösartigen Fiebern sehr ungünstig und die mit einer Kachexie in Verbindung stehende eigentliche Darm- und Bauchwindsucht ist meistens unheilbar und tödtlich.

§. 1692.

Behandlung. Nach Verschiedenheit der Ursachen genügt es, entweder nur das angesammelte Gas wieder aus dem Körper auszutreiben, was insbesondere bei der durch eingedrungene Luft entstandenen Windgeschwulst der Fall ist, oder es müssen die Stoffe, aus welchen sich Gas entwickelt, entleert werden, oder man muss die Lebensthätigkeit der belebten Theile auf die eine oder die andere Weise, je nach dem Character ihrer Abweichung vom gesunden Zustand, umändern. Am häufigsten ist die Erregung einer kräftigern Lebensthätigkeit nothwendig, zuweilen die Besänftigung krampfhafter Zustände, seltener ist ein entzündungswidriges Verfahren erforderlich.

§. 1693.

Bei der Flatulenz, so wie bei der eigentlichen Darm- und Bauchwindsucht muss vorerst dahin gewirkt werden, dass keine blähenden Speisen genossen werden, bei der Flatulenz der Kinder darf auch die Mutter oder Amme keine derartigen Nahrungsmittel geniessen, und sie darf auch das Kind nicht nach einer Gemüthsbewegung anlegen und dasselbe nicht stillen, wenn sie am weissen Fluss, Fussschweissen etc. leidet, oder wenn sie schon zu lange gesäugt hat; zu viel Nahrung muss vermieden

werden, eine vorhandene Verstopfung muss durch Klystiere oder Abführungsmittel gehoben werden, der Leib muss durch eine warme Bedeckung vor Verkältung geschüzt werden etc.

Um das vorhandene Gas zu entfernen, thun leichte Abführungsmittel und gewöhnliche Klystiere sehr gute Dienste (nach *Selle* Klystiere mit fixer Luft), ferner sind Mittel, die die Luft einsaugen sollen, empfohlen worden, wie das kalte Wasser, Kalkwasser, Magnesia, Kohlenpulver, sehr verdünnte Schwefelsäure, oxygenirte Salzsäure, sehr verdünnter Liquor Ammonii causticus, Klystiere von kaltem Wasser und Essig etc., auch hat man vorgeschlagen, das Gas, vermittelst einer in den After gebrachten Klystiersprize, auszuziehen und bei der Bauchwindsucht durch den Einstich dasselbe zu entleeren.

Zum Theil demselben Zwecke entsprechend, indem sie durch Erregung einer kräftigern peristaltischen Bewegung die Blähungen abtreiben, zum Theil die Gasbildung selbst beschränkend, durch kräftigere Erregung der vegetativen Prozesse, sind die flüchtig erregenden, so wie die tonischen Mittel, guter Wein, die versüssten Mineralsäuren, die Naphthen, der Liq. Ammon. caust. und der Liq. Ammon. anisat., vorzüglich die aromatischen Mittel, wie Chamillen, Fenchel, Anis, Kümmel, Melisse, Pfeffermünze, die aromatisch bittern, wie die Wurzel von Calamus aromaticis, die cortices Aurantiorum, Absinthium, die rein bittern Mittel, die China, das Eisen. Mit der innern Anwendung dieser Mittel verbindet man den Gebrauch entsprechender äusserer Mittel, das Auflegen von erwärmten Deckeln, von mit Kümmel, Wachholderbeeren etc. durchräuchertem Flanelle, von erwärmten Kräutersäckchen, welche man mit Campher bestreichen kann, Einreibungen von flüchtigen Linimenten, aromatischen Geistern mit Oleum Caryo-

phyllorum, Liquor Ammon. caust., von Oleum Carvi etc., aromatische Pflaster, aromatische Bäder, und nur in dringenden Fällen und mit grosser Vorsicht kalte Umschläge auf den Unterleib.

Bei einem krampfhaften Zustande dienen die Valeriana, die Asa foetida, das Castoreum und vorzüglich das Opium, womit besänftigende Umschläge und Bäder verbunden werden können.

Ist eine entzündliche Reizung der Gedärme vorhanden, so leisten Blutegel und Cicutaumschläge auch gegen die Aufblähung gute Dienste.

§. 1694.

Gegen die Windsucht der Gebärmutter kann man ein ähnliches Verfahren in Anwendung bringen. Um die Luft auszutreiben, sucht man den Pfropf, der etwa den Muttermund verschliesst, durch Einführung einer Sonde zu beseitigen, den Krampf im Muttermunde durch laue Bäder etc. zu heben, und die Zusammenziehung der ausgedehnten Gebärmutter durch die bekannten Mittel zu befördern.

§. 1695.

Bei dem Pneumothorax können auch aromatische Einreibungen und ähnliche Mittel in Anwendung gebracht werden. Sind die Zufälle dringend, so muss durch den Schnitt oder den Einstich die Brusthöhle geöffnet werden. Um bei der Operation keine Stelle zu treffen, an welcher die Lunge mit der Brustwandung verwachsen ist, untersuche man genau, ob an der zum Einschnitt gewählten Stelle die Percussion einen starken Ton gebe, das metallische Klingen wahrgenommen werde und keine Spur von Respirationsgeräusch gehört werde.

§. 1696.

Das Lungenemphysem empfiehlt *Laennec* wie einen trockenen Katarrh zu behandeln; man soll dabei, um die

Empfänglichkeit zu neuen katarrhalischen Affectionen zu mildern, Oeleinreibungen vornehmen lassen und bei blassen, kachektischen Personen den Crocus martis aperitivus anwenden. Gegen heftige asthmatische Zufälle sind Narcotica anzuwenden, zuweilen ist aber auch eine Aderlässe nothwendig. — Wenn bei dem Emphysem zwischen den Lungenlappen die Infiltration mit Luft bis in das äussere Gewebe gedrungen ist, so mache man einige Einstiche mit der Lanzette.

§. 1697.

Bei der Windgeschwulst im Zellgewebe der Haut kann die Luft durch Einstiche mit der Lanzette und gelindes Drücken entfernt werden. Im Uebrigen behandelt man die Krankheit nach Verschiedenheit ihrer Ursachen und ihres Characters; insbesondere passen auch hier in der Regel aromatische Bähungen, Einreibungen etc.

Die Lustseuche.

(*Lues venerea, Syphilis, Morbus gallicus.*)

(Ueber die Geschichte.) — *Hensler* (2 Bde. Altona 1783—89 u. 94). — *Gruner* (Jena 1789 u. 1793). — *Kurt Sprengel* (Beiträge zur Gesch. d. Med. 1ster Bd.). — *Schaufus* (Lpz. 1805). — *Simon*, jun. (2 Bde. Hamburg 1830).

Astruc (Par. 1736 ed. nov. 1760, a. d. Franz. v. Heise. Frankf. u. Lpz. 1764). — *Fabre* (Par. 1758, 82, a. d. Franz. v. Schröder. Kopenh. 1777, Supplem. Edinb. 1786). — *Swediaur* (Lond. 1784, nach der 4ten franz. Aufl. übers. v. Kneffel, m. Vorrede v. Sprengel, andere Uebers. v. Eyerel. 7. franz. Aufl. Par. 1817). — *Hunter* (aus d. Engl. m. 5 K. Lpz. 1787). — *Girtanner* (Gött. 1797 m. Zusäzen und Anmerk. herausg. v. Cappel. Gött. 1803). — *Clossius* (2te Aufl. Tübingen 1799). — *Hecker* (2te Aufl. Erf. 1801). — *Walch* (Jena 1811). — *Lagneau* (Par. 1812). — *Louvrier* (2te Aufl. Wien und Krems 1819). — *Wendt* (3te Aufl. Bresl. 1825). — *Ritter* (Leipzig 1819). — *Carmichael* (Leipzig 1819). — *Cullerier* (Dict. des scienc. med.). — *Delpech* (Par. et Montpell. 1823). — *Devergie* (Par. 1826). — *Bonorden* (Berlin 1834).

§. 1698.

Die Lustseuche ist die Dyscrasie, welche durch Ansteckung fortgepflanzt wird und sich vorzüglich durch eigenthümliche Geschwüre an den angesteckten Theilen und sodann durch Anschwellung der Leistendrüsen, den ursprünglichen gleichen Geschwüre in andern Theilen, flechtenartige Ausschläge, Knochenschmerzen, Knochenauswüchse und Beinfrass äussert.

§. 1699.

Ueber den Ursprung dieser Krankheit sind viele Untersuchungen unternommen und sehr verschiedene Meinungen ausgesprochen worden. Schon in der Zeit, in welche man die Entstehung der Lustseuche sezt, entspann sich ein Streit, ob die Krankheit eine neue oder

alte sei. Auf der Seite der Vertheidiger der erstern Meinung standen vorzüglich *Leonicenus* und *Martin Pollich*, auf der der Vertheidiger der leztern Ansicht *Simon Pistorius*. Die erstere wurde allmälig die herrschende und zulezt die beinahe allgemein angenommene, doch haben in der neuesten Zeit wiederum Gelehrte, namentlich *Stoll*,[1]) *Krause*,[2]) *Harless*[3]) und *Neumann*[4]) sich für das höhere Alter der Lustseuche ausgesprochen. Die gewöhnlichste Meinung derjenigen, welche die Lustseuche für eine in Europa neue Krankheit ansehen, ist die besonders von *Astruc* und *Girtanner* unterstüzte Ansicht, dass sie amerikanischen Ursprungs sei, von der Mannschaft des Columbus nach Europa gebracht und von den Franzosen bei Gelegenheit des Feldzugs Karls VIII. nach Neapel von den Spaniern ererbt worden sei. Andere schreiben die Schuld der Erzeugung und Verbreitung der Krankheit den Marranen (den aus Spanien nach der Eroberung von Granada vertriebenen Mauren und Juden) zu. Diese Ansichten sind durch *Hensler* und *Sprengel*[5]) bestritten worden. *Schaufus*[6]) sucht das Vaterland der Lustseuche in Hindostan und glaubt, dass dieselbe im 15ten Jahrhundert durch die Zigeuner nach Europa gebracht worden sei. Andere suchen nicht sowohl den Ort als die Art der Entstehung auszumitteln, dahin gehören vorzüglich diejenigen, welche den Ursprung der Lustseuche in dem Aussaze finden wollen. Hieher gehört *Paracelsus*, welcher die Krankheit dadurch entstehen lässt, dass die Lepra bei einem Manne und ein schlieriges Geschwür bei der Frau gewesen sei,

1) Praelect. in divers. morb. chron. ed. Eyerel. Vienn. 1787 P. 5. — 2) Ueber das Alter der Menschenpocken etc. Hannover 1825. — 3) Spec. Nos. II. S. 495. — 4) Spec. Path. u. Therap. B. II. S. 89 u. d. f. — 5) Geschichte der Med. — 6) Neueste Entdeckungen über das Vaterland der Pocken und der Lustseuche.

wo sodann aus der Begattung beider die Venusseuche entstanden sei, wie der Maulesel aus der Begattung des Esels mit der Stute. Auch *Sprengel* hält es für wahrscheinlich, dass die Krankheit sich aus dem Aussaze entwickelt habe. Endlich führe ich die Meinung von *Neumann* an, welcher dafür hält, dass die Lustseuche eine uralte Krankheit sei, welche früher in einer mildern Form vorgekommen, aber im Jahre 1494 durch eine ansteckende, lepröse Epidemie bösartiger geworden und seitdem wieder grösstentheils zu ihrer vorigen Milde zurückgekehrt sei.

Ich meines Theiles bin sehr geneigt, der zulezt geäusserten Meinung im Allgemeinen beizupflichten. Wenn man die zum Theil von *Sprengel* und besonders die von *Simon* gegebenen Nachrichten von dem Vorkommen der primären Lustseuche genau würdigt, so wird man sich wohl überzeugen, dass der Tripper und ansteckende Geschwüre an den Geschlechtstheilen in den ältesten Zeiten und vorzüglich im Mittelalter häufig genug vorgekommen sind, und wenn man bedenkt, dass das Alterthum von sehr vielen Krankheiten, die offenbar in den ältesten Zeiten, wie jezt, vorhanden waren, uns keine genaue Beschreibung hinterlassen hat, ferner dass die Allgemeinkrankheit sehr leicht bei dem mangelnden Geiste der Forschung als lepröse Krankheit betrachtet werden konnte, wie sie denn auch noch am Ende des 15ten und im Anfange des 16ten Jahrhunderts von verschiedenen Schriftstellern unter den Namen der Lepra und Safath vorkommt, und dass wirkliche Fälle bekannt sind, in welchen Personen an einer allgemeinen Krankheit, die von jenen örtlichen Geschwüren entsprungen war, starben, so wird man sich doch kaum des Gedankens enthalten können, dass jene Uebel der Hauptform nach die wirkliche Lustseuche waren. Auf der andern Seite ist es keinem Zweifel unterworfen, dass am Ende des

15ten Jahrhunderts, besonders in den Jahren 1493 und 1494, eine Krankheit, von welcher die noch vorhandene Lustseuche abstammt, seuchenartig herrschte, welche von vielen Aerzten als eine neu angekommene Krankheit betrachtet und von dem Volke mit neuen, den vermeintlichen Ursprung der Krankheit bezeichnenden Namen, wie Franzosenkrankheit und mal de Naples belegt wurde. Hiernach müsste, wenn beide, scheinbar sich widersprechende Thatsachen richtig sind, um dieselben zu vereinigen, angenommen werden, dass die ursprünglich vorhandene Lustseuche, um die genannte Zeit durch etwas Hinzugekommenes, wie z. B. eine leprose Epidemie sich sehr verschlimmert und theilweise eine neue Form angenommen habe, welche sie mit der Zeit allmälig wieder verloren hat, wie man auch Beispiele in der neuern Zeit hat, dass in einer Gegend mit einem Male eine Krankheit erschien, die wohl eine neue genannt werden konnte, doch eigentlich nur eine Modification der längst bekannten Syphilis ist, wie dieses bei dem Scherlievo der Fall ist, welcher eine im östreichischen Küstenlande von Fiume, Lucari und Novi einheimische Krankheit ist, die im Jahre 1831 als Epidemie herrschte und vor 1790 nicht vorhanden war. Hierzu kommt noch der um diese Zeit erwachte Geist der Forschung, der nun eine eigene Krankheitsart fand, die vielleicht der Hauptform nach schon früher vorhanden war, aber nicht als eine solche erkannt wurde, wie auch in der neuesten Zeit Krankheitsformen beschrieben worden sind, von denen man früher Nichts wusste, die aber sicher schon da waren.

§. 1700.

Die Krankheit beginnt mit krankhaften Erscheinungen an den Theilen, durch welche die Ansteckung geschah, gewöhnlich den Geschlechtstheilen (die primären Zufälle oder die örtliche Lustseuche) und gibt sodann ihre Fort-

schritte durch krankhafte Veränderungen in Theilen, die entfernt von dem zuerst ergriffenen liegen (die secundären Zufälle, oder die Lustseuche im engern Sinne oder die allgemeine Lustseuche), zu erkennen. Zu den primären Zufällen rechnet man gewöhnlich den Tripper, den Schanker mit den aus ihm entspringenden Auswüchsen und übrigen Entartungen an den Geschlechtstheilen, und die Bubonen. Zu den secundären Symptomen oder der allgemeinen Lustseuche werden die syphilitischen Geschwüre im Halse, die Hautausschläge, die Knochenschmerzen, die Knochenauswüchse etc. gezählt.*)

§. 1701.

Das *primäre syphilitische Geschwür* (ulcus syphiliticum primarium, Schanker im engern Sinne des Wortes) ist gewöhnlich das erste Zeichen einer geschehenen wahren syphilitischen Ansteckung. Es bricht dasselbe fast immer an einer mit einer zarten Oberhaut versehenen Stelle des Körpers, insbesondere an der innern Seite der Vorhaut, zumal am Bändchen und an dem hintern Theile der Eichel, und bei Weibern zwischen den Schaamlefzen und den Nymphen aus, zuweilen kommt es auf der äussern Seite der Vorhaut und wenn die Ansteckung durch Küsse oder das Säugen eines mit der venerischen Krankheit behafteten Kindes etc. geschah, an den Lippen oder der Brustwarze vor. Die Zeit, in welcher der Schanker nach erfolgter Ansteckung entsteht, ist der 3te bis 4te Tag, doch soll auch die Krankheit zuweilen erst nach 21 Tagen zum Ausbruch kommen. Der Kranke empfindet ein Jucken an der einen oder andern der bezeichneten Stellen; es entsteht hier ein entzündetes Fleckchen und

*) Da der Tripper in der Mehrzahl der Fälle, wie es scheint, nicht eigentlich syphilitischer Natur ist, so wurde er von mir in einem eigenen Kapitel abgehandelt.

es bildet sich auf demselben entweder ein Bläschen, das aufplazt und eine Excoriation bewirkt (das schankerhafte Wundsein oder der krystallinische Schanker) oder es bildet sich, was der gewöhnliche Fall ist, ein kleines Knötchen, das in seinem obern Theile in ein Bläschen übergeht, welches sich mit einer hellen, aber bald eiterartig werdenden Flüssigkeit füllt. Diese Blatter bricht auf und geht dadurch in ein Geschwür über, welches aufgeworfene schwielichte Ränder und eine speckige Grundfläche hat, und eine scharfe, in den Theilen, die sie berührt, neue Entzündung und neue Schankerbläschen veranlassende Jauche absondert. Zuweilen frisst das Geschwür sehr schnell in die Breite und die Tiefe um sich, wobei es auch sehr schmerzhaft wird (der phagedänische Schanker), manchmal sind die Ränder sehr hart und meistens dabei wenig empfindlich, auch das Geschwür wenig um sich fressend (der kallöse Schanker); öfters zeigt auch das Geschwür ein schwammiges Fleisch und hat die Neigung, Auswüchse zu bilden (nicht ganz passend der varicöse Schanker genannt). Heilt das Geschwür, so bleiben vertiefte Narben zurück. Oft veranlassen die Geschwüre auch Verhärtungen, verschiedenartige Auswüchse, Risse und Schrunden, wie sie auch an andern Theilen des Körpers als Zufälle der allgemeinen Lustseuche vorkommen.

§. 1702.

Verbreitet sich die Krankheit weiter, so schwellen nun in vielen Fällen die Leistendrüsen an, was selbst nach manchen Beobachtungen zuweilen geschehen soll, ohne dass ein Schankergeschwür oder ein Tripper vorhanden ist. Glaubt man, dass die Anschwellung blos durch consensuelle Reizung der Leistendrüsen geschehe, wie man dieses vorzüglich bei den im Tripper erfolgenden Anschwellungen annimmt, so nennt man dieses die consensuellen oder symptomatischen Bubonen, hält man

aber dafür, dass dieselbe durch Aufsaugung von Lymphe bewirkt werde, in welchem Falle der schädliche Reiz unmittelbar auf die Leistendrüsen selbst wirkt, so werden sie idiopathische Bubonen genannt. — Den Anfang der Bildung der Bubonen bezeichnet eine spannende Empfindung in der Leistengegend, womit ein oder mehrere Leistendrüsen anschwellen, die man in der Grösse von Bohnen und hart findet (Stadium invasionis). Indem nun stärkere und selbst stechende Schmerzen sich einstellen, nimmt die Geschwulst an Umfang zu und wird selbst so gross, wie ein Hühnerei, und die Haut über derselben wird roth und heiss (Stadium inflammatorium). Endlich wird, wenn die Zertheilung nicht vorher erfolgt, der Schmerz klopfend, die Geschwulst wird weich, schwappend, die Haut wird dünne und bricht zulezt auf, und es entleert sich eine grössere oder geringere Menge Eiter (Stadium suppurationis). Das hiedurch entstandene Geschwür hat einen unebenen Grund und erhält oft aufgeworfene und callöse Ränder, oft bilden sich tiefe Fistelgänge und oft bleibt auch ein Theil der Geschwulst als Verhärtung zurück, so wie auch in andern Fällen in den geschwollenen Drüsen sich keine kräftige Entzündung entwickelt, sondern Verhärtung eintritt. Zuweilen erfolgt der Uebergang der Entzündung in Brand.

§. 1703.

Nachdem diese Veränderungen in den Leistendrüsen eingetreten sind, und noch häufiger ohne Entstehung der Bubonen und selbst oft nach bewirkter Heilung der primären Schanker wird der Kranke, wenn das Uebel sich weiter entwickelt, in einer unbestimmten Zeit, meistens 4 — 6 Wochen nach Entstehung der ersten Zufälle, oft unter etwas Fieber, von Halsweh und zuweilen zugleich von Heiserkeit und Schnupfen befallen. Die Mandeln sind etwas angeschwollen, das Gaumensegel und das Zäpfchen zeigen eine gefleckte Röthe, an einzel-

nen Stellen entstehen Geschwüre mit weissem speckigem Grunde und schwieligen Rändern, welche nicht sehr schmerzen. Oft entstehen Bläschen an der innern Seite der Wangen und an den Mundwinkeln, welche ebenfalls in Geschwüre übergehen. Es werden das Zäpfchen und das Gaumensegel durch Verschwärung zerstört, wodurch die Kranken einen näselnden Ton bei der Sprache erhalten, und diese Zerstörung sezt sich selbst fort auf die harten Theile des Gaumens und auf die Weichtheile und die Knochen der Nase (Ozaena syphilitica), wobei ein äusserst stinkender Eiter oder Jauche aus der Nase ausfliesst und wodurch ein Einsinken der Nase bewirkt wird.

§. 1704.

Immer mehr entwickeln sich nun auch noch in verschiedenen andern Theilen des Körpers ohne bestimmte Reihefolge vielfältige krankhafte Zustände.

In der Haut entstehen selten vor, meistens geraume Zeit nach der Bildung der Halsgeschwüre mancherlei Hautausschläge, Geschwüre und Auswüchse. Vorzüglich bilden sich gerne finnenartige Knötchen von bläulichrother Farbe, welche oft lange Zeit hart bleiben, oft sich mit Eiter füllen, aufgehen, Krusten bilden und längere Zeit bläulichrothe Flecken zurücklassen, und auch oft in Geschwüre übergehen. Solche Knötchen, Flecken, Krusten und Geschwüre befinden sich oft in grosser Menge an der Stirne, was Corona Veneris genannt wird. — Auch kommen ohne Knötchenbildung kupferfarbene und violette Flecken zwischen den Schultern, an der Brust, an der Stirne und an andern Theilen vor, welche sich öfters abschuppen, nässen und Krusten bilden, und zulezt oft in Geschwüre übergehen. — Häufig brechen flechtenartige Ausschläge an verschiedenen Stellen des Körpers aus, die sich von den gewöhnlichen Flechten oft gar nicht, oft aber auch dadurch unterscheiden, dass sie weniger eine zusammenhängende Fläche einnehmen,

sondern in vielen runden Flecken von der Grösse eines Groschens oder Sechskreuzerstückes erscheinen. — Die Geschwüre bilden sich vorzüglich da, wo die Haut zunächst über Knochen liegt, sie sind sehr um sich fressend und zerstören selbst die Knochen, so dass z. B. das Stirnbein durchfressen und die Hirnhäute blos gelegt werden. — An einzelnen Stellen der Haut, z. B. an der innern Fläche der Hände bilden sich Risse und Schrunden (Fissurae, Rhagades), welche nässen und eine übelriechende Materie von sich geben. — Warzen (Verrucae), das sind harte, schmerzlose und gefurchte Auswüchse, sie erscheinen am häufigsten an den Geschlechtstheilen, wo sie aber in der Regel nur Folge der Schanker sind, und zu den örtlichen Zufällen gehören, aber auch im Gesichte, an den Händen und an andern Theilen. — Feigwarzen (Condylomata, mariscae), das sind weiche fleischartige Auswüchse, sie kommen beinahe nur an den Geschlechtstheilen und um dem After herum hervor. Man hat ihnen nach Verschiedenheit ihrer Gestalt verschiedene Namen gegeben, wie Hahnenkämme (Cristae), Feigen (Fici), Maulbeeren (Morae) etc. Diese Auswüchse nässen oft, vorzüglich wenn sie einen gefurchten Bau haben, auch verwandeln sie sich manchmal in ein secundäres Geschwür. — Durch Entartungen der Haut an behaarten Theilen gehen die Haare aus und es entstehen Pläze, und durch das Leiden derselben an den Nägeln fallen diese ab, es entstehen neue unförmliche Massen und oft auch Abscesse und Geschwüre.

§. 1705.

Sehr zu fürchtende Zufälle sind die Entzündung der Bindehaut des Auges (Ophthalmia syphilitica) und noch mehr die der Regenbogenhaut (Iritis syphilitica), indem dieselben oft sehr schnell das Auge zerstören.

§. 1706.

In der Regel entwickeln sich auch während des

Auftretens der bisher beschriebenen Erscheinungen verschiedenartige Knochenleiden. Zuerst stellen sich in der Mitte von Röhrenknochen und in platten Knochen, vorzüglich in solchen, die nahe unter der Haut liegen, wie z. B. das Schienbein und die Schädelknochen, bohrende und nagende Schmerzen (Dolores osteocopi) ein, welche am Tage gering sind, aber in der Nacht in dem Bette sehr quälend werden. — Gewöhnlich in den Knochen, in welchen vorzugsweise die Schmerzen stattfinden, entstehen nun verschiedene Veränderungen, oft bilden sich Hervorragungen, welche sich weich anfühlen lassen und von einer gallertartigen Masse herrühren, die von der wohl auch zugleich entarteten Beinhaut abgesondert zu sein scheint, oft sind sie hart und bestehen aus fester Knochenmasse (Nodi, Exostoses), zuweilen bestehen sie mehr aus einer kreideartigen Masse und sind den veralteten Gichtknoten ähnlich (Tophi, d. h. poröse, tuffsteinartige Massen), zuweilen schwellen auch die Röhrenknochen in ihrer Länge auf und werden weich (Osteosarcosis, Osteomalacia), und manchmal kommt die Knochenauftreibung vor, die man Winddorn (Spina ventosa) nennt. Oefters gehen die Knochenauswüchse in Knochenfrass (Caries) über, häufiger aber werden die Knochen, wo Geschwüre sich befinden und an welchen die Knochenhaut zerstört ist, necrotisch und stossen sich in Stücken ab. Zuweilen entsteht auch eine zerstörende Entzündung in den Gelenken (Arthrocace syphylitica).

§. 1707.

Der Verlauf ist sehr langwierig, und die Krankheit kann sich selbst durch viele Jahre hinziehen. Die Heilung erfolgt meistens ohne andere kritische Ausscheidungen, als die, dass die Produkte abfallen, doch sind oft Schweisse und andere Absonderungen wohlthätig. Kommt die Heilung nicht zu Stande, so gesellt sich ein Zehr-

fieber hinzu, das die Kräfte des Kranken, welche durch die in den Geschwüren und dem Knochenfrass erfolgenden krankhaften Absonderungen, zu welchen oft noch Blutungen hinzutreten, und durch die äusserst quälenden Knochenschmerzen erschöpft sind, vollends aufreibt; zuweilen erfolgt auch der Tod von einzelnen Organen aus, indem sich Desorganisationen im Gehirne, Verschwärungen und Auswüchse im Kehlkopfe etc. bilden, wodurch der Tod unter den Erscheinungen von Schlagfluss und Lähmung, von Kehlkopfschwindsucht etc. herbeigeführt werden kann.

§. 1708.

Auf die Form dieser Krankheit haben verschiedene zufällige Verhältnisse einen oft sehr bedeutenden Einfluss; dieselben sind vorzüglich folgende:

a) Die Constitution und das Alter des Kranken. Bei sehr lebenskräftigen Individuen macht die Krankheit raschere Fortschritte und ist zerstörender, als bei mehr schwachen, doch ist der Erfolg der Behandlung bei erstern bei weitem sicherer, als bei den leztern.

Bei Kindern zeigen sich, wenn sie bei der Geburt während des Durchganges durch die Scheide angesteckt wurden, einige Tage nach der Geburt, wenn aber die Ansteckung auf eine andere Weise, z. B. durch das Trinken an einer mit syphilitischen Geschwüren an den Brustwarzen behafteten Amme, statt fand, zu einer unbestimmten Zeit, besonders an den mit einer zarten Haut versehenen Theilen, wie an den Lippen, den Augenliedern, den Geschlechtstheilen, dem After, dem Nabel und zuweilen auch, wegen grosser Zartheit der ganzen Haut, an andern Stellen Blätterchen und auch grössere Pusteln, die in Geschwüre mit weisslichem, speckigem Grunde und wulstigen Rändern übergehen. Oft gehen ihnen rothe und in's Kupferfarbene spielende Flecken voraus. In der Mundhöhle gleichen sie mehr

der Mundfäule, auf der äussern Haut sind sie aber grössere Pusteln und an manchen Stellen wirkliche Bluteisen, welche aber mehr oder weniger kupferfarbig sind und leicht Geschwüre zurücklassen. Im Gesichte nehmen sie manchmal die Form der crusta serpiginosa an. Zuweilen bilden sich (nach *Mahon*) an den Fingern und Zehen hervorstehende Pusteln, welche bald in Eiterung übergehen und den Verlust der Nägel nach sich ziehen. Diese verschiedenen Pusteln werden nicht selten missfarbig und brandig. Leicht werden die Kinder an verschiedenen Stellen wund und auch hier bilden sich um sich greifende Geschwüre, weniger dagegen kommen Schrunden, Risse und Feigwarzen vor. Die Augen werden sehr leicht von einer Augenentzündung befallen, welche sich durch ein blaurothes Ansehen der Ränder der Augenlieder und der Thränencarunkel, variköse Anschwellungen der Gefässe der Conjunctiva, einen starken citerartigen Ausfluss und schnelle Zerstörung characterisirt. Nach einiger Zeit wird auch die Stimme heiser, das Athmen erschwert und aus der Nase fliesst eine eiterige, stinkende Materie. Ebenso stellt sich ein eiteriger Ausfluss aus den Ohren ein. An verschiedenen Stellen des Körpers schwellen die Drüsen an. Endlich kommen auch noch Knochenanschwellungen und Knochenfrass hinzu, wenn nicht früher das Kind, welches bald ein eingefallenes, runzliches Ansehen erhält, unter Erschöpfung und Gichtern stirbt oder die Heilung bewirkt wird. — Ist die Unterscheidung der Krankheit von den Scropheln schwierig, so muss auch noch der Gesundheitszustand der Mutter oder der Amme des Kindes berücksichtigt werden.

§. 1709.

b) Die Verbindungen mit andern Krankheiten. Mit dem Scorbute verbunden, erzeugt die Lustseuche insbesondere viele Geschwüre, die eine schwammige Be-

schaffenheit haben und aus welchen beerartige, leicht blutende Auswüchse hervorwuchern, die Knochen leiden dagegen weniger. — Bei Verbindung mit der Gicht entwickeln sich schmerzhafte, hartnäckige Gelenksleiden, — bei der mit Scropheln vorzugsweise Knochenleiden. — Nach reichlichem Quecksilbergebrauche verwickeln sich oft die Zufälle der Lustseuche mit denen der Mercurialkrankheit so, dass es schwer und oft unmöglich ist, zu entscheiden, ob eine Erscheinung aus der einen oder der andern Ursache hervorgegangen ist.

§. 1710.

c) Die klimatischen und andern äussern Einwirkungen. In den wärmern Klimaten soll die Lustseuche, in Hinsicht der secundären Zufälle, viel milder sein, mehr die Haut und ihre Fortsezungen ergreifen, und viel leichter heilbar sein, wogegen sie in den kalten Gegenden mehr die Knochen angreift und oft mit Hartnäckigkeit den Mitteln widersteht. Auch sind in gewissen Gegenden eigenthümliche Krankheitsformen einheimisch, die Modificationen der Lustseuche (Syphiloide) zu sein scheinen, so in Schottland die Sibbens, in Dalmatien und Istrien der Scherlievo, in Norwegen, Schweden etc. die Radesyge, in Holstein die Marschkrankheit und in Canada das Mal de Chicot. Vielleicht gehören auch die Yaws und Pians hieher.

§. 1711.

Ursachen. Es befällt die Krankheit Individuen von jedem Alter und jeder Constitution, und hebt keineswegs, wie dieses z. B. durch die Blattern geschieht, die Anlage zu derselben Art von Leiden auf. Nur Stellen des Körpers, die mit einer zarten Oberhaut versehen sind, sind die Zugänge, durch welche die Krankheit in den Körper gebracht wird. Die einzige Gelegenheitsursache zu dieser Krankheit ist die Ansteckung, welche nur durch die Stoffe, die in den Schanker-

geschwüren abgesondert werden, und also nicht durch das Blut und andere Säfte des Körpers zu geschehen scheint. Das Contagium ist ganz fix und wird am häufigsten durch den Coitus, Küsse und andere Berührung der bezeichneten Theile des Körpers mitgetheilt. Auch haftet das Gift an Trägern, z. B. Trinkgeschirren, durch welche ebenfalls Ansteckung erfolgen kann. — Dass die Krankheit schon bei der Zeugung von einem der beiden Eltern oder während der Entwicklung des Foetus von der Mutter dem Kinde mitgetheilt werden könne, ist noch nicht entschieden.

§. 1712.

Das Wesen der Lustseuche ist wohl am wahrscheinlichsten ein krankhafter Lebensprozess in den Capillargefässen und im Gewebe der Organe, in welchem drei Factoren zusammenwirken, die Nerven, das Blut, nebst den übrigen, mit den Nerven in Wechselwirkung stehenden Stoffen und das aufgenommene Contagium. Hiernach trete ich der Ansicht derer bei, welche annehmen, dass das syphilitische Gift aufgenommen werde und an den Ort hingelange, wo es wirke, und es ist mir nicht wahrscheinlich, dass das specifische Gift an andern Stellen, als der primär leidenden blos auf dem Wege des Consenses erzeugt werden könne und auf diesem Wege die allgemeine Lustseuche entstehe. Dass nach den Geschlechtstheilen zunächst der Hals ergriffen wird, scheint allerdings in dem polarischen Verhältniss zwischen dem Hals und den Geschlechtstheilen begründet zu sein, doch scheint das Leiden des Halses immer zunächst durch das resorbirte Contagium hervorgebracht zu werden, das diesen Theil vor allen andern in Krankheit versezt, weil er durch das bezeichnete consensuelle Verhältniss in den Zustand einer krankhaft erhöhten Krankheitsanlage gesezt ist.

§. 1713.

Vorhersage. Die Lustseuche wird nicht leicht tödtlich, wenn nicht durch besondere Vernachlässigung das Uebel den höchsten Grad erreicht hat. Am sichersten ist der Erfolg der Behandlung bei noch nicht veraltetem Uebel und wenn dieses sich noch auf die Weichtheile beschränkt. Am schwersten ist die Heilung zu bewirken, wenn gegen die Krankheit schon viel Quecksilber erfolglos gebraucht wurde und wenn Knochenfrass vorhanden ist. Oft glückt die Heilung nicht vollkommen, so dass das Uebel immer noch durch einzelne Erscheinungen sich kund gibt, oder es dauert ein nicht eigentlich syphilitischer, aber immerhin dyscrasischer und oft ein Schwächezustand fort. Oft bleiben organische Fehler zurück.

§. 1714.

Behandlung der Lustseuche. Durch die bekannten Behandlungsarten der Lustseuche scheinen wir bald auf die eine, bald auf die andere, der im §. 1449 angegebenen Verfahrungsweisen die fehlerhaft gewordenen Prozesse der Ernährung umzustimmen. Wir wirken unmittelbar auf die im Körper befindlichen fremden, schädlichen Stoffe ein, wenn es richtig ist, was man von dem Quecksilber annimmt, dass es das syphilitische Gift, das gleichsam ein parasitisches Leben im menschlichen Körper führe, zu zerstören vermöge, wir wirken jedenfalls durch das genannte Mittel verändernd auf die Säftemasse ein, wir erregen die Absonderungen in der Haut und in den Nieren durch die Holztränke, in den Speicheldrüsen durch das Quecksilber, im Darmkanal durch Abführungsmittel, wodurch vielleicht ebenfalls fremde Stoffe aus dem Körper ausgeführt werden, wir beschränken die krankhaften Bildungen und befördern die Wirkung der die Säfte durchdringenden und das syphilitische Gift zerstörenden Arzneistoffe durch die

Hungerkur, wir stimmen durch die specifischen Mittel vielleicht auch die Thätigkeit der festen Theile unmittelbar um, doch fehlt die nähere Kenntniss, wie dieses geschehe.

§. 1715.

Mag nun die Heilung auf die eine oder die andere Art bewirkt werden, folgendes sind die bewährtesten Kurmethoden der Lustseuche:

Die erste Stelle verdienen immerhin noch die verschiedenen Verfahrungsweisen, in welchen Queksilber das Hauptmittel ist.

Manche wenden, so lange die Krankheit nur in dem ursprünglichen Schanker besteht, nur örtliche Mittel an, doch ist es sicherer, immer zugleich auch innerliche Mittel zu geben, um gewisser der Entstehung der allgemeinen Lustseuche vorzubeugen; wir verordnen jedoch bei der blos örtlichen Krankheit in der Regel nur die leichtern Präparate und kleinere Gaben derselben.

Zu den wichtigern allgemeinen, bei der Anwendung des Queksilbers in der Lustseuche zu befolgenden Regeln gehören: Man bereite den Körper, wo es nothwendig ist, für den Gebrauch des Queksilbers vor; bei gastrischen Unreinigkeiten können Brech- und Abführungsmittel gegeben werden, mit welchen leztern überhaupt, auch abgesehen von vorhandenen Stoffen, viele Aerzte die Kur zu beginnen empfehlen. Bei einem scorbutischen Zustand soll, vor der Anwendung des Queksilbers, dieser möglichst durch Mineralsäuren und andere Mittel beseitiget werden etc. — Man wende im Anfange nur die mildern Queksilberbereitungen und nur kleine Gaben an und gehe bei nicht gehörig eintretendem Erfolge zu stärkern Präparaten und zu grössern Gaben über. Oft genügt es, auch nur mit dem Mittel zu wechseln, ohne gerade ein stärker wirkendes Mercurialmittel zu wählen. — Die Nahrung sei sparsam, damit das Queksilber voll-

ständiger aufgesogen werde und kräftiger auf die reproductiven Prozesse wirke. Eine wirkliche Hungerkur wird als besonderes Heilverfahren in Anwendung gebracht (S. weiter unten). — Geistige Getränke müssen vermieden werden, um die schleichenden, zerstörenden Entzündungen nicht zu erhöhen. — Es versteht sich von selbst, dass saure Dinge und Salze, welche die Mischung des Präparates verändern können, vermieden werden müssen. — Gleichzeitig mit dem Queksilber bringt man gerne Mittel in Anwendung, welche die Absonderungen vermehren. Der Kranke muss sich warm kleiden und die Temperatur des Zimmers warm sein, um die Hautausdünstung zu erhalten; er trinke die auf die Hautausdünstung und die Harnabsonderung wirkenden Holztränke von Lignum Guajaci, rad. Bardanae, Saponariae, Liquiritiae, Lignum Sassafras (Spec. ad decoct. Lignor. Ph. boruss.) und vorzüglich auch von rad. Sarsaparillae. Bei manchen Methoden werden auch wiederholt Abführungsmittel zwischen dem Gebrauche der Queksilbermittel gegeben. — Will man den Speichelfluss erregen, so dient die Anwendung des Queksilbers in den Einreibungen der grauen Queksilbersalbe, will man ihn vermeiden, was man bei den leichtern venerischen Uebeln beabsichtiget, so lässt man die Maassregeln eintreten, die in dem Paragraphen über die Behandlung des Speichelflusses nach den Anzeigen aus den Ursachen angegeben sind. — Leidet etwa der Kranke an einem entzündlichen Fieber und haben die örtlichen Entzündungen einen bedeutenden Grad erreicht, so müssen oft neben dem Gebrauche des Queksilbers allgemeine oder örtliche Blutentleerungen vorgenommen werden; ist er aber sehr empfindlich, zu Magenschmerzen, Koliken, Durchfällen oder Krämpfen geneigt, so kann mit dem Queksilber ein angemessener Gebrauch des Opiums verbunden werden.

§. 1716.

Die gebräuchlichsten mildern Quecksilberbereitungen sind das Calomel (Hydrargyrum chloratum) und der Mercurius solubilis *Hahnemanni* (Hydrargyrum ammoniato-nitricum oxydulatum), von welchem man zweimal täglich und später öfters einen halben oder ganzen Gran gibt; auch gehören hieher der Mercurius saccharatus, der Merc. mellitus (nach *Swediaur*), der Merc. gummosus Plenkii etc. Zwischen den mildern und den schärfern Quecksilberpräparaten steht nach *Sundelin* das salpetersaure Quecksilberoxydulat. Unter den schärfern Präparaten ist das gebräuchlichste der Sublimat (Hydrargyrum bichloratum) (Nro. 94), weniger häufig gebraucht wird der rothe Präcipitat (Hydrargyrum oxydatum rubrum), zweimal täglich zu $1/_{12}$ Gran und allmälig steigend, das Hydrargyrum phosphoricum oxydatum zu $1/_4$ bis $1/_2$ Gr., das Proto- et Deutojoduretum Hydrargyri zu $1/_8$ Gran ein- bis zweimal täglich, das Brom-Quecksilber etc.

§. 1717.

In den gewöhnlichen, nicht allzuhartnäckigen Fällen genügt es, die so eben angegebenen Quecksilberpräparate in der bezeichneten Weise anzuwenden. Hiermit sind jedoch die örtlichen Mittel zu verbinden.

Primäre Schankergeschwüre suchen viele Aerzte, wenn sie frisch sind, durch Aezen mit Höllenstein zu zerstören. Man bestreicht den Schanker mit einer Salbe mit weissem oder rothem Präcipitat, wäscht ihn mit einer Sublimatauflösung, mit dem phagedänischen Wasser, betupft schwielige Ränder mit Höllenstein, bei entzündlichem Zustande aber wendet man Bähungen und erweichende Salben an.

Die Bubonen sucht man in ihrer Entstehung zu unterdrücken und, so lange es noch möglich ist, zu zertheilen. Zu diesem Zwecke lässt man bei ihrer beginnenden Entwicklung Bleiwasserumschläge machen,

sezt Blutegel, wenn sie entzündet sind, und lässt bei mehr tropidem Character die graue Quecksilbersalbe in dieselben einreiben, Mercurial- oder Cicutapflaster auflegen und erweichende Umschläge machen. Geht der Bubo in Eiterung über, so befördert man die Reifung durch Cataplasmen und geeignete Pflaster, überlässt aber die Oeffnung desselben der Natur, doch sind zuweilen Erweiterungen der Oeffnung nothwendig, um Senkungen zu vermeiden. Das zurückgebliebene Geschwür behandelt man wie den Schanker. Zurückgebliebene harte Stellen sucht man durch Umschläge und die oben bezeichneten Einreibungen und Pflaster zu zertheilen. Bei alten, hartnäckigen Verhärtungen der Drüsen kann, ausser den schon angegebenen Mitteln, auch die Jodsalbe in Gebrauch gezogen werden.

Gegen die syphilitischen Geschwüre im Halse dienen Gurgelwasser, Einsprizungen und Pinselsäfte mit Quecksilbermittel. Am gebräuchlichsten ist *Rust's* Pinselsaft (Nro. 95). Bei der Ozaena lässt man reinigende Einsprizungen, mit Zusaz von Sublimat, vornehmen. — Gegen syphilitische Ausschläge zieht man, nebst den innerlichen Mitteln gegen die Lustseuche, die gegen die Hautausschläge im Allgemeinen gebräuchlichen innerlichen und äusserlichen Mittel zu Hilfe, so weit sie nicht die Wirkung des Quecksilbers beschränken; unter den äusserlichen Mitteln vorzüglich auch die Quecksilberbereitungen. — Die Auswüchse fallen gewöhnlich schon durch den innerlichen Gebrauch der Quecksilbermittel ab, geschieht dieses nicht, so wäscht man sie mit einer starken Sublimatauflösung, streut Sabinapulver auf, betupft sie mit dem Liquor Hydrargyri nitrici und andern Aezmitteln, oder nimmt sie mit der Scheere oder dem Messer hinweg und wendet das Aezmittel auf den noch zurückgebliebenen Rest des Aftergebildes an. — Gegen die Knochenschmerzen sind vorzüglich Einreibungen der

grauen Queksilbersalbe, mit Zusaz von Opium purum, dienlich, auch können nach Umständen Blutegel gesezt, Cicutaumschläge gemacht und Cicuta- und Queksilberpflaster aufgelegt werden. Auf dieselbe Weise werden auch die Gummata, Tophi und Exostoses behandelt und bei beiden leztern oft auch reizende Mittel, wie Queksilberpflaster mit Ammoniak und auch Blasenpflaster angewandt.

§. 1718.

Genügen diese leichtern Verfahrungsweisen nicht, so muss man oft zu einer eingreifendern Queksilberkur seine Zuflucht nehmen. Folgende verdienen besonders erwähnt zu werden:

Die *Weinhold'sche grosse Queksilberkur* mit Calomel. Der Kranke nimmt Abends, ein paar Stunden vor dem Schlafengehen, 10 Grane Calomel und trinkt zwei Tassen Fleischbrühe darauf, nach einer halben Stunde dieselben Mengen Calomel und Fleischbrühe, und wenn es ein starkes Individuum ist, nach einer weitern halben Stunde fünf Grane Calomel und zwei Tassen Fleischbrühe, am andern Morgen ein Paar Tassen mässig starken Kaffe, und wenn nunmehr noch keine flüssigen Stuhlgänge eintreten, ein Pulver von 15 — 20 Grane Jalappe und ebensoviel tartarisirtem Weinstein, den 4., 7., 10., 13., 16. und den 19. oder 20. Tag dieselben Gaben des Calomels, welchen man von der 4ten oder 5ten Anwendung an, um noch fortdauernd flüssige Stuhlentleerungen zu Stande zu bringen, 6 — 16 Grane Jalappenpulver zusezen muss. Zugleich lässt man eine leichte Abkochung der China nehmen. Bei dieser Kur muss sich der Kranke warm halten, die Diät soll kräftig sein, doch Fleisch und Wein in geringer Menge genossen werden. Stellt sich Speichelfluss ein, so darf die Kur nicht fortgesezt werden.

§. 1719.

Die *Dzondi'sche Sublimatkur.* Der Kranke nimmt von den in Nro. 96 angegebenen Sublimatpillen, von welchen vier einen fünftels Gran Sublimat enthalten, vier Pillen nach dem Mittag und nimmt sodann immer um den andern Tag zu derselben Zeit eine Portion, die jedesmal um zwei Pillen vermehrt wird, bis er 30 Pillen, also $1\frac{1}{2}$ Grane Sublimat auf eine Gabe nimmt. Die grössern Gaben können auch in mehrern kleinern zertheilt in kurzen Zwischenräumen nach einander genommen werden. Mit der zulezt bezeichneten Gabe wird gewöhnlich der Schluss der Kur gemacht, nachdem also im Ganzen $11\frac{9}{10}$ Grane Sublimat verbraucht worden sind; in sehr hartnäckigen Fällen werden jedoch die grossen Gaben, wenn sie der Kranke verträgt, noch einigemale gegeben. Nebenbei muss der Kranke Sarsaparillthee trinken. Magenbeschwerden, namentlich Erbrechen, sucht man durch etwas Opium zu mildern, entwickelt sich jedoch ein entzündlicher Zustand des Magens, so muss die Kur unterbrochen werden. Tritt Speichelfluss ein, so wird mit dem Gebrauche des Sublimats, bis zur Beseitigung desselben, ausgesezt, und sodann mit der Gabe wieder begonnen, bei welcher man stehen geblieben ist.

§. 1720.

Die *kleine Schmierkur.* Dieselbe besteht in Einreibungen der grauen Queksilbersalbe, welche nur bis zu dem Zeitpunkt fortgesezt werden, in welchen die ersten Spuren des Speichelflusses sich zeigen. Man lässt am warmen Ofen und mit der erwärmten Hand einen Tag um den andern, oder auch alle Tage und selbst jeden Tag zweimal eine halbe oder ganze Drachme, oder auch selbst eine grössere Quantität der bezeichneten Salbe einreiben, bis Speichelfluss sich zeigt, wo sodann die Kur beendet wird. — Man lässt hiebei den Kranken

warme Bäder gebrauchen, sich warm kleiden und eine magere Kost geniessen.

§. 1721.

Die *grosse Schmier- und Hungerkur.* Es ist diese Methode, ihren wesentlichen Theilen nach, eine alte Heilmethode der Lustseuche. In Deutschland ist sie neuerdings wieder von *Louvrier* und *Rust* in Gebrauch gebracht und von denselben auch verbessert worden. Der Körper des Kranken wird vorerst durch eine Vorbereitungskur für das Quecksilber empfänglich gemacht, so dass die Aufsaugung kräftiger von Statten geht und eine verhältnissmässige geringe Menge des Arzneimittels eine grosse Umstimmung hervorbringt. Der Kranke erhält zuerst ein Abführungsmittel, z. B. aus Jalappe mit Weinstein oder einem Senneaufguss mit Salz und Manna, sodann gebraucht er jeden folgenden Tag ein Bad, welches wo möglich 12 Tage fortgesezt werden muss, doch kann auch die Zeit abgekürzt werden. Während des Gebrauchs der Bäder erhält der Kranke nur dreimal täglich eine Suppe von einem halben Quart Fleischbrühe mit etwas Grüze, Gerste, Reis, oder statt derselben etwas Kaffee und in den ersten Tagen auch etwas gekochtes Obst oder leichtes Gemüse. Bei alten und schwächlichen Leuten kann auch etwas Wein, Fleischbrühe mit Eigelb und dergl. gestattet werden; bei sehr vollsaftigen und kräftigen Individuen können aber eine oder selbst zwei Aderlässe vorgenommen werden. Zum Getränk erhält der Kranke eine Abkochung von Rad. Bardanae, Liquiritiae und Althaeae, er muss sich warm kleiden und das Zimmer desselben muss eine beträchtliche Temperatur haben. Nach Beendigung der Bäder wird noch einmal ein Abführungsmittel gegeben. Bei weiblichen Kranken muss die Vorbereitungskur so angeordnet werden, dass sie beendigt ist, wenn die monatliche Reinigung eintritt, damit die Einreibungen, welche in 25 Tagen vollendet

sind, gerade in der Zeit zwischen zwei Reinigungen vorgenommen werden können. Tritt die Reinigung alle 14 Tage ein, so richte man die Kur so ein, dass dieselbe vorüber ist, wenn die kritischen Tage eintreten. Stellt sich die Menstruation während der Einreibungen ein, so werden dieselben so lange fortgesezt, bis diese vorüber ist.

§. 1722.

Die Einreibungen werden mit einer Salbe, aus einem Theile Queksilber und zwei Theilen Fett bereitet, mit der Hand, welche über Kohlen erwärmt ist, vorgenommen, und es werden dabei 1, auch nach Umständen 1½ und selbst 2 Drachmen in folgender Ordnung eingerieben: Am ersten Tag in beide Unterschenkel, am dritten in beide Oberschenkel, am sechsten in beide Arme, am achten in den Rücken, am zehnten in beide Unterschenkel, am zwölften in beide Oberschenkel und zwar an diesen Tagen jedesmal am Morgen, am vierzehnten Tag kann auch noch eine Einreibung gemacht werden, oder man wartet den Eintritt des Mercurialfiebers ab. Es verändert sich nämlich der Zustand des Kranken zwischen dem 14ten und 16ten Tag, derselbe wird unruhig, sein Athem wird beklommen, der Puls voll, seine Zunge belegt, er wird von Herzklopfen und Leibschmerzen befallen, es stellt sich selbst Irrereden ein etc. Endlich bricht ein heftiger, 1 und selbst 2 Tage anhaltender Schweiss aus, wodurch, so wie durch reichlichen Harnabgang und Stuhlentleerungen die Zufälle wiederm gemässigt werden und auch in der Hauptkrankheit eine bedeutende Besserung herbeigeführt wird. Vom 16ten Tag an werden nun wiederum immer um den andern Tag Einreibungen und zwar Abends vorgenommen, in allen dazwischen liegenden Tagen ein mildes Abführungsmittel gegeben und dieses Verfahren bis zum 25sten Tag fortgesezt.

In dieser ganzen Zeit darf der Kranke die Wäsche nicht wechseln, sich nicht waschen, das Zimmer, das stark gewärmt sein muss, nicht verlassen, das Fenster nicht öffnen und muss sich mit der sparsamen Nahrung, wie in der Vorbereitungskur, begnügen. Gewöhnlich stellt sich zwischen dem 3ten und 5ten Tag ein Speichelfluss ein, geschieht dieses früher, so muss die Kur abgebrochen werden, ist er zu reichlich, das ist mehr als 3 Pfunde täglich, so muss zwei Tage mit den Einreibungen ausgesezt und die Menge der Salbe vermindert werden. Schwillt die Zunge in dem Grade an, dass sie sich zwischen den Zähnen einklemmt, so bringt man etwas Korkholz zwischen dieselben. Ist die Geschwulst der Zunge so bedeutend, dass Erstickung droht, so müssen Blutegel gesezt und in den dringendsten Fällen die Zunge scarificirt werden. Die Geschwüre an der Zunge und dem Zahnfleisch bestreicht man mit einer Mischung von 1 Unze Mandelöl und 1 Drachm. Campher. Um Verwachsungen der innern Fläche der Wangen mit dem Zahnfleische zu verhüten, soll der Kranke öfters den Mund recht weit öffnen. Wird durch Verkältung der Speichelfluss oder der Schweiss unterdrückt, in welchem Falle leicht Gefahr für den Kranken eintritt, so wendet man warme Bäder (wohl noch zweckmässiger Dampfbäder) an, lässt den Kranken mit erwärmten camphorirten Tüchern stark reiben, gibt innerlich schweisstreibende Mittel und nach Umständen auch ein Brechmittel, legt Senfteige etc. Wird während der Kur der Kranke sehr schwach, der Puls sehr klein und schnell, oder klein, langsam und aussezend, stellen sich Ohnmachten, Zuckungen und andere bedenkliche Zufälle ein, so müssen die Einreibungen ausgesezt und kräftige Brühen, Wein, *Hoffmänn*'sche Tropfen etc. in Anwendung gebracht werden.

Nach beendigten Einreibungen, die selten vermehrt

werden müssen und von welchen zuweilen auch 9 oder 6 hinreichen, erhält der Kranke ein Bad mit Seife und Weingeist, bekleidet sich sodann mit reiner Wäsche und bezieht ein anderes Zimmer. Der Uebergang zur kräftigen und festen Nahrung darf nur allmälig geschehen, und ebenso darf sich der Kranke nur allmälig der frischen Luft wiederum aussezen. Die Heilung des Speichelflusses wird in der Regel der Natur überlassen.

§. 1723.

Die *von Cirillo erfundene Jnunctionsmethode*, ohne Salivation und Hunger, wird neuerdings wieder von *Hufeland*[1]) anempfohlen. Nachdem der Kranke mehrere Tage durch Fussbäder die Füsse weicher gemacht hat, reibt er jeden Abend 1 Drachme von der Sublimatsalbe (Nro. 97) in die Fusssohlen ein, trinkt dabei eine Abkochung von Sassaparille etc., gebraucht immer um den andern Tag ein warmes Bad, beobachtet eine mässige, mehr vegetabilische Diät und hält sich in einem warmen Zimmer auf. Die Behandlung muss nicht allein bis zum Verschwinden der Zufälle, sondern noch eben so lange nachher fortgesezt werden. Die Kur dauert sehr lange, zwei und selbst sechs Monate.

§. 1724.

Das *Zittmänn'sche Decoct.* Die Anwendungsweise dieses Mittels ist nach der Gebrauchsart von *Chelius* folgende: Der Kranke nimmt am ersten Tage Morgens 16 Stück Pilulae mercuriales laxantes; die vier folgenden Tage trinkt er Morgens eine Bouteille erwärmtes, *starkes*, (Nro. 98), Nachmittags eine Bouteille nicht erwärmtes, *schwaches* Decoct (Nro. 99); am sechsten Tage wieder die abführenden Pillen, wie am ersten Tage, und die vier folgenden Tage das Decoct auf die angegebene Weise. Dabei geniesse der Kranke nur 4 Loth ge-

1) Journ. der practischen Heilkunde. März 1819.

bratenes Hammelfleisch und 4 Loth weisses Brod täglich, und an den Tagen, wo die Abführungsmittel gegeben werden, drei Suppen. — Der Kranke halte sich während der ganzen Kur im Bette, um die Schweisse gehörig abzuwarten. Nach Verbrauch des Decoctes lässt man den Kranken einige Zeit sich noch im Zimmer halten, einen Thee aus Spec. lignorum oder Radix Sassaparillae trinken und noch magere Diät beobachten. Wäre der Kranke jezt noch nicht geheilt, so wende man die ganze Kur zum zweiten Male an. Bei sehr robusten Kranken gebe man am eilften Tage der Kur noch einmal die abführenden Pillen.

§. 1725.

Unter diesen besondern Verfahrungsweisen, die in der Regel nur in Anwenduug gebracht werden, wenn die gewöhnliche Art, das Queksilber zu geben, nicht genügt, verdienen wohl in den meisten Fällen die *Dzondi*'schen Sublimatpillen und besonders, wenn schon viel Queksilber gebraucht worden ist, das *Zittmänn*'sche Decoct den Vorzug. Für die hartnäckigsten Fälle bleibe die grosse Schmier- und Hungerkur aufgehoben, welches ohne Zweifel das grösste Mittel gegen eingewurzelte Lustseuche ist, doch oft auch bedenkliche Zufälle hervorbringt.

§. 1726.

Ausser dem Queksilber sind verschiedene Pflanzen, Rad. Sassaparillae, das Lignum Guajaci, Rad. Bardanae, Saponariae, Liquiritiae, Lign. Sassafras, so wie rad. Caricis arenariae, rad. Chinae, Astragali exscapi, Stipites Dulcamarae, Turiones Pini, cortex viridis nucum Juglandis, cort. Mezerei, Chelidonium majus, Chelidonium glaucium, das Opium, Aconit, Cicuta etc., in verschiedenen Zusammensezungen mit oder ohne Queksilber, wie (ausser dem schon erwähnten *Zittmann*'schen Decoct) in dem *Pollin*'schen Decoct, dem von *Feltz*, von *Struve*,

Cambierie, St. Marie, Vigaroux, dem *Struv*'schen Syrup, dem *Roob von Laffecteur* etc. empfohlen worden.*)

§. 1727.

Aus dem Mineralreiche sind angewandt worden: die Mineralsäuren, besonders die Salpetersäure, Kupfer, Arsenik und vorzüglich Gold.**)

Das Gold wurde vorzüglich von *Chrestien* eingeführt und von *Niel* empfohlen. Es wird als Goldfeile, Goldpulver, Goldoxyd und salzsaures Gold gegeben. Von dem leztern (dem *Chrestien*'schen Goldsalze) wird der erste Gran in 12, der zweite in 11, der dritte in 10 und der vierte in 9 Theile getheilt, und in eben so viel Tage als er Theile hat, mit etwas Stärkmehl oder Bärleppulver vermischt in die Zunge, das Zahnfleisch oder die empfindlichen Stellen der Geschlechtstheile eingerieben.***)

§. 1728.

Endlich müssen die Versuche erwähnt werden, die man in der neuesten Zeit, vorzüglich in England und Hamburg, gemacht hat, die Lustseuche ohne specifische Mittel und insbesondere ohne Queksilber und Metallpräparate zu heilen. Die Behandlung zerfällt in eine allgemeine und in die örtliche. Die erstere besteht in grösster Reinlichkeit, Ruhe und nach Umständen einem stärkern oder schwächern antiphlogistischen Verfahren. Die Kranken werden zuerst gebadet und müssen andauernd im Bette verweilen, alle Producte der Krankheit, wie Schleim und Eiter, müssen durch Abwaschen, Einspriz-

*) Eine Angabe dieser Zusammensezungen ist in dem Werke *Dierbachs*, die neuesten Entdeckungen in der Materia medica, Heidelberg 1828, fortgeszt 1836, zu finden.

**) Ihre Anwendungsart ist in *Richter's* Therapie B. V beschrieben.

***) Nähere Nachrichten über den Gebrauch des Goldes findet man ebenfalls in *Dierbach*

ungen und Einlegen von Charpie aufs sorgfältigste entfernt werden. Der Kranke wird auf eine magere Diät gesezt, so dass er anfangs nur 4 Loth Weissbrod, einen Schoppen Wassersuppe, in welche Mehl eingerührt ist, und des Mittags 6 Esslöffel voll Gemüse erhält; zum Getränk gibt man einen dünnen Haberschleim, oder das Decoctum Lignorum oder einen Sassaparilltrank, erst wenn die Besserung schon bedeutende Fortschritte gemacht hat, darf ihm eine etwas kräftigere Nahrung gestattet werden. — Bei starker Constitution des Kranken und bei entzündlichen Zufällen, insbesondere starker Phimosis oder Paraphimosis wird eine Aderlässe vorgenommen. — Innerlich wird Bittersalz in solchen Gaben angewandt, dass im Anfang mehrere und später wenigstens täglich eine Oeffnung erfolgen. Stellen sich schwämmchenartige Excoriationen ein, so wird mit dem Gebrauch dieses Mittels ausgesezt.

§. 1729.

Die örtliche Behandlung richtet sich nach dem jedesmaligen Zustande der örtlichen Veränderungen, ohne dass auf etwas Specifisches Rücksicht genommen wird. Bei Geschwüren mit entzündlichem Character werden örtliche Blutentleerungen vorgenommen; bei sehr schmerzhaften Geschwüren und solchen mit harten aufgeworfenen Rändern werden erweichende Breiumschläge gemacht. Sind die Geschwüre ohne diese Zufälle, so werden sie mit einer Auflösung von Blei, schwefelsaurem Zink, schwefelsaurem Kupfer oder Kalkwasser verbunden, gegen phagedänische und brandige Geschwüre werden mildernde Umschläge, verdünnte Schwefelsäure, Myrrhentinctur, Terpenthin, Auflösung von Höllenstein angewandt, bei indolenten Geschwüren reizende Umschläge. — Gegen Bubonen wird ein drückender Verband, wobei bei Schmerzhaftigkeit derselben Blutegel gesezt werden müssen, empfohlen; ist Eiterung entstanden, so soll der

Abscess vermittelst des Höllensteins geöffnet und sodann die eiternde Stelle wie ein Geschwür behandelt werden. — Halsgeschwüre werden, so lange noch Entzündung vorhanden ist, mit Blutegeln an den Hals gesezt behandelt; ausserdem werden angewandt: Cataplasmen, Gurgelwasser von einem Aufguss von Salbei, cort. Ulmi, Holderblüthen mit einem Zusaz von Liquamen Myrrhae, oder von Essig und einer schwachen Auflösung von Höllenstein. Bei ausgebreiteten Geschwüren wird zugleich der innerliche Gebrauch der Salpetersäure empfohlen. — Syphilitische Hautausschläge werden, wie die Lustseuche im Allgemeinen behandelt (§. 1728) und ausserdem werden gegen dieselben die Mittel angewandt, welche im Gebrauch sind, wenn sie nicht syphilitischer Natur sind. — Ebenso werden die Knochenleiden einfach behandelt. Gegen Knochenschmerzen, welche in der Mitte oberflächlich liegender Knochen, namentlich des Schienbeins, der Schädelknochen, des Brustbeins und der Vorderarmknochen, ihren Siz haben, werden Einschnitte bis auf den Knochen vorgenommen, worauf die Wunde mit einem Cataplasma bedeckt wird.

Fergusson (med. chir. Transact. Vol. 4.). — *Rose* (ebend. Vol. 8). — *Guthrie* (Rust's Magaz. B. 4.). — *Hennen* (Grundsäze d. Militair-Chirurgie, aus d. Engl. Weimar 1822). — *Hill* (Edinb. med. and surg. Journ. 1822). — *Thomson* (ebend.). — *Alkock* (London. med. Repos. Vol. 9 u. 14). — *Rousseau* (americ. med. Record. Vol. 3.). — *Phiney* (new. engl. Journ. Vol. 9.). — *Ware* (ebend.). — *Stevens* (med. and. surg. Register of New-York hosp. 1820). — *Krüger* (Horn's Archiv 1822). — *Hufeland* (in s. Journ. 1822). — *Huber* (Stuttg. u. Tübingen 1825). — *Otto* (Journ. v. Walther und Gräfe. B. 8.). — *Oppenheim* (Hamb. 1827). — *Fricke* (Annal. d. chirurg. Abtheilung des allgemeinen Krankenhauses in Hamburg. B. I. Hamburg 1828).

§. 1730.

Es ist nunmehr durch viele Erfahrungen bestätigt, dass durch die so eben beschriebene Methode die Lustseuche geheilt werden kann und es wird selbst behauptet,

dass bei derselben niemals die secundären Zufälle, namentlich das Knochenleiden, einen so bösartigen Character annehmen, wie dieses zuweilen bei der Lustseuche der Fall ist, wenn Mercur angewandt worden ist und durch denselben das Leiden nicht bezwungen wurde; es kann jedoch diese Methode nur dann in Anwendung gebracht werden, wenn von dem Kranken eine pünktliche Befolgung der vorgeschriebenen Verhaltungsregeln erwartet werden kann; auch scheint sie nicht so sicher, als die Behandlung der Lustseuche mit Quecksilber zu sein, da doch nach dieser Methode ziemlich häufig die allgemeine Lustseuche auf die örtlichen Zufälle folgt, nach *Thomson* unter 12 Fällen einmal, nach *Guthrie* und *Hill* unter 10, nach *Hennen* unter 5 und nach *Rose* unter 3 Fällen einmal.

Die Syphiloiden.

§. 1731.

Die Syphiloiden sind ansteckende Dyscrasien, die im Ganzen der allgemeinen Syphilis gleichen, aber sich nicht aus den gewöhnlichen Vorläufern der Syphilis entwickeln, leicht anstecken, endemisch und epidemisch vorkommen und meistens noch durch einzelne eigenthümliche Erscheinungen, namentlich oft durch himbeerartige Auswüchse sich auszeichnen.

§. 1732.

Hieher gehört das erst seit dem Jahre 1790 im östreichischen Küstenlande in Fiume, Buccari, Novi, Scherlievo etc. vorkommende Syphiloid, Scherlievo

genannt,[1]) das im September des Jahres 1801 von einer Bevölkerung von 38,000 mehr als 13,000 Individuen ergriffen haben soll. Meistens stellen sich zuerst Schmerzen im Rückgrathe, den Röhrenknochen und den Gelenken ein, zugleich, oder nach, und oft auch ohne jene Schmerzen wird das Gaumensegel und der Rachen dunkelroth; es entstehen an den Lippen und in der Mund- und Rachenhöhle weisse Streifen, Pusteln und schankerhafte Geschwüre, welche die Weichtheile zerstören und sodann auch die Knochen angreifen; durch Ausbreitung dieser Geschwüre auf den Kehlkopf und die Luftröhre entsteht zuweilen Luftröhrenschwindsucht. Mancherlei Hautausschläge entstehen, die Psoriasis guttata, kupferrothe handbreite Flecken (Vitiligo cuprea, *Jenniker*) und ausgebreitete violett-blaue Flecken (Vitiligo violacea, *J.*), einzeln stehende Knötchen, die abtrocknen und schneeweisse Flecken zurück lassen (Scherlievo Psora) und auch dicht beisammenstehende Blätterchen, die durch ihre Abschuppung dem Körper das Ansehen geben, wie wenn er mit Mehl gepudert wäre. Manchmal vereitern die Knötchen und gehen in Geschwüre über, die weisse Narben zurücklassen und zuweilen auch um sich fressen. Auch entstehen dunkelrothe oder blaue erbsengrosse harte Knoten, die an ihrer Spize weisse Schuppen bilden, und nach mehreren Jahren in Verschwärung übergehen, so wie auch auf einem erythemartigen Grunde sizende Bläschen, die in Geschwüre übergehen. Es geben die Geschwüre eine specifisch-stinkende klebrige Jauche von sich, sie zerstören im Gesichte oft die Augen, die Nase, die Lippen etc., geben aber auch zu Verwachsungen Veranlassung, so dass die untere Kinnlade mit der Brusthaut zusammen hängt. Es entstehen Verhärtungen der Speicheldrüsen, lymphatische Geschwülste, Gliedschwämme,

1) *Jenniker* (med. Jahrb. des k. k. österr. Staates, 5. Bd.).

zuweilen der Elephantenfuss. In manchen Fällen werden die Knochen angegriffen, es entstehen Knochenschmerzen, Tophi und Caries. Die Krankheit kann 20 Jahre dauern.

§. 1733.

Grosse Aehnlichkeit mit dem Scherlievo haben die **Sibbens** oder **Siwwens**,[1]) welche in Schottland zu Hause sind und in einigen Gegenden so häufig gewesen sein sollen, dass zuweilen drei Viertheile der Bevölkerung litten. Gegenwärtig kommt dieses Uebel nur selten vor. Es entstehen ebenfalls um sich fressende Geschwüre und hierauf mancherlei Hautausschläge, unter welchen vorzüglich schwammige, weissliche, himbeerartige Auswüchse bemerkenswerth sind (von welchen die Krankheit den Namen Siwwen erhalten hat). Die Knochen leiden selten. Zuweilen kommen an den Geschlechtstheilen Geschwüre vor, aber niemals im Anfange der Krankheit.

§. 1734.

Ein anderes Syphiloid ist das **scandinavische Syphiloïd** oder die **Radesyge**.[2]) Es kommt dasselbe in Schweden, Norwegen, Grönland und Lappland vor und besteht vorzüglich in kupferfarbigen und härtlichen Flecken am Gaumensegel, die allmälig in um sich fressende und selbst die Knochen angreifende Geschwüre übergehen, in einem tuberkulösen Ausschlag, der erbsengrosse Knoten darstellt, die zuerst nicht gefärbt sind, allmälig sich röthen und sich ebenfalls in um sich fressende Geschwüre umwandeln, und in einem Knochenleiden, das sich zunächst durch fixe Schmerzen äussert,

1) *Gilchrist* (auserles. Abhandl. für prakt. Aerzte. B. 24). — *Swediaur* (Trait. compl. des malad. syphilit.).

2) *Arbo* und *Mangor* (zwei Abhandl. a. d. Dän., m. einer Vorrede von Hensler. Alt. 1797). — *Pfefferkorn* (Alt. 1797). — *Osbeck* (Stockh. 1811, a d. Franz. v. Meyer. Bremen 1813). — *Hünefeld* (Lpz. 1826).

worauf Exostosen entstehen, die aufbrechen und in schwammige Geschwüre übergehen.

§. 1735.

Wahrscheinlich aus der Radesyge durch Ansteckung entstanden (in den Jahren 1785—87) ist ein in Hollstein vorkommendes Syphiloid, die Marschkrankheit oder Dittmar'sche Krankheit.[1]) Es besteht diese Krankheit im Geschwüren im Halse, aber auch an den Geschlechtstheilen und dem After, Hautausschlägen, besonders an der Stirne, die oft auch in Geschwüre übergehen, Caries der Nasenknochen, Entzündung der Augenlieder, wobei sich diese Theile umlegen und die Wimpern verlieren, und zulezt sich einstellenden colliquativen Schweissen und Zehrfieber.

§. 1736.

Das Mal de Chicot[2]) ist ein in Canade seit 60 Jahren vorkommendes Syphiloid, das zwar auch bei Erwachsenen, aber vorzüglich bei Kindern sich zeigt. Dasselbe besteht in kleinen, im Anfange den Aphthen ähnlichen Pusteln an den Lippen und in der Mundhöhle, die eine eiterartige Flüssigkeit ergiessen und grosse Zerstörungen veranlassen, so dass oft bei Kindern die Zunge fast ganz zerfressen wird, nächtlichen Knochenschmerzen, Anschwellung der Hals- und der Leistendrüsen, flechtenartigen, fressenden Ausschlägen, Exostosen und Knochenfrass.

§. 1737.

Endlich gehören hieher die Yaws und die Pians, welche von *Sauvages* unter dem gemeinschaftlichen

1) *Brandis* (Hall. allgem. Literat.-Zeit. 1811). — *Struve* (Alt. 1820, auch in dessen Werk über d. Diät, Entziehungs- und Hungerkur in syphil. u. pseudosyphil. Krankh. Alt. 1822). — *Dührssen* (in Pfaff's Mittheil. 1833. B. I.). — *Hübner* (Altona 1833).

2) *Meyer* (lat. Reval 1824). — *Albrecht* (Diss. Dorpat. 1825).

Namen Framboesia (Himbeerausschlag) begriffen wurden, welcher Name übrigens weniger für die Yaws, als für die Pians passt, und auch für die andern Syphiloiden gebraucht worden ist.

Die Yaws,[1]) welche auch Variola magna genannt wurden, da sie den Blattern sehr ähnlich sehen, sind eine in ganz Afrika, auf den westindischen Inseln, wohin die Neger verkauft werden, und in Ostindien endemische Krankheit. Es gehen dem Ausbruche nächtliche Knochenschmerzen, fürchterliche Träume, Melancholie, oft ein widernatürlicher Appetit nach ungeniessbaren Stoffen, z. B. nach Kohle, Erde oder Kreide, und oft auch ein schleichendes Fieber mehrere Wochen vorher. Es schwillt nunmehr der Kopf auf und es brechen zuerst am Halse, besonders in der Gegend des Kehlkopfes, den Blattern ähnliche Pusteln, welche mit einem kleienartigen Staube bedeckt sind und sich immer mehr ausbreiten, besonders in den Achseln und den Weichen, mehrere Monate hindurch aus. Die meisten Vorläufer hören nach diesem Ausbruche auf, mit Ausnahme der Knochenschmerzen, die vorzüglich bei magern Personen oft in Knochengeschwüre übergehen. Die Blattern füllen sich mit einem zähen, weissen Eiter, der um sich frisst und hierdurch oft Blutungen erregt; auch schwellen immer um dieselben die Venen sehr stark an. Die Geschwüre, die hierdurch erzeugt werden, haben kleiige Ränder, geben einen weisslichen Eiter von sich, und sehen, wenn sie in der Mundhöhle vorkommen, den venerischen gleich; in ihrem Umfang werden die Haare weiss. An den Gelenken, besonders an den Knöcheln, sammeln sich die Blattern zu grossen Geschwüren (die Mama- oder Meister-

1) *Schilling* (lat. Ultraj. ad. Rh. 1770). — *Allamand* (nov. act. natur. curios. vol. IV.). — *Nielen* (Samml. auserles. Abhandl. B. 7.). — *Sprengel* (Beiträge z. Gesch. d. Med. u. s. Pathol.).

Yaws) an und an den Fusssohlen erscheinen oft schwielige Geschwüre mit Fleischgewächsen (die Crabbe-Yaws). Zulezt kommen ein hektisches Fieber mit Nervenzufällen (oft Wasserscheu) und oft auch Magenruhr und Wassersucht hinzu. Nicht selten geht die Krankheit in den raudigen Aussaz über.

§. 1738.

Die **Pians**[1]) sind ursprünglich an der Küste von Guinea einheimisch, kommen aber überhaupt bei den Negern in Afrika und Westindien vor und theilen sich seltener als die Yaws den Weissen mit. — Die Krankheit beginnt nicht sowohl mit Knochenschmerzen, wie die Yaws, als mit einem heftigen Fressen und Jucken der Haut, wozu sich oft auch ein schleichendes Fieber hinzugesellt. Es brechen nunmehr, meistens zuerst an den Geschlechtstheilen, kleienartige Flechten aus, zwischen welchen rothe Blüthen von der Grösse eines Stecknadelkopfes ausbrechen, welche später verschwären. Diese Geschwüre breiten sich sehr aus und sind mit gelblichen und zuweilen auch mit röthlichen Beerschwämmen, von der Gestalt der Himbeeren, besezt (die weissgelblichen und die rothen Pians). Oft fliessen mehrere solcher Geschwüre in ein grosses zusammen, das tief um sich frisst (Mama- oder Meister-Pian). — Der Ausbruch der Hautkrankheit ist kritisch, indem die vorhergegangenen Erscheinungen oft nachlassen, doch treten oft noch nach demselben Knochenschmerzen ein und es bilden sich Exostosen und Erweichung der Knochen. Die Haut an den Fusssohlen und zuweilen die an den Händen verdickt sich und wird schmerzhaft, und zwischen den Fingern und den Zehen bilden sich Flechten, welches

1) *J. Hume* (med. Versuche u. Bemerkungen einer Gesellschaft in Edinburg. B. 6.). — *Bajon* (Mém. pour serv. à l'histoire de Cayenne. vol. I.). — *Sprengel* (in den beiden oben angef. Werken).

Uebel in Cayenne Sanauas genannt wird; oft geht dasselbe in krebshafte Geschwüre über (Crabben). An den Nägeln entstehen oft kleine, kirschrothe, schmerzende Geschwüre (Guignes, Kirschen), welche, wenn die Nägel nicht abgeschnitten werden, die Knochen zerstören. Zuletzt kommen Nervenaffectionen, Wassersucht und Schwindsucht hinzu, und nicht selten geht das Uebel in das Mal rouge über.

§. 1739.

Ursachen. Es werden die erwähnten Krankheitsformen zum Theil mehr von dem Aussaze, zum Theil von der Lustseuche abgeleitet. Als mit dem Aussaze verwandt werden in der Regel die Yaws und *Pians* betrachtet, doch haben sie auch grosse Aehnlichkeit mit der Lustseuche, und die Pians pflanzen sich vorzüglich durch den Beischlaf fort, die andern genannten Krankheitsarten werden gewöhnlich der Lustseuche zugeschrieben, doch halten sie auch Manche für Abkömmlinge des Aussazes. Es pflanzen sich diese Krankheiten sämmtlich durch Ansteckung fort, und zwar auch während des Beischlafs, aber auch ohne denselben, bei Berührung des Körpers und vermittelst fester Träger, wie Betten, Kleider, Trinkgeschirre etc. Die Yaws und Pians sollen insbesondere oft durch Fliegen, die von einem Körper auf den andern sich begeben, fortgepflanzt werden. Von dem Scherlievo wird selbst von einigen Aerzten behauptet, dass das Contagium durch die Luft sich verbreite. Die Ansteckung geschieht zum Theil sehr leicht, so dass oft die Krankheit eine grosse Verbreitung erhält. Die Yaws sollen das nämliche Subject nur einmal befallen.

§. 1740.

Vorhersage. Die erwähnten Krankheitsarten werden häufig tödtlich, besonders durch Zehrfieber und Wassersucht, die sich zuletzt hinzugesellen, sie sind

hartnäckig, aber sämmtlich heilbar, ja sie werden zuweilen durch die Naturkräfte allein geheilt, namentlich die Yaws. Ist Beinfrass vorhanden, so ist immer ein günstiger Erfolg der Behandlung sehr zweifelhaft.

§. 1741.

Behandlung. Gegen sämmtliche erwähnte Krankheiten ist das Queksilber im Gebrauche, doch wurden dieselben, wie übrigens die Lustseuche selbst, auch mit Erfolg ohne Queksilbermittel behandelt. Diese Verfahrungsweisen bestehen im Allgemeinen: in sorgfältiger Entfernung der Produkte der Krankheit durch fleissiges Abwaschen und andere Reinigungen der kranken Stellen, in der Entziehungs- oder Hungerkur, der Anwendung von Getränken von Sassaparill, Guajack, Lign. Sassafras, rad. Chinae etc., und auch der Anwendung von Antimonialien, Schwefel etc., so wie in Anwendung örtlicher Mittel, die sich nach Beschaffenheit der Geschwüre, des Ausschlags, der Condylome und der andern örtlichen Veränderungen richten muss.

Zweite Gruppe
der
dritten Ordnung der Bildungskrankheiten.

Die Erweichung der einzelnen Gewebe.

Die Gehirnerweichung.
(*Encephalomalacia.*)

Lallemand (recherches anat. path. sur le cerveau etc. Par. 1821 u. 29, aus d. Franz. v. Weese. Lpz. 1825 u. 26.) — *Rostan* (2te Ausgabe. Par. 1823, übers. von Fechner. Lpz. 1824). — *Bouillaud* (tr. clin. et physiol. de l'encephalite etc. Par. 1825). — *Waldeck* (lat. Königsb. 1829). — *Lippich* (über die schmelzende Entzündung der Gehirnhöhlenwände, med. Jahrb. der österr. Staaten, 1837).

§. 1742.

Die Gehirnerweichung ist während des Lebens nicht leicht mit Sicherheit zu erkennen, da auch andere Substanzveränderungen im Gehirne beinahe die gleichen Erscheinungen hervorzubringen vermögen, und selbst die nämlichen Zufälle vorkommen, und bei den Leichenöffnungen durchaus keine sichtbaren Veränderungen in der Subsanz des Gehirnes angetroffen werden.

Die Individuen, bei welchen man Gehirnerweichung antraf, litten häufig an anhaltenden Kopfschmerzen an einer bestimmten Stelle des Kopfes, an Ohrenklingen, Lichtscheue, Schwindel, oft an Erbrechen, an Schmerzen in den Gliedern; ein Kranker, bei welchem sich eine sehr ausgebreitete Erweichung der linken Hemi-

sphäre des grossen Gehirnes fand, litt einige Zeit vor seinem Tode vier Tage hindurch an heftigen Anfällen von Brustbräune und sodann an einer zermalmenden Nevralgie des linken Fusses, zuweilen leiden sie auch an krampfhaften Zusammenziehungen der Muskeln auf der der erweichten Stelle entgegengesezten Seite des Körpers. Die Geisteskräfte, insbesondere das Gedächtniss, werden schwach, und es stellt sich das Gefühl von Taubheit und Ameisenkriechen in den Gliedern ein, zuweilen ist Delirium vorhanden. Der Puls soll hierbei sehr veränderlich sein, oft gereizt sein, und wieder sehr langsam werden.

Es treten nun ziemlich schnell, und zuweilen auch plözlich, die Zeichen der theilweisen Unterdrückung der Gehirn- und Nerventhätigkeit hervor, was die zweite Periode der Krankheit bezeichnet. Der Kranke verliert das Gedächtniss oft ganz, wird schwerhörig, verfällt in einen schlafsüchtigen Zustand, es bilden sich Lähmungen aus, oder er wird auch plözlich von einem Schlagfluss mit halbseitiger Lähmung auf der der Erweichung entgegengesezten Seite befallen, wie dieses in dem oben erwähnten Falle geschah, in welchem auf die Anfälle der Brustbräune und die Nevralgie im linken Fusse plözlich ein Schlagfluss mit Lähmung der rechten Seite erfolgte, ohne dass bemerkbare Zeichen eines Gehirnleidens vorangegangen waren. Nach *Rostan's* Beobachtungen [1]) verfällt der Kranke in der Mehrzahl der Fälle zulezt in ein adynamisches Fieber.

Wegen schwerer Erkennung der Krankheit, besonders in ihrer Entstehung, lässt sich schwer bestimmen, ob dieselbe in der Regel mehr einen hizigen oder langwierigen Verlauf habe, doch scheint diese Substanz-

1) Am a. O. S. 18.

umbildung sich schneller zu gestalten und schneller tödtlich zu werden, als dieses gewöhnlich bei den andern Substanzveränderungen im Gehirne der Fall ist.

§. 1743.

Ergebniss der Leichenöffnungen. In den geringern Graden ist die Consistenz der erweichten Substanz nicht viel geringer, als die normal beschaffene Hirnsubstanz, welche auch nicht immer ganz denselben Grad der Härte zeigt, so dass es oft schwer zu bestimmen ist, ob wirklich eine krankhafte Erweichung vorhanden ist; in den höchsten Graden ist das Gehirn beinahe so dünnflüssig wie Eiter, doch von diesem besonders durch die Farbe noch wohl zu unterscheiden, meistens ist die Mitte der erwähnten Substanz am dünnflüssigsten. Die Farbe der erwähnten Masse ist meistens ein glanzloses Weiss, wie die Farbe der normalen Hirnsubstanz, oft aber auch gelblich, grünlich, bräunlich. Der Umfang der Erweichung ist sehr verschieden, sie kann selbst beinahe eine ganze Hemisphäre einnehmen. Jeder Theil des Gehirns kann erweichen, am häufigsten scheint aber die Erweichung in den Centraltheilen der Hemisphären, in den Wandungen der Seitenventrikel, im kleinen Gehirne und in den gestreiften Körpern vorzukommen. Zuweilen ist die Gehirnerweichung mit Bluterguss in die erweichte Substanz verbunden. In den Gehirnhöhlen ist meistens Wasser angesammelt.

§. 1744.

Ursachen. Die Gehirnerweichung wird am häufigsten in den Leichen alter Leute angetroffen, wenn man die mit der hizigen Hirnhöhlenwassersucht und mit dem chronischen Wasserkopf verbundenen Erweichungen nicht hieher rechnet.

Als Gelegenheitsursachen werden beschuldigt, der Missbrauch geistiger Getränke, zu grosse Geistesan-

strengungen, heftige Leidenschaften, Gehirnerschütterung, durchdringende Kälte, der Sonnenstich etc.

§. 1745.

Wesen. Der krankhafte Prozess, welcher die bezeichnete Substanzveränderung hervorbringt, wird von vielen Aerzten für eine schleichende Entzündung gehalten; doch kann, wie ich im allgemeinen Theil von der Darstellung der Krankheiten der Reproduction darzuthun mich bemüht habe, die Erweichung der Gewebe ohne Entzündung geschehen, und ich habe auch schon in mehrern Fällen von Gehirnerweichungen durchaus keine Spur von entzündlicher Gefässanfüllung angetroffen.

§. 1746.

Behandlung. Gegen die schon eingetretene Erweichung möchte wohl kein wirksames Heilverfahren aufgefunden werden können, und es beschränkt sich daher die Behandlung auf die Erfüllung einzelner Anzeigen aus den Zufällen, z. B. auf die Mässigung eines Blutandranges nach dem Kopfe, entzündlicher Zufälle etc.

Die Magenerweichung.

Jäger (Hufeland's Journ. B. 36.). — *Rhades* (Horn's Archiv. 1822). — *Cruveilhier* (aus d. Franz. v. Vogel. Liegnitz 1823). — *Camerer* (Stuttgart 1828).

§. 1747.

Die erste Beschreibung von erweichten und durch Erweichung durchlöcherten Stellen des Magens, wie sie auch nach dem Tode zuweilen bei solchen, die an keiner Krankheit des Magens litten, vorkommen, gab *J. Hun-*

ter,[1]) die erste Beschreibung der Krankheit aber, von der hier die Rede ist, ist von *Jäger*.

Es ist die Krankheit sehr schwer und wohl kaum mit vollständiger Gewissheit zu erkennen, da mehrere Krankheiten der Unterleibsorgane und selbst die hizige Gehirnhöhlenwassersucht mit denselben Zufällen auftreten können, und auch die zulezt genannte Krankheit mit der Magenerweichung häufig in Verbindung vorkommt; ja selbst, wenn die Untersuchung der Leiche die unten näher zu bezeichnende Veränderung in dem Magen nachweist, kann es oft zweifelhaft sein, ob diese Veränderung noch während des Lebens sich bildete oder erst nach dem Tode eintrat, da die Beobachtungen von *Hunter*, so wie die Versuche von *Camerer* beweisen, dass die Erweichung nach dem Tode, ohne ein vorhergegangenes Magenleiden, unter gewissen Bedingungen leicht erfolgen. Zuweilen entwickelt sich die Krankheit nur allmälig, indem die Kranken, welches in der Regel nur Kinder von fünf Monaten bis $1\frac{1}{2}$ Jahren sind, allmälig den Appetit verlieren, zuweilen von Erbrechen befallen werden, an schleimigten Durchfällen, Empfindlichkeit des Unterleibes, oft auch an Schleimhusten eine oder mehrere Wochen lang leiden, bis das Uebel sich in seinen höhern Graden entwickelt, meistens jedoch bildet sich die Krankheit in rascherm Verlaufe aus. Die Kinder werden von einem heftigen Fieber, mit sehr starkem Durste, befallen, sie haben grosse Unruhe, wimmern und schreien viel und ziehen die Füsse gegen den Bauch, der meistens gespannt ist, aber auch weich sein kann, an. Es fehlt der Appetit, meistens haben die Kinder Erbrechen, welches oft seltener, oft aber auch anhaltend ist, in der Regel sind grünliche, sauerriechende

1) On the digestion of the stomach after death in den phil. transact. vol. 62

und schleimigte Durchfälle vorhanden, das Athmen ist beengt, und es ist Husten vorhanden, die Kinder verfallen in einen schlafsüchtigen Zustand, aus dem sie jedoch, wenn nicht hizige Gehirnhöhlenwassersucht hinzukommt, oft durch ein geringes Geräusch und die geringste Berührung erweckt werden, die Augen sinken in ihre Höhlen zurück, das Gesicht wird blass, und es fühlt sich, so wie die Gliedmassen, kühl an. Der Körper magert schnell ab, besonders am Halse. Zulezt kommen Convulsionen hinzu.

In der Mehrzahl der Fälle dauert die Krankheit zwischen 3 und 5 Tagen, doch hat man sie auch innerhalb 24 Stunden tödtlich werden und auch zuweilen (*Jäger* und *S. G. Vogel*) einen mehr chronischen Verlauf von mehrern Wochen halten gesehen.

§. 1748.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Die erweichte Stelle befindet sich in der Regel am Grunde des Magens, insbesondere da, wo die Milz anliegt. Hier ist der Magen missfarbig, röthlichbraun, durchscheinend, fasst man ihn an dieser Stelle, so reisst er leicht ein und oft ist er auch schon durchlöchert. An der erweichten Stelle ist die Schleimhaut und oft auch die Muskelhaut in eine sulzige Masse verwandelt, die Erweichung ist in der Mitte am stärksten und wird gegen ihren Rand hin geringer, so dass die erweichte Substanz allmälig in die normale Substanz des Magens übergeht. Im Umfang der Erweichung fand man zuweilen entzündliche Gefässinjectionen, in andern Fällen nicht. Der Inhalt des Magens besteht in einer wässerigten, schleimigten Flüssigkeit von saurem Geruche. Zuweilen traf man auch Stücke von Gedärmen erweicht an, in welchem Falle sich ebenfalls die erwähnte Flüssigkeit vorfand. Die Gekrösdrüsen sind zuweilen angeschwollen, aber weich.

In dem Gehirne trifft man, nach *Camerer*, fast ohne Ausnahme, Spuren von Entzündung an, die Gefässe entzündlich injicirt, die Hirnhäute unter einander verwachsen, Lymphe zwischen dieselben und in die Hirnhöhlen ergossen, die Gefässe in der Hirnsubstanz mit Blut überfüllt, die Consistenz des Gehirnes oft weicher oder härter als gewöhnlich; in der Mehrzahl der Fälle soll der Pons Varolii und die Medulla oblongata widernatürlich fest sein.

§. 1749.

Ursachen. Die Krankheit befällt vorzüglich Kinder von dem angegebenen Alter, nach Manchen vorzüglich solche von scrophulöser und sonst kachektischer Anlage, nach Andern aber ebensowohl solche von guter Gesundheit.

Die Gelegenheitsursachen sind noch nicht gehörig bekannt, es werden aber vorzüglich eine schlechte Mutter- oder Ammenmilch und andere fehlerhafte Nahrungsmittel, besonders nach plözlichem Entwöhnen des Kindes von der Brust, gestörte Hautausdünstung und Metastasen von Rheumatismus, Friesel etc., so wie auch der Keuchhusten, die Rose der Neugebornen und die hizige Gehirnhöhlenwassersucht als entferntere Ursachen dieser Krankheit beschuldigt.

§. 1750.

Wesen der Magenerweichung. *Hunter*, *Meckel* u. A. glauben, dass die Erweichung des Magens erst nach dem Tode entstehe, indem der Magensaft die Magenhäute auflöse, was ersterer Schriftsteller eine Selbstverdauung nennt. *Jäger* nimmt eine Lähmung der Magennerven, insbesondere des Vagus an, wodurch der Magensaft eine saure (essigsaure) Beschaffenheit annehme und dadurch die Eigenschaft erhalte, zerstörend auf die Magenhäute einzuwirken. Die Fähigkeit des Magensaftes, so wie der Essigsäure, den Magen aufzulösen, hat

Camerer nachgewiesen, jedoch nur in der Art, dass der Magen einige Zeit nach dem Tode hierdurch aufgelöst wird. *Cruikshank* sucht die nächste Ursache in einer verstärkten Einsaugung der resorbirenden Gefässe, *Cruveilhier* in einer Reizung, wodurch ein Andrang von weissen, zur Ausdünstung bestimmten Säften nach dem Magen Statt finde, und derselbe als ein sehr zartes Gewebe von denselben durchdrungen und aufgelöst werde. *Lenhosök* leitet die Magenerweichung von einem Gehirnleiden ab, das sympathisch auf den Magen wirke und einerseits dessen Organisation so verändere, dass sie der auflösenden Kraft der thierischen Säfte nicht mehr widerstehen kann, andererseits die Säfte des Magens wahrscheinlich durch vermehrte Entwicklung von Essigsäure ungewöhnlich scharf und äzend mache. *Sundelin* leitet die Krankheit von einem fehlerhaften biochemischen Einfluss der Nerven des Magens, welcher oft metastatischen Ursprungs zu sein scheine, her. Manche Aerzte sehen die Krankheit für einen Ausgang der Magenentzündung an.

§. 1751.

Vorhersage. Die schon zu Stande gekommene Erweichung des Magens scheint unheilbar zu sein, wohl aber mag der Krankheitsprozess, der die Erweichung zur Folge hat, öfters durch die Hilfe der Kunst unterdrückt werden.

§. 1752.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Insofern ein Verdacht obwaltet, dass eine fehlerhafte Mutter- oder Ammenmilch die Schuld der Krankheit trage, muss schnell eine andere Amme gewählt werden, auch muss, wenn das Kind nicht durch die Mutterbrust ernährt wird, die grösste Sorgfalt auf die Nahrungsmittel gewandt werden, insbesondere werden Eichelkaffee mit Milch, Sago, Reis und Gersten-

schleim mit Kalbs-Boullion bereitet und Zwiebackbrei mit Fleischbrühe empfohlen, doch möchte oft bei sehr gereiztem Magen reine, warme Milch das zweckmässigste sein.

§. 1753.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* So lange die Natur der Krankheit nicht mit einiger Bestimmtheit bekannt ist, und auch eine sichere Erkennung der Krankheit kaum möglich ist, wornach also nicht mit Sicherheit beurtheilt werden kann, ob bei glücklichem Erfolg wirklich die erwähnte Krankheit vorhanden war, lässt sich schwer bestimmen, welche Behandlung die zweckmässigste sei. — Aus den Erscheinungen der Krankheit, namentlich dem Erbrechen, den Durchfällen und den Schmerzen geht hervor, dass der Magen und der Darmkanal in einem gereizten Zustande sich befinden, und man wird nur Nuzen gewähren, wenn man jedenfalls besänftigende Mittel anwendet, besänftigende Umschläge auf die Magengegend, Bäder und im Anfang der Krankheit wohl auch Blutegel, innerlich, nach *Cruveilhier's* Rath, das Opium, bei dem aber, besonders bei hervorstehendem Gehirnleiden, immerhin Vorsicht nothwendig ist. Da der Magen so sehr von dem Zustande des Gehirnes abhängt und in der Regel eine entzündliche Gehirnaffection vorhanden ist, so scheint es auch zweckmässig zu sein, Blutegel an den Kopf zu sezen, ja sie möchten zuweilen an dieser Stelle angewandt eine grössere Wirkung, als auf den Magen gesezt, äussern. Da bei dieser Krankheit der Magensaft eine sehr saure Beschaffenheit erhalten soll, und die Essigsäure wenigstens im Tode den Magen aufzulösen im Stande ist, so möchten neben der besänftigenden Methode die säuretilgenden Mittel angezeigt sein. — Von der Ansicht ausgehend, dass der nervus vagus entzündet sei, empfiehlt *Camerer* Blutegel

an den Hals gesezt und Einreibungen von Quecksilbersalbe an derselben Stelle, wobei er zugleich in der Voraussezung eines lähmungsartigen Zustandes des Magens das von *Pommer* gerühmte salzsaure Eisen anwendet. *Jäger* empfiehlt in chronischen Fällen eine Mischung von kohlensaurem Kali, wässerigter Rhabarbertinktur, Extract von unreifen Pomeranzen, Diacodiensyrup und Fenchelwasser, welche Zusammensezung für manche Fälle sehr zweckmässig zu sein scheint. *Nasse* rühmt die Salpetersäure, *Rhades* die oxygenirte Salzsäure und *Pitschaft* die brenzlige Holzsäure.

Dritte Gruppe
der dritten Ordnung der Bildungskrankheiten.

Die Erhärtung einzelner Gewebe.

Die einfachen Verhärtungen der Organe verdienen in eigenen Kapiteln abgehandelt zu werden, da sie, wie es scheint, nicht immer aus Entzündung entstehen und jedenfalls, wenn sie auch aus Entzündung entsprungen sind, lange Zeit für sich fortbestehende, von der Entzündung verschiedene Krankheitszustände sind und auch von den Afterbildungen, bei welchen das Gewebe zugleich verhärtet ist, wohl zu unterscheiden sind. Einstweilen habe ich, dem alten Herkommen gemäss, die Verhärtungen der einzelnen Organe blos gelegentlich bei der Darstellung der Entzündung dieser Theile beschrieben und mich begnügt, das Nothwendige über die Erhärtung als krankhaften Bildungsprozess in dem allgemeinen Theile der Bildungskrankheiten anzuführen und eben daselbst die allgemeinen Regeln über die Behandlung der Erhärtung der Gewebe anzugeben (§. 1451). — Hier, zwischen der Darstellung der Erweichung der Gewebe (von denen ich nur als Beispiel die Erweichung von zweierlei Organen angeführt habe) und der der Afterbildungen verdienen die Verhärtungen der einzelnen Organe beschrieben zu werden.

Vierte Gruppe

der dritten Ordnung der Bildungskrankheiten.

Die Afterbildungen.

Die Tuberkelbildung.

§. 1754.

Tuberkeln sind schon beinahe in allen Organen angetroffen worden. Es beginnt die Bildung derselben gewöhnlich in einem einzelnen Organ, späterhin werden aber meistens ein oder mehrere andere davon ergriffen. Es gibt verschiedene Arten der Entwicklung der Tuberkeln, im Allgemeinen herrscht aber in der Form dieser Afterbildungen nach den verschiedenen Organen, in welchen dieselben vorkommen, eine grosse Uebereinstimmung und es mag daher genügen, die Tuberkelbildung desjenigen Organs hier allein zu beschreiben, das am häufigsten diesen Desorganisationen unterworfen ist. Es sind dieses die Lungen in der Lungenschwindsucht.

Die Lungenschwindsucht.
(*Phthisis pulmonalis.*)

Morton (London 1689, a. d. Lat. Helmst. 1780). — *Reid* (a. d. Engl. v. Diel. Offenb. 1787). — *Portal* (aus d. Franz. mit Anmerk. v. Mühry. 2 Bde. Hann. 1789 u. 1802). — *Storr* (Stuttg. 1809). — *Bayle* (Paris 1810). — *Duncan* (Edinburg 1814, aus d. Engl. von Choulant. Lpz. 1817). — *Southley* (London 1814, aus d. Engl. von Radius. Lpz. 1820). — *Young* (Lond. 1815, u. in d. Samml. auserlesener Abhandl. B. 28). — *J. A. Walther* (2 Bde. Bamberg 1819). — *Engelhard* (Aarau 1823). — *Louis* (Paris 1825, a. d. Franz. v. Weese. Leipzig 1827). — *Laennec* (de l'auscult. méd.). — *Lorinser* (Lehre von den Lungenkrankheiten). — *Williams* (Path. u. Therap. d. Lungenkrankh., a. d. Engl. v. Velten. Bonn 1835). — *Clark* (a. d. Engl. übers. von Vetter und von Stannius. 1836).

§. 1755.

Unter Lungenschwindsucht versteht man in der Regel die Abmagerung des Körpers, welche durch ein Lungenleiden bedingt ist.

§. 1756.

Man nimmt gewöhnlich drei Arten von Lungenschwindsucht an:

1) Die *schleimige Lungenschwindsucht* (Phthisis pulm. pituitosa). Dieselbe besteht in einem langwierigen Katarrh oder einer langwierigen Luftröhren- und Bronchienentzündung mit reichlicher Schleimabsonderung, wodurch allmählig die Kräfte und die Stoffe des Körpers verzehrt und ein hektisches Fieber herbeigeführt wird. Die Kenntniss dieses Krankheitszustandes und der Behandlung desselben geht aus dem hervor, was über den Katarrh, die Luftröhrenentzündung und das hektische Fieber bekannt ist.

2) Die *knotige Lungenschwindsucht* (Phthisis pulm. tuberculosa). Aus dieser knotigen Lungenschwindsucht entwickelt sich in der Regel die eiterige und sie kann daher, in so weit dieses der Fall ist, als der erste

Zeitraum der eiterigen angesehen werden, in so fern es aber Knoten gibt, die niemals in Eiterung übergehen, muss sie als eine eigene Art der Lungenschwindsucht betrachtet werden. In der Natur kommen übrigens nicht wohl Fälle vor, in welchen neben andern Knoten nicht auch solche, die in Eiterung übergehen, vorhanden sind und es ist auch bei dem Lebenden unmöglich zu bestimmen, von welcher Beschaffenheit sämmtliche vorhandene Knoten sind, wesshalb es vergönnt sein wird, die Beschreibung der knotigen Schwindsucht in der Darstellung des ersten Zeitraums der tuberkulös-eiterigen Schwindsucht zu geben.

3) Die *eiterige Schwindsucht* (Phth. pulm. purulenta). Die Eiterbildung im Gewebe der Lunge kann sowohl durch Erweichung der Hepatisation oder eines gangränösen Schorfes als auch durch Erweichung von Lungenknoten geschehen. Die ersten beiden Krankheitsvorgänge wurden in dem Kapitel von der Lungenentzündung geschildert, der leztere ist nebst der vorausgehenden Tuberkelbildung die Krankheit, welche viele neuere Aerzte ausschliesslich Lungenschwindsucht genannt wissen wollen und es bleibt uns auch, da die übrigen Arten von Lungenkrankheiten, die zuweilen Abzehrung herbeiführen, schon in andern Kapiteln der besondern Krankheitslehre abgehandelt worden sind, nur noch übrig, die Tuberkelbildung und ihre Erweichung oder die Lungenschwindsucht in dem engern Sinne des Wortes darzustellen.

§. 1757.

Die **Lungenschwindsucht** (Phthisis tuberculoso-purulenta) durchläuft in der Regel drei Zeiträume, die man gewöhnlich das Stadium inflammationis s. Ph. incipiens, das Stad. suppurationis s. Ph. confirmata, und das Stad. colliquationis s. Ph. consummata nennt, die ich aber lieber den Zeitraum der Bildung der Knoten in der Lunge, den Zeitraum der Vereiterung der Lungenknoten und

den Zeitraum der sympathischen Verschwärung nennen möchte, doch kann die Krankheit auch im ersten Zeitraum schon tödtlich werden und die sympathische Verschwärung sehr frühe eintreten.

§. 1758.

1) *Zeitraum der Knotenbildung in der Lunge.* Die Individuen, welche von Lungenschwindsucht befallen werden, oder bei welchen sich die Lungenknoten zu bilden angefangen haben, haben meistens ein eigenthümliches Aussehen. Meistens bemerkt man mit Ausnahme der Farbe in der Mitte der Wange eine eigene glanzlose weissliche und zuweilen in's Wachsgelbe spielende Gesichtsfarbe, besonders längs der Nase; die Wangen zeigen oft eine leichte, nicht weit verbreitete Röthung, die am stärksten in der Gegend des Foramen infraorbitale ist und oft auch eine stärkere und bestimmt umschriebene Röthe, wie der rothe Fleck eines Apfels und sind hiebei mehr als gewöhnlich warm. Oft kann man an der Beschaffenheit dieser Röthe die leidende Seite erkennen, indem auf derselben die Röthe etwas stärker ist und auch einzelne mit Blut überfüllte kleine Gefässchen in ihr bemerkbar sind. Meistens sind die Kranken zu Morgenschweissen geneigt. Es glauben dieselben im Anfange nur an einem Katarrhe zu leiden, sie haben ein leichtes, trockenes oder mit Schleimauswurf verbundenes Hüsteln, und zuweilen einen starken, etwas Krampfhaftes zeigenden Husten, manchmal leiden sie auch an Herzklopfen. Die Percussion gibt noch überall einen hohlen Ton, doch ist dieselbe oft an einzelnen Stellen, besonders unter den Schlüsselbeinen und am häufigsten auf der rechten Seite etwas matter, als an andern Orten. Vermittelst des Stethoscops nimmt man das Respirationsgeräusch noch überall wahr, doch ist es an einzelnen Stellen und zwar denselben, an welchen die Percussion einen etwas mattern Ton zeigt, unvollkommener als an andern, das

heisst, man nimmt bei dem Einathmen des Kranken nicht die Vollfüllung einer so grossen Menge und dicht an einander gedrängter Lungenbläschen wahr, wie bei der gesunden Respiration.

Bei der Zunahme der tuberkulösen Entartung, wobei aber in der Regel zugleich einige Knoten in Eiterung übergehen und daher die Erscheinungen des zweiten Zeitraums sich zu entwickeln beginnen, geben nun die leidenden Stellen eine immer matter werdende Percussion, wobei sie sich auch zulezt bei dem Einathmen nicht mehr gehörig ausdehnen; man hört an diesen Stellen nur unvollkommen ein Respirationsgeräusch, welches oft mehr das Bronchialrauschen als das murmelnde Respirationsgeräusch ist, und mit etwas Schleimrasseln und einer Art Krächeln verbunden ist. Zulezt verschwindet oft das Respirationsgeräusch gänzlich und man hört entweder an diesen Stellen durchaus Nichts, oder man nimmt bei völliger Abwesenheit des Respirationsgeräusches die Bronchienstimme wahr. Die Kranken leiden nun mehr am Husten, sie empfinden zuweilen Stiche und auch einen drückenden Schmerz in der Brust, sie sind mehr oder weniger engbrüstig, was sich jedoch oft nur bei stärkern Körperbewegungen zeigt, zuweilen zeigen sich hiebei die Halsvenen und die feinen venösen Gefässchen in den Wangen überfüllt, die Kräfte der Kranken und ihr Körperumfang nehmen allmälig ab, sie haben oft fliegende Hize in den Wangen, besonders nach Tisch, Hize in den Handflächen, zuweilen Abends Frost, gegen Morgen Schweisse.

In den seltenern Fällen wird schon dieser Zustand, ohne dass sich ein reichlicher Eiterauswurf einstellt, tödtlich. Manchmal husten die Kranken kleine knochenartige oder den erdigen Concrementen ähnliche Stückchen aus. Meistens stellen sich Durchfälle ein. Die Beengung, die Kräfte- und Körperabnahme und das hektische Fieber

werden immer stärker, zulezt schwellen die Füsse an und es kommen auch oft noch die Zufälle von Brust- und Herzbeutelwassersucht hinzu.

§. 1759.

2) *Zeitraum der Vereiterung der Lungenknoten.* Gewöhnlich, bevor sich die höhern Grade des so eben angeführten Leidens entwickelt haben, fängt der Kranke an, reichlicher auszuwerfen. Von Anfang ist es mehr Schleim mit einer weisslichen und gelblichen, dickern Materie gemengt, oder man erkennt auch Bröckchen von käseartiger Materie der erweichten Lungenknoten, später wird es immer mehr vollkommen Eiter, welcher oft noch mit Schleim gemischt eine gelbliche und grünliche, zähe, oft sehr übel riechende Materie bildet, oder ganz rein ist und dickflüssige, gelbliche und grüne, runde Massen darstellt. Oft ist der Eiter mit Blut gemengt oder es stellt sich ein stärkerer Anfall von Bluthusten ein, wodurch zuweilen erst die Kranken auf ihr Leiden aufmerksam gemacht werden. Oeffnet sich eine grössere Ansammlung von erweichter tuberkulöser Masse (Eitersack, vomica) plözlich, so wird oft eine ausserordentliche Menge von Eiter ausgeleert, und es kann auch durch Anfüllung der Luftröhrenäste mit Eiter ein Erstickungsanfall eintreten. Indem sich nun durch Erweichung der Lungenknoten Aushöhlungen bilden, zeigt das Stethoscop das cavernöse Rasseln und immer mehr eine Art Gegurgel von einer immer dünner werdenden Flüssigkeit, die Respiration und der Husten werden cavernös und es stellt sich der Bruststton (Pectoriloquie) ein, welcher, wenn er unzweifelhaft ist, ein ganz sicheres Zeichen einer sog. tuberkulösen Aushöhlung ist. Der Brustton verschwindet oft vorübergehend wieder, wenn sich nämlich die Aushöhlung wieder mit Eiter vollfüllt. Ist eine Aushöhlung halb mit Eiter und halb mit Luft gefüllt, und steht der Weg offen, damit bei dem Athmen

Luft in den leeren Raum der Höhle dringen kann, so vernimmt man zuweilen das metallische Klingen. Ist die Aushöhlung sehr bedeutend, liegt sie nahe an der Oberfläche der Lunge und bildet ihre äussere Wand nur eine dünne Haut, so hört man zuweilen das Segelgeräusch. Bricht ein erweichter Lungenknoten in die Brusthöhle auf, was übrigens selten der Fall ist, so stellen sich die Zeichen des Empyems und meistens auch die des Pneumothorax ein.

Während nun die Vereiterung in den Lungenknoten vor sich geht, nimmt auch das hektische Fieber zu, die Schweisse werden schmelzender, der Harn wird trübe und soll zuweilen auf seiner Oberfläche ein schillerndes Häutchen und Fettaugen zeigen, die Kranken, die übrigens oft noch geraume Zeit ausser Bett sein können, und oft noch eine gute Esslust und keine Ahnung von ihrer schweren Krankheit haben, werden immer mehr abgezehrt und verlieren die Kräfte.

§. 1760.

3) *Zeitraum der sympathischen Verschwärung und der vollendeten Abzehrung des Körpers.* Gewöhnlich ohne Leibschmerzen und selbst ohne Schmerz bei einem starken Druck auf die der *Bauhin*'schen Klappe entsprechende Gegend des Unterleibs, zuweilen aber auch unter Leibschneiden stellen sich nun häufige, immer von neuem wiederkehrende Durchfälle ein, mit welchen oft die Speisen unverdaut abgehen, und in welchen zuweilen Blutspuren sich zeigen. Die Magengegend wird hiebei oft empfindlich, es stellen sich leicht Magenweh und Beschwerden der Verdauung ein. Während Durchfälle vorhanden sind, mildern sich oft die Schweisse, kehren aber doch immer wieder zurück und werden sehr schmelzend. Die Abzehrung erreicht allmälig den höchsten Grad, so dass die Kranken oft nur aus dem Gerippe und der Haut zu bestehen scheinen, ihre Augen liegen

tief, die Jochbogen stehen hervor, die Nase ist spiz, die Haare gehen aus, alle Rippen sind zu zählen, die Backenknochen ragen hervor, die vordern Glieder der Finger sind kolbig und die Nägel gekrümmt, um das vordere Ende des Knochens gebogen, die Stimme der Kranken ist heiser und sehr schwach, in dem Munde erscheinen Schwämmchen, die Füsse schwellen ödematös an. Hierbei sind die Kranken in der Regel in ruhiger und selbst in erhobener Gemüthsstimmung, sie glauben meistens nicht an ihren Tod, und entwerfen Pläne für eine ferne Zukunft, oft sehen sie auch ihr Ende mit Fassung herannahen, seltener sind sie ängstlich und kleinmüthig, was vorzüglich dann der Fall ist, wenn eine ausgebreitete Lungenverhärtung vorhanden ist, und dadurch oder durch Wassererguss in die Brusthöhle und die Höhle des Herzbeutels bedeutende Athmungsbeschwerden veranlasst werden. Der Tod tritt meistens aus Schwäche ein und zwar erlischt das Leben oft unversehens nach einer etwas anstrengenden Bewegung des Körpers, oft geht noch einige Zeit eine Schwerathmigkeit, wobei meistens der Auswurf stockt, voraus, und zuweilen stellt sich noch vor seinem Eintritt ein soporöser Zustand ein, manchmal macht ein Blutsturz vor völliger Abzehrung dem Leben unerwartet ein Ende.

§. 1761.

Nur in sehr seltenen Fällen tritt bei der Lungenschwindsucht Heilung ein oder vielmehr ein Aufhören der weitern Tuberkelentwicklung, wo sodann einzelne unentwickelte Tuberkeln und die durch die Tuberkelerweichung gebildeten leeren Höhlen zurückbleiben, der Kranke aber dabei sich wieder erholt.

§. 1762.

Es zeigt der Verlauf dieser Krankheit mancherlei Verschiedenheiten. Immer ist derselbe langwierig, doch

ist die Zeit seiner Dauer sehr verschieden, indem dieselbe oft viele Jahre und oft nur einige Monate beträgt (die galoppirende Schwindsucht). Zuweilen geräth das Lungengewebe im Umkreis der Tuberkeln in wirkliche Entzündung, wo man sodann das knisternde Geräusch wahrnimmt, und der Kranke mehr Stiche in der Brust fühlt. Diese Fälle sind es vorzüglich, in welchen der Verlauf der Krankheit schnell ist, eine stärkere Röthe der Wangen sich zeigt, mehr Hize in denselben, so wie in den Handflächen vorhanden und eine grössere Reizung im Pulse bemerkbar ist (die blühende Schwindsucht, Phthisis inflammatoria, sanguinea, florida). — In manchen Fällen besteht die Krankheit nach ihrer Haupterscheinung, den unbesiegbaren Durchfällen, mehr in einem Unterleibsleiden und es geben sich die Erscheinungen des Lungenleidens nur in geringerm Grade kund, so wie auch bei der Leichenöffnung in diesen Fällen oft nur eine geringere Tuberkelbildung in den Lungen, und dagegen eine ausgebreitete Verschwärung im Darmkanal und tuberkulöse Entartungen der Drüsen in grosser Menge gefunden werden. — Manchmal verlieren die Kranken nicht sehr viel von ihrem Körperumfang und sterben mehr an Erschöpfung der Kräfte in Folge des starken hektischen Fiebers, das zuweilen auch den nervösen und putriden Character annimmt. — Zuweilen bleibt die Lungenschwindsucht bis kurz vor dem Tode verborgen, was besonders dann leicht geschieht, wenn sie sich im Verlaufe einer andern chronischen Krankheit, z. B. des Scorbutes, der Lustseuche und während der Zufälle, die der Gebrauch einer grossen Menge von Mercur veranlasst, entwickelt. Man schreibt in diesen Fällen die Lungenschwindsucht gerne diesen Krankheiten zu und nennt sie scorbutische, venerische, mercurielle Lungenschwindsucht, doch leugnet *Laennec* den Ursprung derselben aus diesen Krankheitszuständen.

§. 1763.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Nach *Laennec* entwickelt sich die tuberkulöse Materie unter zwei Hauptformen, der der *isolirten Körper* und der der *Infiltration*. Die erstern bilden vier Varietäten, die hirseförmigen Tuberkeln, die rohen Tuberkeln, die tuberkulösen Granulationen und die in einen Balg eingeschlossenen Tuberkeln (Balgtuberkeln), die leztere bietet drei Verschiedenheiten dar, die graue, die gallertartige und die gelbe Infiltration; immer aber hat diese tuberkulöse Materie im Anfange das Aussehen einer grauen und durchscheinenden, und nach und nach gelblich-dunkel und dicht werdenden Materie, welche sich allmälig zu einer eiterartigen Materie erweicht und durch die Luftröhrenäste ausgeleert wird und Höhlungen zurücklässt, welche unter dem Namen Lungengeschwüre bekannt sind und von *Laennec* tuberkulöse Aushöhlungen genannt wurden.

Die *hirseförmigen Tuberkeln* sind die gewöhnlichste Form; ihr Aussehen ist das von kleinen, grauen, halbdurchscheinenden Körnern, von einer geringern Consistenz als die der Knorpel, von der Grösse eines Hirsekornes bis zu der eines Hanfkornes, von unregelmässig rundlicher Form. Diese Körner vergrössern sich durch gegenseitige Aufnahme in einander, und vereinigen sich so nach Gruppen. Bevor diese Vereinigung geschieht, entwickelt sich ein kleiner, gelblich-weisser und dunkler Punkt im Mittelpunkt von einem jeden Tuberkel und nimmt zulezt, von dem Mittelpunkt nach aussen sich vergrössernd, das ganze Tuberkel ein. Endlich bildet die ganze Gruppe eine gleichförmige Masse von weisslich-gelber Farbe und von einem weniger festen und feuchten Gewebe als die Knorpel sind. Man nennt sie das gelbe rohe oder einfach das *rohe Tuberkel*. Wenn die hirseförmigen Tuberkeln sehr getrennt von einander

stehen, so erreichen sie oft, ohne sich mit einander zu vereinigen, die Grösse von einem Kirschkern und selbst von einer Mandel, man erkennt sodann meistens, dass sie nur einen einzigen Kern haben, und sie behalten auch ihre rundliche Form bei. Im Anfange der Bildung der Knoten ist das Lungengewebe gesund und knisternd.

Die *tuberkulösen hirseförmigen Granulationen* sind gewöhnlich in grosser Zahl in der Substanz der Lunge zerstreute, vollkommen runde oder eirunde, ganz durchscheinende, farblose Körnchen, von der Grösse eines Hirsekornes, welche sich nicht zu Gruppen vereinigen, oder wenn sie auch ihrer Menge wegen sehr nahe beisammen stehen und daher feste Massen bilden, doch bei dem Einschnitt in dieselben durch gesundes oder mit Serum leicht infiltrirtes Gewebe von einander getrennt erscheinen. — Wenn die die tuberkulöse Aushöhlung gewöhnlich auskleidende, halb knorpelartige falsche Membran schon gebildet ist, bevor das Tuberkel erweicht ist, und also das rohe Tuberkel von ihr eingeschlossen wird, so stellt dieses das *Balg-Tuberkel* dar.

Die *graue tuberkulöse Infiltration*, welche vorzüglich um die tuberkulösen Aushöhlungen, aber auch ohne dieselben sich bildet, besteht in grössern Massen tuberkulöser Materie von dem ersten Grade ihrer Entwicklung. Das Lungengewebe ist dicht, feucht, gänzlich für die Luft unzugänglich und von einer grauen oder etwas dunkeln Farbe, und wenn man ein dünnes Blättchen davon ausschneidet, so ist es beinahe so fest wie Knorpel, hat eine glatte, polierte Oberfläche, und man erkennt in seinem Gewebe Nichts mehr von den Lungenzellen. — Die *gallertartige tuberkulöse Infiltration*. Man findet häufig zwischen den hirseförmigen Tuberkeln eine wenig ausgebreitete Infiltration von einer sehr feuchten oder vielmehr flüssigen, ungefärbten oder etwas blutigen, einer Gallerte ähnliche Materie. Man unterscheidet diese

Infiltration vom Oedem der Lunge dadurch, dass man mehr und mehr keine Luftzellchen erkennt, welche vielmehr in Gallerte umgewandelt zu sein scheinen; auch bilden sich aus dieser Gallerte gelbe, rohe Tuberkeln. — Die *gelbe tuberkulöse Infiltration* bildet sich, indem in der grauen Infiltration eine gewisse Menge kleiner, gelber und schattiger Punkte sich entwickelt, welche sich vermehren, vergrössern und am Ende das ganze verhärtete Stück der Lunge einnehmen. Ebenso verwandelt sich die gallertartige Materie in diese gelbe, der Substanz der rohen, gelben Tuberkeln ähnliche Substanz, indem sie allmälig härter wird, wobei man in dem durchsichtigsten und flüssigsten Theile der gallertartigen Materie kleine, gelbe, offenbar tuberkulöse Punkte entstehen und in rohe, gelbe Tuberkeln sich umwandeln sieht. Diese gelben, tuberkulösen Massen der gelben Infiltration sind unregelmässig und eckig, und bilden, wenn sie an der Oberfläche der Lunge liegen, keinen Vorsprung. Sie nehmen zulezt ganz die Farbe der andern rohen Tuberkeln an.

Auf welche Weise sich die rohen Tuberkeln auch mögen gebildet haben, so erweichen sie sich zulezt und werden flüssig. Diese Erweichung geschieht immer zuerst in dem Mittelpunkt von jeder Masse. Die tuberkulöse Materie wird von Tag zu Tag weicher und wird in eine bröckliche, käseartige oder fettartige Materie verwandelt, in deren Mitte sich der erste Tropfen Eiter bildet. Endlich erreicht die Erweichung auch allmälig den Umfang des Tuberkels und wird vollständig. Die erweichte Materie gleicht bald einem dicken, geruchlosen, gelben Eiter, bald scheidet sie sich in zwei Theile, wovon der eine sehr flüssig, mehr oder weniger durchscheinend, und wenn er nicht mit Blut gemischt ist, farblos ist, der andere dunkel und von der Consistenz eines weichen, zerreiblichen Käses ist. In dem leztern

Falle, welcher vorzüglich bei scrophulösen Subjecten vorkommt, gleicht die Materie oft den Molken, in welcher Theilchen einer käseartigen Materie schwimmen.

Wenn die erweichte Materie durch die Luftröhrenäste ausgeleert ist, so lässt sie eine Höhle zurück. Selten ist nur *eine* solche Aushöhlung vorhanden. Meistens sind diese Höhlungen von rohen und hirseförmigen Tuberkeln umgeben, diese erweichen sich allmälig und öffnen sich in die schon bestehende Höhle, wodurch die gewundenen Gänge entstehen, die oft bis in die entferntesten Theile der Lunge dringen. Diese Höhlen durchziehen oft Bande oder Säulen von verdichtetem und mit tuberkulöser Materie infiltrirtem Lungengewebe. Selten sind diese Säulen Blutgefässe, welche beinahe immer obliterirt sind; die Bronchienäste werden aber immer sehr schnell zerstört und öffnen sich in die tuberkulösen Aushöhlungen. — So wie diese Höhlen anfangen sich zu entleeren, umkleiden sich die Wände mit einer dünnen, gleichförmigen, dunkelweisslichen, ziemlich weichen und zerreiblichen falschen Haut, welche man leicht mit dem Messer hinwegschaben kann. Manchmal findet man an der Stelle dieser Haut eine pseudomembranöse Ausschwizung, weniger dicht und mehr durchscheinend, als diese, und welche in der Regel die Wände der Aushöhlung nur stellenweise umkleidet. Manchmal findet man auch diese Ausschwizung unter der erstern, welche sodann nicht gehörig anhängt und zerrissen ist. Es scheint, dass diese zweite Haut nur der erste Grad der Erweichung der erstern ist. Manchmal findet man auch weder von der einen, noch von der andern dieser Häute eine deutliche Spur, und die Wände der Aushöhlung bildet das Lungengewebe, welches verhärtet und mit tuberkulöser Materie infiltrirt ist. Wenn die Krankheit lange anhält, so bilden sich auf der der Aushöhlung zugewandten Fläche der er-

wähnten falschen Haut weisslich-graue, halbdurchscheinende Streifen, von einem dem Knorpel ähnlichen, aber etwas weichern Gewebe, welche grösser werden, sich vereinigen und zuletzt eine knorpelartige Haut bilden, welche die Aushöhlung vollständig auskleidet und sich in der innern Haut der Luftröhrenäste, die sich in die Höhle öffnen, endiget.

Ausser diesen, in Erweichung übergehenden Lungenknoten trifft man auch knorpel- und knochenartige, so wie stein- oder kreidenartige Concretionen in den Lungen an. Dieselben sind entweder in Bälge eingeschlossen oder nicht, oft befinden sie sich in der Mitte von erweichter tuberkulöser Materie, wo sie leicht mit dieser ausgeworfen werden. *Laennec* hat nachgewiesen, dass diese kreidenartigen Concremente nicht aus eingeathmetem Steinstaube gebildet sind, da sie aus phosphorsaurem Kalke bestehen, während jener in der Regel andere Bestandtheile hat. Endlich findet man auch in der Lunge von Individuen, welche an einem der Lungenschwindsucht ähnlichen Krankheitszustand starben, die scirrhöse, die hirnartige Masse und die Melanose, worüber die Kapitel über den Markschwamm und die Melanose zu vergleichen sind.

§. 1764.

Die Anlage zur Lungenschwindsucht ist oft angeerbt und gibt sich durch eine eingedrückte Brust, langen Hals, flügelförmig hervorstehende Schulterblätter, umschriebene Röthe der Wangen, und im Allgemeinen durch einen zarten Bau zu erkennen, auch bluten solche Individuen in dem Knabenalter viel aus der Nase; ferner sind die Scrophulösen zu dieser Krankheit geneigt, Weiber werden mehr als Männer von ihr befallen, und der Ausbruch geschieht vorzüglich in dem Alter nach der Entwicklung der Mannbarkeit bis zum 35sten Jahre, wiewohl man die Krankheit auch ziemlich häufig

bei Individuen von jedem andern Alter wahrnimmt und selbst oft in Fötusleichen die Merkmale derselben findet.

§. 1765.

Gelegenheitsursachen. Bei vorhandener starker Anlage entwickelt sich die Lungenschwindsucht um eine bestimmte Zeit des Lebens von selbst und oft auch bei der sorgfältigsten Verhütung aller schädlichen Einflüsse unaufhaltsam. Als Gelegenheitsursachen wirken übrigens, besonders bei vorhandener Anlage, alle Ursachen, die entzündliche und catarrhalische Affectionen der Lunge oder Bluthusten hervorbringen können, insbesondere eine kalte Atmosphäre, daher die Krankheit mehr in den nördlichen, als südlichen Ländern zu Hause ist, das andauernde Einathmen von Staub und andern reizenden Stoffen, daher die Krankheit häufig bei Müllern, Webern, Seilern, Steinhauern etc. vorkommt, zu reichlicher Genuss geistiger Getränke, unterdrückter Monatsfluss oder Hämorrhoiden, geheilte alte Fussgeschwüre, zurückgetretene oder unvollkommen geheilte Hautausschläge, insbesondere Kräze (von *Autenrieth*, so wie von *Hahnemann* wohl viel zu allgemein als die Ursache dieser Krankheit beschuldigt), vielleicht auch eine Art Ansteckung durch andauerndes Beisammenwohnen mit Schwindsüchtigen und Schlafen in dem Bette oder Tragen der Kleidungsstücke derselben, doch wird diese Ursache von *Laennec* geleugnet, auch manche schwächende Einflüsse, wie z. B. andauernder Kummer, lange dauernde Durchfälle, zu lange fortgeseztes Säugen, die Onanie etc., endlich werden auch der Scorbut, die Lustseuche, die Gicht, welche wohl manchmal zur Entstehung der erdigen Concremente beitragen mag, und der zu reichliche Gebrauch von Queksilberpräparaten beschuldigt.

§. 1766.

Das Wesen der Krankheit ist, wie *Laennec* ge-

nügend bewiesen hat, nicht in Entzündung zu suchen, und die Krankheit kein Produkt der Entzündung, sondern sie ist ein Fehler der Ernährung, deren nähere Ursache noch unbekannt ist. Mir scheint, ähnlich wie bei der Entzündung, ein Prozess statt zu finden, in welchem die sämmtlichen, im Organengewebe liegenden Stoffe eine wechselseitige Verbindung eingehen und sich zulezt zu einem gleichförmigen Stoffe, dem Eiter, vereinigen. Es mögen hier wohl aus den Gefässen in das Gewebe Stoffe ausschwizen, aber eine eigentliche Entzündung ist nicht vorhanden, indem das Blut nicht stockt und sich nicht in eine gleichförmige rothe Masse umwandelt. *Ich habe* Tuberkeln mit dem Mikroscop untersucht und gefunden, dass in ihnen durchaus keine entzündliche Blutüberfüllung vorhanden ist, und dass auch gewöhnlich das sie zunächst umgebende Lungengewebe ohne Entzündung ist. Dass der erwähnte Prozess zwischen den verschiedenen Substanzen des Lungengewebes statt finde, dafür spricht die Verzehrung des Gewebes, die Umwandlung des Gewebes in eine halbflüssige Masse, die wiederum sich in eine andere, in Eiter übergehende Substanz verwandelt, bei der gallertartigen Infiltration, und endlich die Eiterbildung selbst, welche bei der Entzündung das Resultat eines ähnlichen Vorganges ist. So scheint mir die Tuberkelbildung und Erweichung ungefähr derselbe Prozess zwischen den verschiedenen Substanzen des Organengewebes, namentlich zwischen Nervensubstanz und den ihr entgegenstehenden Substanzen im Gewebe selbst, etwa mit Theilnahme von Lymphe, welche aus den Gefässen ausschwizt, zu sein, den wir in der Entzündung vorzüglich zwischen Nerven und Blut bestehend erkannt haben.

§. 1767.

Vorhersage. Die hier beschriebene Lungenschwindsucht ist in der Regel tödtlich, doch sieht man in selte-

nen Fällen Kranke, bei welchen sich das Uebel selbst zu einem bedeutenden Grade entwickelt hatte, wiederum genesen, wie ich selbst einige wenige derartige Fälle beobachtet habe. Mit diesen Fällen sind nicht die auf Lungenentzündung oder auf Verwundung der Lunge folgende Eiterung und die bei der Luftröhrenentzündung oft eintretende eiterartige Absonderung zu verwechseln, welche viel häufiger einen günstigen Ausgang nehmen.

§. 1768.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Der Kranke muss aufs sorgfältigste Alles vermeiden, was Katarrh oder Brustentzündungen veranlassen könnte, und es müssen, sind solche Affectionen entstanden, dieselben sorgfältig behandelt werden, wobei bei entzündlichen Zuständen oft kleine Aderlässe von Nuzen sind. Der Kranke darf nur eine wenig reizende Nahrung und keine geistigen Getränke geniessen, und muss sich mehr an eine Milchdiät halten, das Blasen von Instrumenten, Bergsteigen etc. muss er vermeiden, ein nachtheilig wirkendes Handwerk muss er, wo möglich, aufgeben, zur Schwindsucht geneigte Frauen dürfen ihre Kinder nicht stillen, doch sezt die Schwangerschaft den Fortschritten der Schwindsucht oft auf die Dauer derselben Grenzen, die Einwirkung der kalten Luft muss möglichst vermieden werden etc. Sowohl durch Vermeidung auf den Kranken wirkender nachtheiliger Verhältnisse, als auch zuweilen durch stattfindende wirklich wohlthätige Einflüsse ist oft die Veränderung des Wohnortes, welches *Laennec* für das vorzüglichste Mittel in der Lungenschwindsucht hält, sehr zuträglich. Es wird vorzüglich der Aufenthalt in warmen Ländern und am Meere gelegener Gegenden, der Aufenthalt auf dem Lande, an milden und mit Tannenwäldern versehenen Stellen von Gebirgen, das Wohnen in Kuh-

ställen und besonders auch das Seereisen empfohlen. Auch soll der Aufenthalt in der mit Schwefelwasserstoffgas gemischten Luft an den Schwefelquellen zuträglich sein, wie denn auch *Beddoes* das Einathmen von Stickgas, Wasserstoffgas etc. empfohlen hat. Bei vorhandener Scrophelkrankheit muss gegen diese gewirkt werden, glaubt man eine schlecht geheilte Kräze als Ursache der Schwindsucht annehmen zu können, so kann man die Brechweinsteinsalbe einreiben lassen, und den Schwefel, die *Plummer*'schen Pulver etc. innerlich geben; auch ist selbst die Einimpfung der Kräze empfohlen worden; ebenso muss auf andere Kachexien Rücksicht genommen werden.

§. 1769.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Wir können uns zur Aufgabe sezen, neue Tuberkelbildung zu verhindern, schon gebildete Tuberkel aufzulösen, die tuberkulöse Erweichung zu befördern und eine zu reichliche Eiterung zu beschränken. — Die meisten als specifisch gerühmten Mittel können wohl zu dem einen oder zu dem andern Zwecke angewandt werden, doch ist keines aufgefunden worden, das die Krankheit auf die eine oder die andere Weise zu heilen vermöchte.

Um neue Tuberkelbildung zu verhüten, hat man wiederholte Aderlässe gerühmt, es lässt sich jedoch schon aus dem Grunde nicht viel von ihnen erwarten, dass die Tuberkeln nicht aus Entzündung hervorgehen, auch zeigt die Erfahrung, dass sie den bezweckten Erfolg nicht haben und dagegen leicht durch Schwächung der Kräfte schaden. Zu demselben Zwecke sind Blasenpflaster, Fontanelle, Haarseile, Einreibungen der Brechweinsteinsalbe, Aezmittel und Moxen empfohlen worden, welche aber ebenfalls die Tuberkelentwicklung nicht aufzuhalten im Stande sind. Am meisten vermag noch

die sorgfältigste Erfüllung der im 1768ten Paragraphen angegebenen Vorschriften, die Tuberkelbildung für einige Zeit zu beschränken; auch ist es vortheilhaft, die Lungenausdünstung zu befördern, was einigermaassen durch reichliches Trinken von Selterserwasser mit Milch, von Molken, Abkochungen von Graswurzel, Eibisch, Süssholz etc. scheint bewirkt werden zu können. *Ramadge* (a. d. Engl. v. Hohnbaum 1835) versichert, durch lange fortgesezte Inhalationen von Wasserdämpfen, vermittelst einer Röhre mit enger Mundöffnung, wodurch auf eine künstliche Weise ein Emphysem der Lunge erzeugt werde, öfters die weitere Tuberkelbildung verhütet und selbst Aushöhlungen zur Vernarbung gebracht zu haben.

Um schon gebildete Tuberkeln aufzulösen, scheint sich von den auflösenden Mitteln etwas erwarten zu lassen, doch haben sie auch noch wenig Erfolg gezeigt und die wirksamsten unter ihnen, namentlich Jod, werden, wegen ihrer eigenthümlich reizenden Wirkung, oft nicht ertragen. Eher können gebraucht werden: die Extracte von Graswurzel, Taraxacum, Marrubium album etc., die auflösenden narkotischen Mittel, insbesondere die Digitalis und die blausäurehaltigen Mittel (Nro. 98), so wie auch Hyoscyamus, Cicuta, Aconit, das Phellandrium aquaticum (Nro. 99) etc., ferner der Salmiak, das Seewasser, die Milchlinge von Häringen, das Calomel, der Goldschwefel, die Seife, die Terra ponderosa salita etc. Mit Aurum muriaticum natronatum stelle ich gegenwärtig Versuche an.

Die Tuberkel in Erweichung zu bringen, hat man selten die Anzeige, indem es am vortheilhaftesten ist, dass die Entwicklung der Tuberkeln möglichst zurückgehalten wird, doch kann man dieselbe versuchen, wenn die Knoten zu sehr als Reiz wirken und das Athmen durch die tuberkulöse Anpfropfung zu sehr gehemmt ist. Man lässt erweichende Dämpfe einathmen und auch

warme Umschläge auf die Brust machen. Auch scheinen der Salmiak, Antimonialmittel etc. die Auflösung und die Ausleerung der tuberkulösen Materie zu befördern.

Um eine zu reichliche Eiterung zu beschränken wendet man das isländische Moos (Nro. 100), das Millefolium, die Cardobenedicten, die Polygala amara, die Cascarille, die Alcornoque-Rinde, die China, das Blei (Nro. 101) an. Auch wird diese Wirkung der Myrrhe, dem peruvianischen, dem Copaivbalsam, dem Terpenthinöl, dem Asphaltöl etc. zugeschrieben. Zu demselben Zwecke mag auch das Einathmen der Dämpfe von Wachs, Pech, Theer, Weihrauch, Storax etc., mit welchen entweder das Zimmer durchräuchert oder welche mit Vorsicht durch die *Mudge*'sche Maschine eingeathmet werden können, in Anwendung gebracht werden. Um einen faulichten, übelriechenden Auswurf zu verbessern, hat *Beddoes* das Einathmen von fixer Luft empfohlen.

§. 1770.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Die vorzüglichsten nachtheiligen Folgen der Tuberkelbildung und Vereiterung der Lunge sind die Abmagerung und das Schwinden der Kräfte. Man sucht dieselben möglichst aufzuhalten durch eine gute, nährende Kost, frisch gemolkene Kuhmilch, die Milch der Ziege, der Eselin, so wie auch Frauenmilch, die Molken, das Eigelb, Sago, Salep, Schneckenbrühe, Gallerte, gut bereitetes Fleisch u. s. w., so wie durch isländisches Moos, China etc. In dem lezten Zeitraum der Krankheit müssen *Hoffmann*'sche Tropfen und ähnliche Mittel in Bereitschaft gehalten werden, um bei den nun leicht eintretenden Ohnmachten gebraucht zu werden.

Kommt zur Tuberkelbildung Entzündung des Lungengewebes hinzu, so sezt man Blutegel oder nimmt eine kleine Aderlässe vor. Bei zu starkem Fieber kann man etwas Salpeter, verdünnte Mineralsäuren etc. geben und

gibt zur Nahrung mehr Obstspeisen. Den gewöhnlichen Husten sucht man durch einhüllende und besänftigende Mittel und vor allem durch Opium und die Morphiumtropfen (Nro. 102) zu stillen. Dieses Mittel wird auch dem Kranken, um denselben durch Schlaf zu erquicken, um die Durchfälle zu mässigen, Kolikschmerzen zu heben etc., gereicht, und ist daher mit Recht Solamen Phthisicorum genannt worden. Gegen Durchfälle wendet man übrigens auch Columbo und andere Mittel an. Die Schweisse dürfen nur mit Vorsicht gemässigt werden, wozu die gegen die Ephidrosis überhaupt gebräuchlichen Mittel in Anwendung gebracht werden können. Ebenso muss man die Schwämmchen etc. zu heilen suchen.

Die Kehlkopf- und Luftröhrenschwindsucht.

(Phthisis laryngea, Phth. trachealis.)

Flormann (Samml. auserl. Abhandlungen. B. XVI.). — *Cayol* (Paris 1810). — *Neumann* (Horn's Archiv. 1811). — *Sachse* (Hannover 1821). — *Bock* (Diss. Berlin 1825).

§. 1771.

Die Kehlkopf- und Luftröhrenschwindsucht ist die Abzehrung des Körpers, welche durch Vereiterung in dem Kehlkopf und der Luftröhre entsteht.

§. 1772.

In der Regel kommt diese Krankheit in Verbindung mit der Lungenschwindsucht vor, so dass entweder die Symptome derselben eintreten, wenn die Lungenschwindsucht sich bis zu einem gewissen Grade entwickelt hat, oder sich zuerst ausbilden und nur die Vorläufer der leztern Krankheit sind. Entwickelt sich die Luftröhren-

schwindsucht vor der Lungenschwindsucht, so stellt sich die Krankheit im Anfange nur als eine Heiserkeit dar; es verräth sich aber das tiefere Leiden durch den der Schwindsucht eigenen Gesichtsausdruck und den Körperbau des Kranken, durch eine aussergewöhnliche Erregbarkeit des Herzens, Neigung zu Morgenschweissen etc. Der Kranke fühlt nun immer mehr einen stechenden Schmerz, ein Brennen und Kizel im Kehlkopfe, der zu einem trockenen und zum Theil mit pituitösem und eiterig-mucösem Auswurf verbundenen Husten reizt. Bei stärkerer Berührung des Kehlkopfes von aussen zeigt sich eine krankhafte Empfindlichkeit in demselben und zuweilen gibt sich auch eine solche beim Schlingen kund. Meistens erscheint hiebei das Gaumensegel und die hintere Wand leicht entzündlich injicirt. Allmälig nehmen die Kräfte und der Körperumfang des Kranken ab und es stellen sich hektische Fieberregungen ein. Nunmehr wird der Auswurf vollkommen eiterig und löst sich oft in grosser Masse in dem Kehlkopf und der Luftröhre los; auch enthält er oft Blut. Die Stimme wird ganz heiser und leise und bei dem Ein- und Ausathmen ist ein Zischen in dem Kehlkopfe vernehmbar, so wie auch der Husten einen eigenen zischenden Ton erhält. Die Lunge selbst zeigt sich nun immer deutlicher leidend, indem sie immer mehr von Tuberkeln in den obern Kegeln besezt wird. Auch stellen sich colliquative Durchfälle ein, Schwämmchen kommen hinzu, zuweilen schwellen auch die Füsse ödematös an und der Kranke stirbt, nachdem die Krankheit viele Monate oder selbst Jahre gedauert hat, an Erschöpfung, nachdem oft auch noch Erstickungsanfälle hinzugekommen sind. — Ist die Lungenschwindsucht zuerst vorhanden, so stellen sich, nachdem diese eine gewisse Höhe erreicht hat, auch Heiserkeit und die übrigen Zeichen der Luftröhrenschwindsucht ein.

§. 1773.

Bei der Leichenöffnung findet man auf der Epiglottis, auf der innern Fläche des Kehlkopfs und der Luftröhre Geschwüre, oft kleine tuberkulöse Massen, auch fleischartige Auswüchse, und die Knorpel nicht selten von Caries ergriffen. Die Stimmrize ist zuweilen ödematös. In der Lunge finden sich meistens Tuberkeln vor.

§. 1774.

Rechnen wir zu dieser Krankheit nur die Geschwüre, welche aus Tuberkeln entstanden sind, so ist die Pathogenie dieser Krankheit ganz dieselbe, wie der Lungenschwindsucht; es können aber Geschwüre in diesen Theilen auch auf andere Weise sich bilden und die Excrescenzen, welche man findet, haben oft einen ganz andern Character. Solche Zustände können veranlasst werden durch alle Einflüsse, welche eine schleichende Kehlkopf- und Luftröhrenentzündung veranlassen können und sind nicht selten syphilitischen und scrophulösen Ursprungs.

§. 1775.

Vorhersage. Das erwähnte Leiden wird wohl häufiger geheilt, als die Lungenschwindsucht, jedoch, wie es scheint, mehr solche Geschwüre, welche nicht tuberkulösen Ursprungs sind.

§. 1776.

Behandlung. Im Anfange der Krankheit zeigen sich wiederholt gesezte Blutegel sehr nüzlich, so wie auch Fetteinreibungen, Umschläge, das Einathmen von warmen Dämpfen, ableitende Mittel, innerlich einhüllende und auf die Absonderungen der Schleimhaut wirkende Mittel, Calomel etc. Ist die Krankheit syphilitischer Herkunft, so ist eine durchgreifende Quecksilberkur nothwendig. Im Uebrigen wird die Krankheit wie die Lungenschwindsucht behandelt.

Die Bildung des Melanosengewebes.

(*Melanosis.*)

Bayle (Recherches sur la Phthisie pulm.). — *Laennec* (sur l'auscult. méd.) — *Breschet* (a. d. Franz. übers. in Harless neuen Jahrb. d. deutsch. Med. und. Chir. B. 5.). — *Merat* (Dict. des Scienc. med.). — *Heusinger* (Eisenach 1823).

§. 1777.

Die Melanosen stellen schwarze, bei dem ersten Anblick oft drüsenartige Hervorragungen dar, welche oft nur die Grösse eines Masernfleckes haben, oft aber auch die des grössten Tuberkels erreichen. Sie haben im Anfange die Consistenz der lymphatischen Drüsen, erweichen nach und nach, wo sich oft eine rothbräunliche mit schwarzen Krummen vermischte Flüssigkeit ausdrücken lässt, und verwandeln sich zulezt in einen schwarzen Brei, wie mit Russ bereitet. Diese schwarzen Massen haben keinen eigentlichen organischen Bau, sie besizen insbesondere keine Nerven und keine Blutgefässe, und zeigen nur etwas Körniges oder Blätterartiges. Sie sind entweder in Bälge eingeschlossen oder in das Gewebe eines Organs infiltrirt, oder auf seine Oberfläche abgelagert. Nach den von *Brechet* angeführten chemischen Analysen ist die Melanose ein Absaz der färbenden Materie und des Faserstoffs des Blutes, beide aber in einem besondern Zustande, in welchem sich dreierlei fettige Materien unterscheiden lassen.

§. 1778.

Die Melanosen kommen in den Lungen, der Leber, der Milz, im Zellgewebe, in der Haut, auf der Oberfläche der Eingeweide und auch, jedoch am seltensten im Gehirne und Rückenmarke vor. In den Lungen, wo

sie am häufigsten angetroffen werden, erzeugen sie Husten und Athmungsbeschwerden und einen schleimigen Auswurf, womit zuweilen die erweichten Massen ausgeleert werden. Es entstehen hierdurch Aushöhlungen, welche durch die Pectoriloquie angezeigt werden. Die Kranken zehren hierbei ab und werden zuweilen auch wassersüchtig. *)

Die krebshafte Verhärtung und der Krebs.

Roux (in Desault's auserlesenen chirurg. Wahrnehmungen, a. d. Franz. v. Dörner. Frankfurt 1806). — *E. Home* (London 1805). — *Bayle* (Bibl. med.). — *Wenzel* (Mainz 1815). — *Abernethy* (surg. Works). — *Scarpa* (Milano 1825). — *v. Walther* (Journ. für Chir. u. Augenheilk. B. 5.). — *Recamier* (2 Vol. Paris 1829). — *Rust* (Aufsäze und Abhandlungen. 2 Bde. Berl. 1834 u. 1836).

§. 1779.

Die krankhafte Verhärtung (Scirrhus) ist eine sehr harte (beinahe steinharte), in der Regel höckerige, begrenzte Geschwulst, welche meistens zulezt in eine, alle Theile zerstörende, Verschwärung übergeht. Der Krebs ist die aus dem Scirrhus entstandene, um sich fressende Verschwärung.

§. 1780.

Entwickelt sich der Scirrhus in äussern Theilen, so erkennt man dieses an der Entstehung einer sehr harten

*) Da dieser krankhafte Zustand in der Regel nur nach dem Tode erkannt wird und wir auch noch kein Heilverfahren desselben kennen, so ist er bis jezt noch mehr Gegenstand der pathologischen Anatomie, als der Therapie.

Stelle im Gewebe des ergriffenen Organs. Dieselbe wird allmälig grösser, die hierdurch entstehende Geschwulst zeigt bei dem Befühlen höckerige Unebenheiten, selten ist sie glatt, manchmal an einzelnen Stellen weich und elastisch, sie ist schwer und gewöhnlich im Anfange unschmerzhaft. Die Haut, die die Geschwulst bedeckt, hat die natürliche Beschaffenheit.

§. 1781.

Geht der Scirrhus in den Krebs über, so empfindet der Kranke von Zeit zu Zeit heftige stechende Schmerzen in der Geschwulst und diese wird, indem sie zugleich grösser und höckeriger wird, auch andauernd empfindlich, die Haut über derselben wird violett-roth, es zeigen sich viele, sehr erweiterte Venen in der Haut, und diese klebt nun mit der scirrhösen Geschwulst fest zusammen. Endlich zeigen sich eine oder mehrere kleine weiche Stellen, an welchen unter der Haut etwas Flüssigkeit zu sein scheint, und diese dünne wird und aufzubrechen droht (der verborgene Krebs, Cancer occultus).

Hat sich eine solche Stelle geöffnet (der offene Krebs, Cancer apertus), so fliesst eine sehr stinkende, bräunliche und oft blutige Jauche aus. Die Ränder um das hierdurch entstandene Geschwür sind meistens aufgeworfen und hart, der Boden sehr uneben, höckerig. Durch die Verschwärung wird nun zwar ein Theil der schon gebildeten scirrhösen Masse verzehrt, es entstehen aber im Grunde der Geschwüre schwammige Wucherungen, das scirrhöse Gebilde wächst selbst und im Umfange der Geschwulst geht immer mehr gesundes Organengewebe in scirrhöse Verhärtung über, so dass zulezt die krebshafte Geschwulst eine sehr beträchtliche Grösse erhält. Gewöhnlich schwellen die benachbarten lymphatischen Drüsen an, zuweilen entwickelt sich die krebshafte Entartung auch noch in andern Theilen als in dem zuerst ergriffenen, der Kranke magert ab, erhält eine blasse

und erdfahle Gesichtsfarbe und einen eigenthümlichen schmerzhaften Ausdruck in den Gesichtszügen, es stellt sich ein hektisches Fieber ein und durch dasselbe, so wie durch die heftigen Schmerzen und zuweilen durch Blutflüsse, welche sich aus den verschwärten Stellen ergiessen, werden die Kräfte des Kranken vollends aufgerieben.

§. 1782.

Der Krebs zeigt in seiner Gestalt und in seinem Verlaufe mancherlei Verschiedenheiten, welche grösstentheils von der Verschiedenheit des Gewebes abhängen, in welchem derselbe Wurzel gefasst hat. So erscheint er unter verschiedenen Modificationen, je nachdem er in Drüsen, in der Haut, in einer Schleimhaut, in Nerven oder in Knochen seinen Siz hat.*)

§. 1783.

Der Krebs in innern Theilen gibt sich, auch wenn die harte Geschwulst sich nicht fühlen lässt, oft sehr deutlich durch den im Krebse vorkommenden eigenthümlichen Ausdruck im Gesichte des Kranken, durch die heftigen stechenden Schmerzen mit Störungen in den Verrichtungen des leidenden Organs und durch eigenthümliche Ausscheidungen zu erkennen.

§. 1784.

Der *Scirrhus in der Speiseröhre* ist oft lange Zeit unschmerzhaft und auch im spätern Verlaufe weniger schmerzhaft als der Magenkrebs, dagegen ist das Schlingen sehr erschwert und wird zulezt unmöglich; gelangen die Speisen an die krankhafte Stelle, so werden sie wieder zurückgestossen und zuweilen wird zugleich ein heftiger Husten erregt, wie wenn ein Theil der Speisen in die Luftröhre gekommen wäre, woher der Verdacht

*) Da der Krebs in äussern Theilen der Chirurgie anheim fällt, so kann die nähere Darstellung desselben füglich hier umgangen werden.

erregt wird, dass die vordere Wand der Speiseröhre und die hintere der Luftröhre durchgefressen wären und daher beide Kanäle mit einander in Verbindung stünden; doch fand ich ungeachtet solcher Zufälle die Kanäle der Luft- und Speiseröhre nicht in Verbindung getreten, sondern nur die Speiseröhre vom Scirrhus ergriffen. Der Kranke stirbt an Erschöpfung.

§. 1785.

Bei dem *Magenkrebs* (Carcinoma ventriculi) *) ist gewöhnlich der krebshafte Ausdruck im Aussehen des Kranken sehr stark ausgesprochen und ein geübter Blick erkennt selbst den Siz des Uebels. Es ist nämlich das Gesicht äusserst blass, erdfahl und mager, und zeigt einen besonders schmerzhaften Ausdruck, der sich vorzüglich durch zwei tiefe Furchen, welche von der Nase aus sich um den Mund herumziehen und durch einen etwas stieren Blick zu erkennen gibt. Der Kranke hat beinahe ohne Unterbrechung ein schmerzhaftes Gefühl in der Magengegend, welches nach dem Genusse von Speisen vermehrt wird und bei vorgeschrittenem Uebel, besonders dem offenen Krebse, sich wie von Nadelstichen oder einer glühenden Kohle herrührend darstellt. Die Magengegend ist aufgebläht und bei bedeutender Ausdehnung der Verhärtung fühlt man einen beweglichen harten Körper. Hat die Verhärtung ihren Siz an dem Pförtner, so stellt sich nach einer halben oder ganzen Stunde, oft auch erst nach drei oder vier Stunden nach dem Essen, besonders nach dem Genusse von schwer verdaulichen Speisen ein Erbrechen ein, wodurch im Anfange nebst den Speisen ein sehr saurer Magensaft und späterhin, nach dem Uebergange in den offenen Krebs, eine ganz

*) Schriften von *Petzold* (Dresden 1787). — *Rahn* (Briefwechsel, 2te Samml.). — *Wichmann* (Id. z. Diagn.). — *Chardel* (franz. Paris 1808). — *René Pras* (a. d. Franz. v. Balling. Würzb. 1829).

braune, der Farbe nach dem Kaffeesaz ähnliche Materie ausgeleert wird, und womit sich zuweilen ein Blutsturz verbindet. Hat die Verhärtung, was seltener der Fall ist, den obern Magenmund ergriffen, so wird das Hinabschlingen der Speisen immer mehr erschwert und am Ende ganz unmöglich gemacht, so dass der Kranke verhungert; hat dieselbe aber an der grossen Krümmung des Magens ihren Siz, so fehlt zuweilen das Erbrechen und das Schlingen findet ungehindert statt. Hiebei ist gewöhnlich die hartnäckigste Verstopfung vorhanden und der Kranke wünscht sehnlichst den Abgang von Blähungen, deren Zurückhaltung er oft sein ganzes Leiden zuschreibt. Derselbe leidet vielen Hunger, indem er denselben wegen der durch die Speisen erregten Beschwerden nicht gehörig befriedigen kann; oft wird er, besonders wenn die Bauchspeicheldrüse mit in die Verhärtung gezogen ist, von einem starken Speichelfluss geplagt; sein Gemüth ist sehr niedergeschlagen und auch leicht erregbar, der Körper magert ab, die Kräfte schwinden und zulezt schwillt der Kranke wassersüchtig an, wenn nicht bälder durch einen Blutsturz dem qualvollen Leiden ein Ende gemacht wird.

§. 1786.

Der *Krebs in den Gedärmen.* Er kommt vorzüglich in der S förmigen Krümmung des Kolons und im Mastdarm vor. Er veranlasst oft Verstopfung, Aufblähung, sehr heftige Kolikschmerzen, und auch stechende und zerrende Schmerzen im Unterleib, zuweilen Erbrechen, das 8 bis 12 Stunden nach dem Genusse der Speisen eintritt, oft erschöpfende, sehr stinkende Durchfälle. Hat das Uebel seinen Siz im Mastdarme, so sind ähnliche Beschwerden vorhanden, wie sie bei schmerzhaften Hämorrhoiden vorkommen, doch erreichen die Beschwerden einen viel höhern Grad. Zuweilen werden der Mast-

darm und die Scheide durch das Krebsgeschwür durchfressen, wo sodann Koth durch die Scheide geht.

§. 1787.

Der *Krebs des Pancreas* tritt unter ähnlichen Erscheinungen auf, wie der Magenkrebs und ist auch häufig mit demselben verbunden. Schon im Anfange wird der Magen in Mitleidenschaft gezogen, der Kranke hat Uebelkeiten und öfters Erbrechen, wodurch ein sehr scharfer, saurer Schleim ausgeleert wird; bei grösserer Entwicklung der Krankheit ist das Magenleiden noch stärker, indem sich oft Magenkrampf und anhaltendes Erbrechen hinzugesellen. Auch stellt sich leicht ein heftiger Speichelfluss ein, wodurch nach einer Beobachtung von *Peter Frank* selbst 12 Pfund Speichel täglich entleert werden können. Im Uebrigen sind die gewöhnlichen Zeichen des Krebses vorhanden.

§. 1788.

Die Entwicklung des *Scirrhus in der Gebärmutter* zeigt sich meistens zuerst durch eine schmerzhafte monatliche Reinigung an, bei welcher aber, sobald das Blut gehörig fliesst, die Schmerzen wiederum nachlassen; Meistens tritt nun ein weisser Fluss ein, die Kranken haben oft das Gefühl von Schwere im Becken, und es erregen Erschütterungen des Körpers beim Fahren, so wie der Beischlaf zuweilen Schmerzen. Oft findet ein Drängen nach den Geschlechtstheilen statt und Beschwerden beim Harnlassen, und auch zuweilen beim Stuhlgange. Bei der innern Untersuchung findet man, wenn der Siz der Krankheit am Muttermunde und Mutterhalse ist, was beinahe immer der Fall ist, die Gebärmutter hart, uneben, selbst knollig, und mit aufgeworfenen und gleichsam eingekerbten Lippen des Muttermundes.

Geht dieser Scirrhus in den Krebs über, so stellen sich plözlich eintretende Stiche ein, die quer durch das Becken gehen, und die Kranke empfindet auch mehr

andauernde, brennende Schmerzen im Unterleibe, welche das Sizen, das Urinlassen und die Stuhlentleerungen sehr beschwerlich machen. Es fliesst nun eine scharfe, das Zimmer der Kranken mit fast unausstehlichem Geruche erfüllende Jauche aus. Bei der innern Untersuchung, die nunmehr der Kranken Schmerzen verursacht, findet man den Scheidentheil der Gebärmutter noch rauher, höckeriger und heiss und mit schwammigen Auswüchsen, die leicht bluten, behaftet. Die Kranke leidet an Verdauungsbeschwerden, an mancherlei schmerz- und krampfhaften Zufällen, sie magert ab, ein Zehrfieber stellt sich ein und dieses, so wie mehr oder weniger heftige Blutflüsse, die aus der verschwärten Gebärmutter hervordringen, machen dem qualvollen Leben der Kranken ein Ende.

§. 1789.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Das scirrhöse Gebilde, welches von verschiedener Härte ist und oft nur die Consistenz eines festen Speckes, oft selbst die des Knorpels hat, zeigt beim Durchschnitt zweierlei Substanzen, eine fibröse, undurchsichtige, welche unregelmässig gelagerte und sich kreuzende Blätter darstellt, wodurch Zellen gebildet werden, und eine halbdurchsichtige, ohne bestimmte Organisation, gewöhnlich von hellbräunlicher, oft bläulicher und weisslicher Farbe, welche die durch die erstere gebildeten Zellen ausfüllt. Beide Substanzen sind in dem Scirrhus fest, die faserige insbesondere erreicht oft die Härte von Knorpel. — An den Stellen, wo der Scirrhus in den Krebs übergegangen ist, ist insbesondere die mehr durchscheinende Substanz erweicht und zuweilen ganz in eine dünne, gelbliche Flüssigkeit übergegangen. Manchmal trifft man auch in der scirrhösen Geschwulst Bälge an, welche mit einer verschieden gefärbten Flüssigkeit gefüllt sind. An den in Krebs übergegangenen Stellen, besonders an

den offenen Geschwüren, befinden sich blutige, harte, schwammartige Bildungen, die den Fleischwarzen ähnlich, aber härter als diese sind.

§. 1790.

Dass wenigstens bei vielen Individuen, die von dieser Krankheit befallen werden, eine eigenthümliche Anlage bestehe, zeigt die oft ohne äussere Ursache eintretende Entwicklung und die in der Regel erfolgende Wiederkehr, auch bei frühzeitig geschehener Hinwegnahme der scirrhösen Geschwulst. Die Anlage soll oft erblich sein. Die Krankheit kommt am häufigsten im Alter, in welchem die Zeugungsfähigkeit schwindet und in zur Zeugung bestimmten Organen, wie der Gebärmutter, den Brüsten und den Hoden vor.*) Weiber sollen von derselben häufiger, als Männer befallen werden. Auch scheinen Individuen von atrabilarischer Constitution eine besondere Anlage zu dieser Krankheit zu haben.

§. 1791.

Gelegenheitsursachen geben ein Stoss, andauernder Druck, eine zu reizende Behandlung und Verlezung verhärteter Theile, die Entstehung scrophulöser und syphilitischer Geschwülste und Auswüchse, eine niedergebeugte Gemüthsstimmung, sizende Lebensart, geheilte Fussgeschwüre, unterdrückte Flechten etc. — Der Magenkrebs insbesondere wird am häufigsten hervorgebracht durch fortgeseztcn starken Genuss des Branntweines, wie es scheint auch häufig durch immer wiederkehrenden Verdruss, durch schlechte Nahrungsmittel, durch den Missbrauch der Brech- und Abführungsmittel, durch metallische Gifte, vielleicht wohl auch durch die Einwärtsbiegung des schwertförmigen Knorpels, durch Trinken von sehr kaltem Wasser etc. Dieselben

*) S. *Chelius* Chirurgie.

Schädlichkeiten werden auch als die Ursachen des Krebses des Darmkanals und der Bauchspeicheldrüse beschuldigt. — Der Krebs der Gebärmutter kommt vorzüglich in der Zeit vor, in welcher die monatliche Reinigung aufhört, er soll am häufigsten bei Frauenzimmern angetroffen werden, bei welchen die Befriedigung des Geschlechtstriebes nicht statt fand, bei solchen, die sich der Onanie hingegeben haben, so wie auch bei öffentlichen Dirnen und unfruchtbaren Weibern, doch kommt er auch bei solchen vor, die Kinder geboren haben. Es werden ferner beschuldigt: häufige Missfälle, langwieriger weisser Fluss, vorhergegangene venerische Affectionen, Tripper, mechanische Verlezungen bei Geburten, ein ungeeigneter Gebrauch kalter und zusammenziehender Einsprizungen etc.

§. 1792.

Ueber das Wesen des Krebses weiss man noch nichts Sicheres. Viele nehmen eine eigene Krebsschärfe an. Dieselbe mag wohl bestehen, wenn das krebshafte Geschwür schon gebildet ist, ihr Dasein aber vor der Entstehung des Scirrhus ist durch Nichts erwiesen. *Adams* hielt den Krebs, und zwar eigentlich den mit Bälgen, in welchem eine gallertartige Flüssigkeit enthalten ist, versehenen Krebs für ein Aggregat von lebenden Hydatiden. *Leurs*, *Schäffer* und *Harless* nehmen einen krankhaften Nerveneinfluss an. Ein krankhafter Nerveneinfluss findet gewiss auch statt, indem keine Organisationsveränderung ohne Betheiligung der Nerven geschehen kann und hier noch insbesondere der Einfluss des Kummers und des Verdrusses auf die Entstehung des Krebses den Antheil, den das Nervensystem hiebei hat, kund gibt, doch ist nicht erklärt, wie gerade diese Art der Desorganisation zu Stande komme. Viele Aerzte glauben, dass der Scirrhus aus einer schleichenden Entzündung hervorgehe, doch ist diese noch nicht mit

Gewissheit nachgewiesen, und ist auch zur Erklärung der Entstehung dieser bestimmten Art von Desorganisation nicht genügend. — Die Fortpflanzung des Krebses auf andere Theile und die in Folge des Krebses sich entwickelnde allgemeine Dyscrasie scheinen vorzüglich durch Aufsaugung der krebsigten Jauche zu geschehen, indem in der Regel die lymphatischen Drüsen, welche zwischen der krebshaften Stelle und dem Ductus thoracicus liegen, anschwellen, doch ist hiebei auch das polarische Verhältniss der einzelnen Nerventheile mitwirksam, indem vorzüglich solche Theile secundär der krebshaften Entartung ausgesezt sind, die mit dem zuerst leidenden Organe in Beziehung stehen, wie z. B. die Gebärmutter bei dem Krebse der Brust.

§. 1793.

Vorhersage. Der Krebs in innern Theilen scheint unheilbar zu sein; auch möchten schwer sichere Beweise von glücklicher Zertheilung einer scirrhösen Verhärtung aufzubringen sein.

§. 1794.

Die Behandlung des Krebses durch die Operation und die äzenden Mittel, insbesondere durch Arsenik, hat noch den meisten Erfolg; ihre Darstellung wird übrigens in den Lehrbüchern der Chirurgie gegeben. — Die innerlichen, gegen den Krebs empfohlenen Mittel sind meistens auflösende Mittel, namentlich die auflösenden Extracte, die narkotischen auflösenden Mittel, wie die Blausäure, das Extractum Belladonnae (in Kirschlorbeerwasser aufgelöst, nach *Hufeland*), das Extractum Cicutae, Hyoscyami, Aconiti, die Digitalis, ferner die Calendula, das Calomel, Jod, das salzsaure Gold, Arsenik, mit welch leztern Mitteln, wegen ihrer reizenden Eigenschaft, grosse Vorsicht nothwendig ist, damit nicht der Uebergang des Scirrhus in den Krebs durch sie beschleunigt werde.

§. 1795.

Mehr als durch die Versuche wirklicher Heilung vermag der Arzt in der Behandlung des Krebses durch Mässigung der Zufälle zu nüzen, insbesondere durch Milderung der heftigen Schmerzen vermittelst des Opiums.

§. 1796.

Bei dem Magenkrebse können nur die milden, nicht reizenden, auflösenden Mittel angewandt werden, wie die genannten narcotischen Mittel (unter welchen ich das Extract. Hyoscyami, in Aq. Laurocerasi aufgelöst, und gleichzeitig Morphium aceticum, schon öfters mit grosser Linderung gegeben habe), auch die milden, auflösenden Extracte, Calomel, Einreibungen der grauen Quecksilbersalbe; auch narkotische und andere Mittel, auf endermatischem Wege angewandt.

Um die Ernährung des Körpers, so viel wie möglich, zu unterhalten, gibt man milde, aber kräftig nährende Nahrungsmittel, kräftige Fleischbrühe, Krebsbrühen, weichgesottene Eier etc. — Schmerzen und Erbrechen stillt man am besten durch Opium. — Wegen der hartnäckigen Verstopfung sind wiederholte Klystiere nothwendig. — In einem Falle, in welchem ein Scirrhus in dem untern Theile der Speiseröhre sich befand und in welchem bei dem Schlingen ein Krampf in der Speiseröhre sich noch hinzugesellte, so dass die Speisen nicht in den Magen gelangen konnten, bewirkte ich dadurch den Durchgang der Speisen durch die krankhafte Stelle, dass ich jedesmal vor dem Genusse derselben ein Säftchen mit Opium nehmen liess, wodurch dem Krampfe vorgebeugt wurde.

§. 1797.

Gegen den Scirrhus und den Krebs der Gebärmutter sind dieselben Mittel, wie gegen den Magenkrebs anwendbar, insbesondere die bezeichneten narkotischen

Mittel; bei Verdacht des Ursprungs des Uebels aus der Lustseuche eine Quecksilberkur. Es können hier auch die angegebenen Mittel, z. B. eine Schierlingsabkochung, örtlich, vermittelst Einsprizungen, der Einbringung von damit befeuchteten und bestrichenen Charpiebäuschchen etc. in Anwendung gebracht werden. Endlich kann man auch versuchen, den krebshaften Theil durch Aezmittel oder vermittelst des Messers hinwegzunehmen, wiewohl der Erfolg dieser Operation nur höchst selten günstig sein mag. Die Exstirpation der ganzen Gebärmutter mag in einzelnen Fällen glücklich vollbracht werden, doch wird hierdurch wohl nicht leicht das Leben der Patientin lange gefristet werden (wegen meistens schon weiter gediehenen Krebsübels), in der Regel wird aber dasselbe durch dieses Verfahren sehr abgekürzt werden.

Der Markschwamm.

(Encephaloide nach Laennec, weicher Krebs nach Wardrop, Medullarcarcinom, Fungus medullaris, Sarcoma medullare, auch Fungus haematodes (Blutschwamm), welche Benennung aber zur Verwechslung mit der Teleangiektasie Veranlassung geben kann.)

Wardrop (aus dem Engl. v. Kühn, mit 8 K. Leipzig 1817). — *Laennec* (Dict. des Sciences méd. art. Encephaloide). — *Breschet* (ebend. Art. Haematode). — *Maunoir* (a. d. Franz. Frankf. 1820). — *v. Walther* (Journal für Chirurgie u. Augenheilk. B. 5.). — *Hasse* (Diss. Berol. 1824, und in Rust's Magazin. B. 16.). — *Meyen* (Berl. 1828).

§. 1798.

Der Markschwamm ist die krankhafte, im Gewebe

der Organe erzeugte Substanz, welche der Marksubstanz des Gehirnes ähnlich ist.

§. 1799.

Kommt der Markschwamm in äussern Theilen vor, so erkennt man ihn an einer, im Anfange kleinen, festen, aber nicht harten Geschwulst, welche wächst, mehr weich und elastisch wird und sodann auch eine Art Schwappung zeigt. Die Haut über der Geschwulst ist im Anfange von natürlicher Beschaffenheit, später wird sie dünn, bricht auf und es fliesst eine blutige Jauche aus. Aus der geschwürigen Oeffnung wuchert nun eine schwammartige Masse von röthlicher Farbe hervor, welche leicht blutet. Nunmehr wird auch die Geschwulst, die allmälig grösser wird, empfindlicher, es durchfahren sie stechende Schmerzen, die benachbarten lymphatischen Drüsen und auch Drüsen in entferntern Theilen schwellen an, der Kranke erhält ein kachektisches Aussehen und zehrt ab. *)

§. 1800.

Die Encephaloide in innern Theilen ist sehr schwer zu erkennen. Der Markschwamm der harten Hinterhaut ist meistens auf der äussern Fläche dieser Haut befindlich und erzeugt, wenn die Geschwulst bedeutend ist, eine Oeffnung in den Schädelknochen. Mancherlei durch Druck auf das Gehirn erzeugte Zufälle werden durch diese Geschwülste hervorgebracht. In einem Falle, in welchem sich bei der Leichenöffnung eine Encephaloidengeschwulst von der Grösse eines kleinen Borstorferapfels auf der innern Fläche der harten Hirnhaut, zur Seite der *Varol*'schen Brücke, vorfand, beobachtete ich folgende Zufälle: Viele Monate hindurch heftige Kopf-

*) Eine vollständigere Beschreibung des Markschwammes in äussern Theilen findet man in den Lehrbüchern der Chirurgie.

schmerzen, besonders unter dem Scheitel, heftige Schmerzen im Nacken, Vorwärtsbeugen des Kopfes, wie bei Spondilarthrocace der Halswirbel, späterhin einen, ohne Gebrauch von Merkur eingetretenen, heftigen Speichelfluss, schwarzen Staar an beiden Augen, Hervorgetriebenheit der Augäpfel, Stummpfsinn, zulezt erschwertes Schlingen und Röcheln.

§. 1801.

In den Lungen veranlasst dieses krankhafte Gebilde vorzüglich anhaltende und zulezt sehr heftige, selbst Erstickung herbeiführende Athmungsbeschwerden, die Kranken haben mehr oder weniger Husten, der meistens mehr trocken, doch auch, besonders im spätern Verlaufe der Krankheit, mit einem trüben, halb gallertartigen, mit weissen Flocken gemischten, zuweilen auch eiterigen und blutigen Auswurf verbunden ist. Das Stethoscop zeigt an Stellen, wo die Encephaloidenmasse einen grossen Umfang erreicht hat, Abwesenheit des Respirationsgeräusches. Ein Fieber ist während der längsten Zeit der Krankheit nicht vorhanden. Die Kranken magern ab (Phthisie cancreuse, nach *Bayle*), doch sterben sie oft, ehe die Abzehrung einen beträchtlichen Grad erreicht hat, an Erstickung; leicht kommt auch Wassersucht hinzu. — Die Krankheit kann eine Dauer von ein bis zwei Jahre haben.

§. 1802.

Der Markschwamm der Gebärmutter tritt beinahe unter denselben Erscheinungen auf, wie der Gebärmutterkrebs, doch ist wegen der hier in der Regel stattfindenden grossen Masse der krankhaften Substanz das Gefühl der Schwere im Becken grösser, und aus demselben Grunde sind die Kreuzschmerzen und die Beschwerden bei dem Harnlassen und dem Stuhlgange bedeutender. Bei der innern Untersuchung findet man meistens viel grössere Geschwülste, als bei dem Krebse,

und es ist auch mehr, als bei jenem, die Scheide davon besezt, die Geschwülste sind aber weich anzufühlen. Ist der Markschwamm schon aufgebrochen, so findet man Blumenkohl ähnliche Wucherungen. Eine sehr stinkende und scharfe Jauche fliesst aus. Leicht stellen sich Blutungen ein, die oft sehr beträchtlich werden.

§. 1803.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Die Markschwammsubstanz hat, je nach dem Grade ihrer Entwicklung, eine verschiedene Dichtheit. In dem ersten Grade, der der Rohheit, hat sie die Consistenz des Speckes, ohne aber eine Spur von Fett zu enthalten, sie ist in zahlreiche Läppchen getheilt und in dünne Schichten geschnitten, mehr oder weniger durchscheinend; in der zweiten Periode gleicht sie der Substanz eines Kinder-Gehirnes und ist ebenfalls in Lappen getheilt; in der dritten Periode, der der vollständigen Erweichung, stellt die erweichte Substanz eine dicke, Eiter ähnliche, breiartige Masse dar. — Die Farbe ist der der Marksubstanz des Gehirnes gleich, zuweilen ist sie aber von zahlreichen, sie durchdringenden Gefässchen oder von beigemengtem Blute röthlich, bräunlich und selbst in's Schwärzliche gehend. — Die schwammige Masse, welche nach dem Aufbruch der Markschwammgeschwulst aus derselben hervorwuchert, besizt einen sehr grossen Reichthum von kleinen Gefässen. *Laennec* beschreibt dreierlei Arten des Vorkommens der hirnartigen Substanz. 1) Die in Bälgen eingeschlossenen Encephaloidenmassen. Ihre Grösse ist die einer Haselnuss, bis zu der eines Apfels. Die Bälge haben eine Dicke von ungefähr einer halben Linie, ihre Farbe ist weisslichgrau, sie sind halb durchscheinend, ihr Gewebe gleicht ganz dem der Knorpel und ist nur weicher als diese. Man kann sie aber unter die unvollkommenen Knorpel zählen.

Die in diesen Bälgen eingeschlossene hirnartige Substanz hängt nur leicht an denselben an, sie sind in mehrere Lappen durch ein feines, der Pia mater vergleichbares Zellgewebe getheilt, welches auch in der Beziehung der erwähnten Haut gleicht, dass eine grosse Anzahl von Gefässen dasselbe durchzieht. Diese Gefässe haben sehr feine Wände und dringen in das Innere der Marksubstanz ein. — 2) Die nicht in Bälge eingeschlossenen hirnartigen Massen. Dieselben sind viel häufiger, als die so eben beschriebene Art, ihre Grösse ist sehr verschieden, man findet sie bis zu der des Kopfes eines ausgetragenen Foetus. Ihre Oberfläche ist ebenfalls in Lappen getheilt und ihr innerer Bau ist ganz von derselben Art, wie der der eingebalgten Encephaloiden. — 3) Die in das Gewebe der Organe infiltrirte, hirnartige Substanz. Man unterscheidet dieselbe von der nicht eingebalgten hirnartigen Masse dadurch, dass diese Materie keine umschriebenen Massen bildet. Sie bietet einen sehr verschiedenen Anblick dar, nach den verschiedenen Verhältnissen ihrer Mischung mit den verschiedenen Organengeweben, in welchen sie sich entwickelt.

§. 1804.

Man hat für diese Krankheit, wie für den Krebs, eine eigenthümliche Anlage (Diathesis fungosa) angenommen. Die Gelegenheitsursache ist zuweilen eine mechanische Schädlichkeit, doch entwickelt sich meistens die Krankheit ohne eine erkennbare äussere Ursache und zuweilen in mehrern Theilen des Körpers. Es sind somit die Ursachen dieses Uebels beinahe völlig unbekannt.

§. 1805.

Vorhersage. Der Markschwamm in innern Theilen ist unheilbar und wohl immer tödtlich, und selbst der in äussern Theilen ist dieses in der Regel, da auch

nach der Ausschälung der kranken Stelle das Uebel meistens wiederkehrt.

§. 1806.

Behandlung. Das einzige Verfahren gegen dieses Leiden, von dem noch einigermassen ein günstiger Erfolg erwartet werden kann, ist die frühzeitige Hinwegnahme alles Krankhaften durch die Exstirpation desselben oder die Abnahme des Gliedes, an welchem das Uebel haftet.

Fünfte Gruppe
der dritten Ordnung der Bildungskrankheiten.

Die Bildung parasitischer Thiere.

Die Wurmkrankheit.

(*Wurmsucht*, *Wurmbeschwerden*, *Würmer*, *Helminthiasis*, *vermitio*, *morbus verminosus.*)

Bloch (mit 1 K. Berlin 1782). — *Götze* (Leipzig 1782, m. K. Nachtrag, herausgegeben von Zeder, ebend. 1804). — *Zeder* (m. K. Bamberg 1803) — *Joerdens* (m. K. Hof 1801 – 2). — *Brera* (a. d. Ital. m. Zusäzen v. Weber, m. K. Leipzig 1803). — *Rudolphi* (entozoorum hist. natur. vol. III. Amsterdam 1808—1810, ej. entozoor. synops. c. tab. Berol. 1819). — *Bremser* (üb. lebende Würmer im lebenden Menschen, m. Abbild. Wien 1819., und icon. helminth. systema Rudolphii entozoolog. illust. fol. Wien 1823).

§. 1807.

Unter **Wurmkrankheit** versteht man *a*) den Zustand des Körpers, der zur Wurmerzeugung beiträgt, *b*) die Zufälle, welche von dem Aufenthalt von Würmern im Körper herrühren und *c*) das Vorhandensein von Würmern.

§. 1808.

Man findet Würmer in den verschiedensten Theilen des Körpers, ausserhalb des Darmkanals den Fadenwurm (Filaria medinensis), im Zellgewebe unter der Haut; den Fühlwurm (Hamularia subcompressa), bis jezt nur einmal (von *Treutler*) wahrgenommen in den Bronchial-

drüsen; den Pallisadenwurm (Strongylus Gigas) in den Nieren; den Leberegel (Distoma hepaticum) in der Gallenblase und vielleicht auch in der Leber selbst; das Vielloch oder den Fettblattwurm (Polystoma pinguicola), einmal von *Treutler* in dem verhärteten Fette des linken Eierstockes gefunden; die Finne oder den Blasenschwanz (Cysticercus cellulosae) im Zellgewebe der Muskeln, nach *Bremser* auch in dem des Gehirnes und von *Sömmering d. j.* im Auge gefunden; eine kleine Filaria und die Monostoma lentis von *Nordmann* in extrahirten Linsen von staarblinden Menschen entdeckt, und, wie man gewöhnlich annimmt, die Hydatiden (Echinococcus humanus).

Das Vorhandensein einer eigenen Wurmart (Hydatide oder Hülsenwurm) im menschlichen Körper scheint noch nicht erwiesen zu sein. Hydatiden nennt man die im menschlichen Körper in verschiedenen Theilen vorkommenden, in eigenen Kapseln frei enthaltenen oder auch mit einem Organ verwachsenen und oft auf Stielen sizenden Wasserblasen. Diese Hydatiden, besonders die frei in eigenen Kapseln liegenden, aber auch selbst die gestielten halten *Bremser* und mit ihm andere Naturforscher für Thiere; andere, namentlich *Rudolphi*, halten diese Blasen nicht für Thiere. *Bremser* glaubt, dass bei den Thieren, bei welchen deutlich die Echinococci (kleine, beinahe mikroscopische Thierchen, mit vier Saugmündungen und einem Hackenkranze) vorkommen, die Hydatiden auf die Weise entstünden, dass die Echinococci, welches die Jungen der Mutterhydatiden seien, die Hacken und Saugmündungen verlieren und sich zu einfachen Kügelchen umwandeln, die allmälig wachsen und die Hydatiden darstellen. Beim Menschen fände man zwar jene mit Saugmündungen und einem Hackenkranze versehenen Echinococci nicht, man müsse aber die in den Hydatiden oft sich vorfindenden kleinen,

glatten Kügelchen für eine Art Echinococcus halten, und da diese Bläschen wachsen und Hydatiden werden, auch die beim Menschen vorkommenden Hydatiden für Thiere halten. — Es scheint mir nicht, dass die Entstehung der Hydatiden durch eine Verwandlung des Echinococcus, wo derselbe auch wirklich vorkommt, erwiesen ist, ebenso scheint es nicht nachgewiesen zu sein, dass die in den Hydatiden des Menschen zuweilen vorkommenden kleinen Bläschen wirkliche Echinococci sind; das Vorhandensein eines Thieres können wir aber nur annehmen, wenn ein Körper thierische Organe besizt oder an irgend einer Stelle desselben willkürliche Bewegung wahrgenommen wird, was beides bei den bezeichneten Wasserblasen nicht der Fall ist. Hiernach kann ich die Hydatiden des Menschen nicht als wirkliche Thiere anerkennen. Bei den Thieren, in welchen wirkliche Echinococci in den Hydatiden gefunden werden, sind diese Thierchen eine Gelegenheitsursache der Entstehung der Wasserblasen, bei dem Menschen aber hat man diese Ursachen der Hydatiden noch nicht mit Bestimmtheit aufgefunden.

§. 1808.

Innerhalb des Darmkanals des Menschen kommen folgende Würmer vor:

1) Der *Spulwurm* (Ascaris lumbricoides). Er ist am häufigsten vorhanden, hält sich in den Dünndärmen auf und kriecht auch zuweilen in den Magen und selbst in den Schlund. (Ascaris. Spindelförmig oder cylindrisch, beiderseits verdünnt; Mund mit drei klappenartigen Knötchen. Männliche Ruthe doppelt. — A. lumbricoides: weisslich, bräunlich oder roth, gross (6 — 16″ lang, 1 — 2‴ dick), beiderseits längs gefurcht; das Hinterende stumpf.

2) Der *Madenwurm* (Pfriemenschwanz, Mastwurm, Springwurm, Askaride, Oxyuris vermicularis, ascaris

vermicularis). Derselbe kommt oft in grosser Menge im Mastdarm vor. (Oxyuris. Dünn, kurz, spindelförmig, zumal hinten zugespizt; Mund kreisrund. Männliche Ruthe einfach, mit einer Scheide. O. vermicularis. Klein (2—5''' lang), vorn dicker, mit zwei kleinen, blasenartigen Hautflügeln; Schwanzende beim Weibchen zugespizt, gerad; beim Männchen stumpf, eingebogen.)

3) Der *Peitschenwurm* (Trichocephalus dispar). Er kommt im Blind- und Dickdarm vor; ist übrigens selten Gegenstand der Behandlung, da er, wie es scheint, wenig Beschwerden verursacht und selten während des Lebens wahrgenommen wird. (Trichocephalus. Vordertheil haarförmig, dann plözlich dicker, cylindrisch; Mund kreisrund, ohne oder mit Stächelchen. Männliche Ruthe einfach, mit einer Scheide. T. dispar. Der haardünne Theil am längsten (1—1½''), vorne ganz spizig, unbewaffnet; der Hintertheil (½—1'' lang) beim Weibchen fast gerad, beim Männchen schneckenförmig gebogen, die Ruthenscheide umgekehrt eiförmig.

4) Der *langgliedrige Bandwurm* (Taenia Solium, T. cucurbitina). Im Dünndarme. (Taenia. Lang, platt, gegliedert, mit Eierlöchern am Rande; der Kopf mit vier Sauglöchern und zuweilen mit einem ausstreckbaren Rüssel und einem Hackenkranze. T. Solium. Kopf halbkuglig, Rüssel stumpf, mit einem (doppelten) Hackenkranze; Hals nach vorne verdickt; die vordersten Glieder sehr kurz, die folgenden fast quadratisch, die übrigen länglich, alle stumpfeckig; Eierlöcher wechselständig. Einzeln abgehende Glieder sehen Kürbiskernen ähnlich.

5) Der *breite Bandwurm* (Bothriocephalus latus, Taenia lata). Er ist selten in Deutschland, kommt dagegen häufig in der Schweiz, Frankreich und Russland vor. (Bothriocephalus. Lang, platt, gegliedert, mit Eierlöchern auf der Fläche der Glieder; Kopf vierkantig,

mit 2 oder 4 Sauggruben, zuweilen vorne mit einzelnen Hacken oder langen Hackenrüsseln. B. latus. Kopf mit zwei länglichen Sauggruben, ohne Hacken; kein Hals; die vordern Glieder sehr kurz, die übrigen fast quadratisch. Er soll bis 60 Ellen lang werden.) *)

§. 1810.

Die Zufälle, welche durch die Würmer erregt werden, sind: Häufig und ohne eine weitere Ursache wiederkehrende Leibschmerzen, welche eher bei nüchternem Magen, als nach dem Genusse von Speisen sich einstellen, oft nach dem Genusse von Zwiebeln, Knoblauch, Meerrettig und ähnlichen Stoffen zunehmen, aber nach dem einer reichlichen, milden Nahrung, insbesondere Milch- und Mehlspeisen, gestillt werden, Aufgetriebenheit des Leibes und zuweilen selbst harte Stellen an verschiedenen Theilen des Unterleibes, Verstopfung, zuweilen aber auch damit abwechselnde Durchfälle, viel Hunger, zuweilen aber auch Mangel an Appetit, meistens eine stark belegte Zunge, öfteres Zusammenlaufen des Speichels im Munde, morgens nüchtern Neigung zum Erbrechen, oft ein sehr übler Geruch aus dem Munde. — Das Gefühl von Jucken in der Nase, öfteres Niesen und zuweilen auch Nasenbluten, erweiterte, manchmal aber auch verengerte Pupillen, Schwäche des Gesichtes und auch zuweilen Lichterscheinungen, dunkle Ringe um die Augen, ein blasses, aufgedunsenes Antliz, öfterer Schwindel, Kopfweh, selbst zuweilen Irrereden, Schmerzen in verschiedenen Theilen, leichtere Zuckungen in den Gesichts- und andern Muskeln, Herzklopfen, Husten und Athmungsbeschwerden, so wie auch zuweilen

*) Obige Beschreibungen der fünf, im Darmkanal des Menschen vorkommenden Wurmarten sind die von *Perleb* gegebenen. S. dessen Lehrbuch der Naturgeschichte, Zoologie. Freiburg 1831 — 33.

selbst Anfälle von Veitstanz, Fallsucht oder Starrsucht, zuweilen aber ein mehr andauerndes, schleichendes Fieber, Abmagerung des Körpers, Wassergeschwülste und zulezt selbst allgemeine Wassersucht.

§. 1811.

Die Spuhlwürmer insbesondere bringen häufiges Grimmen hervor, oft kriechen sie in den Magen und erregen einen nagenden und krampfhaften Magenschmerz, zuweilen kriechen sie auch in den Schlund und veranlassen Würgen und Erbrechen, auch hat man schon diese Würmer in der Highmorshöhle angetroffen, wo sie bedeutende Beschwerden veranlassen. — Die Madenwürmer erregen ein oft sehr heftiges Jucken im After, Stuhlzwang und zuweilen selbst Schleim- oder Blutausflüsse aus dem Mastdarm; sie kriechen zuweilen in die Scheide und verursachen daselbst ein heftiges Jucken. — Der Bandwurm veranlasst heftige Koliken, oft ein Gefühl von einer wellenförmigen Bewegung in der Gegend des Nabels, oft auch plözliche Stiche, wie von einer Nadel, das Allgemeinbefinden ist mehr als bei dem Vorhandensein anderer Würmer gestört, insbesondere kommen oft Krämpfe vor und es bildet sich leicht Wassersucht aus.

§. 1812.

Die Wiederherstellung der Gesundheit erfolgt durch den Abgang der Würmer und Heilung des krankhaften Zustandes des Darmkanals, insbesondere der Verschleimung, was am häufigsten allmälig bei dem Uebergang des Individuums von dem Knaben- in das Jünglingsalter geschieht. Oft gehen die Würmer bei hizigen Krankheiten, namentlich dem Nervenfieber, von selbst ab, oft ohne irgend eine bekannte Veranlassung. Zum Tod führt die Krankheit durch Krampfanfälle, Fieber, Abzehrung, Wassersucht.

§. 1813.

Ursachen. Die Würmer kommen vorzüglich bei Kindern vor, mehr bei Weibern, als bei Männern, bei Individuen mit trägem und verschleimtem Darmkanal, ihre Entstehung und ihr Gedeihen werden befördert durch reichliche Nahrung, insbesondere von Milch und Mehlspeisen, Mangel an Körperbewegung, eine niedergebeugte Gemüthsstimmung und den Aufenthalt in einer feuchten, dumpfen Wohnung.

§. 1814.

Ueber die *Entstehungsweise der Würmer* im menschlichen Körper hat man verschiedene Hypothesen aufgestellt. Man glaubte früher (*Linné, Unzer, Tissot*), es kämen die in den Thieren lebenden Würmer auch ausserhalb des thierischen Körpers vor und würden, wenn nicht gerade selbst, doch ihre Eier, durch die Speisen und Getränke in den Körper des Thieres gebracht. — *Brera* glaubte, dass Würmer, die ausserhalb des Körpers leben, in den thierischen Körper gelangen, ihre Form verändern, und dass dadurch die Eingeweidewürmer entstehen. — Andere (*Pallas, Bloch*) waren der Meinung, der Saamen der Eingeweidewürmer würde bei dem Zeugungsakte, oder bei der Ernährung der Frucht im Mutterleibe und vermittelst der Muttermilch von den Eltern den Kindern mitgetheilt. — Die Unhaltbarkeit aller dieser Meinungen hat *Bremser* gründlich bewiesen. — Man glaubt nun ziemlich allgemein, die Eingeweidewürmer entstünden durch Generatio aequivoca und hält dafür, dass sie aus einem Ueberschuss von Bildungsstoff entstehen, der im thierischen Körper in einen gewissen selbstständigen Bildungsprozess gerathe. Da dieser Bildungsstoff in verschiedenen Thierarten Besonderheiten zeigt, die dem anderer Thiere abgehen, so ist das Produkt des abnormen Bildungsprozesses in verschiedenen Thierarten häufig verschieden, woher es kommt, dass viele Thierarten ihre

besondern Arten von Eingeweidewürmern haben. Die einmal vorhandenen Eingeweidewürmer pflanzen sich durch Begattung fort.

§. 1815.

Vorhersage. Die Wurmkrankheit wird selten lebensgefährlich; insbesondere sind bei erwachsenen Personen die Spuhlwürmer, die Madenwürmer und die Peitschenwürmer beinahe nie gefahrbringend, zuweilen jedoch bei Kindern. Leichter hat der Bandwurm lebensgefährliche Folgen. Zuweilen sind die Würmer schwer abzutreiben, insbesondere widersteht der langgliedrige Bandwurm oft den stärksten Mitteln.

§. 1816.

Behandlung. Wir haben drei Anzeigen zu erfüllen: 1) die vorhandenen Würmer abzutreiben, 2) die durch die Würmer hervorgebrachten Zufälle zu beseitigen und 3) die Wiedererzeugung der Würmer zu verhüten.

1) Die *Abtreibung der Würmer*. Es entsprechen dem angegebenen Zwecke zwei Reihen von Mitteln: *a)* solche, welche den Wurm krank machen und tödten, und *b)* solche, welche ihn aus dem menschlichen Körper hinwegschaffen. Die erstern sind: möglichst grosse Entziehung der Nahrung, die Kälte, daher reichliches Trinken von kaltem Wasser und insbesondere von kalten salzigen Mineralwassern, so wie auch beim Aufenthalt der Würmer in dem Mastdarm kalte Klystiere, stark gesalzene Speisen, z. B. Häringe, ferner Rettige, Knoblauch, Zwiebeln, gelbe Rüben, unter den eigentlichen Arzneimitteln Sem. Cinae, sem. Tanaceti, rad. Valerianae, Absinthium, rad. Filicis maris, Helmintochorton, Chenopodium anthelminticum, Spigelia anthelmia et marilandica, cortex viridis nucum Juglandis, Geoffroea surinamensis, cortex rad. Punicae Granati, Sem. Sabadilli, Asa foetida, Campher, Naphtha, Oleum Tanaceti, Oleum Filicis maris, Terpenthinöl, Oleum animale Dippelii,

Oleum empyreumaticum Chaberti, das laufende Queksilber, Calomel, limatura Stanni, limat. martis, Vitriolum martis, Ammonium muriaticum, Aqua Calcis, Tartarus stibiatus etc.

§. 1817.

Um die geschwächten oder getödteten Würmer aus dem Körper hinwegzuschaffen, kann man irgend ein gehörig wirkendes Abführungsmittel geben, Bittersalz, Senne, Rhabarber, Calomel in Verbindung von Jalappe, Ricinusöl, so wie auch selbst Gummi Gutta, Gratiola, Helleborus niger, Oleum Crotonis etc.

§. 1818.

Es ist zweckmässig, zuerst einige Zeit Wurmmittel allein und sodann erst dieselben in Verbindung mit Abführungsmitteln oder diese allein zu geben. Oft genügt ein einziges Wurmmittel, oft ist es nöthig, mehrere Wurmmittel mit einander in Verbindung zu geben. Man lässt die Mittel gewöhnlich morgens nüchtern gebrauchen und auch den Kranken während der ganzen Kur eine sparsame Diät führen und den Würmern widrige Speisen geniessen. Man sagt, die Würmer liessen sich am leichtesten bei abnehmendem Monde abtreiben, was aber nicht der Fall zu sein scheint.

§. 1819.

Zur Abtreibung der Spuhlwürmer bedient man sich der leichtern der oben angeführten Mittel, insbesondere des Wurmsaamens, den man zu einem Kaffeelöffel voll in Wasser, oder auf Butterbrod oder in Honig, oder der Confectio sem. Cinae, oder in Wurmzeltchen und in verschiedenen Verbindungen mit andern Wurmmitteln und Abführungsmitteln anwendet. (Nro. 103.)

§. 1820.

Gegen die Madenwürmer wendet man ausser den gewöhnlichen Wurmmitteln starke Abführungsmittel und Klystiere von kaltem Wasser, oder von einem Aufguss

der Valeriana, Wurmsaamen, Absinthium, von Knoblauch mit Milch gekocht, oder von Auflösungen der Aloë, der Asa foetida etc. und Stuhlzäpfchen von Speck oder Honig und Seife und den Dampf von Knoblauch in Milch gekocht, an den After geleitet, an.

§. 1821.

Um den Bandwurm abzutreiben, wendet man die stärkern Anthelminthica in verschiedenen Zusammensezungen, namentlich die Farrenkrautwurzel, die Zinnfeile, das Terpenthinöl, das *Chabert*'sche Oel, und nach deren Gebrauch die stärkern Abführungsmittel, insbesondere starke Gaben von Calomel und Jalappe, Gummi Gutt und Ricinusöl, an. Mehrere Gebrauchsarten dieser Mittel haben sich einen besondern Ruf erworben. Dahin gehören:

Die *Odier*'sche Methode: Am Morgen 3 Drachmen des Pulvers von rad. Filicis maris und nach zwei Stunden 3 Unzen von Oleum Ricini, jede halbe Stunde 1 Esslöffel voll in Fleischbrühe.

Die von *Richter*: Der anhaltende Gebrauch der Farrenkrautwurzel alle 2 Stunden zu einer halben Drachme 14 Tage bis 3 Wochen lang fortgesezt.

Das *Nuffer*'sche Mittel: Am Abend eine dünne Wassersuppe mit viel Butter und bei Verstopfung ein Klystier, am andern Morgen 3 Drachm. Farrenkrautwurzel, zwei Stunden nachher folgenden Bolus: ℞: Calomel, Scammon. sicc. aa gr. Xij. Gumm. Gutt. gr. V. — m. f. pulv. et ope confect. de hyacinth. bolus. Nach dem Anfange der Ausleerung etwas warmen Thee. Erfolgt kein gehöriges Abweichen, noch 2—3 Drachm. englisches Salz.

Das *Herrenschwand*'sche Mittel: Zwei Tage nach einander des Morgens nüchtern und des Abends 2 Stunden nach einer leichten Mahlzeit 1 Drachme Farrenkrautwurzel, am dritten Tage früh nüchtern ℞: Gumm. Gutt. gr. Xij; Sal. Absinth. Drachm. dimid.; Sapon. Starkeyan.

gr. ij. Drei Stunden nachher 1 Unze Ricinusöl, welches 1 oder 2 Mal wiederholt werden kann. Geht der Wurm noch nicht ab, ein Klystier aus gleichen Theilen Wasser und Milch, und 3 Unzen Ricinusöl.

v. Beck's Methode. ℞: Mercurii dulcis Scrup. j; Corn. Cerv. ust., Cinnabaris Antimonii aa. gr. X. m. f. pulv. d. s. A. — ℞: Rad. Filic. mar. Drachm. j., rad. Jalapp., Gumm. Gutt., Herb. card. benedict., Ebur ust. aa. Drachm. ß. M. f. pulv. div. in part. iij aequal d. s. B. oder Specificum. Nachmittags um 5 Uhr das Pulver A. in einem Löffel voll Wasser, Abends eine Suppe und sodann 2 Unzen Mandelöl, am andern Morgen ein Pulver von B. mit einem Esslöffel voll Syrupus Persicorum und Theewasser, worauf gewöhnlich innerhalb 2 Stunden zwei- bis dreimal Erbrechen entsteht. Geht hierauf der Wurm nicht ganz ab, nach zwei Stunden das zweite Pulver, und wirkt auch dieses nicht, selbst das dritte. Bei sehr zarter Leibesconstitution des Kranken sezt man statt der Jalappe gr. XXX Herb. Gratiolae zu.

Das *Schmidt'*sche Verfahren: Einen Mittag nichts zu essen und den ganzen Tag Zuckerwasser, Abends einen Salat aus einem Häring, 8 Loth rohem Schinken, 4 Loth Zucker und etwas Zwiebeln (ohne Kartoffel), den andern Morgen ℞: Pulv. rad. Jalapp. gr. XV; Sem. Cinae. gr. X; Gumm. Gutt., Calomel aa. gr. Vj; Elaeosacchar. Tanacet. Drachm. j. M. f. pulv. d. s. nüchtern auf einmal mit Syrup z. n. Eine Stunde nachher schwarzen Kaffee mit viel Zucker, Mittags eine Mehlsuppe mit Zucker, Abends einen Häringssalat, den Tag über zum Getränk Zuckerwasser. Den dritten Tag ℞: Rad. Valerianae Drachm. Vj; Fol. Senn. Drachm. ij; Natr. sulphuric. crystallisat. Drachm. iij; infund. Aq. fervid.; Colatur. Unc. Vj add.: Elaeosacchar Tanacet. Drachm. ij. D. s. Alle 2 Stunden 2 Esslöffel voll. Die Diät wie am Tage vorher. Den vierten Tag: von morgens

5 oder 6 Uhr an jede Stunde 6 Stücke von folgenden Pillen. ℞: Asae foetid., Extract. Gramin. aa. Drachm. iij; Pulv. Gumm. Gutt., rad. Rhei, rad. Jalapp. aa. Drachm. ij; Ipecacuanh. herb. Digital., Sulphur. aurat. aa. gr. X; Calomel. Scrup. ij; Olei Tanacet., Ol. Anis. aa. gutt. XV. m. f. pilul. gr. ij; Consperg. Lycopod. mit Syrup z. n. Jedesmal eine halbe Stunde nach den Pillen 1 Esslöffel voll Ricinusöl. Gegen 8 Uhr schwarzen Kaffee, um 10 Uhr eine Tasse Fleischbrühe, Abends eine Mehlsuppe.

Das *Matthieu*'sche Mittel: Einige Tage hindurch wenig nährende, stark gesalzene Speisen, namentlich Häringe. Sodann ℞: Limatur. Stann. angl. Unc. j; pulv. rad. Filic. mar. Drachm. Vj; sem. Cinae Unc. dimid.; pulv. rad. Jalapp., sal. polychrest. aa. Drachm. j. M. f. c. mell. comm. q. s. Elect. S. Nr. 1. — ℞: Pulv. rad. Jalapp., Sal. polychrest. aa. Scrup. ij; Scammon. Alepp. Scrup. j; Gumm. Gutt. gran. X. M. f. c. mell. q. s. Elect. S. Nr. 2. — von Nr. 1 alle 2 Stunden 1 Theelöffel voll 2 bis 3 Tage hindurch, und hierauf von Nr. 2 alle 2 Stunden 1 Theelöffel voll. Geht der Bandwurm nicht nach ein paar Tagen ab, so wird dasselbe Verfahren wiederholt und auch Ricinusöl gegeben.

Hufeland's Methode: Morgens nüchtern eine Abkochung des Knoblauchs in Milch; früh, Nachmittags und Abends 1 Esslöffel voll Ricinusöl und täglich eine Latwerge aus einer halben Unze Limatur. Stann. und Conserv. Rosar. bereitet; den Unterleib öfters mit Petroleum eingerieben; viel saure und salzige Speisen und Abends ein Klystier von Milch. Dieses wird mehrere Wochen fortgesezt. Geht das Kopfende nicht ab, so gibt man die nämlichen Mittel zwei Tage in stärkern Gaben und insbesondere 2 bis 4 Mal täglich 2 Esslöffel voll Ricinusöl in Verbindung von Pulv. herb. Gratiolae gr. Viij. Ist auch dieses ohne Erfolg, alle 2 Stunden 30 Tropfen Tinctur. Asae foetidae volatilis. Zulezt das

Pyrmonter oder Driburger Mineralwasser alle Morgen wenigstens zu 2—3 Pfunden wochenlang fortgesezt.

Kämpf und *Clossius* wendeten das Terpenthinöl als Probiermittel an, um über die Gegenwart des Bandwurms Gewissheit zu erhalten; eine Drachme Terpenthinöl mit Eidotter in einigen Unzen Wasser aufgelöst, des Abends vor Schlafengehen in zwei Portionen zu nehmen. Sehr kräftig aber zuweilen dem Kranken selbst Gefahr bringend ist die *englische Methode* der Anwendung des Terpenthinöls, wornach morgens nüchtern $1/2$ bis 2 Unzen Terpenthinöl gegeben werden. Man kann dasselbe in Verbindung mit etwas Syrup reichen.

Rosenstein und *Rudolphi* empfehlen das Oleum animale aethereum. Lezterer gibt dreimal täglich 5—10 Tropfen in einer Tasse Fleischbrühe.

Bremser rühmt sehr das zuerst von *Chabert* angewandte Oel, welches durch Mischung und Destillation von einem Theil stinkenden Hirschhornöls und 3 Theilen Terpenthinöl bereitet wird (Oleum empyreumaticum Chaberti). Zuerst eine gewöhnliche Wurmlatwerge (Nro. 103) 2 bis 3 Mal täglich einen Kaffeelöffel voll, bis die Latwerge verbraucht ist. Hierauf jeden Morgen und Abend 2 Kaffeelöffel voll des Oels mit einem Mund voll Wasser. Sind 2 bis 3 Unzen des Oels verbraucht, folgendes Abführungsmittel: ℞: Pulv. rad. Jalapp. Scrup. j; Pulv. fol. Senn. Drach. dimid.; Tartar. vitriolat. Drachm. j. M. f. pulv. divid. in part. iij aequal. S. Alle St. 1 oder alle halbe St. $1/2$ Pulver z. n. Hierauf wieder Wurmöl bis 4—5 und in hartnäckigen Fällen bis 6 oder 7 Unzen verbraucht sind. Der Wurm geht meistens verwest ab. — Es scheint mir, diese Methode vor allen andern den Vorzug zu verdienen. Ich habe sie schon öfters mit Erfolg angewandt.

Bourdier's Methode. Des Morgens nüchtern eine Drachme Schwefeläther in einem Glase einer starken

Abkochung der Farrenkrautwurzel, eine Stunde später 2 Drachm. Ol. Ricini mit Syrup. Dieses am zweiten und dritten Tag am Morgen wiederholt.

Breton's Methode. Zwei Unzen der frischen Rinde der Wurzel von Punica granatorum werden mit $1\frac{1}{2}$ Pinten Wasser bis zu $\frac{3}{4}$ Pinten eingekocht und hievon viermal hinter einander jede halbe Stunde ein Weinglas voll gegeben.

Auch wurde empfohlen, den Bandwurm, wenn ein Theil von ihm aus dem After heraushänge, nach einem gemachten Einschnitt in denselben mit Blausäure zu bestreichen.

§. 1822.

2) Um die *Zufälle*, welche durch die Würmer hervorgebracht sind, *zu mässigen*, ist das zuverlässigste Mittel, die Würmer schnell zu vertreiben. Lässt sich ihr baldiger Abgang nicht erwarten, so stehe man während des Vorhandenseins heftiger Zufälle von dem Versuche, den Wurm abzutreiben, ab, und suche die Würmer durch die Darreichung von reichlicher Milch und Mehlnahrung zu beruhigen, und die Empfindlichkeit des Kranken durch die besänftigende Methode, z. B. durch etwas Opium, zu vermindern. Im Uebrigen sind die bezeichneten Krankheitszustände nach ihrer Natur zu behandeln.

§. 1823.

3) Um die *Neigung zur Wurmerzeugung im Körper zu tilgen*, lasse man den Kranken eine Diät halten, welche der Wurmbildung nicht günstig ist, daher nicht zu viel Nahrung und mehr Fleisch, Wein und Gewürze als Milch- und Mehlspeisen geniesse, zugleich wende man längere Zeit aromatische und bittere Mittel an.

Die Läusesucht.

(*Phthiriasis.*)

§. 1824.

Man glaubt, dass es einen eigenthümlichen krankhaften Zustand des Körpers gebe, der zur Läuseerzeugung beitrage, indem in manchen Krankheiten sich besonders leicht Läuse bilden und es selbst Fälle geben soll, in welchen Läuse aus innern Theilen, den Ohren, der Nase, dem Munde, dem After, der Harnröhre etc., in welchen Theilen sich viele Knötchen und Pusteln bilden, hervorkommen und auch aus solchen Pusteln bei der Oeffnung derselben herauskommen sollen. Die Lymphe und die ausgedünstete Materie sollen eine eigenthümliche, zur Läuseerzeugung beitragende Beschaffenheit haben. — Es gibt drei Arten von Läuse auf dem menschlichen Körper: Die Kopflaus (Pediculus capitis), die Kleiderlaus (P. vestimenti) und die Filzlaus (P. pubis, Morpion).

§. 1825.

Es kommen die Läuse besonders bei Kindern vor, bei vieler Schuppenbildung in dem behaarten Theile des Kopfes, bei vielem Schwizen, bei der Lungenschwindsucht und andern langwierigen Krankheiten und bei grosser Unreinlichkeit. Auch werden beschuldigt: der reichliche Genuss der Feigen, des Vipernfleisches, der Genuss von verdorbenem Fleische etc.

§. 1826.

Behandlung. Fleissiges Kämmen, Waschungen mit einem Aufguss von Semina Sabadilli oder Staphisagriae, Beschmieren der Theile mit der grauen Quecksilbersalbe oder einer andern Mercurialsalbe.

Achte Krankheitsfamilie.

DIE NERVENKRANKHEITEN.

Fr. Hoffmann (Diss. Halle 1708, Opp. omn. Tom. VII.). — *Boerhaave* (lat. 2 Tom. Lugd. Bat. 1761). — *de la Roche* (aus d. Franz. v. Merzdorf. 2 Bde. Halle 1794). — *Tissot* (a. d. Franz. v. Ackermann, 3 Bde. Lpz. 1789—91, v. Weber, 4 Bde. Königsberg 1781—85). — *Whyte* (aus d. Engl. Lpz. 1794). — *Reuss* (Prag 1788). — *Michell* (Wien 1798). — *Reil* (über d. Fieber. 4r Bd.). — *v. Hoven* (Nürnberg 1813). — *Georget* (aus d. Franz. v. Kummer, Lpz. 1823. Paris 1827). — *Feuerstein* (Lpz. 1828). — *Mart* (Lond. 1835). — *Travers* (London 1835).

Erster Abschnitt.

Von den Nervenkrankheiten im Allgemeinen.

§. 1827.

Nervenkrankheiten im engern Sinne des Wortes nennen wir die Krankheiten, in welchen krankhafte Aeusserungen in der Empfindung, der Muskelbewegung oder den geistigen Verrichtungen als solche Krankheitserscheinungen auftreten, welche für sich eine Krankheitsart bilden, in so fern die leztern nicht wirkliche Seelenstörungen sind.

§. 1828.

Die drei angegebenen krankhaften Lebensäusserungen

kommen sehr häufig als Symptome anderer Krankheiten vor, z. B. der Schmerz in der Entzündung, eine zitternde Bewegung der Muskeln im Nervenfieber, das Irrereden in allen heftigen Fiebern, und sind auch für sich betrachtet wirkliche Nervenkrankheiten; doch konnten sie nicht von der Krankheitsform, mit der sie verknüpft sind, getrennt werden und mussten daher in andern Kapiteln der Krankheitslehre erwähnt werden. Auf der andern Seite kommen in Nervenkrankheiten, ausser den angegebenen drei Krankheitsäusserungen, noch andere krankhafte Zufälle vor, z. B. Veränderungen der Temperatur und der Absonderungen; diese Zufälle sind aber immer nur die Symptome deuteropathischer Krankheitsvorgänge und sind nicht ein Theil der reinen Nervenkrankheit, welche auch bestehen kann, ohne dass jene Zufälle eintreten. So z. B. ist Absonderung eines sehr blassen Urins ein gewöhnlicher Begleiter von Krampfkrankheiten, es bildet aber diese krankhafte Absonderung nicht einen Theil des Krankheitsprozesses, der den Krampf in den Muskeln darstellt, sondern hat ihren Siz in einem ganz andern Organ und fehlt auch oft, ungeachtet Krampf vorhanden ist.

§. 1829.

Die Krankheitsform ist oft sehr einfach, so dass zuweilen nur eine einzige Krankheitserscheinung von den erwähnten drei Symptomenreihen vorhanden ist, z. B. Schmerz, oft ist sie aber zusammengesezter, so dass fehlerhafte Empfindungen, krankhafte Muskelbewegungen und Störungen in den Aeusserungen der psychischen Thätigkeit zugleich vorhanden sind, wie z. B. in der Fallsucht.

Die Abweichungen vom gesunden Zustand bestehen entweder in vermehrten oder in der Art nach veränderten oder in verminderter Empfindung, Muskelbewegung und Aeusserung der geistigen Thätigkeit. — Vermehrt

und häufig zugleich der Art nach verändert erscheint die Empfindung bei erhöhter Empfindlichkeit der Sinnesorgane und bei Sinnestäuschungen, wie z. B. bei der Lichtscheue, der scheinbaren Wahrnehmung von Funken vor den Augen, dem Ohrenklingen etc., und bei krankhaften Empfindungen im Gemeingefühl, z. B. dem Schmerze. Vermehrt erscheint die Muskelbewegung in den tonischen und klonischen Krämpfen, wovon die erstern diejenige Krämpfe sind, in welchen die Muskeln andauernd zusammengezogen sind und also der vom Krampfe befallene Theil unbeweglich ist, oder sich langsam zusammenziehen und also den leidenden Theil langsam bewegen (meistens verdrehen), und die leztern in schneller Hin- und Herbewegung des Theiles (Zuckungen) bestehen. Vermehrt und verändert sind die Aeusserungen des geistigen Lebens in vielen Affecten und Leidenschaften, die Begleiter vieler Nervenkrankheiten sind, in der Schlaflosigkeit und in dem Irrereden, das in manchen Nervenkrankheiten vorkommt, wie z. B. in dem sogen. Delirium tremens. Dieses Irrereden ist sehr wohl von dem, die eigentliche Seelenstörung kund gebenden Irresein zu unterscheiden, indem es mit dem bestehenden Nervenleiden eng verknüpft und meistens nur vorübergehend ist, und nie einen moralischen Ursprung hat. — Vermindert oder aufgehoben erscheint die Empfindung bei Schwäche der Sinnesorgane und bei Mangel der Empfindungen, die das Gemeingefühl im normalen Zustand gibt, namentlich des Durstes und des Hungers, die Muskelbewegung bei der Starrsucht, Ohnmacht, Lähmung, die Aeusserung der geistigen Thätigkeit im schlafsüchtigen Zustande, Betäubung, Ohnmacht, Schlagfluss etc.

Oefters sind mit diesen Störungen noch solche in der Blutbewegung, Wärmebildung, den Absonderungen oder der Ernährung verbunden, so z. B. wird der Theil, welcher von Nevralgie befallen ist, oft röther und

wärmer, als im gesunden Zustande, bei dem Krampfe hat der Harn gewöhnlich eine blasse Beschaffenheit, der gelähmte Theil zehrt ab etc.

§. 1830.

Der Verlauf der Nervenkrankheiten ist bald hizig, bald langwierig. Alle Nervenkrankheiten, mit Ausnahme derjenigen, in welchen das Nervenleben mehr oder weniger zernichtet ist, haben das Eigenthümliche, dass die Krankheitserscheinungen nie in derselben Heftigkeit ununterbrochen andauern, sondern nachlassen oder, was der häufigere Fall ist, zeitweise aussezen. Diesemnach machen die meisten Nervenkrankheiten Anfälle und es scheint oft selbst, wie wenn in der Zeit zwischen den Anfällen durchaus kein krankhafter Vorgang im Körper statt finde. Der Anfall kehrt zuweilen in einer bestimmten, meistens jedoch in unbestimmter Zeit zurück, er entwickelt sich entweder allmählig oder tritt sogleich mit grosser Heftigkeit auf und verschwindet entweder allmälig oder hört plözlich auf. Das Ende des Anfalls ist zuweilen von Ausscheidungen bezeichnet, doch kommen dieselben auch bei der nämlichen Krankheitsart, bei der sie zuweilen statt finden, nicht immer vor, und scheinen bei keiner einzigen Nervenkrankheit eine nothwendige Bedingung der Entscheidung zu sein. Wie der einzelne Anfall, so kann in jeder Nervenkrankheit das ganze Nervenleiden sich ohne sichtbare Ausscheidungen heben; öfters jedoch geschieht der Uebergang in Gesundheit unter Ausscheidung von Stoffen unter Schweissen, Ablagerungen im Urin, nach dem Zustandekommen der monatlichen Reinigung, der Hämorrhoiden, nach Bildung von Eiterheerden, von Geschwüren, nach Entstehung eines Rothlaufes, der Gicht etc. Zuweilen haben die Nervenkrankheiten Nachkrankheiten zur Folge. Manchmal sind dieses Nervenkrankheiten anderer Art, wie z. B. die Lähmung zuweilen auf Krämpfe folgt; oft

sind es Congestionen, Entzündungen, Geschwülste, Abzehrung, Wassersucht etc. Den Tod können die Nervenkrankheiten herbeiführen: entweder durch Hemmung der Verrichtung der wichtigern Theile des Nervensystems, z. B. des Gehirnes, wo sodann sich mit dem reinen Nervenleiden stets eine Störung in den vegetativen Lebensprozessen verbindet, oder durch Erschöpfung der Kräfte. Auch können die Nachkrankheiten zum Tode führen.

§. 1831.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Nach den heftigsten Nervenzufällen findet man oft durchaus keine Veränderung in dem Gehirne, dem Rückenmarke und den Nerven, ja es scheint keine einzige Nervenkrankheit zu geben, die beständig mit einer bestimmten Structurveränderung in den Nerven verbunden wäre. Oft findet man aber auch in den Nerven oder ihren Hüllen oder in den angrenzenden weichen und harten Theilen Entzündungen, Ausschwizungen, Eiterung, Erweichung, Verhärtung, Geschwülste etc.

§. 1832.

Anlage zu Nervenkrankheiten hat mehr das weibliche, als das männliche Geschlecht, besonders zart gebaute Frauenzimmer mit leicht erregbarem Gemüthe. In gewissen Perioden des Lebens ist der Körper auch mehr als in andern zu Nervenkrankheiten geneigt, so kommen im Kindesalter, besonders in der Zahnperiode, sehr häufig Zuckungen (Gichter) vor, zur Zeit der Geschlechtsentwicklung bilden sich oft schwere Nervenkrankheiten aus, zur Zeit der monatlichen Reinigung, auch nach der Empfängniss, während der Entbindung und im Wochenbette sind die Frauenzimmer oft besonders zu Krämpfen geneigt. Im höhern Alter hören oft die Nervenkrankheiten, welche den Character der Erregung tragen, wie z. B. die Hysterie, auf, es treten

aber eher solche mit Unterdrückung der Lebensäusserungen, wie der Schlagfluss und die Lähmung, ein. Zuweilen ist die Anlage zu gewissen Nervenkrankheiten angeerbt, indem man zuweilen bei den Kindern eine Hinneigung zu demselben Nervenleiden, mit welchem eines der Eltern behaftet war, bemerkt; auch sollen zuweilen die Umstände, unter welchen die Zeugung vorgenommen worden ist, den Grund zur Anlage des Kindes zu Nervenkrankheiten legen; dieses soll namentlich bei dem bei Berauschung eines der Eltern, bei erzürntem Gemüth oder unter Abneigung des einen Theiles gegen den andern erfolgten fruchtbaren Beischlaf zuweilen der Fall sein.

§. 1833.

Die häufigsten Gelegenheitsursachen zu Nervenkrankheiten sind Gemüthsbewegungen, besonders häufig wiederkehrender Verdruss, anhaltender Kummer, Schrecken, z. B. bei dem Anblick eines Schauder erregenden Gegenstandes, wie namentlich der mit heftigen Krämpfen behafteten Personen, auch zu starke und zu frühzeitig stattfindende Geistesanstrengung, übermässige und besonders frühe vorgenommene Geschlechtsreizungen und unbefriedigter starker Geschlechtstrieb, ferner Hemmung der monatlichen Reinigung, Erkältung, der Wurmreiz, der Missbrauch des Weines, des Kaffees, in den Körper aufgenommene Gifte und gewisse Contagien, Verlezungen der Substanz des Gehirnes, des Rückenmarks oder einzelner Nerven durch äussere Einwirkungen und mancherlei Krankheiten etc., auch grössere oder geringere Entziehung nothwendiger Einflüsse auf das Nervensystem, wie z. B. des Blutes, der atmosphärischen Luft, des Lichtes etc.

§. 1834.

Die Ansichten, die man über das Wesen der Nervenkrankheiten aufgestellt hat, gründen sich auf sehr verschiedene Vorstellungsarten über die Wirkungsart

der Nerven, die sich auf folgende zurückführen lassen: 1) Auf mechanische Vorstellungsweisen. Man hielt die Nerven für feste, elastische Fasern, deren Wirkung, wie die der Saiten musikalischer Instrumente durch schwingende Bewegung erfolge. Diese Meinung trifft man schon bei griechischen Aerzten an und sie hat sich auch bis in die neuere Zeit erhalten, doch wurde dieselbe nie die herrschende. Am meisten trug wohl zu ihrer Verbreitung die *Stahl*'sche Schule bei. — Indem man durch Anschauung erkannte, dass die Nerven nicht wie Saiten gespannt in den Geweben liegen, so nahm man an, dass das Nervenmark aus elastischen Kügelchen bestehe, welche durch Oscillation die Wirkung der Nerven hervorbringen sollen. — 2) Auf dynamische Vorstellungsweisen. Viel verbreiteter, als jene mechanischen Ansichten, war die Meinung, dass in den Nerven ein feines Fluidum sich bewege, das man Lebensgeist, Nervengeist oder Aether, Anima sensitiva, Nervenfluidum etc. nannte. Diese Ansicht stammt wohl von *Galen* her, und wurde von den berühmtesten Aerzten der ältern und der neuern Zeit auf verschiedene Weise modificirt wiederum vorgetragen, namentlich von *Fr. Hoffmann*, *Boerhave*, *Tissot*, *Sömmering*. In der neuesten Zeit hat *Ehrenberg*, vermittelst des Mikroskopes, entdeckt, dass Gehirn und Nerven aus äusserst dünnen Röhren bestehen, in welchen eine feine Flüssigkeit enthalten sei. Bestätigt sich diese Entdeckung, so wird sie uns einen Schritt weiter in der Kenntniss vom Nervenleben führen, so wie auch die Entdeckung von *Bell*, über die Verschiedenheit der vordern und hintern Rückenmarksnerven, über die Bewegungen im Nervensystem Licht verbreiten kann. Endlich hat man, auch ohne gerade bestimmte Strömungen eines Fluidums anzunehmen, den Grund der Wirkung der Nerven in einer Art Electricitätsentwicklung gesucht und das Nervensystem mit der Voltaischen

Säule verglichen. — Die auf diese Meinungen gestüzten Theorien der Nervenkrankheiten leiten nun die Krankheitszufälle bald von einer zu grossen Spannung oder Erschlaffung der Nerven, bald von einer fehlerhaften Richtung in der Bewegung des Nervenfluidums, oder von Schärfe des Nervensaftes, so wie auch von einem Fehler in den Electricitätsverhältnissen zwischen den Nerven und der Aussenwelt etc. ab, doch ist die Theorie der Nervenkrankheiten noch beinahe gar nicht ausgebildet und ermangelt beinahe ganz einer sichern Grundlage.

§. 1835.

Indem wir von der Physiologie nähern Aufschluss über die Vorgänge innerhalb der Nerven zu erhalten abwarten müssen, beschränke ich mich auf folgende Bemerkungen über das Wesen der Nervenkrankheiten: Bei sämmtlichen Nervenkrankheiten nimmt das Blut keinen unmittelbaren Antheil an dem Krankheitsprozess. Zwar liegt häufig in dem Blute die Ursache der Nervenkrankheit, es kann aber eine solche nur als die entferntere Ursache angesehen werden, indem in der Wechselwirkung zwischen Nerven und Blut weder die nächste Ursache der Empfindung, noch der Muskelbewegung, noch der Gedankenbildung liegt, und also auch eine Störung in dem normalen Verhältniss zwischen Nerven und Blut nicht die nächste Ursache einer fehlerhaften Empfindung, die äussere Gegenstände veranlassen, noch des Krampfes, noch des Irreredens sein kann. Dass die erwähnten Verrichtungen nicht in einem Wechselprozess zwischen Nerven und Blut begründet sind, geht schon daraus hervor, dass, wie ich häufig beobachtet habe, niedere Thiere, denen man alles Blut entleert, doch noch Berührung empfinden und vor dem Verfolger die Flucht ergreifen, also sich willkürlich bewegen und sich Vorstellungen zu bilden im Stande sind. Bewirkt das

Blut eine Nervenkrankheit, so kann dieses dadurch geschehen, dass das in den Gefässen angesammelte oder aus denselben ausgetretene Blut auf das Gehirn, das Rückenmark oder auf Nerven drückt, oder dass schädliche Stoffe in demselben enthalten sind, die die Nerven reizen oder auf das Nervenleben zerstörend wirken, in welchem Falle aber auch diese Einwirkung des Blutes auf die Nerven nicht die nächste Ursache der Nervenkrankheit ist, welche vielmehr in einem andern Verhältniss, z. B. bei dem Krampfe in einem fehlerhaften Verhältnisse der Nerven zu den ihnen in dem Muskel entgegengeseztcn Similartheilen, zu suchen ist, oder dadurch, dass durch Entziehung des Blutes die Nervenkraft nicht wieder ersezt wird, wodurch secundär Gefühl, Muskelbewegung und geistige Thätigkeit gestört werden, oder dass durch plözliche Aufhebung der Wechselprozesse zwischen Nerven und Blut momentan sich die Nervenkraft in höherm Grade auf die Muskeln wendet und Krämpfe erzeugt etc. — In dem physiologischen Theil dieses Werkes habe ich die Ansicht ausgesprochen, dass in gewissen Nervenverrichtungen, z. B. bei den Sinnesempfindungen, in dem Nervenagens gewisse Gegensäze entstehen, ähnlich den Theilungen des Lichtstrahles in Farben, und habe verschiedene Gründe angeführt, welche dieses wahrscheinlich machen. Ist nun diese Annahme richtig, so lässt sich denken, dass bei gewissen Krankheiten der Nerven, z. B. bei Sinnestäuschungen, fehlerhafte Brechungen in dem Strahle des Nervenagens vor sich gehen.

§. 1836.

Das Wesen des Krampfes scheint mir in einer krankhaften, in dem Gewebe der Muskeln und der übrigen, einer krampfhaften Zusammenziehung fähigen Gebilde vor sich gehenden Anziehung der in dieselben eindringenden Nerven auf die in dem Gewebe des Organs

ihnen entgegenstehenden Similartheile zu bestehen. Es scheint die Muskelbewegung und also auch die krampfhafte Bewegung nach denselben Gesezen zu geschehen, nach welchen die Bewegungen der Dotterkügelchen in den Eiern der Batrachier bei den mannigfaltigen Formbildungen, welche der bleibenden Gehirnbildung vorangehen, höchst wahrscheinlich bewirkt werden, und nach welchen auch die Bewegung des Chylus und des Blutes geschieht, insoweit sie nicht durch mechanische Einwirkung allein bewirkt wird, nämlich durch die Einwirkung zweier, einander in ihren Kräften entgegengesezten Theile auf einander, wodurch Anziehung beider auf einander erfolgt, wie dieses auch bei der electrischen Anziehung der Fall ist. Der eine dieser die Bewegung bedingenden Factoren ist bei der Muskel- und Blutbewegung immer das Nervensystem, der andere bei der Bewegung des Blutes die Blutkügelchen und vielleicht auch die Blutflüssigkeit, bei der Muskelbewegung aber die, nebst der Nervensubstanz, das Gewebe des Organs bildenden Similartheile (Muskularsimilartheile).

§. 1837.

Vorhersage. Die meisten Nervenkrankheiten werden, ungeachtet ihrer scheinbaren Heftigkeit, in der Regel nicht lebensgefährlich, doch gibt es einige, wie der Schlagfluss und der Wundstarrkrampf, die dieses im höchsten Grade sind. Mehrere Nervenkrankheiten gehören zu den leicht heilbaren Krankheitszuständen, andere spotten unserer Kunst.

§. 1838.

Behandlung der Nervenkrankheiten. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Man suche den Reiz zu entfernen, der noch fortdauernd auf's Nervensystem einwirkt. Man suche das Gemüth zu beruhigen, beuge der Onanie vor, entferne Würmer und andere gastrische Reize, suche die monatliche Reinigung wiederum her-

zustellen, man suche den etwa stattfindenden Blutandrang nach den Centraltheilen des Nervensystems zu mässigen, Blutstockungen im Pfortadersysteme zu zertheilen, eine Entmischung des Blutes, die etwa entferntere Ursache der Nervenkrankheit sein könnte, zu heben etc. Ebenso suche man auch die normalen Reize auf's Nervensystem, wo sie etwa fehlen, wiederum herzustellen, man suche die Bereitung eines bessern Blutes zu bewirken, empfehle dem Kranken einen Aufenthalt in einer sehr gesunden Atmosphäre etc.

§. 1839.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Besteht die Nervenkrankheit in erhöhter Lebensthätigkeit im Nervensystem, so ist die besänftigende Methode angezeigt. In manchen Fällen genügen schon fette Mittel, so wie auch schleimige und zuckerhaltige Substanzen, und zwar hüllen diese Dinge nicht allein ein und wirken dadurch, dass sie einen fremden Reiz unschädlich machen, sondern vermögen die erhöhte Sensibilität wirklich zu mässigen. Sie wirken vorzüglich an dem Orte, auf den sie angewandt werden, wie z. B. bei Schmerzen in äussern Theilen, bei welchen Einreibungen von erwärmtem Oele, das Auflegen von Fettläppchen, Pflaster etc. gute Dienste thun, und bei Magen- und Darmkrämpfen, bei welchen Oelmixturen oft sehr nüzlich sind; sie wirken aber auch auf entfernte Theile, so z. B. mässigen zuckerhaltige Stoffe den Husten, Oelmixturen den Blasenkrampf etc. Besänftigend wirken ferner feuchte und trockene Wärme, welche vermittelst Umschläge, warmer Wasser-, Dampf- oder Luftbäder, Kräutersäckchen, erwärmter Tücher, heissgemachter irdener Deckel, Wärmflaschen etc. angewandt werden. — Vorzüglich mässigen die Narcotica die erhöhte Sensibilität und unter ihnen am zuverlässigsten das Opium. Sie bringen diese Wirkung sowohl in dem Theil, auf

den sie angebracht werden, hervor, als auch im ganzen Nervensystem; alle wirken mehr oder weniger die Gehirnthätigkeit unterdrückend, das Opium schlafmachend, mehrere zeigen noch ausserdem eine besondere Beziehung zu andern Theilen des Körpers, so wirken die Digitalis und die Blausäure auf das Herz, die Nux vomica auf das Rückenmark etc. — In manchen schmerzhaften und krampfhaften Krankheiten werden auch gewisse erregende Mittel, die zugleich eine schmerz- und krampfstillende Wirkung haben, mit Nuzen angewandt. Zu diesen Mitteln gehören die versüssten Säuren (die *Hoffmänn*'schen Tropfen), die Naphthen, der Hirschhorngeist, die Chamillen, die Valeriana, das Chenopodium ambrosioides, Asa foetida, Castoreum, Moschus etc. Man sucht ihre Wirkung in einer gleichförmigen Vertheilung der Sensibilität durch allgemeinere Erregung der Lebensprozesse, doch scheint diese Erklärung nicht ganz zu genügen. — Mit Nuzen bedient man sich, um die erhöhte Sensibilität abzuleiten, der antagonistisch wirkenden Mittel, der Senfteige, Blasenpflaster, der Urtication und selbst der Moxen. Auf antagonistische Weise wirkt wohl auch die Erregung von Absonderungen, vorzüglich des Schweisses, welche oft vorzügliche Mittel sind, um Schmerzen und Krämpfe zu mässigen. — Zum Theil auf antagonistische Weise mögen gewisse in grössern Gaben Erbrechen erregende krampfstillende Mittel wirken, wie die Ipecacuanha, das Zincum axydatum, Z. sulphuricum und Z. hydrocyanicum, Bismuthum nitricum, Kupfer-, Silber- und Goldpräparate etc., doch scheinen sie auch noch auf andere Weise besänftigend zu wirken, da sie auch bei Magenkrampf angewandt werden, wo sie aber immerhin unzuverlässige und leicht nachtheilig werdende Mittel sind. — In manchen Fällen ist auch eine psychische besänftigende Behandlungsweise von nicht unbedeutendem Einfluss und zwar sowohl un-

mittelbare Beruhigung des Gemüthes durch Tröstung etc., als auch Ableitung der Aufmerksamkeit auf andere Gegenstände, wodurch z. B. Krämpfe verhütet werden können. — Geht die Nervenkrankheit von einem einzelnen Nerven aus, so kann nach Umständen die Zusammendrückung und selbst die Durchschneidung des Nervens unternommen werden. — Endlich muss auch der thierische Magnetismus erwähnt werden, der, um zu besänftigen, vermittelst der einfachen Striche, des Handauflegens, des Fächelns etc., in Anwendung gebracht werden soll.

§. 1840.

Qualitative Abweichungen in der Nerventhätigkeit, z. B. Gefühlstäuschungen, sind meistens auch mit Veränderungen im Grade der Thätigkeit verbunden und können sehr häufig durch die besänftigende Methode, zuweilen auch durch ein, die Nerventhätigkeit erhöhendes Verfahren beseitigt werden. Ausserdem kann man auf verschiedene Weise die Nerventhätigkeit der Art nach umstimmen, z. B. durch Gemüthseindrücke, durch Veränderung der Gewohnheiten und der ganzen Lebensweise, durch die Eckelkur, Brechmittel, Begiessungen mit kaltem Wasser und vielleicht auch durch manche der gegen verschiedene Nervenkrankheiten als specifisch gerühmten Mittel.

§. 1841.

Liegt das Wesen der Nerventhätigkeit in verminderter Lebensthätigkeit der Nerven, so sind, um die Empfindung und Bewegung wieder herzustellen oder zu erhöhen, die erregenden Mittel angezeigt, wie Pflanzentheile mit ätherischem Oele, namentlich die Herba et Flores Melissae, Majoranae, Menthae, Lavendulae, Serpylli, Chamomillae, rad. Valerianae, Angelicae, Serpentariae, flor. Arnicae, rad. Senegae. Sem. Anisi, Foeniculi, Carvi, Baccae Juniperi, die Nelken, der Zimmt, die Muskat-

nüsse, Vanille, Ingwer, Pfeffer etc., die aus diesen Stoffen bereiteten ätherischen Oele, der Wein, der Weingeist, die versüssten Säuren, die Naphthen, Ammonium, Castoreum, Moschus, Phosphor u. a., welche Mittel innerlich und äusserlich in Anwendung gebracht werden können. Oft ist es gut, mit diesen Mitteln aromatisch-tonische zu verbinden oder von den flüchtig erregenden den Uebergang zu denselben zu machen.

§. 1842.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Nicht selten gesellen sich zu den Nervenzufällen Andrang des Blutes und selbst ein entzündlicher Zustand in dem ergriffenen Organ hinzu. Sind diese Zufälle nicht von der Bedeutung, dass augenblickliche Gefahr daraus zu entstehen droht, so hat man in der Regel nicht nothwendig, viel gegen dieselben zu unternehmen, indem meistens der Nervenzufall bald vorübergeht und sodann diese Erscheinungen ebenfalls verschwinden; werden jedoch dieselben Gefahr drohend, so muss zur Ader gelassen werden, oder es müssen Blutegel gesezt, kalte Umschläge gemacht werden etc. Bringen die Nervenzufälle krankhafte Absonderungen hervor, so muss der erzeugte Stoff ausgeleert werden, und das gereizte Absonderungsorgan vor Zerstörung geschüzt werden. Leidet in Folge der Nervenkrankheit die Ernährung, so muss das geeignete Verfahren, um die Reproductionsthätigkeit zu erhöhen, in Anwendung gebracht werden.

§. 1843.

Eintheilung der Nervenkrankheiten. Da die Verrichtungen des Nervensystems, deren Störungen die eigentlichen Nervenkrankheiten sind, wie andere Funktionen in dreierlei Weise vom normalen Zustand abweichen können, indem sie blos krankhaft vermehrt, oder der Art nach verändert, oder krankhaft vermindert sein

können, so könnte man auch die Nervenkrankheiten nach diesen drei verschiedenartigen Störungen des gesunden Zustandes in drei Ordnungen theilen; da jedoch die qualitativen Fehler immer auch mit quantitativen Störungen im Nervenleben verbunden sind, so kann man wohl sämmtliche Nervenkrankheiten in zwei Ordnungen theilen. *Erste Ordnung*: Nervenkrankheiten mit krankhaft erhöhter Nerventhätigkeit. Diese Ordnung enthält drei Krankheitsfamilien. *a*) Die krankhaft erhöhten Empfindungen (Hyperaestheses), zu welchen gehören: die erhöhte Empfindlichkeit der Augen, des Ohres, der Organe des Geruches und des Geschmackes, der Haut, die schmerzhaften Krankheiten, der erhöhte Geschlechtstrieb, die Hypochondrie und die Hysterie. *b*) Die Krämpfe (Spasmi) und zwar die der Muskeln der willkürlichen Bewegung, insbesondere die Fallsucht, die Eclampsia, der Veitstanz, und der Starrkrampf, und die der Muskeln der unwillkürlichen Bewegung, der Lungenkrampf, der Keuchhusten, das Herzklopfen, das Erbrechen. *c*) Vom Nervensystem ausgehende krankhafte Erregung der geistigen Thätigkeit: die Schlaflosigkeit, das Nachtwandeln, der Säuferwahnsinn. *Zweite Ordnung*: Nervenkrankheiten mit verminderter Nerventhätigkeit. Hieher gehören die verminderte Empfindlichkeit der Sinnesorgane, die Ohnmacht, der Scheintod, die Starrsucht, der Schlagfluss und die Lähmung.

Als Anhang zu den Nervenkrankheiten mögen endlich einige Krankheiten angeführt werden, welche meistens nicht einfache Krankheitsarten und auch nicht immer reine Nervenkrankheiten sind, bei denen aber doch gewisse Nervenzufälle die wichtigsten und wesentlichsten Erscheinungen sind. Es sind dieses die durch Vergiftungen entstandenen Krankheiten und einige ihnen ähnliche Krankheitszustände, zu welchen leztern die durch verdorbene Würste hervorgebrachten Krankheits-

zufälle, die Kriebelkrankheit, die Cholera, die durch das Milzbrandcontagium entstandene Krankheit und die Hundswuth gehören.

Erste Ordnung der Nervenkrankheiten.

Nervenkrankheiten mit Aeusserung erhöhter Nerventhätigkeit.

Erste Gruppe:

Die krankhaften Empfindungen. *)

Die Schmerzkrankheiten.

(*Nevralgiae.*)

§. 1844.

Es haben alle Schmerzen in dem Nervensystem ihren Siz und es könnte daher der Ausdruck Nevralgie (Nervenschmerz) als ein Pleonasmus verworfen werden; doch nennt man nicht alle Schmerzen Nevralgien, sondern nur diejenigen, in welchen der Schmerz nicht im Gewebe

*) Die Schilderung der krankhaften Empfindlichkeit der Sinnesorgane kann hier umgangen werden, da die Darstellung der Augen- und der Gehörkrankheiten von diesem Lehrbuche ausgeschlossen sind und erhöhte Empfindungen in den übrigen nicht leicht als selbstständige Krankheiten auftreten und das Nöthige über diese Erscheinungen in der allgemeinen Krankheitslehre, Symptomatologie, von mir vorgetragen werden wird.

eines Organs, sondern in Nervenstämmen oder Aesten seinen Siz hat; auch erscheint bei den Nevralgien der Schmerz nicht blos als ein untergeordnetes Symptom einer andern Krankheit, sondern ist immer sehr heftig, oft zermalmend und die einzige oder Haupterscheinung des Uebelbefindens.

§. 1845.

Nach Verschiedenheit des Sizes des Schmerzes in dem einen oder dem andern Theile des Nervensystems hat man verschiedene Arten der Nevralgien angenommen, im Gehirne (Cephalalgia), im Rückenmark (Rhachialgia), in dem Augenhöhlenstirnzweige des dreiästigen Nervens (Nevralgia frontalis), in dem Infraorbitalnerven (Nevr. infraorbitalis), in dem Unterkiefernerven (Nevr. maxillaris), in den Nerven des Saamenstranges und Hodens (Nevr. ilioscrotalis), im ischiadischen Nerven (Nevr. femoro-poplitaea), im Schenkelnerven (Nevr. femoro-praetibialis), in den Sohlennerven (Nevr. plantaris), in dem Ellenbogennerven (Nevr. cubito-digitalis) etc. *) — Ich werde einige der wichtigern der hier angeführten Nevralgien vollständiger darstellen, ausserdem aber eine zweite Gruppe anführen, die man gewöhnlich nicht zu den Nevralgien zählt, das sind die Schmerzkrankheiten verschiedener Eingeweide. Hieher rechne ich vorzüglich die Brustbräune, den Magenkrampf, und die Kolik.

*) Vergleiche *Chaussier* (Table synoptique de la névralgie. Paris 1801).

Das Nervenkopfweh.

(*Cephalalgia.*)

Fr. Hoffmann (Diss. Halle 1731). — *Brendel* (Diss. Gött. 1747). — *Nicolai* (Diss. Halle 1763, Jena 1785, 86, 88). — *S. G. Vogel* (kleine Schriften. Berlin 1814).

§. 1846.

Das Nervenkopfweh ist ein meistens heftiger, anfallsweise sich einstellender Kopfschmerz, welcher gewöhnlich als das einzige Symptom einer Gehirnaffection sich darstellt, oder wenn noch ein anderes Gehirnleiden besteht, sich nicht als ein Symptom dieses Krankheitsprozesses, sondern als eine deuteropathische Affection ausspricht.

§. 1847.

Es stellt sich das ganz reine Nervenkopfweh von Zeit zu Zeit als ein Kopfschmerz ein, welcher meistens sehr heftig wird, so dass oft die Kranken laut wehklagen und mit beiden Händen den Kopf halten. Der Schmerz ist oft mehr über den ganzen Kopf verbreitet, oft nur auf einer Seite (das halbseitige Kopfweh, Hemicrania, Migraine), oft aber nur auf *eine* Stelle beschränkt (Clavus). Meistens ist der Schmerz mehr stechend und reissend, oft aber auch drückend (Carebaria). Oft hält er nur wenige Minuten, oft mehrere Stunden und zuweilen, jedoch mit bedeutenden Nachlässen, einen Tag und länger an. Oft ist das Gesicht dabei blass und mit kaltem Schweisse bedeckt, oft wird es aber auch roth und heiss; doch ist dieses nur eine vorübergehende Erscheinung, ganz von der Heftigkeit des Schmerzes abhängig, und es ist nicht der andauernd fortschreitende Krankheitszustand zu bemerken, wie in der Gehirnent-

zündung.*) — Ist das Nervenkopfweh eine deuteropathische Affection von einem andern Gehirnleiden, so bestehen die Zeichen dieses Leidens gewöhnlich andauernd fort, z. B. die Zeichen eines Druckes auf das Gehirn, es gesellen sich aber von Zeit zu Zeit heftige Kopfschmerzen hinzu.

Der einzelne Anfall und die ganze Krankheit hört oft auf, ohne dass Ausscheidungen eintreten, oft auch, nachdem Entleerungen aus irgend einem Organe, z. B. dem Darmkanal, eingetreten sind, wodurch oft die entferntere Ursache des Kopfschmerzes hinweggeräumt wird. Zum Tod führt der Nervenkopfschmerz, wenn er eine organische Veränderung im Gehirne hervorbringt, vielleicht auch in sehr schweren Fällen ohne diese durch Verzehrung der Kräfte.

§. 1848.

Ergebniss der Leichenöffnungen. In einem Falle, in welchem Anfälle von zermalmendem Kopfschmerz mehrere Jahre hindurch sich sehr häufig eingestellt hatten, fand ich im Gehirne durchaus keine Veränderung, dagegen in der Leber Scirrhus, in einem andern Falle eine Encephaloidengeschwulst zur Seite der *Varol'*schen Brücke; auch werden Exostosen, Erhärtung des Gehirnes, Erweichung desselben etc. angetroffen.

§. 1849.

Ursachen. Es kommt das Nervenkopfweh vorzüglich bei Personen vor, die an einem gereizten Zustand des Nervensystems leiden, namentlich bei Hypochondristen und den hysterischen Personen. Gelegenheitsursachen können alle Einflüsse werden, die Gehirnentzündung veranlassen können (Vergleiche §. 526), ausserdem sind dieses aber verschiedene chronische Uebel, wie Exostosen,

*) Vergl. den §. 524, in welchem die Diagnose der verschiedenen Arten des Kopfschmerzes angegeben ist.

Geschwülste in der harten Hirnhaut, Caries in den Schädelknochen, der Bandwurm, Scirrhus der Leber etc.

§. 1850.

Vorhersage. Es ist das Nervenkopfweh schwer auf die Dauer zu heilen, doch wird es selten gefahrbringend.

§. 1851.

Behandlung. Sorgfältige Vermeidung der erregenden Einflüsse, der Geistesanstrengung, erhizender Getränke etc. und Hinwegräumung des etwa im Körper liegenden Reizes, z. B. der Würmer. Ist irgend Verdacht einer entzündlichen Affection im Gehirne vorhanden, so müssen Blutegel oder selbst eine Aderlässe und kalte Umschläge angewandt werden. Bei dem reinen Nervenkopfweh dient die besänftigende Methode, Einreibungen von Opiatsalbe, das Auflegen von erwärmten Tüchern, Bähungen mit warmen, feuchten Umschlägen von Cicutaabkochung etc., oder aromatischen Umschlägen, Auftropfen von Aether oder Einreibungen von aromatischen Geistern mit Aether, warme Fussbäder, Senfteige, Blasenpflaster etc. und innerlich bei vollkommenem Mangel von Blutcongestion das Opium oder besser das Morphium aceticum.

Das Zahnweh.

(*Zahnschmerzen, Odontalgia.*)

Die Schriftsteller über die Krankheiten der Zähne.

§. 1852.

Das Zahnweh ist oft nur ein leichtes, dumpfes, schmerzhaftes Gefühl, oft sind es heftige, reissende, stechende und klopfende Schmerzen. Oft beschränkt sich

der Schmerz auf *einen* Zahn, oft dehnt er sich über alle Zähne einer Seite und oft auch über die Schläfen, die Ohren und selbst auf das Gehirn aus. Der Schmerz wird bei der geringsten Berührung der Zähne, welche dem Kranken wie verlängert erscheinen, und durch zu warme und kalte Stoffe, die in den Mund kommen, vermehrt. Das Zahnfleisch schwillt an, der Speichel fliesst stark, es bildet sich oft Stomacace, zuweilen ein kleiner Auswuchs (Epulis) und oft auch ein kleines Abscesschen (Parulis), das Gesicht wird roth und es entsteht oft eine bedeutende Geschwulst, wobei aber meistens das Zahnweh nachlässt. Bei grosser Heftigkeit des Uebels können sich selbst Fieberbewegungen und Zuckungen hinzugesellen. — Es hält das Zahnweh oft nur wenige Stunden an, zuweilen, jedoch mit Remissionen, mehrere Tage und eine längere Zeit. Zuweilen entsteht Beinfrass und eine Zahnfistel.

§. 1853.

Ursachen. Der Zahnschmerz ist meistens durch einen hohlen Zahn (Caries des Zahnes) veranlasst; zuweilen kommt er ohne das Vorhandensein von hohlen Zähnen vor und ist sodann meistens rheumatischer Natur. Zuweilen scheinen die Zahnnerven entzündet zu sein. Die gewöhnlichen Veranlassungen sind scharfe Stoffe, die in den Zahn gelangt sind, und besonders Verkältung, z. B. durch den feinen Luftzug am Fenster, das Umhergehen mit blossen Füssen und das Liegenlassen durchnässter Kleider auf dem Körper. Ausserdem sind auch zuweilen Erhizung des Körpers, gastrische Reize, die Schwangerschaft, die Gicht, die Scropheln, die Lustseuche, der Scorbut, Ursache des erwähnten Leidens.

§. 1854.

Für die beste Behandlung halte ich folgende: Bei der ersten Spur des Zahnweh's vollständige Reinigung des Zahnes von fremden Stoffen, sorgfältige Ver-

meidung jeder Verkältung, starke Erwärmung der Füsse durch das Anlegen von wollenen Strümpfen, selbst im Sommer und des Nachts im Bette, auch durch Fussbäder mit etwas Senfmehl, leichte Transpiration im Bette; genügen diese Mittel nicht, bei leichtern Graden des Zahnschmerzes ein Senfteig auf den untern Theil der Wange oder den Nacken gelegt, etwas Opiumtinktur in den Zahn gebracht und in die Wange eingerieben und selbst einige Tropfen derselben innerlich gegeben; bei sehr heftigem Schmerz vier Blutegel an die Wange oder 1 bis 2 an das Zahnfleisch gesezt; bei immer wiederkehrendem Zahnweh die Herausnahme des hohlen Zahnes. — Ausserdem werden in Anwendung gebracht: besänftigende Mundwasser, z. B. Milch, in welcher Feigen gekocht sind, die Coccinella septempunctata, Curculio antiodontalgicus etc. zwischen den Fingern zerrieben an die Zähne gebracht, das reine Creosot auf Baumwolle in den hohlen Zahn gebracht (in einzelnen Fällen sehr nüzlich, öfter unwirksam und zuweilen den Schmerz vermehrend), Cajeputöl, Gewürznelkenöl, Zimmtöl, Vitriolnaphtha in den Zahn gebracht, Branntwein, kalt Wasser in dem Mund gehalten, Kaumittel, wie Meerrettig, Bertramwurzel etc., das Tabakrauchen, das Ausbrennen des Zahnes (in seltenen Fällen helfen diese Mittel, häufiger vermehren sie den Schmerz sehr). — Zur Verhütung neuer Anfälle von Schmerz wird das Plumbiren angewandt, welches oft vortreffliche Dienste leistet, oft aber auch ein andauerndes Zahnweh veranlasst, in welchem Falle die Ausfüllung des Zahnes wieder herausgenommen werden muss.

Der Gesichtsschmerz.

(*Der Fothergill'sche Gesichtsschmerz, Nevralgia facialis, Dolor faciei, Prosopalgia, Trismus dolorificus Sauvag.*)

Fothergill (in s. Schriften. B. 3, und Samml. auserles. Abhandl. B. 3). — *Pujol* (a. d. Franz. v. Schreyer. Nürnb. u. Altd. 1788). — *Lentin* (in Blumenbach's med. Bibl. B. 2, u. in s. Beit. z. ausübend. Arzneiw. B. 1 u. 3). — *Forstmann* u. *Leidenfrost* (lat. Duisb. 1790). — *G. Cp. Siebold* (lat. Würzburg 1796—97). — *Langenbeck* (lat. Goett. 1806). — *Murray* (New-York 1816). — *Heyfelder* (Diss. Breslau 1820). — *Barth* (mit einer Vorrede v. Dzondi. Lpz. 1825). — *Masius* (Hecker's literar. Annal. d. gesammt. Heilk. 1826).

§. 1855.

Der Gesichtsschmerz ist ein anfallsweise sich einstellender heftiger, oft zermalmender Schmerz nach dem Laufe eines der Aeste des fünften oder siebenten Nervenpaares im Gesichte.

§. 1856.

Meistens stellt sich der Schmerzanfall plözlich ein, oft gehen ihm aber auch Angst in der Herzgrube, ein Gefühl von Kizel an der leidenden Stelle und zuweilen ein Gefühl von Ameisenkriechen voraus. Der Schmerz beginnt am häufigsten an der Stelle, an welcher der Infraorbitalnerve aus dem foramen infraorbitale hervortritt, er ist heftig, zuckend, zermalmend, wie ein electrischer Strahl über verschiedene Nervenzweige sich verbreitend, oft gerathen zugleich die Muskeln des Gesichtes in eine zitternde Bewegung und manchmal wird auch die Stelle, welche vom Schmerz ergriffen ist, roth, wie entzündet, das ganze Gesicht wird oft roth und die Carotiden klopfen oft stark; manchmal stellt sich auch ein Thränen- oder ein Speichelfluss und oft auch Abgang von Blähungen, meistens mit Erleichterung ein. Der Anfall geht oft sehr schnell, selbst in wenigen

Secunden, oft aber auch erst nach einer Viertelstunde und einer längern Zeit vorüber. Zuweilen entsteht eine wässerigte Geschwulst im Gesichte, die einige Zeit zurückbleibt.

§. 1857.

Die beschriebenen Anfälle kehren oft nach wenigen Minuten und in einem Tag öfters und auf diese Weise viele Tage nach einander, häufig aber auch nur nach mehrern Tagen oder nach einer Ruhe von mehrern Monaten zurück. Zuweilen tritt der Anfall in ganz bestimmten Perioden, denen des Wechselfiebers gleich, ein. — Gewöhnlich sind im Anfange die Anfälle seltener und werden später immer häufiger. — Die Krankheit im ganzen kann viele Jahre dauern. — Zur Gesundheit geht sie über, indem die Anfälle wieder seltener und weniger heftig werden, oft indem sich die Gicht in den Gelenken ausbildet, oder Hämorrhoiden oder gastrische Ausleerungen eintreten etc. Zum Tode führt die Krankheit durch Abzehrung des Körpers, in Folge der beständig sich wiederholenden heftigen Schmerzanfälle, wobei sich zulezt zuweilen der Gesichtskrebs ausbildet.

§. 1858.

Anlage haben Personen von höherm Alter, insbesondere Weiber nach Verlust der monatlichen Reinigung. Als erregende Ursachen beschuldigt man das Krebsgift (Fothergill), das venerische Gift (Masius), einen gichtisch-rheumatischen Stoff (Leidenfrost), unterdrückte Kräze, Flechten, weissen Fluss, Verkältung, gastrische Reize und bei dem vollkommen periodischen Gesichtsschmerz die Ursachen des Wechselfiebers.

§. 1859.

Vorhersage. Die Krankheit widersteht zuweilen allen Mitteln. Am leichtesten zu heilen ist der eine bestimmte Periode haltende Gesichtsschmerz. Tödlich wird die Krankheit selten.

§. 1860.

Behandlung. *Nach den Anzeigen aus den Ursachen* sind bei gastrischen Reizen Brech- oder Abführungsmittel, bei einem bestimmt periodischen Typus des Leidens das Chininum sulphuricum, bei syphilitischem Ursprung eine Mercurialsalbe, insbesondere der Gebrauch des Sublimats, bei Entstehung des Uebels aus Rheumatismus oder Gicht ein antirheumatisches und antiarthritisches Verfahren angezeigt. — Spricht sich eine mehr entzündliche Natur des Leidens aus, so sind Blutegel an die leidende Stelle zu sezen, so wie auch der von *Steinbuch* empfohlene Salpeter oder das Calomel in Anwendung gebracht werden kann; auch können die ebenfalls empfohlenen kalten Umschläge (die wohl aber auch schaden können) und das Auftröpfeln von Vitriolnaphthe, so wie die Einreibungen von grauer Queksilbersalbe gebraucht werden. Im übrigen ist die besänftigende Methode angezeigt: lauwarme Bähungen mit einem Cicutaaufguss, Auflegen von Fettlappen, leichte Einreibungen von Oleum Hyoscyami oder Opiatsalbe in die Umgegend der schmerzhaften Stelle, lauwarme Bäder, Streifen von Blasenpflaster, nach dem Verlaufe des Nervens gelegt, Fontanelle, Haarseile, die Acupunktur, Moxen, in verzweifelten Fällen selbst die Durchschneidung des Nervens. Hiermit verbindet man den innerlichen Gebrauch besänftigender Mittel, insbesondere narkotischer Mittel, des Opiums, der Belladonna, der von *Lentin* empfohlenen Tinctura Stramonii etc. Ausserdem sind noch als specifisch empfohlen worden: das Ferrum carbonicum (von englischen Aerzten dreimal täglich zu 15 bis 30 Granen), das Kali muriaticum oxygenatum (zu Grana iij täglich dreimal), die Terra ponderosa salita (von *Autenrieth* empfohlen), und der Arsenik.

Das nervöse Hüftweh.

(*Nevralgia ischiadica, Ischias nervosa postica Cotunni.*)

Cotunni (lat. Neapel 1764, a. d. Lat. Leipz. 1792). — *Petrini* (aus dem Engl. v. Spohr. Lemgo 1787). — *Bailly* (Paris 1803). — *Martinet* (a. d. Franz. Leipzig 1824).

§. 1861.

Das nervöse Hüftweh ist ein Schmerz, welcher vorzüglich zwischen dem grossen Trochanter und dem Sizbein sich befindet, sich aber auch bis zur Lumbalgegend und bis zur Kniekehle verbreitet und genau dem Laufe des ischiadischen Nervens folgt; zuweilen erstreckt derselbe sich auch noch über die Nerven des Unterschenkels und der Fusssohle. Zuweilen hat im Anfange die Krankheit mehr den entzündlichen Character und es sind Fieberbewegungen vorhanden, meistens aber besteht das Leiden nur in einem mehr oder weniger heftigen Schmerz, mit welchem eine schwere Beweglichkeit des Fusses und Hinken, oder wegen der Grösse des Schmerzes vollkommene Unbeweglichkeit des Fusses verbunden sind. Hiebei ist weder eine Verschiedenheit in der Stellung der grossen Trochanteren, noch eine Ungleichheit in der Länge beider Füsse, noch der characteristische Schmerz im Knie vorhanden, wie in der Coxarthrocace. Bei längerer Dauer wird der Fuss mager und es stellt sich eine lähmungsartige Schwäche ein.

§. 1862.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Zuweilen findet man einen Erguss von seröser Flüssigkeit zwischen den Nervenscheiden und den Nerven selbst; oft auch kleine Pseudomembranen.

§. 1863.

Die vorzüglichsten Ursachen sind die des Rheumatismus und der Gicht, besonders Verkältung, ausserdem aber mechanische Einwirkungen durch Stoss, das Heben schwerer Lasten etc., schnell geheilte alte Geschwüre, unterdrückte Hämorrhoiden, ein Leiden in den Beckenknochen und in den den ischiadischen Nerven umgebenden Weichtheilen; auch soll die Krankheit zuweilen venerischen Ursprungs sein.

§. 1864.

Vorhersage. Das Uebel ist zuweilen hartnäckig und kehrt auch leicht wieder zurück; wohl nie ist es für sich tödtlich.

§. 1865.

Behandlung. Sorgfältige Abhaltung der schädlichen Einflüsse, wie in dem Rheumatismus. Im Anfange bei entzündlichem Character eine Aderlässe am Fusse oder Blutegel und kühlende Abführungsmittel oder Klystiere, so wie auch Salpeter. Sodann Einhüllen des leidenden Theiles in Flanell und Wachstaffent, warme Wasserbäder, Dampfbäder, das Bad in heisser Luft (besonders wirksam) und ein Blasenpflaster, welches nach *Cotunni* 6 Zoll lang und 4 Zoll breit sein und so gelegt werden soll, dass es den Kopf des Wadenbeines bedeckt und die beiden eingeschnittenen Enden nach der Kniekehle herauf und nach dem Schienbein herunter reichen. Das Blasenpflaster wird öfters an der nämlichen Stelle wiederholt. Zieht der Schmerz weiter am Fusse herunter, so wird auch hier ein Blasenpflaster gelegt. In sehr hartnäckigen Fällen selbst die Moxen oder das Glüheisen. — Innerlich die gegen den Rheumatismus gebräuchlichen Mittel, bei heftigem Schmerz vorzüglich das Opium.

Der Brust-Nervenschmerz.

(Die Brustbräune, Nevralgia pectoris interna, Nevralgia cordis nach Laennec, Angina pectoris nach Heberden, Sternalgia nach Baumes, Arthritis diaphragmatica nach Butter, Asthma dolorificum nach Darwin, Asthma convulsivum nach Elsner, Syncope anginosa nach Parry, Stenocardia nach Brera, Pnigophobia nach Swediaur, Sternodynia syncopalis nach Sluis.)

Heberden (Med. Transact. London 1772, vol. 2, Commentar de morb. histor.). — *Fothergill* (Werke. B. 2.). — *Elsner* (Königsberg 1778). — *Butter* (Lond. 1798). — *Parry* (Bath. 1799, a. d. Engl. 1801). — *Wichmann* (Id. z. Diagn.). — *Sluis* (lat. Groening 1802). — *Brera* (Verona 1810, und in Hufeland's Journal 1818, nebst Bemerk. v. Harless). — *Lentin* (Beiträge z. ausübenden Arzneiw.). — *Desportes* (Paris 1811). — *Jurine* (a. d. Franz. v. Menke, mit einer Vorrede v. Kreysig. Hannover 1816). — *Zucchinelli* (Padov. 1814). — *Laennec* (de l'auscult. méd.). — Die Schriftsteller über Herzkrankheiten.

§. 1866.

Der **Brust-Nervenschmerz**, wie ich die Angina pectoris nennen möchte, ist ein heftiger, oft zermalmender Schmerz, welcher anfallsweise sich einstellt, in der Tiefe der Brust unter dem Brustbein beginnt, sich nach verschiedenen Richtungen in der Brust und von da oft über die Arme und andere Theile verbreitet und mit dem Gefühl grosser Beengung und häufig auch mit Unordnungen in dem Herzschlag verbunden ist.

§. 1867.

Die Krankheit beginnt mit einem Anfall der erwähnten Erscheinungen, der meistens zuerst beim Gehen gegen den Wind, beim Treppensteigen, Erhizung des

Körpers durch geistige Getränke oder nach einer Gemüthsbewegung, aber auch ohne erkennbare Veranlassung sich einstellt. Der Schmerz ist oft so heftig, dass die Kranken laut aufschreien (in einem von mir beobachteten Fall klagte der Kranke, es sei ihm, als ob die Arme an den Ellbogen abgehauen würden). Wirkliche Hemmung im Athmen ist weniger vorhanden, als mehr das Gefühl der Beengung. Der Herzschlag ist oft wenig verändert, zuweilen zu stark, oft sehr schwach und unordentlich. In den heftigsten Anfällen wird der Kranke ohnmächtig, kalt und ein kalter Schweiss bedeckt die Stirne. — Der Anfall dauert meistens nur wenige Minuten, zuweilen aber auch mehrere Stunden und selbst Tage, und geht sodann unter allmäligem Nachlassen der Zufälle, wobei sich oft Auswurf einstellt und auch zuweilen viele Blähungen abgehen, vorüber.

§. 1868.

Nach dem Anfalle befindet sich der Kranke oft mehrere Wochen ziemlich wohl, wenn nicht ein anderes Leiden neben der Brustbräune besteht. — Es kehren die Anfälle in unbestimmten Zeiträumen zurück und verlieren sich zuweilen allmälig wieder. — Meistens aber werden die Anfälle immer heftiger und stärker, bis der Kranke in einem solchen Anfalle oder nachdem sich Brustwassersucht oder Zufälle von organischen Herzfehlern, oder ein schlafsüchtiger Zustand, Schlagfluss, Zuckungen und Lähmungen hinzugesellt haben, stirbt.

§. 1869.

Bei den Leichenöffnungen hat man öfters Verknöcherungen der Kranzarterien und der Klappen des Herzens gefunden, oft aber auch nicht, sondern andere Herzfehler, namentlich Fettmassen, Abscesse und Hypertrophie des Herzens, oder gar keine Herzfehler, zuweilen Geschwülste in der Leber oder der

Milz und Verhärtung des Magens. In einem Falle fand ich, neben Wasserergiessung in der Brusthöhle und dem Herzbeutel, geröthete Stellen auf der äussern Fläche des Herzbeutels, durch welche der Nervus phrenicus sich zog, und eben solche Stellen im Gewebe, durch welche im Mediastinum posticum der Nervus vagus geht, so wie auch Röthungen auf der innern Haut des Bogens der Aorta und eine *Gehirnerweichung*, welche die eine Hemisphäre beinahe ganz einnahm.*) In einem andern Falle fand ich mehrere kugelförmige Bälge (Végetations globuleuses nach *Laennec*) an der innern Fläche des Herzens. Bei beiden Leichenöffnungen wurden keine Verknöcherungen am Herzen gefunden.

§. 1870.

Ursachen und Wesen. Am häufigsten beobachtete man die Krankheit bei Männern im vorgerückten Alter, insbesondere bei gichtischen Individuen. — Die ältere und früher beinahe allgemein angenommene Meinung vom Wesen der Brustbräune ist die, dass dieselbe nur ein Symptom von Verknöcherungen am Herzen sei. *Harless* hält das Leiden für einen Krampf des Herzens und seiner Gefässmündungen, *Laennec* für eine Nevralgie des Herzens. Ich habe im Anhange zu meiner Fieberlehre zu beweisen gesucht, dass die Krankheit eine Nevralgie sei, deren Siz ich übrigens nicht vorzugsweise in das Herz legte, sondern mehr in die grossen Nervengeflechte in der Brusthöhle, wesswegen ich die Krankheit Nevralgia pectoris interna nannte. — Ein solches Nervenleiden scheint mir nun hervorgebracht werden zu können, durch alles, was Nevralgie veranlassen kann, durch Gicht, Rheumatismus, mechanische Verlezung,

*) Die Brustbräune wechselte in diesem Falle mit einer zermalmenden Nevralgie des einen Fusses und endigte mit Schlagfluss.

z. B. durch Druck von benachbarten Geschwülsten, Desorganisationen in den Theilen, in welchen Nerven sich befinden, z. B. bei organischen Fehlern im Herzen, so wie auch durch Desorganisation in entfernten Theilen des Nervensystems, z. B. bei Erweichung des Gehirnes etc.

§. 1871.

Vorhersage. Die Krankheit ist schwer zu heilen und häufig tödtlich.

§. 1872.

Behandlung. Nebst der Entfernung der die Krankheit erzeugenden und auch der den Anfall veranlassenden Einflüsse (§. 1867 u. 1870) muss das Nervenleiden nach seinem Character behandelt werden. Oft möchten im Anfange Blutentziehungen nothwendig sein, häufiger eine antirheumatische und antiarthritische Behandlung; daher die von *Wichmann* empfohlene Tinctura Antimonii Thedenii; die von *Goodwin* gerühmte Brechweinsteinauflösung, auch das von *Schlesinger* empfohlene Extract. Lactucae virosae, so wie die ableitenden Mittel, Blasenpflaster, Fontanelle und wohl auch Moxen. Vielleicht zeigen sich auch die Bäder, insbesondere Dampfbäder und Bäder von heisser Luft wirksam; so wie auch vielleicht das Einathmen von mässig erwärmter Luft nüzlich ist. — Während des Anfalls sind besänftigende Mittel, namentlich Opium, dienlich.

Das Magenweh.

(*Der Magenkrampf, Gastrodynia, Cardialgia, Cardiogmus.*)

Trnka de Krzowitz (Wien 1785). — *Lentin* (Beiträge zur ausübenden Arzneiwissenschaft). — *Barras* (2te ed. Paris 1827).

§. 1873.

Das **Magenweh** ist jedes schmerzhafte Gefühl im Magen. **Magenkrampf** wird dasselbe genannt, wenn der Schmerz anfallsweise sich einstellt und dem Kranken sich als kneipend und zusammenschnürend darstellt.

§. 1874.

Das Magenweh besteht oft in einem drückenden Gefühl in der Herzgrube, welches meistens andauernd ist und durch einen Druck mit der Hand oder Erschütterung des Körpers erregt wird, und bald durch den Genuss von Speisen vermehrt, bald aber auch durch denselben gemässigt oder aufgehoben wird und dagegen bei leerem Magen an Heftigkeit zunimmt. Oft ist dieses Gefühl auch nagend, oder es werden leichte Stiche in derselben Gegend wahrgenommen; manchmal ist es das Gefühl von Brennen, welches besonders bei *der* Form von Krankheit vorkommt, die man das Sodbrennen nennt. In manchen Fällen ist die Magengegend sehr empfindlich, so dass der leiseste Druck auf dieselbe nicht ertragen wird; ja es gibt Kranke, welche glauben, ihre eigene Haut drücke sie. Während nun der Kranke ein solches andauerndes Magenweh empfindet oder auch ohne dass ein solches vorhanden ist, stellen sich oft in regelmässigen oder in unbestimmten Zeiträumen Anfälle von sehr heftig klemmenden, zusammenschnürenden Schmerzen

ein, welche in der grössten Heftigkeit oft nur einige Minuten anhalten, sodann etwas nachlassen und wieder heftiger werden und auf diese Weise einen Anfall bilden, der eine Stunde und längere Zeit dauern kann, aber auch wiederum Abwechslungen in Hinsicht des Grades des Schmerzes zeigt und jeden Tag ein- und mehreremale, aber auch in viel längern Zwischenräumen zurückkehren kann. Hat der Schmerzanfall einen sehr hohen Grad erreicht, so verbreitet sich der Schmerz oft gegen den Rücken und nach beiden Seiten hin, die Kranken sind gezwungen, sich zusammen zu beugen, manchmal erbrechen sie sich, oft werden dabei die Wangen roth und heiss und der Puls gereizt; öfter aber auch wird bei den höchsten Graden des Schmerzes das Gesicht blass, die Augen eingefallen, die Hände und Füsse werden kalt, ein kalter Angstschweiss bedeckt die Stirne, der Puls wird klein und aussezend, der Urin ist blass, manchmal kommen selbst Krämpfe in äussern Theilen und Ohnmachten hinzu. Die Schmerzanfälle endigen sich oft unter Erbrechen verschiedener Stoffe, insbesondere eines sehr sauren Magensaftes, einer grasgrünen Galle etc., oder sie lassen auch ohne Erbrechen allmälig nach.

§. 1875.

Diese Schmerzanfälle können vorhanden sein, ohne dass ein anderes Leiden des Körpers dabei bemerkt wird und bei dem Kranken ausserhalb der Anfälle irgend ein Leiden wahrgenommen wird (der reine Magenkrampf). Manchmal sind die Zeichen gastrischer Stoffe vorhanden, die Zeichen von Galle, von Säure etc. Das leztere ist gewöhnlich der Fall, wenn das Magenweh als sogen. Sodbrennen (Pyrosis, Soda) erscheint. Der Schmerz ist in diesem Falle brennend, der Kranke hat das Gefühl, wie wenn ein brennender Dunst den Hals heraufsteige, er hat dabei Aufstossen einer wasserhellen, sauern oder

ranzigen Materie, und manchmal auch saures Erbrechen etc.[1])

In manchen Fällen besteht neben dem mehr andauernden Magenweh und dem zeitweise wiederkehrenden Magenkrampf eine grosse Muskelschwäche und Schwindel, in andern Fällen kommen selbst Krämpfe in den Gliedern hinzu und es nähert sich sodann der Zustand dem der Cholerine, so wie bei der Cholerine und der asiatischen Cholera der Magenkrampf eine Haupterscheinung ist.

Ist das Magenweh ein weniger hervorstehendes Symptom, dagegen mehr Schwindel, grosse Mattigkeit und ein fieberhafter Zustand vorhanden, so nähert sich die Krankheit dem Nervenfieber oder wird es selbst.

Ist der Magenschmerz sehr bedeutend und andauernd, so ist er in der Regel ein Symptom der Magenentzündung, besonders wenn dabei Fieber und die übrigen Zufälle der Gastritis vorhanden sind. Es können hiebei die Schmerzen sich anfallsweise noch sehr vermehren, in welchem Falle der Magenkrampf in Verbindung oder im Gefolge der Magenentzündung auftritt.

Ebenso sind oft anhaltendes Magenweh und Magenkrampf nur die Symptome oder deuteropathischen Affectionen von andern Krankheiten des Magens, namentlich des Magenkrebses.

§. 1876.

Der Uebergang des Magenwehes und des Magenkrampfes in Gesundheit geschieht gewöhnlich allmälig, oft ohne Ausscheidungen, oft mit solchen, namentlich Erbrechen, Durchfall, Schweiss, manchmal auch, nachdem Hämorrhoiden fliessend geworden sind, eine gichtische Entzündung in den Gelenken sich gebildet hat etc. Den

1) Vergl. das Kapitel vom sauren Magensaft.

Tod hat der Magenkrampf nicht leicht zur unmittelbaren Folge, doch führt *Heister* [1]) ein Beispiel an, nach welchem ein Anfall von Magenkrampf tödtlich wurde, nachdem sich allgemeine Convulsionen und Tetanus hinzugesellt hatten. Der tödtliche Ausgang wird in der Regel nur durch diejenige Krankheit bedingt, die den Magenkrampf in ihrem Gefolge hat, doch kann auch ein reiner, aber heftiger Magenkrampf eine Magenentzündung veranlassen.

§. 1877.

Ursachen. Manche Personen, vorzüglich cholerische, haben eine besondere Anlage zum Magenkrampf, so dass die geringste Ursache ihn erzeugt. Vor der Pubertät kommt aber der Magenkrampf selten vor.

Gelegenheitsursachen sind von Aussen aufgenommene Stoffe, die Gifte, mit schädlichen Stoffen untermengte oder verdorbene Nahrungsmittel, schwer verdauliche Nahrungsstoffe, wie Buttergebackenes, Käse, geräuchertes Fleisch, Schnecken etc., der Genuss säuerlicher oder zur ranzigen Verderbniss geneigter Speisen und Getränke, welcher vorzüglich zum Sodbrennen Veranlassung gibt; in sehr seltenen Fällen Insectenlarven, welche sich im Magen aufhalten, so wie Ueberladung des Magens etc. Ferner sind es häufig im Körper erzeugte Stoffe, namentlich verdorbene Galle, stark saurer Magensaft oder Würmer, vielleicht auch der Blutreiz bei Stockungen im Pfortadersysteme und Fortpflanzung einer Reizung vom Darmkanal auf den Magen bei Colik aus Verstopfung u. s. w., antagonistische Reizung des Magens durch Unterdrückung der Hautausdünstung (der rheumatische Magenkrampf), durch unterdrückte Hämorrhoiden, Gicht etc. Vorzüglich häufig bewirken Gemüthsbewegungen, namentlich Aerger,

1) In den medizin. chirurg. Wahrnehmungen. S. 614.

Magenweh und Magenkrampf, manchmal auch die Hypochondrie, die Hysterie, so wie auch die Schwangerschaft. Endlich ist der Magenkrampf oft eine deuteropathische Affection von Krankheiten des Magens, namentlich von Magenentzündung und Magenkrebs.

§. 1878.

Wesen. Das Magenweh ist, wie schon angegeben wurde, ein Symptom sehr verschiedenartiger Krankheitszustände des Magens, der Magenkrampf aber ist seiner Haupterscheinung nach, nämlich des anfallsweise sich einstellenden heftigen Schmerzes, eine Nevralgie der Magennerven, womit in der Regel eine krampfhafte Zusammenziehung in dem Magen verbunden zu sein scheint. Nicht jede krampfhafte Zusammenziehung des Magens bringt die Erscheinungen der Cardialgia hervor, wie dieses die heftigsten und andauernden Anfälle von Erbrechen, die oft schmerzlos sind, beweisen, und es kann daher die Cardialgie mit mehr Recht zu den Nevralgien als zu den Krampfkrankheiten gerechnet werden.

§. 1879.

Vorhersage. Der Magenkrampf wird nicht leicht lebensgefährlich, und die Kunst vermag in der Regel den Schmerzanfall zu mässigen und zu beseitigen, doch hält es oft schwer, die Rückkehr der Anfälle zu verhüten. In dieser Hinsicht hängt die Prognose von der Möglichkeit oder Unmöglichkeit, die Ursache der Cardialgie zu entfernen, ab.

§. 1880.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Vorerst muss auf's Genaueste untersucht werden, ob Stoffe vorhanden sind, welche den Schmerz verursacht haben oder ihn unterhalten, und da die Ausleerung derselben vermittelst eines Brechmittels den Schmerz zu erhöhen, ja selbst vielleicht Magenentzündung hervorzubringen vermag, auf der andern Seite aber

die Ausleerung derselben oft die Bedingung der Heilung ist, mit der sorgfältigsten Erwägung aller Verhältnisse die Frage entschieden werden, ob Stoffe ausgeleert werden müssen oder nicht. Ausgeleert müssen die Stoffe immer werden, wenn sie sehr scharfer und giftiger Natur sind, daher insbesondere die in den Körper aufgenommenen eigentlichen Gifte, wenn man nicht etwa ein sicheres Mittel besizt, sie im Körper selbst gänzlich unschädlich zu machen. In diesem Falle gibt die Cardialgia, selbst wenn sie einen hohen Grad erreicht hat, keine Gegenanzeige zum Brechmittel, nur wende man dasselbe mit den Vorsichtsmassregeln an, die bei der Behandlung der Magenentzündung über die Anwendung der Brechmittel angegeben worden sind. Man gebe insbesondere das Brechmittel, wo möglich nur, wenn der Schmerzanfall gerade nachlässt, und lasse seiner Anwendung den innerlichen und äusserlichen Gebrauch der einhüllenden und besänftigenden Mittel, unter leztern selbst den des Opiums, vorangehen. Gehören die Stoffe *nicht* gerade zu den giftigen Substanzen, zeigen sie aber *doch* offenbar eine nachtheilige Wirkung, so halte ich es für das Beste, sich in der Regel nach der Heftigkeit der Zufälle zu richten. Ist der Magenkrampf sehr heftig und die Empfindlichkeit der Magengegend sehr gross, so wird es in der Regel zuträglicher sein, vorerst kein Brechmittel zu geben, die vorhandenen Stoffe aber auf andere Weise unschädlich zu machen zu suchen und sogleich die gegen die Cardialgia unmittelbar gerichteten Mittel in Anwendung zu bringen; ist der Magenkrampf dagegen nicht heftig, und sind offenbare Zeichen nachtheiliger Stoffe vorhanden, so wende man unter Befolgung der angegebenen Vorsichtsmassregeln sogleich ein Brechmittel an. Endlich wende ich auch in dem Falle ein Brechmittel an, wenn auf die besänftigenden Mittel keine dauernde Besserung eintritt, sondern das Magen-

weh immer wieder von neuem zurückkehrt, der Magen aber doch nicht so sehr empfindlich ist, dass von einem Brechmittel grosse Nachtheile zu befürchten wären und die Krankheit auch nicht Erscheinungen darbietet, die auf eine wirkliche Entzündung des Magens oder auf eine Desorganisation in demselben schliessen lassen. Das Brechmittel leert sodann doch in manchen Fällen einen im Verborgenen vorhandenen schädlichen Stoff aus und vermag auch vielleicht durch Erschütterung des Nervensystems und die mit dem Erbrechen verbundene Secretion eine Ausgleichung der Sensibilität zu bewirken.

Hält man die Anwendung des Brechmittels für zu gewagt, so suche man die vorhandenen Stoffe durch einhüllende Mittel oder solche, die sie neutralisiren, oder überhaupt ihre Wirkung vermindern, unschädlich zu machen. Man lasse daher schleimige Getränke, nach Umständen auch fette Dinge, bei genommenen Giften die Gegengifte, [1]) bei Säure die Magnesia und andere Säure tilgende Mittel und bei Galle die Pflanzensäuren, z. B. den *Riveri*'schen Trank mit Ueberschuss von Citronensaft, oder diesen allein nehmen. Bei Flatulenz wende man ätherisch-öligte Mittel an, gebe etwas Castoreum und ähnliche Mittel, Würmer suche man durch Milchklystiere in den untern Theil des Darmkanals zu ziehen oder durch Darreichung von Nahrung, z. B. Mehlbrei, zu beruhigen etc.

Wenn auch keine Stoffe im Magen die Ursache des Magenwehes sind, so geben doch leicht in denselben hineingebrachte Stoffe Veranlassung zu Erhöhung oder Erregung der Schmerzen und es ist daher bei der Anordnung der Diät genau zu untersuchen, ob die Nahrungsmittel gut vertragen werden oder nicht.

Ausser den Stoffen im Magen sind auch die übrigen

1) Vergl. das über die Behandlung der Vergiftungen Gesagte.

Ursachen der Cardialgie zu berücksichtigen, und es sind desshalb bald wegen unterdrücktem Hämorrhoidalfluss Blutegel an den After zu sezen und wegen Stockungen im Pfortadersystem die auflösende Methode anzuwenden, bald wegen Rheumatismus oder Gicht die auf die Haut wirkenden Mittel in Gebrauch zu ziehen, vorzüglich aber ist diejenige Krankheit des Magens selbst zu beseitigen, von welcher der Magenkrampf eine deuteropathische Affection ist. Hier ist die Frage über das Vorhandensein einer Entzündung die wichtigste und es muss daher stets bei Behandlung des Magenkrampfes auf's Genaueste geprüft werden, ob keine Entzündung vorhanden ist. Lässt die andauernde grosse Empfindlichkeit des Magens, die Beschaffenheit des Pulses etc. auf eine solche schliessen, so sezt man Blutegel auf die Herzgrube, und macht Umschläge von einer Cicutaabkochung und wendet zugleich oder nach eingetretener Wirkung der antiphlogistischen Methode die gegen den Magenkrampf wirksamen Mittel an, von welchen aber diejenigen nicht in Gebrauch gezogen werden dürfen, welche bei dem entzündlichen Zustande nicht passen, wie z. B. das Magisterium Bismuthi, die ätherischen Mittel etc.

§. 1881.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Da das Wesen der Cardialgie Nevralgie mit Krampf ist und die Behandlung des mit derselben manchmal verbundenen entzündlichen Zustandes des Magens als protopathische Affection bei der Angabe der ersten Kuranzeige dargestellt wurde, so kann hier nur von der Behandlung des reinen Nervenleidens die Rede sein. Das vorzüglichste von allen Mitteln ist das Opium, von welchem in geeigneten Zwischenräumen die Tinctur zu 6 — 15 Tropfen angewandt werden kann; an dasselbe schliessen sich die übrigen Narcotica, namentlich die Blausäure haltigen

Mittel und das Extractum Hyoscyami, an, deren Wirkung aber sehr unzuverlässig ist. Ferner wirkt vorzüglich gut eine Reihe von flüchtig erregenden Mitteln, wie die Chamillen, Baldrian, Melissen, Pfeffermünze, welche vorzüglich wohlthätig in Theeform wirken, von denen aber auch das ätherische Oel, so wie das Oleum Cajeput in Oelzucker gegeben werden können. Ferner die *Hoffmänn*'schen Tropfen, so wie die andern versüssten Säuren und die Naphthen, unter welchen die Essignaphtha vorzüglich empfohlen werden kann, und auch andere erregende und zugleich krampfstillende Mittel, wie das Castoreum, der Hirschhorngeist und die Asa *foetida*. An diese Mittel schliessen sich die Gewürze an, wie z. B. der Ingwer und an sie die erregend-tonischen Mittel, der rothe Wein, die Tinktur und Extracte von Pomeranzen, Columbo, Quassia etc. Ich glaube, dass die zulezt genannten Mittel, welche übrigens mehr geeignet sind, die Anfälle von Magenkrampf zu verhüten, als einem heftigen Anfall zu mässigen und oft auch nicht ertragen werden, so wie zum Theil auch die flüchtig erregenden Mittel dadurch wirken, dass sie die im Uebermaass in den Nerven des Magens angesammelte Nervenkraft durch Beförderung der Bereitung eines guten Magensaftes und Erregung einer kräftigen Verdauung verzehren. Vorzüglich gerühmt wurde von Einigen das von *Odier* zuerst empfohlene Magisterium Bismuthi zu $^1/_4$, $^1/_2$ bis 1 Grane alle 1 bis 2 Stunden, welches besonders bei langwierigem, rein nervösem Magenschmerz anwendbar ist. Ebenso möchten auch die Zinkblumen, so wie das Zincum sulphuricum und hydrocyanicum, und auch das von *Berends*[1]) empfohlene krystallinische, salpetersaure Silberoxydulat zweimal täglich zu $^1/_{12}$ Gran sich in geeigneten Fällen nüzlich

1) Pract. Arzneiw. B. 8. S. 336.

erweisen. Endlich verdienen die Mineralsäuren und die von *Löffler*[1]) empfohlenen Eispillen, so wie ganz kaltes Getränk erwähnt zu werden, welche vielleicht zurücktreibend auf die in dem leidenden Theil concentrirte Nerventhätigkeit wirken.

§. 1882.

Ausser den Arzneimitteln muss ich noch eines andern, vorzüglich besänftigenden Mittels, Erwähnung thun; es sind dieses die Nahrungsmittel. Es werden, wie oben schon angegeben wurde, die Speisen sehr häufig in dem Magenweh nicht ertragen; es gibt aber auch, wie ich schon öfters beobachtet habe, Fälle, in welchen der Magenschmerz um die Zeit eintritt, wenn der Magen nicht in dem Geschäfte der Verdauung begriffen ist, z. B. einige Stunden nach dem Frühstücke. Hier dient der Genuss von etwas Nahrung unmittelbar vor der Zeit in welcher sich gewöhnlich der Magenschmerz einstellt. Auch bei der Wirkung dieser Mittel scheint der Magenschmerz dadurch aufgehoben zu werden, dass die übermässig angehäufte Nervenkraft auf die der Verdauung unterworfenen Stoffe sich entlade.

§. 1883.

Die Wirkung der angegebenen Mittel wird durch die äusserliche Anwendung besänftigender Mittel unterstüzt, und oft sind selbst diese zur Kur hinreichend. Dahin gehören das Auflegen eines erwärmten und in Tücher eingeschlagenen irdenen Deckels, eines erwärmten Flanelles, Umschläge von einer Abkochung der Chamillen oder der Cicuta, der aromatischen Species mit Wein, Einreibungen von Opiatsalbe oder von aromatischen und geistigen Dingen, z. B. der aromatischen Spiritus und Ammonium und das Auflegen von aromatischen und

1) *Hufeland's* Journ. 1810. Jul.

Opiatpflastern. Auch dienen erweichende und besänftigende Klystiere von Chamillenaufguss und Milch etc.

Endlich verdienen die antagonistisch-wirkenden Mittel Erwähnung und Empfehlung, vorzüglich die schweisstreibenden Mittel und die Hautreize, namentlich Senfteige oder ein camphorirtes Blasenpflaster auf die Herzgrube gelegt.

§. 1884.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Das Erbrechen ist zu behandeln, wie das Erbrechen aus erhöhter Sensibilität [1]) und wird in der Regel durch dieselben Mittel gestillt, die auch den Schmerz mässigen. — Bei Kälte der Glieder lässt man erwärmte Tücher umschlagen, die Füsse auf Wärmflaschen stellen etc.

§. 1885.

Die Diät muss auf's sorgfältigste geordnet werden. Oft darf nur die nothdürftigste und die leichteste Nahrung gereicht werden, oft ist es besser, in kürzern Zwischenräumen Speisen zu geben. Eine gute Fleischkost mit etwas gutem Wein ist meistens zuträglicher als Milch- und Mehlspeisen. Schwer verdauliche Dinge müssen vermieden werden, doch gibt es auch Fälle, in welchen auch derbere Speisen, wie z. B. selbst Schnecken, Pöckelfleisch und Erbsen, mehr zusagen als zartere. [2])

1) Vergl. die Behandlung des Erbrechens. — 2) Vergl. hierüber *Berends.* B. VIII. pag. 336.

Das Bauchweh.

(*Darmschmerz, Grimmen, Kolik, Colica, Dolor colicus, Enteralgia.*)

Purcell (London 1714, übers. m. Anmerk. v. Gessner. Nördlingen 1775). — *Barthez* (Montpellier 1816).

§. 1886.

Die Kolik sind Schmerzen in dem Unterleibe, welche anfallsweise sich einstellen, einen zusammenziehenden und schneidenden eigenthümlichen Schmerz (Grimmen) darstellen und vorzüglich in der Umgegend des Nabels ihren Siz haben.

§. 1887.

Zuweilen gehen Aufblähung des Leibes, Verstopfung, Neigung zum Erbrechen etc. dem Schmerzanfall voraus, oft auch stellt sich derselbe ohne vorhergegangene Zeichen von gastrischen Störungen ein. Der Schmerz ist oft gering, oft aber sehr heftig, so dass die Kranken sich zusammenkrümmen, laut wehklagen, oft heiss und roth im Gesichte werden, und der Puls gereizt erscheint, oder selbst so heftig, dass die Kranken blass und kalt im Antliz werden, ein kalter Schweiss die Stirne bedeckt, die Gliedmassen kalt werden und sich selbst krampfhafte Zufälle in den Gliedern einstellen. Der Unterleib ist dabei gespannt, oft aufgebläht und zeigt oft während des Anfalls einzelne hervorgetriebene Stellen von aufgetriebenen Gedärmen, zuweilen ist er aber auch einwärtsgebogen. Leicht gesellt sich zu den heftigern Kolikanfällen Erbrechen hinzu. Meistens ist Verstopfung vorhanden, oft auch Durchfälle. Der einzelne Schmerz geht oft in einigen Secunden und meistens in wenigen

Minuten vorüber, kehrt aber oft so schnell wieder zurück, dass diese wiederholten Schmerzen doch nur als ein Kolikanfall zu betrachten sind. Der Anfall hört auf, indem die Schmerzen sich allmälig verlieren, was oft unter dem Eintritt von Blähungen und Stuhlentleerungen geschieht. — Es kehren solche Anfälle oft nie mehr, oft in ganz unbestimmten Perioden, je nachdem die Veranlassung derselben früher oder später sich wieder einstellt, seltener in ganz bestimmten Zeiträumen zurück. Zum Tode führt die Krankheit durch Erschöpfung der Kräfte, durch die heftigen Schmerzanfälle, das wiederholte Erbrechen, das oft zum Kothbrechen (*Ileus, Passio iliaca*) wird, und indem sie Darmentzündung und Brand zur Folge hat.

§. 1888.

Nach Verschiedenheit der Ursachen nimmt man verschiedene Arten der Kolik an. Die blos aus erhöhter Sensibilität entsprungene (die nervöse Kolik, Colica nervosa, auch Colica hysterica), wobei keine weitere äussere Veranlassung statt findet, als der gewöhnliche Reiz der in den Gedärmen enthaltenen Stoffe, und welche bei Individuen, die eine besondere Anlage zur Kolik haben, so wie auch bei solchen vorkommt, die überhaupt an einer erhöhten Empfindlichkeit der Nerven leiden, wie die Hypochondristen und die hysterischen Personen, — die von einem entzündlichen Zustand der Gedärme verursachte Kolik (Colica inflammatoria), — die von Hämorrhoiden und nicht zu Stande kommender Menstruation abhängende Kolik, wobei die Gefässe der Gedärme mit Blut überfüllt sind und oft auch ein entzündlicher Zustand vorhanden ist (die Blutkolik, colica sanguinea, colica haemorrhoidalis), — die von Verkältung abhängende Kolik, wobei häufig sonst noch rheumatische Zufälle sich zeigen (C. rheumatica), — die von Anhäufung von Koth, Würmern etc. veranlasste Kolik

(C. a sordibus), wobei oft hartnäckige Verstopfung vorhanden ist, und wobei oft noch besondere, aus der Beschaffenheit der angesammelten Stoffe hervorgehende Erscheinungen sich zeigen, grosse Aufblähung des Leibes (Windkolik, C. flatulenta), gallichte Erscheinungen (Gallenkolik, C. biliosa), Wurmzufälle (Wurmkolik, C. verminosa) etc., — die durch Bleivergiftung entstandene Kolik (die Bleikolik, C. saturnina),*) — endlich die von organischen Fehlern abhängende Kolik; es ist dieselbe oft bedingt durch einen Scirrhus in den Gedärmen, grosse Verschwärungen, Umschlingung der Gedärme durch das Nez, Ineinanderschiebung derselben (Volvulus), einen eingeklemmten Bruch (eine vorzüglich wichtige Ursache der Kolik) etc. Der eine ganz bestimmte Periode haltenden Kolik kann sowohl ein um eine bestimmte Zeit immer von neuem eintretende Gelegenheitsursache der Kolik, z. B. die um eine bestimmte Zeit nach dem Essen an eine krankhafte Stelle des Darmkanals gelangenden Fäces, als auch der Krankheitszustand, der das Wechselfieber bedingt, zum Grunde liegen.

§. 1889.

Vorhersage. Es hängt der Erfolg der Behandlung vorzüglich von der Möglichkeit oder Unmöglichkeit, die Ursachen der Kolik zu heben, ab. Tödtlich ist daher häufig die Krankheit bei der aus einem Volvulus, Umschlingung der Gedärme etc. entstandenen Kolik, leicht zu heilen aber z. B., wenn sie durch Verkältung veranlasst ist.

§. 1890.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Oft sind Abführungsmittel nothwendig, zu-

*) Die Bleikolik, welche eigenthümliche Erscheinungen darbietet, wird in dem Kapitel von der Bleivergiftung beschrieben werden.

weilen Wurmmittel, meistens thun einhüllende Mittel, z. B. Oelmixturen, gute Dienste, oft auch Mittel gegen die Blähungen, z. B. ein aromatischer Thee. Bei der Blutkolik dienen Blutegel an den Damm gesezt. Ist es nicht möglich, die Ursache der Kolik schnell zu entfernen, und sind die Schmerzen sehr heftig, so müssen jedenfalls mit den gegen die Ursachen gerichteten Mitteln solche, die den Schmerz mildern, verbunden werden; so z. B. müssen bei der Kolik von Kothansammlungen, neben den Abführungsmitteln, die äussern besänftigenden Mittel, und nicht verstopfende innerliche besänftigende Mittel, bei sehr heftigen Schmerzanfällen aber auch Opium gegeben werden.

§. 1891.

b) Der *Anzeige aus dem Wesen* der Krankheit entspricht die besänftigende Methode. Oft genügt schon die Anwendung äusserlicher besänftigender Mittel, Einhüllen des Unterleibes in Flanell, Auflegen von erwärmten irdenen Deckeln, feuchte, warme Umschläge, Bäder etc. und leichte, innerliche, besänftigende Mittel, wie Oelmixturen, ein warmer Thee von Chamillen, Melissen u. s. w., in den stärkern Graden des Uebels ist aber in der Regel das Opium nothwendig, welches das zuverlässigste Mittel ist.

Der übermässige Geschlechtstrieb.

(*Bei Männern Satyriasis, bei weiblichen Individuen Mutterweh, Manntollheit, Nymphomania, Hysteromania, Furor uterinus.*)

de Bienville (aus d. Franz. 1772). — *Robion* (Paris 1808). — *Herpian* (Par. 1812). — *Rothamel* (Heidelb. klin. Annal. 6r Bd.). — Die Schriftsteller über die Weiberkrankheiten.

§. 1892.

Zuweilen ist der Geschlechtstrieb so sehr erhöht, dass der Körper dadurch erkrankt und selbst Verstandesverwirrung eintritt. Durch die andauernde Begierde zur Geschlechtsbefriedigung ist das Nervensystem in einer beständigen Erregung, der Kranke ist schlaflos, der Puls beschleunigt, die Verdauung leidet, der Körper magert ab, bei den Männern finden ununterbrochene Erectionen statt, bei den Weibern sind die Geschlechtstheile angeschwollen und heftiges Jucken vorhanden. Die Kranken vermögen nicht mehr ihre Begierden zu verbergen, sie führen schamlose Reden, entblösen sich, fordern selbst zum Geschlechtsgenusse auf und greifen selbst Individuen von andern Geschlechtern an, oft verfallen sie in allgemeine Verwirrtheit und Raserei. Zuweilen lassen diese Zufälle nach vollzogenem Beischlafe nicht nach.

§. 1893.

Ursachen. Das erwähnte Uebel kommt am meisten bei Personen mit erethischer Constitution vor; es wird veranlasst durch Ausschweifungen der Phantasie, welche durch häufiges Romanelesen, schlüpferige Gespräche, häufigen Umgang mit Individuen des andern Geschlechts etc.

unterhalten werden, dabei strenge Enthaltsamkeit, besonders in den schon etwas vorgerückten Jahren und auch nach vorhergegangener, zur Gewohnheit gewordener häufiger Ausübung des Beischlafes, aus welchen Ursachen die Krankheit vorzüglich bei schon etwas ältern Mädchen und bei jungen Wittwen vorkommt; ferner Reizungen der Geschlechtstheile durch unkeusche Betastungen, den Hämorrhoidalreiz, Askariden, die in die Scheide gelangt sind, Flechten, welche die Geschlechtstheile befallen haben etc.

§. 1894.

Behandlung. Es sind zur Vermeidung der Geschlechtserregung die nämlichen Mittel in Anwendung zu bringen, die in dem Kapitel von der Behandlung des Saamenflusses angegeben worden sind. Befinden sich die Geschlechtstheile in einem entzündlichen Zustand, so müssen Blutegel in die Nähe gesezt oder eine Aderlässe vorgenommen, kalte Umschläge auf dieselben gemacht, der Kranke auf einer magern Diät gehalten und Antiphlogistica in Anwendung gebracht werden. Als specifisches Mittel, um den Geschlechtstrieb zu vermindern, wird der Kampfer empfohlen, der schicklich in Verbindung mit dem Salpeter gegeben wird.

Die Hypochondrie.

(*Milzsucht*, *Hypochondriasis*, *Malum hypochondriacum*, *Affectio hypochondriaca.*)

Fr. Hoffmann (Diss. Halle 1719). — *Kämpf* (neue Methode, die hartnäckigsten Krankheiten des Unterleibes, insbesondere die Hypochondrie, zu heilen. 2te Aufl. Lpz. 1786). — *Whytt* (aus d. Engl. nach der 2ten Aufl. Lpz. 1794). — *Stoll* (Diss. ed. Eyerel. Wien 1798). — *Storr* (Stuttg. 1805). — *Zimmermann* (Bamb. 1816). — *Reid* (Lond. 1816, a. d. Engl. v. Haindorf, Essen u. Duisb. 1819). — *Louyer-Villermay* (vol. 2. Paris 1816). — *Falret* (Paris 1822. a. d. Franz. v. Wendt. Leipzig 1822). — *Georget* (Paris 1824). — *Schnaubert* (Eisenb. 1827).

§. 1895.

Hypochondrie nennen wir den Zustand eines Individuums, in welchem dasselbe gewöhnlich die Eindrücke auf das Gemeingefühl sehr lebhaft empfindet, sich verkehrte Vorstellungen von dem Zustande des Körpers macht und dadurch in eine düstere Gemüthsstimmung versezt ist.

§. 1896.

Die Beschwerden, über welche die Hypochondristen klagen — wer vermöchte von ihnen ein Verzeichniss zu geben und sie nur einigermassen so zu ordnen, dass sie ein zusammenhängendes Krankheitsbild darstellen? Fragen wir zunächst nach den Krankheitserscheinungen, welche der Krankheit eigenthümlich sind, so dass sie nicht fehlen dürfen, wenn nicht auch damit die bestimmte Krankheitsform verloren gehen soll, so finden wir gerade nur das Eigenthümliche, dass der Kranke über so Vieles klagt, dessen wirkliches Bestehen kaum angenommen werden kann und auf welches ein Anderer nicht Rücksicht nehmen oder wenigstens keinen so grossen Werth

legen würde. Es wird jede kleine Empfindung, die der Körper veranlasst, beschrieben und meistens vergrössert dargestellt, ausführliche Erzählungen über das Aussehen der Zunge, über den Appetit, mit welchem der Kranke jedesmal ass, über die Beschaffenheit der Stuhlentleerungen und des Urins, über den Schlaf etc. werden dem Arzte mündlich und schriftlich gegeben, über Beengung des Athmens wird geklagt, wenn auch die Luft ungehindert die ganze Lunge durchdringt, über Herzklopfen, wenn nur ein starkes Gehen das Vorhandensein der Herzbewegung bemerklich gemacht hat etc. Dabei bildet sich der Hypochondrist eigenthümliche Theorien über seinen Krankheitszustand, gebraucht andauernd Mittel und ist in einer düstern Gemüthsstimmung. — Die noch am meisten vorhandenen Störungen in den Verrichtungen der Organe, die von dem Arzte wirklich wahrgenommen werden, sind Unterleibsaffectionen, ein starker Beleg der Zunge, Aufblähung des Leibes, bald Verstopfung, bald Durchfälle, Hämorrhoiden etc. (die Hypochondrie mit Materie).

§. 1897.

Zuweilen verschwindet der hypochondrische Zustand nach Veränderung der äussern Verhältnisse, mit dem höhern Alter, nach dem Eintritt fliessender Hämorrhoiden etc. Die Hypochondrie schwächt die Lebenskräfte im Allgemeinen und kann hierdurch zu Krankheiten in der Reproduktion beitragen, zuweilen geht sie in wirkliche Seelenstörung (Melancholie und fixen Wahn) über.

§. 1898.

Anlage zur Hypochondrie haben vorzüglich Personen von melancholischem oder cholerischen Temperamente und solche, die sich sehr weich sind, auch häufiger Männer, als Weiber. Gelegenheitsursachen sind eine sizende Lebensart, grosse Geistesanstrengungen, Onanie, Uebermasss im Genuss von Speisen und Getränken

gastrische Unreinigkeiten, Stockungen im Pfortadersysteme, Verhärtungen der Leber etc.

§. 1899.

Das **Wesen** der Hypochondrie sucht man gewöhnlich in Aufregung und Täuschung des Gemeingefühls; es sind übrigens nicht sowohl die krankhaften Gefühle selbst der Zustand, den man Hypochondrie nennt, als die Gemüthsstimmung, die sie bei dem Kranken veranlassen, indem dunkle und lebhafte krankhafte Gefühle im Unterleibe und in andern Theilen, deren Ursachen oft ebenfalls unbedeutend sind und oft nicht erkannt werden können, häufig vorkommen, ohne dass sie die Hypochondrie darstellen, wenn nämlich diese Zufälle bei muthvollen und lebensfrohen Personen sich einstellen. Diesemnach sehe ich die Hypochondrie mehr für einen bestimmten Zustand des Gemüthes an, der sich den Seelenstörungen, und zwar der Melancholie und zuweilen auch dem fixen Wahne nähert, aber noch innerhalb der Grenzen der Gesundheit liegt, wie es auch andere psychische Zustände gibt, die in gewissen Unvollkommenheiten bestehen, aber keine eigentliche Krankheiten sind, wie z. B. der Mangel an Muth.

§. 1900.

Behandlung. Der wichtigste Theil der Behandlung ist die psychische. Man tröste den Kranken, suche ihn zu erfreuen, leite seine Aufmerksamkeit und seine Thatkraft auf äussere Gegenstände, sein Gemüth auf etwas Höheres, und suche ihm auch auf geeignete Weise das Unmännliche seiner Gemüthsstimmung begreiflich zu machen. Hiebei suche man wirkliche Krankheitszustände zu beseitigen, insbesondere solche, die im Unterleibe ihren Siz haben; man hebe die Leibesverstopfungen, suche die Verdauung zu verbessern, Stockungen im Pfortadersysteme zu heben, lasse den Kranken bei

erhöhter Sensibilität der Unterleibsnerven die Aqua Laurocerasi, die Asa foetida, Bäder und andere besänftigende Mittel gebrauchen etc.

Die Hysterie.

(Mutterbeschwerde, Mutterkrankheit, Hysteria, Malum hystericum.)

Whytt, Zimmermann, Louyer-Villermay, Georget (in den bei der Hypochondrie angeführten Werken). — *Fr. Hoffmann* (Diss. Halle 1733). — *Manning* (aus d. Engl. v. Hanke. Wien 1790). — *Tate* (London 1830).

§. 1901.

Hysterie nennen wir die bei dem weiblichen Geschlecht vorkommenden Nervenzufälle, welche in einer erhöhten Reizbarkeit des Gemüthes, in krankhaften Gefühlen im Unterleibe und in Krampfanfällen, die im Unterleibe und im Halse sich zuerst zeigen und sodann die verschiedenartigsten Formen annehmen, bestehen, und meistens mit Störungen in den Geschlechtsverrichtungen in Verbindung stehen.

§. 1902.

Die hysterischen Personen haben, wenn sie nicht zugleich an Hypochondrie leiden, eine ganz andere Gemüthsstimmung, als die Hypochondristen. Es sind bei ihnen nicht die grosse Bekümmerniss um den Zustand ihres Körpers und das zu tausendfachen irrigen Vorstellungen führende Nachdenken über denselben zu bemerken, sondern Gemüthsregungen, die auf die Aussenverhältnisse sich beziehen. Die Hysterische fühlt sich unglücklich, weil sie, ohne Theilnahme zu finden, ver-

lassen in der Welt steht, viele Kränkungen erdulden musste etc., meistens wirkt hiebei der unbefriedigt gelassene Geschlechtstrieb mit, oder sie ist eine sehr empfindliche, zornmüthige Person, welche durch den häufigen Verdruss, dem sie hierdurch ausgesezt ist, sehr angegriffen wird. Nur in seltenen Fällen entwickeln sich die hysterischen Zufälle, ohne dass einer von beiden Gemüthszuständen, die aber oft sorgfältig verborgen werden, besteht, und dieses möchte noch am meisten der Fall sein, wenn Störungen in den Geschlechtsverrichtungen vorhanden sind, z. B. die monatliche Reinigung in Unordnung ist, Desorganisationen in der Gebärmutter oder den Eierstöcken sich bilden etc. Es klagen die Hysterischen über mancherlei Beschwerden, die zum Theil wirklich vorhandene Krankheitszustände, zum Theil aber ungegründet sind, und zwar entspringen die zulezt bezeichneten Angaben, wenn zugleich eine wahre Hypochondrie vorhanden ist, oft von falschen Vorstellungen vom Zustande des Körpers, sehr häufig sind sie aber absichtliche Uebertreibungen, wozu man bei vielen Hysterischen eine besondere Neigung bemerkt.

Die vorzüglichsten Erscheinungen sind mancherlei Nervenzufälle, die auf geringfügige Ursache auftreten. Ein unbedeutendes Ereigniss bringt heftigen Schrecken, Zittern der Glieder, heftiges Herzklopfen und selbst Ohnmacht hervor oder veranlasst einen den Körper erschütternden Verdruss, auch wechselt leicht die Gemüthsstimmung, so dass Lachen und Weinen leicht miteinander abwechseln. Die besonders characterischen Zeichen der Hysterie sind übrigens meistens auf Gemüthsbewegungen und oft auch von selbst sich einstellende Krämpfe, die, so mannigfaltig sie in ihrer Form sind, doch Eigenthümlichkeiten haben, durch welche sie ihren Ursprung sehr leicht verrathen. Die Kranken empfinden gewöhnlich zuerst eine Art von Bewegung

in der Gegend der Gebärmutter, oft sind damit Aufblähungen und ein Gurren im Leibe verbunden, und zuweilen bewegt sich hierbei die vordere Bauchwandung sehr schnell abwechselnd ein- und auswärts. Hierauf stellt sich die Empfindung ein, wie wenn Etwas aus dem Unterleibe in den Hals heraufsteige und daselbst wie ein Brocken (Globus hystericus) stecken bleibe, und es tritt nun ein krampfhaftes Würgen und eine eigenthümliche Auftreibung des Halses ein, wodurch das Athmen oft so sehr gehemmt wird, dass die Kranken von gehindertem Rückfluss des Blutes vom Kopfe ein aufgetriebenes und dunkelrothes Gesicht erhalten und oft in grosser Erstickungsgefahr zu schweben scheinen. Dieses Würgen und Auftreiben des Halses ist ein so beständiges und characteristisches Zeichen des hysterischen Krampfes, dass es auch meistens bei Ohnmachten und kataleptischen Anfällen der Hysterischen nicht ganz fehlt und dadurch die Natur dieser Krankheitszufälle kund gibt. Meistens befällt nun der Krampf auch die Gliedmassen, wodurch dieselben heftig verdreht werden und der Körper oft mit grosser Gewalt hin und her geworfen wird. Manchmal wird auch das Gehirn ergriffen, so dass das Bewusstsein unterdrückt wird und die Krämpfe den epileptischen sehr ähnlich werden, wie sie in andern Fällen mehr denen des Veitstanzes gleichen, zuweilen unter der Form des Tetanus auftreten und auch in kataleptische Anfälle sich umgestalten. Zuweilen zeigen sich bei diesen Krampfanfällen wilde Delirien. — Der Harn, der während der Zeit der Anfälle abgeht, ist meistens wasserhell. Ausser diesen Zufällen sind die Hysterischen noch mit mancherlei Leiden behaftet. Sie leiden oft an heftigen, aber stets den aussezenden Typus haltenden Kopfschmerzen, welche zuweilen auf eine kleine Stelle beschränkt sind und das Gefühl darstellen sollen, wie wenn ein Nagel an dieser Stelle eingeschla-

gen wäre (Clavus hystericus). Manchmal ist dieser Kopfschmerz auch mit dem Gefühl, wie wenn ein Stück Eis aufgelegt wäre, verbunden. Oefters leiden die Kranken auch an Verdauungsbeschwerden, Magenkrämpfen, Aufblähung des Leibes, Unordnungen in der monatlichen Reinigung, weissem Fluss etc.

§. 1903.

Die Dauer der einzelnen Anfälle beträgt oft nur wenige Minuten, oft auch mehrere Stunden und selbst Tage, der ganze Krankheitszustand ist langwierig und oft beinahe habituell. Der einzelne Anfall geht durch allmäligen Nachlass der Zufälle vorüber oder hört auch plözlich auf, ohne Krisen. Die ganze Krankheit verschwindet nach eingetretenen Aenderungen in den äussern Verhältnissen und gewissen Umänderungen im Körper, z. B. nach der Verehelichung und bei Frauen nach stattgefundener Schwangerschaft, in dem höhern Alter, nach Wiederherstellung der unterdrückten monatlichen Reinigung etc. Zum Tode soll zuweilen die Krankheit führen durch einen Schlagfluss und durch Erstickung in einem heftigen, hysterischen Anfall, eher kann der Tod aber durch allgemeine Schwäche und allmälige Abmagerung (Tabes nervosa) und durch starke tympanitische Auftreibung des Unterleibes, die zulezt in Wassersucht übergeht, veranlasst werden.

§. 1904.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Zu den Veränderungen im Körper, die man in den Leichen hysterischer Personen und mit der Krankheit in einer ursächlichen Verbindung stehend annimmt, rechnet man Steatome, Hydatiden, Vereiterungen und andere Entartungen in den Eierstöcken und in der Gebärmutter.

§. 1905.

Anlage. Die Hysterie kommt beinahe nur bei weiblichen Individuen von der Zeit der Geschlechts-

reife bis zum Aufhören der Geschlechtsverrichtungen vor. Kinder haben die Krankheit durchaus nie und alte Frauen höchst selten. Ein sehr zarter Körperbau, Schwäche des Körpers, ein sehr reizbares Nervensystem, frühe Geschlechtsreife und starker Geschlechtstrieb machen dazu besonders geneigt; auch soll die Krankheit erblich sein. — In seltenen Fällen kommt auch bei Männern ein der Hysterie ähnlicher Zustand vor. Ich hatte einen Jüngling in der Behandlung, welcher Onanist war, und dessen Benehmen ganz weibisch war und dem einer empfindlichen, hysterischen Person glich. Derselbe bekam sehr häufig Krampfanfälle, die den hysterischen Krämpfen ganz ähnlich waren und insbesondere mit dem characteristischen Würgen im Halse und Auftreibung desselben verbunden waren.

§. 1906.

Gelegenheitsursachen sind zum Theil die Einflüsse, die die Ausbildung der oben bezeichneten Anlage begünstigen, daher alle schwächenden Einflüsse, wie eine sizende Lebensart, schwächende Krankheiten, z. B. wiederholte Blutflüsse, weisser Fluss, Kummer, Sorgen, unglückliche Liebe etc., alle Einflüsse, welche die Sensibilität und insbesondere die Reizbarkeit der Geschlechtstheile erhöhen, wie zu frühzeitige Ausbildung des Geistes, zu starke Erweckung der Thätigkeit der Phantasie und des Gefühls, z. B. durch vieles Romanelesen, das Lesen schlüpfriger Darstellungen, häufiger gesellschaftlicher Umgang mit Männern, unsittliches Betasten der Geschlechtstheile und überhaupt Aufreizungen des Geschlechtstriebes ohne Befriedigung, auch Unterdrückung des Monatsflusses, schleichende Entzündung und Entartungen in der Gebärmutter oder den Eierstöcken etc.

Die den hysterischen Anfall zur unmittelbaren Folge habenden Ursachen sind vorzüglich Gemüthsbewegungen, besonders häufig diejenigen, die durch einen Zank,

durch unglückliche Liebe, Eifersucht, den Widerwillen gegen einen mit Abneigung geheiratheten Mann hervorgebracht sind, auch scheint der Anblick von Individuen, die an einem Krampfanfall leiden, den Anfall bei dazu geneigten Personen erwecken zu können etc.

§. 1907.

Die nächste Ursache dieser Krankheit scheint in einem in dem Grade gereizten Zustand der Nerven der Geschlechtstheile und zugleich der Nerven, in welchen die Gemüthsaffecte sich vorzüglich äussern, nämlich den Unterleibsganglien zu liegen, dass hierdurch abnorme Empfindungen und vorzüglich krampfhafte Zufälle entstehen, die zunächst sich in den unter den genannten Nerven stehenden Organen äussern, sodann aber über den ganzen Körper, insbesondere über die unter dem Einfluss der Rückenmarksnerven stehenden Theile sich verbreiten.

§. 1908.

Die Vorhersage kann in Beziehung auf die Erhaltung des Lebens günstig gestellt werden, indem an dieser Krankheit, so Gefahr drohend die Anfälle oft zu sein scheinen, wohl nur höchst selten jemand stirbt, so dass z. B. unter den Krankheitsfällen, die ich zu beobachten Gelegenheit hatte, kein einziger während des Anfalls tödtlich wurde. Stirbt das Individuum an Abzehrung, Wassersucht etc., so wirken wohl zur Entstehung dieser Zustände noch andere Ursachen mit. Der Erfolg der Behandlung ist übrigens in der Regel kein sehr glänzender, indem es ohne Umänderung der äussern Verhältnisse meistens nicht glückt, dem Nervensysteme die zu grosse Reizbarkeit, die den hysterischen Anfällen zum Grunde liegt, zu nehmen.

§. 1909.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den*

Ursachen. Von der grössten Wichtigkeit ist die gehörige Berücksichtigung der Gemüthsstimmung der Kranken. Ist dieselbe von Kummer gebeugt, so sei der Arzt ein theilnehmender und tröstender Freund und suche das unglückliche Loos der Kranken möglichst zu verbessern. Man empfehle den Verwandten eine milde Behandlung der Kranken, suche die Kranke zu einer Reise, zu einem Aufenthalt in einem Bade zu bewegen, um ihr Gemüth aufzuheitern etc. Ist dagegen die Kranke eine launige, zu Zank und Intriguen geneigte Person, so muss der Arzt mit Festigkeit und so weit es in seiner Macht steht, selbst mit Strenge gegen sie verfahren, damit dieselbe ihren Launen, durch welche *häufig* neue Anfälle erregt werden, nicht ganz freien Lauf lasse. Da der Anfall oft halb willkürlich erregt wird, und jedenfalls ein kräftiges Ankämpfen des Willens gegen denselben dazu beiträgt, ihn seltener zu machen, so ist es oft sehr nüzlich, auf den Willen der Patientin durch Erregung der Scham und der Furcht vor dem Anfall und auf andere Weise zu wirken. Ebenso wie auf das Gemüth der Kranken gewirkt werden muss, sucht man auch die Geschlechtsaufreizungen möglichst zu verhüten, und untersagt die Romanelektüre, häufige Gesellschaft mit Männern, ist ein Verdacht vorhanden, dass Onanie statt finde, so lenkt man auf geeignete Weise die Aufmerksamkeit der Mutter der Kranken auf diesen Gegenstand, man wirkt darauf hin, dass die Kranke den ganzen Tag den Geist und die Körperkräfte in Anspruch nehmende Beschäftigung habe etc. Ist die monatliche Reinigung in Unordnung, so sucht man dieselbe wiederum herzustellen, leidet die Kranke an der Bleichsucht, an Blutflüssen, am weissen Flusse oder andern auf die Hysterie Einfluss habenden Krankheitszuständen, so sucht man sie bald zur Heilung zu bringen.

§. 1910.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um die erhöhte Sensibilität zu beruhigen, wendet man sowohl während als ausserhalb des Anfalls einen Aufguss von Chamillen, Melissen, Pfeffermünze, Baldrian oder Raute, die Asa foetida, den Liquor Cornu Cervi succinatus, das Oleum animale Dippelii, die versüssten Säuren, das Castoreum, den Moschus, und wohl auch bei heftigen Anfällen, wobei das Gehirn frei bleibt, mit Vorsicht das Opium an, auch lässt man die Kranken an verbrannten Federn, an Hirschhorngeist, dem *Dippel*schen Thieröl riechen, aromatisch-geistige Einreibungen den Rücken herunter vornehmen, aromatische Bäder gebrauchen, Klystiere mit Valeriana, Asa foetida und dergleichen geben, und kann auch, sowohl um den Anfall zu beschränken, als die ganze Krankheit zu heben, den thierischen Magnetismus in Anwendung bringen.

Von grosser Wichtigkeit scheint es zu sein, in der Zeit zwischen den Anfällen einen angemessenen Verbrauch der Nervenkräfte durch Muskelthätigkeit, mithin durch körperliche Arbeit, besonders im Freien, und durch Hinleitung derselben auf die oft ganz darniederliegenden vegetativen Prozesse zu bewirken. Zu leztern Zwecke dienen das Extract der Pomeranzenschaalen, Calamus aromaticus, die China, die Eisenpräparate etc.

§. 1911.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Droht in einem Anfalle Gefahr der Erstickung oder eines Schlagflusses, so muss eine Aderlässe gemacht werden, doch darf man sich nicht zu leicht zur Vornahme einer Blutentleerung hinreissen lassen, indem scheinbar sehr gefährliche Zustände in der Regel doch ohne Nachtheil vorübergehen. — Ist Ohnmacht oder Starrsucht eingetreten, so werden diese Krankeitszustände auf die gewöhnliche Weise behandelt, doch wählt man

unter den erregenden Mitteln vorzüglich die antihysterischen. — Als Erweckungsmittel in diesen Zufällen, so wie überhaupt um die Kranke in den hysterischen Anfällen wieder zu sich zu bringen, kann man sich unter Andern auch der Besprizungen des Gesichtes mit kaltem Wasser mit Vorsicht bedienen. — Bei Herzklopfen und Blutwallungen wendet man die verdünnten Mineralsäuren an. — Die Aufblähungen des Leibes, die Verstopfungen und Stockungen im Pfortadersystem verdienen eine besondere Berücksichtigung. — Bei Abnahme der Kräfte die stärkende Methode.

Zweite Gruppe

der ersten Ordnung der Nervenkrankheiten.

Die Krämpfe.

Clarus (der Krampf in pathologischer und therapeutischer Hinsicht. Leipzig 1822).

Die Fallsucht.

(*Fallende Sucht, Epilepsia, Morbus sacer, herculeus, divinus, comitialis, lunaticus, caducus, daemoniacus, puerilis, Sti. Valentis, Sti. Joannis.*)

Tissot (Lausanne 1770, a. d. Franz. Leipzig 1771). — *Greding* (advers. med. pract. Vol. I—III. u. in s. vermischten Schriften). — *Lentin* (in s. Beiträg. B. III.). — *Löbenstein Löbel* (Lpz. 1818). — *Mansford* (aus d. Engl. 1819 v. Cerutti. Leipzig 1822). — *Portal* (Paris 1827, a. d. Franz. v. Hille. Leipzig 1828).

§. 1912.

Die Fallsucht ist die Krankheit, die sich durch Anfälle zu erkennen gibt, in welchen der ganze Körper, vorzüglich die Glieder, von heftigen Zuckungen befallen und auch von tonischen Krämpfen verdreht wird und Empfindung, und Bewusstsein und überhaupt alle Merkmale der Seelenthätigkeit mangeln.

§. 1913.

Verlauf des einzelnen Anfalls. Wenn die Zuckungen und die Unterdrückung das Bewusstsein mit

Vorboten eintreten, wird der Verlauf des Anfalls in 3 Stadien eingetheilt: 1) das der Vorboten, 2) das der Zuckungen und Bewusstlosigkeit und 3) das des schlafsüchtigen Zustandes. Die Vorboten beschränken sich zuweilen auf Symptome eines Ergriffenseins des Gehirns, Schwindel, Betäubung, Schwere und Schmerz im Kopfe, Ohrensausen, Funken vor den Augen, ein Thränen der Augen, einen stieren wilden Blick, Zittern der Augenlieder, eine stammelnde Sprache und kurz vor dem Anfall zuweilen die Empfindung eines Rauschens und Krachens im Kopfe. Oefters zeigen sich die ersten Erscheinungen nicht im Gehirne, sondern der Kranke wird noch bei wenig eingenommenem Kopfe von grosser Angst befallen, hat Herzklopfen, empfindet einen Druck in den Präcordien, zuweilen Aufblähungen etc., wo er sodann unmittelbar vor dem Anfalle oft das Gefühl hat, wie wenn etwas von der Herzgegend oder einer andern Stelle in den Kopf hinauffahre, in welchem Momente das Bewusstsein verloren geht und die Krämpfe beginnen. Ebenso gibt es Fälle, in welchen der Kranke in einer der Gliedmassen einen warmen, häufiger einen kalten Hauch, oder ein Ameisenkriebeln oder eine Art electrischen Schlages (Aura epileptica) wahrnimmt, welcher sich von einer bestimmten Stelle aus, insbesondere einer Narbe, nach dem Verlaufe der Nerven gegen das Gehirn hinzieht, wo sodann, so wie er dieses erreicht hat, Bewusstlosigkeit und die Krämpfe eintreten. Die häufigsten Fälle sind übrigens die, in welchen auch in diesem Stadium das Gehirn vorzüglich ergriffen erscheint, wobei jedoch als weniger bedeutende Erscheinungen auch Aufblähung des Leibes, Neigung zum Erbrechen u. s. w. vorhanden sein können. In der Regel ist in diesem Zeitraum auch das Gemüth sehr verstimmt, der Kranke ungewöhnlich zornmüthig oder niedergeschlagen. Oft empfindet der Kranke ein Ziehen und Reissen in den

Gliedern, oft hat er jezt schon einige Zuckungen. Der Urin ist gewöhnlich blass.

§. 1914.

Nach verschieden langer Dauer der erwähnten Zufälle, oft nach wenigen Augenblicken, oft auch ohne alle Vorboten wird der Kranke von allgemeinen heftigen Zuckungen und von Bewusstlosigkeit befallen. Er läuft gewöhnlich einige Schritte vorwärts, wobei sein Kopf auf die eine Seite gewendet und er selbst oft in einem Kreise gedreht wird und stürzt unter einem heftigen Schrei nieder. Der Kopf wird hin und her geschleudert und oft mit grosser Schnelligkeit auf den Boden aufgeschlagen. Das Gesicht, das aufgetrieben und oft dunkelroth wird, ist in einer Abscheu erregenden Bewegung, der Mund wird oft schnell in die Länge gezogen und wieder rüsselförmig hervorgetrieben, die Zähne knirschen, und die etwa zwischen die Zähne gebrachte Zunge wird verlezt, so wie selbst Zähne abspringen können, Schaum ist vor dem Munde, die Augen rollen, die Augenlieder werden entweder krampfhaft geschlossen oder stehen unbeweglich offen, oder zittern, die Pupille erweitert und verengert sich abwechselnd, und die Iris ist oft in einer zitternden Bewegung, die Haut der Stirne und der behaarte Theil des Kopfes werden hin und her bewegt. Die Arme werden verdreht oder schlagen oft mit grosser Gewalt nach einer bestimmten Richtung, z. B. auf die Brust, oder auch nach einer unbestimmten Richtung, der Daumen ist in der Regel fest eingeschlagen und die Hand bildet eine Faust. Ebenso werden die Füsse verdreht und mannigfaltig bewegt, und durch die Zusammenziehungen der Muskeln des Rumpfes wird der Körper bald auf die eine, bald auf die andere Seite gebogen und hin und her geworfen. Das Athmen ist erschwert, der Kranke stöhnt und stosst ungewöhnliche Töne aus, der Puls und der Herzschlag sind unregelmässig, zuweilen

zitternd, man vernimmt ein Gurren im Leibe, die Hoden sind gegen den Bauchring angezogen, das Glied in Erection, der Samen und der Urin werden ausgesprizt, der Koth ausgeleert. Hiebei ist der Kranke völlig ohne Bewusstsein und ist auch gewöhnlich ohne Gefühl, so dass z. B. weder auf Ueberraschung, noch auf den schmerzhaftesten Eindruck, selbst auf starke Verbrennung irgend eine Veränderung an ihm wahrgenommen wird. — Nachdem die heftigen Zuckungen einige Zeit angedauert haben, gehen sie häufig in einen tonischen (tetanischen) Krampf über, der sich wieder in Zuckungen auflöst, welche sodann allmälig, oft unter übelriechendem Aufstossen und wirklichem Erbrechen oder *Abgang* von Blähungen oder Durchfall nachlassen, und worauf der Kranke zu einigem Bewusstsein kommt.

§. 1915.

Ein solcher Anfall dauert 10, 15 Minuten, selten eine halbe Stunde und darüber. Hierauf verfällt der Kranke in der Regel in einen sehr tiefen Schlaf, aus welchem er nicht leicht erweckt werden kann und in welchem der Puls voll und regelmässig und die Respiration freier wird und gewöhnlich ein reichlicher übelriechender Schweiss ausbricht. Nach dem Erwachen fühlt sich der Kranke abgespannt, er ist noch eine Zeit lang schläfrig, eingenommen im Kopfe, missmuthig und erholt sich nach und nach. Zuweilen verfallen die Kranken nach dem Anfalle in eine Art von Somnambulismus. Sie gehen hin und her mit offenen, aber meistens stieren Augen, sprechen und singen, geben auch selbst einige Antwort auf die an sie gestellten Fragen, kommen aber zu keinem klaren Bewusstsein, so dass sie sich in einer Art Traumleben befinden. Dieser Zustand dauert oft mehrere Tage, bis er gänzlich vorübergeht.

§. 1916.

Verlauf der ganzen Krankheit. Den ersten Anfällen gehen oft sehr lange Zeit Anfälle von Schwindel und von leichten Zuckungen, insbesondere im Gesichte, vorher, oft ist es den Kranken, wie wenn ihnen plözlich von der Herzgrube aus Etwas nach dem Kopfe steige, worauf ein schnell vorübergehender Schwindel eintritt; zuweilen haben sie auch Anfälle von Catalepsie, namentlich der leichtern Art derselben, die ich unter dem Namen das *Staunen* beschreiben werde, welche Anfälle oft nach längerer Zeit in die Epilepsie übergehen; oft haben sie auch nur häufiges Kopfweh und Wüstigkeit des Kopfes; in manchen Fällen bricht die Fallsucht aus, ohne diese Erscheinungen zu Vorläufern zu haben. Selten geht die Krankheit mit einem Anfalle vorüber und selten sezen die Anfälle ganze Jahre hindurch aus, gewöhnlich kommen sie in kürzern Zwischenräumen zurück, z. B. alle Monate, alle Wochen, ja alle Tage und jeden Tag mehrere Male, öfters halten sie bestimmte Perioden, gewöhnlich thun sie aber dieses nicht. Haben sie längere Zeit ausgesezt, so kommen sodann gerne mehrere Anfälle schnell aufeinander. Gewöhnlich vermehren sich die Anfälle, je länger die Krankheit dauert. Die ersten Anfälle sind in der Regel die leichtern, die spätern die heftigern, doch kann auch der umgekehrte Fall statt finden.

Die Krankheit hat einen sehr chronischen Verlauf und haftet oft an dem Kranken bis zu seinem Tode. In Gesundheit geht die Krankheit öfters bei dem Eintritt des Kranken in das Alter der Geschlechtsreife und dem Eintritt der monatlichen Reinigung, nach Abgang von Würmern, öftern, gewöhnlich sehr übelriechenden Schweissen etc. über, doch geschieht dieses nicht mit einem Male, sondern allmälig, indem die Anfälle immer seltener und schwächer werden. — Zum Tode

kann die Epilepsie durch Nachkrankheiten, so wie auch durch Schlag- oder Stickfluss während eines heftigen Anfalls führen. — Folgekrankheiten sind: düstere und zornige Gemüthsstimmung, Schwäche des Gedächtnisses, der Urtheilskraft, zulezt wirklicher Blödsinn oder Verrücktheit, Taubheit, seltener Blindheit, Neigung zum Schlagfluss, Lähmung, Abzehrung, Wassersucht.

§. 1917.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Es möchte wohl kaum eine bekannte Veränderung im Gehirne geben, die man nicht auch nach der Fallsucht angetroffen hat, verschiedene Fehler im Bau des Schädels, z. B. eine schiefe Stellung der Schädelknochen, auffallende Dickheit derselben, Knochenauswüchse, Verengerung der Löcher, aus welchen die Gefässe und Nerven aus der Schädelhöhle treten, Verknöcherungen der Dura mater, Anschwellungen der Pachionischen Drüsen, Erweichung und Verhärtung des Gehirnes, Veränderungen der Zirbeldrüse, starke Anfüllung der Gefässe des Gehirns mit Blut, wässerigte und lymphatische Ausschwizung zwischen den Hirnhäuten und in den Hirnhöhlen, Hydatiden der Adergeflechte etc. *Wenzel* will constant bedeutende Veränderungen in dem Gehirnanhang gefunden haben; beide Lappen desselben seien mehr oder weniger von einander entfernt, der Zwischenraum mit einer dünnen, meistens farblosen, etwas klebrigen Feuchtigkeit ausgefüllt, zuweilen auch kleine hirseförmige durchscheinende Körperchen in demselben vorhanden, der Gehirnanhang selbst oft sehr gross, weich, die Oberfläche desselben im hintern Lappen dunkelblau, im vordern sehr roth etc. [1])

Zuweilen hat man auch Fehler im Rückenmark und den Nerven und ihren Umgebungen gefunden, insbe-

1) Vergleiche dessen Schrift über den Hirnanhang fallsüchtiger Personen.

sondere Balggeschwülste, erdige Concremente etc., durch welche die Nerven gedrückt wurden.

Ausserdem fand man noch verschiedene Abnormitäten in den Lungen, dem Herzen, der Leber, der Milz, dem Magen etc., die zuweilen wohl als entferntere Ursachen zur Entstehung der Fallsucht mitwirken konnten, oft aber auch in keiner Beziehung zu derselben gestanden haben mochten. — Oft findet man auch in den Leichen der Fallsüchtigen keine organischen Veränderungen.

§. 1918.

Verschiedenheiten der Fallsucht nach den Ursachen stellen dar die Epilepsia hereditaria et acquisita, die E. idiopathica et sympathica, nach ihrem ursprünglichen Size die E. cerebralis, spinalis, abdominalis, extremitatum; nach ihren Erscheinungen und Verlaufe E. completa et incompleta, E. diurna et nocturna, E. atypica et periodice recurrens, E. acuta et chronica.

§. 1919.

Die Anlage zur Epilepsie ist oft angeerbt und angeboren, und es sind zu derselben sowohl Personen mit sehr empfindlichem Nervensysteme und leicht beweglichem Gemüthe, als auch mit Congestionen nach dem Kopfe behaftete Individuen geneigt.

Gelegenheitsursachen sind *a*) solche, die unmittelbar auf's Gehirn wirken: Erschütterung des Gehirns, Verlezungen des Schädels, der Sonnenstich, übermässige Geistesanstrengungen etc.; *b*) consensuell und antagonistisch wirkende: Würmer, Gifte und andere Reize im Magen und Darmkanal, anhaltende Verstopfung und Stockungen im Pfortadersysteme, Fehler in den Geschlechtsverrichtungen, insbesondere zur Zeit der eintretenden Geschlechtsreife, das Nichterscheinen der monatlichen Reinigung, Onanie, Schwangerschaft und schwere Geburten, das beschwerliche Zahnen, zurückgetretene

Hämorrhoiden, Gicht, Fussschweisse, Hautausschläge etc.; *c*) allgemein auf's Nervensystem wirkende: heftige Gemüthsaffecte, insbesondere Zorn und Schrecken, der Anblick eines Epileptischen, heftige Körperbewegung, grosse Hize und Berauschung, so wie auch ein stärkerer Blut- und anderer Säfteverlust und andere schwächende Einflüsse.

§. 1920.

Ueber das Wesen der Fallsucht kann nur so viel mit einiger Bestimmtheit angenommen werden, dass die Krankheit in einer zeitweise eintretenden Hemmung der Gehirnthätigkeit und in allgemeinen durch den krankhaften Zustand des Gehirns bedingten Krämpfen bestehe. *Tissot*[1]) erklärt die Krankheit aus einer Zusammendrückung und Zusammenziehung des Gehirns, wodurch die Lebensgeister in die bewegenden Nerven getrieben werden.

§. 1921.

Vorhersage. Die Krankheit ist zwar selten tödtlich, sie wird aber auch selten geheilt; tödtlich ist sie am leichtesten bei Individuen mit Neigung zum Schlagfluss, heilbar noch am meisten, wenn ihre Ursache entdeckt wird und entfernt werden kann, wenn die Zeit der Geschlechtsreife noch nicht vorüber ist, wo sie oft mit der Vollendung dieser Periode von selbst aufhört (nach *Hippokrates* ist die Krankheit bei Kranken von mehr als 25 Jahren unheilbar), und wenn sie nicht so lange gedauert hat, dass sie zu sehr zur Gewohnheit geworden ist oder selbst Desorganisationen im Gehirne veranlasst hat.

§. 1922.

1) *Die* Behandlung *während des Anfalls.* Es

1) Abhandlungen über die Nerven. Von der fallenden Sucht. Artikel 2.

kann und soll in der Regel hier nichts gethan als der Kranke vor Verlezungen bewahrt werden. Man halte denselben nicht, suche ihm nicht die Daumen aufzubrechen, sondern lasse den Krämpfen freien Lauf und bringe den Kranken nur in eine Lage, in welcher er sich nicht beschädigen kann, man lege unter das Haupt und auf die Brust, wenn er auf dieselbe schlägt, ein Kopfkissen, und, wenn er die Zunge zwischen die Zähne bringt, zwischen die beiden Reihen der Zähne ein Stückchen Korkholz. Nur wenn während des Anfalls Gefahr drohende Erscheinungen eintreten, namentlich Stick- oder Schlagfluss zu fürchten ist, hat man die geeigneten Mittel anzuwenden; in den angegebenen Fällen eine Aderlässe und im leztern Falle auch kalte Umschläge auf den Kopf oder kalte Begiessungen desselben, so wie das Auftröpfeln von Schwefeläther.

Um den schon in seinen Vorboten auftretenden Anfall zu unterdrücken, hat *Richter* [1]) Brechmittel empfohlen; auch hat man das Trinken von kaltem Wasser, das Ableiten der Aufmerksamkeit, magnetische Manipulationen und wenn der Anfall mit dem epileptischen Hauch in einer der Gliedmassen beginnt, das feste Anlegen eines Bandes gerühmt; das leztere Mittel soll jedoch dem Kranken oft eine ausserordentliche Angst veranlassen, die nur durch die Lösung des Bandes und den Eintritt des Paroxysmus gehoben wird.

§. 1923.

2) *Behandlung der Krankheit ausserhalb des Anfalls.* a) *Die Anzeige aus den Ursachen* ist in der Behandlung dieser Krankheit die wichtigste, indem man, wenn keine noch fortwirkende Ursache auffindbar ist und entfernt werden kann, seine Zuflucht zu den specifischen Mitteln nehmen muss und von diesen meistens ohne

1) Spec. Therap.

Hilfe gelassen wird. Ist die Krankheit bei einem Kinde von der Mutter aus angeerbt, so darf es nicht von derselben gestillt werden, sondern muss an die Brust einer gesunden Amme gelegt werden. Die Mutter oder Amme eines epileptischen Kindes muss sich vor Leidenschaften und dem Genuss geistiger Getränke hüten, sie muss eine leichte Kost geniessen etc. Sehr häufig dienen, besonders bei Kindern, wegen Säure im Magen und Stoffe in den Gedärmen, Brechmittel, Säure tilgende Mittel, Abführungsmittel, noch öfter wegen Wurmreiz, die wurmabtreibenden Mittel. Geheilte Geschwüre und zurückgetretene Ausschläge sucht man wieder herzustellen. Ausschweifungen in den Geschlechtsverrichtungen sucht man zu verhindern. Eindrücke der Schädelknochen entfernt man durch die Trepanation. Geschwülste, die auf die Nerven drücken, schneidet man aus, verlezte Nerven durchschneidet man vollends. Bei Narben, von denen die Aura epileptica ausgieng, hat man mit glücklichem Erfolge Aezmittel angewandt etc.

§. 1924.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* So wenig man über das Wesen der Epilepsie noch im Klaren ist, so weiss man doch Einiges über die Natur derselben, was bei der Behandlung einen Fingerzeig geben kann.

a) Es ist gewiss, dass bei der Epilepsie immer das Gehirn entweder primär oder secundär leidet und meistens, wenigstens im Anfalle, eine Blutüberfüllung im Gehirn und oft auch, wie es scheint, eine vorübergehende Bewegung in den Nerven nach diesen Theilen stattfindet; es sind daher alle Veranlassungen zu Congestionen nach dem Kopfe möglichst zu vermeiden und vom Gehirne ableitende Mittel anzuwenden, nach Umständen Fussbäder, kühlende eröffnende Mittel, Fontanelle und Blasenpflaster,

häufiges kaltes Waschen und leichte Begiessungen des Kopfes mit kaltem Wasser etc.

b) Man erkennt oft deutlich den primären Siz der Krankheit und kann sodann die Mittel auf das ursprünglich leidende Organ richten. Geht z. B. die krankhafte Bewegung von den Ganglien des Unterleibes aus, so sind oft Brechmittel nüzlich, und es kann bei gesteigerter Sensibilität dieser Theile leichter als bei primärer Gehirnaffection das Opium angewandt werden. Zuweilen ist auch in diesem Falle ein verlarvtes Wechselfieber im Spiele und es dient die China und das Chininum sulphuricum. Vielleicht könnte auch die Bewegung in den Nerven von den Ganglien auf das Gehirn durch das Auflegen von Blasenpflastern, Einreibung der Brechweinsteinsalbe oder das Aufsezen von Moxen auf die Herzgrube oder in der Mitte des Rückens einigermassen gehemmt werden, wie man einen ähnlichen Erfolg von der Anwendung von Aezmitteln bei Narben, von denen die Aura epileptica ausgieng, beobachtete.

c) Wir können oft aus vielen Thatsachen schliessen, dass im Gehirn und Nervensystem keine materielle Veränderung und überhaupt kein sehr tiefes Leiden vorhanden ist, und dass die Epilepsie mehr blos in einer zur Gewohnheit gewordenen fehlerhaften Nervenbewegung besteht. Hier scheint es vorzüglich darauf anzukommen, durch Verhütung der Anfälle diese Gewohnheit aufzuheben, was oft am Besten durch die wiederholte Anwendung der Brechmittel, besonders vor den Anfällen geschieht, welche durch die Erschütterung des Nervensystems, insbesondere des Gangliensystems, eine freiere Bewegung in den Nerven wieder herzustellen scheinen; doch habe ich auch beobachtet, dass durch Brechmittel Anfälle erregt werden.

d) Zuweilen hat die Fallsucht deutlich den einen oder den andern der Hauptkrankheitscharactere ange-

nommen. Ist es ein hypersthenischer Zustand, so dienen von Zeit zu Zeit kleine Blutentleerungen, kühlende Mittel, eine magere Diät, im entgegengesezten Fall die stärkende, seltener die erregende Methode.

e) Die eine Haupterscheinung der Krankheit ist ihrem Wesen nach immer Krampf und es können daher die krampfstillenden Mittel mit der gehörigen Auswahl angewandt werden, wobei insbesondere die Vorsorge getroffen werden muss, dass durch ihre Anwendung nicht die andere Haupterscheinung, die Unterdrückung des Bewusstseins und Gefühls, verschlimmert werde, das ist, das Gehirn nicht verlezt werde. Aus diesem Grunde erfordert die Anwendung des Opiums die grösste Vorsicht. Die krampfstillenden Mittel sind grösstentheils als Specifica gegen die Epilepsie gerühmt worden und werden bei der Angabe dieser Mittel namentlich angeführt werden; sie können aber sehr häufig den erwünschten Erfolg nicht haben, da die Krämpfe in der Regel nur die Folge des Gehirnleidens sind und dieses meistens durch die krampfstillenden Mittel nicht gehoben werden kann.

f) *Lentin*[1]) gibt den Rath, genau zu beobachten, unter welchen Ausscheidungen der einzelne Anfall aufhöre und auf diese zu wirken, so z. B. lasse man bei Trockenheit der Haut ausser dem Anfall und reichlichem Schweisse nach demselben den Kranken von Zeit zu Zeit in ein warmes Bad bringen und mit einem mit Seife geriebenem Schwamme abreiben, bei Aufstossen und Erbrechen gebe man wiederholt Brechmittel, bei Abgang von Blähungen abführende Mittel etc.

§. 1925.

Die als specifisch wirkend gerühmten Mittel sind grösstentheils krampfstillende, aber auch erregende, schweisstrei-

1) Beiträge. B. III. S. 144 u. d. f.

bende, auf den Darmkanal ableitende Mittel u. s. w., und besizen oft mehrere dieser Wirkungen zugleich. Die vorzüglichsten sind: die Valeriana (zu 1 Scrupel bis ½ oder ganzen Drachme 4—5 Mal täglich), welche schon von *Dioscorides* empfohlen und von *Tissot* als das erste unter den specifischen Mitteln gerühmt worden ist;[1]) die Folia Aurantiorum, Lignum Visci querni; die Radix Paeoniae officinalis, ungefähr zu derselben Gabe; die von *Burdach*[2]) gerühmte Rad. Artemisiae vulgaris, immer um den andern Tag und am besten ½ Stunde vor dem Anfall einen gehäuften Theelöffel voll, etwa 50—70 Grane, in erwärmtem Bier gegeben, wobei der Ausbruch des Schweisses durch warme Bedeckung im Bette befördert werden muss;[3]) das Oleum animale Dippelii zu 5—10 Tropfen auf Zucker oder 2 Scrup. in 2 Drachm. Schwefeläther gelöst zu 10—30 Tropfen 4 Mal täglich; das Oleum Terebinthinae in grossen Gaben, der Hirschhorngeist, die Asa foetida, Castoreum, Moschus, der Kampher, Phosphor — das Opium, die Belladonna, Hyoscyamus etc. — das Kali carbonicum, die Flores Zinci, das Cuprum sulphurico ammoniacum täglich 2 Mal zu ½ Gran, das Magisterium Bismuthi, das Argentum nitricum fusum früh und Abends ½ Gran und allmälig steigende Gaben bis zu 1 oder 2 Granen, Sedum acre von der getrockneten Pflanze das Pulver zu 15 Granen bis zu 1 Scrup., endlich zu 1 Drachm. pro dosi, ebenso der Agaricus muscarinus, der Saft der weissen Zwiebeln, die Brechmittel, die drastischen Mittel, wie Helleborus, Pulsatilla nigricans, Gratiola etc., der unreife Traubensaft (das Omphacium) 4 Mal zu einem halben Esslöffel voll, gestiegen bis zu ½ Obertasse voll mit Wasser verdünnt, die Mineral-

1) Nervenkr. B. III. S. 389. — 2) *Hufeland's* Journ. B. 58. — 3) Vergl. *Dierbach's* neuest. Entdeck. in der Mat. med. S. 217, und *Richter's* spec. Therap. B. X. S. 377.

säuren, Queksilber, China, Eisen, — die Electricität, der thierische Magnetismus, — Schröpfköpfe, Blasenpflaster, Fontanelle, Haarseile, Moxen und das glühende Eisen auf den Nacken oder selbst auf den Kopf — kalte Begiessungen, Bäder, insbesondere Seebäder — Einreibungen von geistigen, ätherisch-öligten und narkotischen Dingen in den Rücken und die Herzgrube etc.

Die eigenthümlichen Convulsionen der Gebärenden.

(*Eclampsia parturientium.*)

Kelp (Diss. Argent. 1747). — *Engelmann* (Diss. Altd. 1752). — *Gehler* (Diss. Lips. 1776 u. 77, und in seinen kl. Schriften d. Entb. 1r Bd. Lpz. 1798). — *G. F. Hoffmann* (Frankfurt a. M. 1795). — *Hamilton* (Journ. d. ausl. Literatur 1802). — *Velpeau* (Par. 1836). — *Boer*, *Siebold*, *Nägele* u. a. Schriftsteller über Geburtshilfe und Weiberkrankheiten.

§. 1926.

Mit dem Namen Eclampsie der Gebärenden werden höchst gefährliche, vor, während oder sogleich nach dem Geburtsact vorkommende Krämpfe belegt, die in der Form mehr oder weniger mit der Epilepsie übereinkommen, aber eine hizig verlaufende Krankheit sind. [*])

§. 1927.

Dem Krampfanfalle gehen oft Mattigkeit, Kopfschmerz, Betäubung, Sausen vor den Ohren, Verdunk-

*) Auch bei Kindern kommen, nebst den übrigen Krampfformen, hizige, die Form der Epilepsie darstellende Krampfanfälle vor (Eclamp. infantum), welche häufig von gastrischen Reizen, Zahnreiz, entzündlicher Gehirnaffection etc. veranlasst sind.

lung des Gesichtes, über den Rücken herablaufende Schauder, Angst und Herzklopfen vorher. Sodann brechen Zuckungen in den Gliedmassen, welche mit tonischen Krämpfen abwechseln, aus, die Kranke verliert bald das Bewusstsein, das Gesicht wird verzerrt, die Augen verdreht, die Pupille ist erweitert, Schaum vor dem Munde, das Athmen erschwert, der Puls klein, der Körper mit einem kalten Schweisse bedeckt, Stuhl- und Urinabgang unwillkührlich. Während der Krämpfe oder auch schon vorher, öffnet sich der Muttermund, das Kind macht gewöhnlich, wenn es nicht schon abgestorben ist, sehr lebhafte Bewegungen, und es erfolgt zuweilen unter heftigen Contractionen der Gebärmutter, wobei diese zerreissen kann, die Geburt.

Nach dem Anfalle sinkt die Frau in einen tiefen, von Schnarchen begleiteten Schlaf, und weiss nach dem Erwachen nicht, was mit ihr vorgegangen ist.

Solche Anfälle kehren wiederholt zurück, oft schon nach $^1/_4$ Stunde, und treten besonders mit dem Eintritt einer Wehe ein; haben sie sich schon öfters wiederholt, so kommt die Kranke in der Zwischenzeit nicht zum klaren Bewusstsein und redet irre oder erwacht gar nicht aus dem Schlafe. Die Anfälle hören meistens auf, wenn die Geburt erfolgt ist, können aber auch noch nach der Entbindung zurückkehren, und tödten häufig, ohne dass diese zu Stande kommt.

§. 1928.

Wesen und Ursachen. Diesen Zufällen scheint vorzugsweise ein starker Blutandrang nach dem Kopfe zum Grunde zu liegen. — Es werden mehr vollsaftige und blühende, als hysterische Personen, und besonders Erstgebärende davon befallen. — Die Gelegenheitsursachen kennt man nicht hinreichend, es werden übrigens beschuldigt: Ueberladung des Magens, Ge-

müthsaffecte, Verkältung, das Absterben des Foetus schwierige Geburten.

§. 1929.

Vorhersage. Die Krankheit ist sehr gefährlich, sich überlassen endigt sie sich meistens mit dem Tode, und bei der besten Behandlung soll ungefähr die Hälfte der Kranken sterben.

§. 1930.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Man zögere nicht, die künstliche Entbindung vorzunehmen, weil sie das noch am häufigsten Rettung bringende Mittel ist, und ohne Vollendung der Geburt die Krämpfe meistens nicht aufhören; werden die Zuckungen aber hierdurch vermehrt, so lasse man mit den Versuchen einstweilen nach.

§. 1931.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Die eigentlichen Antispasmodica, namentlich das Opium, sind selten dienlich und nur mit grosser Vorsicht anzuwenden. Dagegen beweisen sich Aderlässe, warme Bäder, kalte Ueberschläge auf den Kopf, eröffnende Klystiere, reizende Fussbäder und andere Ableitungsmittel heilsam (nach *Richter* das Uebergiessen der Füsse mit heissem Wasser).

§. 1932.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Man sorge, wie bei der Epilepsie, dafür, dass die Kranke sich nicht verleze. Das Festhalten der Kranken und das Aufbrechen der Daumen ist hier ebenfalls zweckwidrig.

Der Veitstanz.

(*Chorea St. Viti, Scelotyrbe, Epilepsia saltatoria, Ballismus, Tarantismus.*)

Wedel (lat. Jena 1628). — *Brückmann* (lat. Frankf. 1785). — *Wichmann* (Id. z. Diagnost.). — *Bernt* (lat. Prag 1810). — *Wagner* (Nürnberg 1818). — *Stransky* (lat. Wien 1822).

§. 1933.

Der Veitstanz ist die chronische Krankheit, welche in anfallsweise wiederkehrenden, clonischen, schnell wechselnde Bewegungen darstellenden Krämpfen, bei welchen das Bewusstsein völlig frei ist oder Ecstase und Irrereden vorhanden ist, besteht.

§. 1934.

Es gehen dem Krampfanfall meistens einige Vorboten voraus, eine besondere Launenhaftigkeit oder Niedergeschlagenheit, Schwindel, Herzklopfen, das Gefühl von Griebeln in den Gliedern etc. Hierauf und auch ohne diese Vorboten, stellen sich Krämpfe ein, welche in keinen sehr gewaltsamen Zuckungen, aber in schnell mit einander wechselnden Zusammenziehungen der meisten Muskeln des Körpers besteht, so dass hierdurch die mannigfaltigsten und sonderbarsten Bewegungen hervorgebracht werden. Der Kranke verzieht abwechselnd das Gesicht zu verschiedenen Grimassen, er dreht die Arme im Kreise, schleudert sie hin und her, schlägt einen Gegenstand (Malleatio), krümmt die Finger, macht Drehungen mit dem Rumpfe, wirft die Füsse über einander, hinkt, läuft schnell vorwärts (Epilepsia procursiva) und macht Bewegungen, wie bei einem komischen Ballettanze. Zuweilen kommen solche Krämpfe nur auf einer Seite des Körpers vor (Chorea

semilateralis). Hiebei sind meistens die Kranken im vollen Gebrauche ihrer Geisteskräfte, zuweilen in Ecstase, wobei sie häufig die Neigung haben, die Zufälle, welche die Umstehenden oft in Erstaunen oder Lachen versezen, absichtlich zu vermehren, zuweilen befinden sie sich in einer Art Somnambulismus, wobei die Kranken zwar nicht beim Bewusstsein sind, ihre Geistesthätigkeit aber nicht unterdrückt ist, wie in der Fallsucht, sondern dieselben in einer Art Traumleben sich befinden, so dass sie reden, lachen, singen, aber die Eindrücke der Aussenwelt gar nicht oder nur theilweise wahrnehmen.

Ein solcher Anfall dauert eine Viertel- bis zu einer ganzen Stunde, worauf die Krämpfe nachlassen. Der Kranke fühlt sich ermattet, aber nicht in der Art angegriffen, wie in der Fallsucht.

§. 1935.

Die Anfälle kehren meistens in unbestimmten, zuweilen aber auch in bestimmten Zeiträumen zurück und treten oft ohne äussere Veranlassung, oft auch auf eine solche, namentlich auf Gemüthsbewegungen, ein. — Die Krankheit verliert sich oft von selbst, besonders bei dem Uebergang des Individuums in eine andere Lebensperiode. Zum Tode führt sie für sich nie, doch kann sie in eine schwerere Nervenkrankheit, namentlich die Fallsucht, sich umwandeln, oder es kann eine andere Krankheit, namentlich Melancholie, Nervenschwindsucht, Schlagfluss hinzukommen.

§. 1936.

Anlage haben vorzüglich zart gebaute und nervenschwache Kranke und Mädchen, kurz vor und während der Zeit des Mannbarwerdens. **Gelegenheitsursachen** sind Onanie, nicht zu Stande kommende monatliche Reinigung, Gemüthsbewegungen, insbesondere Schrecken, Würmer, gastrische Unreinigkeiten, Erkältung, zurückgetretene Ausschläge, Verlezung eines Nervens etc.

§. 1937.

Von dem **Wesen** des Veitstanzes kann nur so viel angegeben werden, dass derselbe eine Krampfkrankheit ist und dass die Krämpfe nicht vom Gehirne, wie in der Epilepsie (welches Organ hier meistens gar nicht oder nur secundär leidet), sondern, wie es scheint, vom Rückenmarke ausgehen.

§. 1938.

Vorhersage. Die Krankheit wird nicht leicht habituell, wie die Epilepsie, und ist in der Regel nicht gefährlich.

§. 1939.

Die **Behandlung** während des Anfalls kann sich darauf beschränken, den Kranken vor Verlezung zu schüzen. Bei länger dauernden Anfällen können die gewöhnlichen krampfstillenden Mittel zu Hilfe gezogen werden. Nüzlich ist es, die Zuschauer zu entfernen, weil sie oft zur Vermehrung der Zufälle mittelbar beitragen.

In der Zeit ausser dem Anfalle sucht man die Ursachen der Krankheit zu entfernen, namentlich der Onanie vorzubeugen, die monatliche Reinigung in Gang zu bringen oder Würmer zu entfernen, und zieht krampfstillende Mittel, namentlich die Valeriana, Fol. Aurantiorum, Zinkblumen, den thierischen Magnetismus, lauwarme Bäder, und bei allgemeiner Schwäche China und Eisen in Gebrauch.

Der Brustkrampf.

(*Der Lungenkrampf, die krampfhafte Engbrüstigkeit, Asthma im engern Sinne, Asthma spasmodicum, s. caducum, Epilepsia pulmonum.*)

Floyer (nebst Ridley's Beobacht. aus dem Engl. v. Scherf. Lpz. 1782). — *Withers* (Lond. 1786, a. d. Engl. Lpz. 1796). — *Ryan* (Lond. 1793, a. d. Engl. Leipzig 1796). — *Bree* (Birmingh. 1800, a. d. Engl. Lpz. 1800). — *Brodhag* (Freiburg 1826). — *Hoffbauer* (Leipzig 1826).

Ueber das Asthma der Kinder: *Millar* (Lond. 1769, a. d. Engl. v. Krause. Leipzig 1769). — *Wichmann* (Id. z. Diagnost.). — *J. Ch. Albers* (lat. mit Vorrede v. J. Alb. Albers. Goettingen 1817). — Die Schriftsteller über Kinderkrankheiten.

§. 1940.

Der Brustkrampf ist eine heftige, anfallsweise sich einstellende Beengung, welche mit dem Zeichen des Krampfes verbunden ist.

§. 1941.

Diese Krankheit zeigt in ihrem Verlaufe einige Verschiedenheiten, je nachdem sie bei erwachsenen Individuen oder bei Kindern vorkommt.

Die *krankhafte Engbrüstigkeit der Erwachsenen* (Asthma adultorum) macht gewöhnlich zuerst des Nachts einen Anfall. Der Kranke erwacht unter heftiger Beengung und unter dem Gefühle des Zusammenschnürens in der Brust und in dem Kehlkopfe aus dem Schlafe, er bemüht sich, den Athem einzuziehen, wobei meistens in dem Kehlkopfe ein pfeifender und rauher Ton erregt wird. Oft sind die Athmungsbeschwerden so stark, dass der Kranke aus dem Bette springt, das Fenster aufreisst, um frische Luft einzuziehen, die Brust durch Anstrengung der Arme unterstüzt, um mehr Luft zu schöpfen etc.

Hiebei ist das Gesicht entweder blass und eingefallen oder dunkelroth, das Herz klopft stark oder ist in einer zitternden Bewegung, der Puls ist aussezend und krampfhaft, der Harn hat, wenn ein solcher gelassen wird, eine blasse, mehr wasserhelle Farbe. Das Stethoscop zeigt in solchen Augenblicken Abwesenheit des Respirationsgeräusches.

Ein solcher Anfall hält in der Regel einige Minuten und zuweilen eine viertel, eine halbe und mehrere Stunden an, er lässt sodann allmählig nach, wobei gewöhnlich, unter etwas Husten, ein schleimiger Auswurf sich zeigt und der Harn dunkler wird und einen Bodensaz erhält.

§. 1942.

Gewöhnlich kommen solche Anfälle mehrere Nächte hinter einander, sie sezen sodann eine geraume Zeit, oft Monate und selbst Jahre lang aus, bis wieder ein neuer Anfall, dem wieder eine Reihe anderer folgt, eintritt. Nur in seltenen Fällen halten die Anfälle ganz bestimmte Perioden.

In der Zeit zwischen den Anfällen befindet sich der Kranke, besonders in dem Anfange der Krankheit, ziemlich wohl, doch verändert sich auch in dieser Zeit sein Befinden allmälig. Zuerst empfindet er nur kurz nach dem Anfalle noch einige Athmungsbeschwerden, Mattigkeit etc. und es stellen sich auch einige Zeit vor dem Anfalle, gewöhnlich eine Stunde nach dem Mittagessen und gegen Abend, Vorboten des Anfalls, wie leichte Beweglichkeit des Gemüthes, Eingenommenheit des Kopfes, Ziehen zwischen den Schultern und im Nacken, Aufblähung des Leibes etc. ein. Späterhin bleibt auch in den Zwischenräumen der Anfälle eine gewisse Engbrüstigkeit zurück, auch kommen nun leichter Anfälle am Tage auf starke Körperbewegung, Gemüthsbewegung etc. zu Stande, endlich gesellt sich oft ein schleimiger, eiteriger und blutiger Auswurf hinzu, es

entwickelt sich oft wirkliche Lungenschwindsucht oder es bildet sich, was häufiger der Fall ist, Brustwassersucht aus; nicht selten entstehen auch im Verlaufe der Krankheit Anevrysmen des Herzens und der grossen Arterien.

Die Dauer des ganzen Leidens beträgt oft eine lange Reihe von Jahren, in Gesundheit geht die Krankheit durch allmälige Besserung über, auch unter Ausscheidungen, Entstehung von stellvertretenden Krankheiten etc., der Tod wird selten durch den Anfall selbst herbeigeführt, und tritt sodann unter Stick- und Schlagfluss ein, meistens ist er die Folge der sich nach langer Dauer der Krankheit oft ausbildenden Brustwassersucht oder Lungenschwindsucht.

§. 1943.

Der Brustkrampf ist entweder ohne Verbindung mit einer andern Brustkrankheit vorhanden oder es besteht eine solche neben demselben und kann die Ursache des Asthmas sein, doch kann eine davon herrührende Beengung nur dann Brustkrampf genannt werden, wenn durch die bestehende Lungenkrankheit das Athmen nicht unmittelbar gehemmt, sondern zuerst hierdurch ein Krampf in den Athmungsorganen hervorgebracht wird. Das Bestehen des Lungenkrampfes erkennt man vorzüglich an dem eigenthümlichen, zusammenschnürenden, den Krampf besonders bezeichnenden Gefühl in der Brust und dem pfeifenden Ton in dem Larynx. Fehlen diese krampfhaften Zufälle, so kann keine, auch noch so heftige Beengung, mit welchem Brustleiden sie in Verbindung stehen mag, Asthma genannt werden.

§. 1944.

Als eine eigene Art von Asthma nimmt *Laennec* das *Asthma mit kindlichem Respirationsgeräusche* an. Es findet hier eine Schwerathmigkeit statt, ohne dass irgend eine materielle Veränderung in der Brusthöhle

oder in den Lungen wahrgenommen wird, oder ein Herzfehler vorhanden ist, welche oft bei vollkommener Körperruhe ganz verschwindet, aber bei einiger Körperbewegung erregt und oft zu einem hohen Grade gesteigert wird. Hiebei ist aber das Athmen nicht wirklich gehemmt, und man nimmt bei der Untersuchung mit dem Stethoscop nicht Abwesenheit des Respirationsgeräusches, wie bei dem eigentlichen Lungenkrampf, sondern das kindliche Respirationsgeräusch wahr. Auch ist hiebei wohl nicht der pfeifende und rauhe Ton in dem Kehlkopfe wahrnehmbar. — *Laennec* schreibt diesen Zustand, sehr scharfsinnig, einer Vermehrung des Bedürfnisses der Respiration zu, wahrscheinlich in unbekannten Modificationen des Nerveneinflusses begründet; ein wirklicher Lungenkrampf ist derselbe jedoch nicht.

§. 1943.

Das *krampfhafte Asthma der Kinder* (hiziges Asthma, Millar'sche Asthma, Asthma spasmodicum infantum, Asthma Millari, von *Millar* selbst sehr passend Cynanche trachealis spasmodica oder spasmodic Croup genannt) besteht in sehr heftigen, nach vorhergegangenem leichtem Athemholen, eintretenden Erstickungsanfällen mit einem rauhen Ton im Kehlkopfe, welche oft sehr schnell tödtlich werden. Ohne Vorboten, als etwa leichten catarrhalischen Zufällen, stellt sich meistens in der Nacht der erste Anfall ein. Die Kinder erwachen unter Schreien mit einem rauhen, hohlen Ton, sie schnappen nach Luft, und suchen diese mit Gewalt in die Brust einzuziehen, sie haben das Gefühl von Zusammenschnürung in der Brust, ihr Gesicht wird blauroth, der Puls ist unterdrückt, die Haut trocken, zuweilen gesellen sich auch allgemeine Krampfzufälle hinzu. Nach einigen Minuten oder einer viertel oder halben Stunde lässt der Anfall nach, wobei oft etwas Husten und Niesen mit Schleim-

auswurf, oder auch Erbrechen und Stuhlentleerungen sich einstellen.

In der Zwischenzeit ist das Kind matt, traurig oder mürrisch, es zeigen sich manchmal leichte Zuckungen im Gesichte und in andern Theilen, das Athmen geht übrigens leicht von Statten.

Nach 12 bis 24 Stunden kommt ein neuer und heftiger Anfall und so kehren sechs und mehr Anfälle in immer kürzer werdenden Zwischenräumen und mit grösserer Heftigkeit, oft aber auch nach scheinbarem Nachlasse von Neuem zurück, bis ein Anfall oft unerwartet, unter Erstickung und Krampfzufällen, tödtet. Geht die Krankheit in Gesundheit über, so werden die Anfälle immer seltener und schwächer, doch zeigen sie sich in leichterm Grade oft noch zwei und drei Wochen hindurch.

Ich habe diese Krankheit in einem einzigen, jedoch unzweifelhaften Falle, beobachtet, und glaube denjenigen Aerzten, die dieselbe noch nicht gesehen haben, eine ziemlich vollkommene Vorstellung von der Krankheit geben zu können, wenn ich die Anfälle des Millar'schen Asthmas mit dem krampfhaften Einathmen, das in dem blauen Husten zwischen dem convulsivischen Husten eintritt, vergleiche. Dieses eigenthümliche Einathmen tritt nach Zwischenräumen, in welchen die Respiration ganz frei ist, ein, das Kind wird zuweilen vor dem Anfalle unruhig, es stellt sich aber durchaus kein Husten oder höchstens ein ein- oder zweimaliges kurzes Hüsteln ein, worauf sodann die grosse Beklemmung mit dem bei dem Einziehen der Luft statt findenden, dem Keuchhustentone ähnlichen, jedoch etwas rauhern Tone in dem Kehlkopfe eintritt. In den schwersten Anfällen des Asthmas kommt, wie in den schwersten Anfällen des Keuchhustens, das Einziehen der Luft nicht wirklich zu Stande, sondern der Athem wird ganz unterdrückt und

das Kind befindet sich in der höchsten Erstickungsgefahr, was plözlich und ohne vorhergegangenes Schreien des Kindes eintritt.

§. 1946.

Anlage zum Brustkrampf haben Personen mit sehr reizbaren Nerven, von dem mittlern Alter und mehr Männer als Weiber. Gelegenheitsursachen sind Gemüthsbewegungen, Verkältungen, eine sehr rauhe Witterung, starke Körperbewegungen durch schnelles Laufen, Singen etc., Diätfehler, zurückgetretene Gicht, Unterdrückung von Ausleerungen etc.

Als Ursache des Millar'schen Asthmas wird von *Millar* die feuchte und veränderliche Witterung im Frühlinge und Herbste, von *Wichmann* Erkältung im strengen Winter beschuldigt. Der von mir beobachtete Fall kam bei einem dreivierteljährigen Knaben vor, dessen schwächlicher Vater an krampfhaften Zufällen litt, die er sich wahrscheinlich durch Umgang mit metallischen Giften zugezogen hatte; vielleicht wurde das Kind selbst den Dämpfen metallischer Gifte ausgesezt. Auch war, nach der Aussage der Eltern, denselben schon ein Kind an derselben Krankheit in dem vierten Anfall gestorben.

§. 1947.

Das Wesen des eigentlichen Asthmas ist ein tonischer Krampf in der Lunge, wie es scheint in den Ringfasern, die nach *Reisseisen's* und *Laennec's* Untersuchungen da anfangen, wo die Knorpelringe aufhören und welche vielleicht sich bis in die Lungenbläschen fortsezen, und dem Kehlkopfe selbst. Dieser Krampf kann sowohl durch die Empfindlichkeit der Lungensubstanz selbst und der Lungennerven, so wie durch die unmittelbar auf die Lungen wirkenden Gelegenheitsursachen, als auch durch ein Leiden der Centralorgane des Nerven-

systems bedingt sein, was jedoch bei der gewöhnlichen Form des Asthmas ein seltener Fall zu sein scheint.

Mehrere Aerzte, namentlich *Autenrieth*, *Hecker*, *Jurine* und *Albers*, haben die Existenz des *Millar*'schen Asthma geleugnet und behauptet, dass die Aerzte, die diese Krankheit gesehen haben wollen, die häutige Bräune dafür gehalten hätten, und *Puchelt* ist geneigt, eine Verwechslung mit der häutigen Bräune oder mit der Carditis infantum anzunehmen; doch sieht man nicht ein, warum diese Krampfform allein bei Kindern, welche doch sonst zu Krämpfen eher eine grössere als eine geringere Anlage als Erwachsene haben, nicht soll vorkommen können, und es gibt auch eine nicht geringe Anzahl von ganz zuverlässigen Beobachtern, die diese Krankheit gesehen hat, dahin gehören *Wichmann*, *Lentin*, *Wiegand*, *Wendt*, *Hufeland*, *Heim*, *Formey*, *Gölis* etc. — In dem von mir beobachteten Fall schien der Krampf vorzugsweise in dem Kehlkopfe statt zu finden, wodurch die Krankheit allerdings einige Aehnlichkeit mit dem Croup erhielt; sie unterschied sich aber dadurch von demselben, dass sie vollständig intermittirte und die Anfälle unzweideutig das Gepräge des Krampfes hatten.

§. 1948.

Vorhersage. Das Asthma der Erwachsenen wird in den Anfällen selten lebensgefährlich, doch ist es schwer heilbar und es entwickeln sich leicht im Verlaufe der Zeit andere, zulezt tödtlich werdende Brustleiden. Das *Millar*'sche Asthma ist eine höchst gefährliche Krankheit und kann schon in den ersten Anfällen tödten.

§. 1949.

Behandlung *des Asthmas der Erwachsenen.* a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Insofern die Ursachen der asthmatischen Zufälle in dem Aufenthaltsort oder in dem Gewerbe des Kranken liegen, müssen

diese verändert werden; ist die Krankheit von oxydirten metallischen Substanzen veranlasst, so empfiehlt *Haase* den innerlichen Gebrauch der Schwefelleber mit Campher und das vorsichtige Einathmen von geschwefeltem Wasserstoffgas; der Kranke muss das Einathmen einer sehr kalten Luft, die Gemüthsbewegungen, Diätfehler etc. zu vermeiden suchen. Der Arzt muss aufs Genaueste untersuchen, ob nicht irgendwo im Körper ein Reiz liege, der die Krampfzufälle errege, und muss denselben zu beseitigen suchen.

§. 1950.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Ist es ganz sicher, dass die Beengungszufälle rein durch Lungenkrampf bedingt sind, wozu jedoch die genaueste Untersuchung des Kranken, insbesondere durch das Stethoscop, nothwendig ist, so ist sowohl während als ausserhalb des Anfalls die krampfstillende Methode angezeigt. Die kräftigsten Mittel sind ohne Zweifel, besonders um die Anfälle zu mässigen, Opium und Morphium aceticum, neben welchem man gerne schwarzen Kaffee trinken lässt, ferner das Extractum Lactucae virosae, das Lactucarium, Extr. Hyoscyami, die Nux vomica, die Digitalis, die Blausäure, die Belladonna, der Spiritus sulphurico aethereus, Naphtha vitrioli, Spirit. corn. cerv. succinat. und pyro-oleosus, Valeriana, Asa foetida, Moschus, die Ipecacuanha in kleinen Gaben, Zinkblumen, Brechmittel, auch stärkende Mittel, wie die China und Eisentinktur. Hiermit kann man verbinden das von *Hegewisch* empfohlene vorsichtige Rauchen der getrockneten Blätter von Datura Strammonium, das Einziehen erweichender und narkotischer Dämpfe, krampfstillende Klystiere, Einreibungen von erwärmtem Fett, narkotische und flüchtige Einreibungen in den Hals, die Brust und zwischen die Schulterblätter, aromatische Bähungen,

Bäder, reizende Fussbäder, Senfteige, Blasenpflaster, Einreibungen der Brechweinsteinsalbe etc.

§. 1951.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* In den höchsten Graden der Erstickungsanfälle ist, wenn die angegebenen Mittel nicht ausreichen und besonders wenn eine Blutstockung damit verbunden ist, eine Aderlässe vorzunehmen. Zeigt sich nach den Anfällen eine Verschleimung der Lunge, so gibt man Salmiak, Goldschwefel, und bei sehr zähem Schleime und passivem Zustande die Meerzwiebel, das Gummi Ammoniacum etc.

§. 1952.

Gegen das Asthma der Kinder ist von *Millar* die Asa foetida empfohlen worden, von *Wichmann* der Moschus, welcher nunmehr von den meisten Aerzten als das Hauptmittel anerkannt wird und welchem gegen das Ende der Krankheit auch China zugesezt werden soll, ausserdem das Opium, das Extractum Hyoscyami, der Goldschwefel, erweichende Bähungen, auf den Kehlkopf und die Brust gelegt, Senfteige und Blasenpflaster. — In dem von mir beobachteten Fall liess ich, da das Knäbchen sehr feist war, zuerst einige Blutegel auf die Brust sezen und gab ein abführendes Mittel, sodann gab ich Moschus und Opium, und als die Anfälle demungeachtet mit grosser Heftigkeit zurückkehrten, ein Brechmittel. Von diesem Augenblick war die Kraft der Anfälle gebrochen, worauf ich sodann bis zum völligen Verschwinden der Anfälle noch Moschus nehmen liess.

Der Keuchhusten.

(Der blaue Husten, Stickhusten, Eselshusten, Schafshusten.)

Butter (London 1773, aus d. Engl. v. Scherf. Stend. 1782). — *Danz* (Marburg 1791). — *Jahn* (Rudolstadt 1805). — *Hufeland* (Bemerk. über die natürl. u. inocul. Blattern, verschiedene Kinderkrankh. u. s. w.). — *Whatt* (Glasg. 1813). — *Marcus* (Bamberg u. Leipzig 1816). — *Desruelles* (Paris 1827, a. d. Franz. von v. dem Busch. Bremen 1828).

§. 1953.

Der **Keuchhusten** ist ein heftiger convulsivischer Husten, welcher von einem gedehnten, ebenfalls krampfhaften und mit einem eigenen, pfeifenden Tone begleitenden Einathmen unterbrochen wird und sich häufig unter Erbrechen endiget.

§. 1954.

Von dem Croup, dem Catarrh, der Bronchitis und der Lungenentzündung unterscheidet sich der Keuchhusten durch den heftigen, mit den Zufällen einer etwa zugleich vorhandenen Bronchitis durchaus in keinem Verhältniss stehenden, oft Erstickung drohenden Husten, durch den Krampf in den Respirationsorganen, welcher während der Anfälle bei dem Einathmen statt findet und sowohl durch den eigenthümlichen Ton, als auch durch die Abwesenheit des Respirationsgeräusches bei dem Einziehen der Luft erkannt wird, und durch die, neben dem Husten öfters vorkommenden, allgemeinen krampfhaften Affectionen.

§. 1955.

Verlauf der Krankheit. Man theilt den Verlauf der Krankheit gewöhnlich in drei Stadien ein, in das catarrhalische, das convulsivische und das Stadium des

Nachhustens oder der Abnahme, welche Abtheilungen jedoch weder durch eine plözliche Umänderung der Symptome streng von einander getrennt sind, noch ein bestimmtes Zeitmaass haben.

Die Krankheit beginnt mit gewöhnlichen catarrhalischen Zufällen, welche oft nur einige Tage, oft aber auch zwei Wochen und länger andauern, ehe der Character des Keuchhustens deutlicher hervortritt, doch ist meistens schon in diesem Zeitraum der Husten etwas stärker und dabei trockener als beim gewöhnlichen Katarrh.

Es entwickelt sich nun immer mehr der convulsivische Husten. Der Anfall des Hustens zeigt sich gewöhnlich an durch ein eine kurze Zeit vorher eintretendes leichtes Schleimrasseln mit etwas erschwertem Athmen, die Kinder werden unruhig, sie zeigen einige Angst und aus ihrem Benehmen scheint hervorzugehen, dass sie einen Druck auf der Brust spüren. Sodann tritt der Anfall des heftigen Hustens ein, wobei die Kinder um sich greifen, sich zu halten suchen und den Oberleib vorwärts beugen. Die Exspirationen geschehen stossweise, folgen äusserst schnell auf einander und sind ganz kurz, so dass zwischen ihnen keine Luft in die Lungenbläschen aufgenommen zu werden scheint, das Gesicht der Kinder wird dabei roth und bläulich, die Venen am Kopfe schwellen an und es tritt selbst manchmal Blut unter die Conjunctiva der Augen aus oder es fliesst Blut aus Mund und Nase; der Puls wird dabei unterdrückt, Hände und Füsse kalt, junge Kinder lassen gewöhnlich den Urin gehen, oft geht selbst der Husten in einen anhaltenden Lungenkrampf über, wobei Husten und Athem fehlt, welcher höchst ängstliche Zustand oft eine geraume Zeit andauert. Auf ein solches heftiges Husten folgt eine Bemühung des Einathmens, es scheint jedoch dabei ein Hinderniss im Larynx statt zu finden,

wodurch ein eigener, hoher, von Manchen dem Eselsgeschrei verglichener Ton hervorgebracht wird und die Luft verhindert wird, bis in die Luftzellchen in dem Umfange der Lunge einzudringen, was durch den in diesem Augenblick statt findenden gänzlichen Mangel des Respirationsgeräusches erkannt wird. Nach diesem unvollkommenen Einziehen der Luft in die Lunge stellt sich das heftige Husten von neuem ein, und so wechseln der Husten und die unvollkommenen Athmungsversuche mehrmals bis nach einer halben, einer ganzen oder mehrern Minuten der Anfall sich gewöhnlich unter Auswurf eines zähen Schleimes und oft auch unter Erbrechen endiget. Oft verbinden sich mit den Anfällen Zuckungen und Verdrehungen der Glieder.

§. 1956.

Solche Anfälle kehren oft nur einigemal am Tage zurück, kommen etwas häufiger in der Nacht, als am Tage vor, wiederholen sich aber oft auch jede halbe Stunde und werden insbesondere durch den Zorn der Kinder, aber auch durch starke Bewegungen des Körpers, durch den Genuss von Speisen und auch ohne alle äussere Ursachen hervorgebracht.

§. 1957.

Das Befinden der Kranken in der Zeit zwischen den Anfällen ist verschieden; bei manchen bemerkt man kein Unwohlsein, ihr Athem geht sehr leicht, hebt man das Ohr an die Brust der Kinder, so vernimmt man ein vollkommenes reines Respirationsgeräusch, das in der Regel nur kurze Zeit vor einem Anfalle etwas Schnarchen und Schleimrasseln zeigt, die Kinder haben keine Hize, ihr Puls ist ruhig, sie haben Appetit, sie sind munter und gehen den Spielen nach, meistens bemerkt man zwischen hindurch einen leichten catarrhalischen Husten. Andere Kinder sind auch zwischen den Anfällen mehr oder weniger bedeutend krank, sie haben ihre Munter-

keit verloren und suchen den Schooss der Mutter oder liegen schwerer krank in dem Bette; ihr Auge ist trübe, sie haben Hize in den Waugen, einen häufigen und schnellen Puls, und in den stärkern Fällen eine schnelle und kurze Respiration. Legt man das Ohr an die Brust der Kranken oder untersucht man mit dem Stethoscop, so hört man einen schnellen, starken, über die ganze Brust verbreiteten Herzschlag, das Respirationsgeräuch ist mit Pfeifen, Schnarchen und Schleimrasseln verbunden, und in manchen Fällen hört man in irgend einem Theile der Lunge das knisternde Geräusch. — Oft ist im Anfange des Keuchhustens der zuerst beschriebene Zustand vorhanden und das bedeutendere und andauernde Lungenleiden entwickelt sich erst allmälig, oft aber fängt die Krankheit sogleich mit Hitze und den stärkern so eben beschriebenen Brustaffectionen an; diese aber steigert sich entweder auf einen hohen und Gefahr drohenden Grad oder verschwindet mit Hilfe der Kunst oder von selbst allmälig und hinterlässt sodann den einfachen Keuchhusten.

§. 1958.

Nachdem die Krankheit die grösste Höhe erreicht hat, nimmt sie allmälig und ohne offenbare Krisen wieder ab und geht sodann in einen einfachen Husten, den Nachhusten, über. War die Schleimhaut der Lunge stärker ergriffen oder selbst das Parenchym der Lunge entzündet, so tritt die Besserung nicht leicht ein, ohne dass Krisen, insbesondere Schweisse, sich einstellen. Oefters wird der Auswurf vollkommen eiterförmig, doch verliert er oft nach einiger Zeit dieses Aussehen und die Lunge erhält die gesunde Beschaffenheit wieder.

§. 1959.

Die Dauer der ganzen Krankheit ist nicht leicht kürzer, als acht Wochen, oft beträgt sie auch das doppelte und eine noch längere Zeit. Manchmal stellt sich, wenn

die Krankheit schon in dem Stadium des Nachhustens begriffen ist, besonders nach Verkältung, aber auch ohne alle erkennbare Ursache ein neuer heftiger Husten ein, welcher zuweilen mit einem bedeutenden und andauernden Leiden der Lunge verknüpft ist, oft aber auch in wenigen Tagen gefahrlos vorübergeht.

§. 1960.

Der Tod wird durch diese Krankheit vorzüglich auf zweierlei Wege herbeigeführt. *a)* Manchmal brechen während heftiger Anfälle des Krampfhustens tödtlich werdende Gichter aus, wovon zum Theil die Ursache in der durch den gehemmten Athem bedingten Blutüberfüllung im Gehirne liegen mag; doch scheinen mir auch diese Zuckungen ohne Theilnahme des Gehirns durch starkes Ergriffensein des Nervensystems entstehen zu können; auch habe ich beobachtet, dass der Husten ausblieb und, ohne dass Narcotica gebraucht worden waren oder eine andere Veranlassung statt fand, tödtliche Gichter sich einstellten. *b)* Durch Luftröhrenentzündung oder Blutüberfüllung und wirkliche Entzündung der Lunge, durch welche die Kranken entweder noch während des Verlaufs des Keuchhustens oder längst nach Beendigung desselben durch Auszehrung hinweggerafft werden, wobei auch manchmal bei scrophulösen Kindern zugleich Tuberkeln in der Lunge sich bilden. Seltener stirbt ein Kind während des Anfalls durch wirkliche Erstickung oder durch Schlagfluss oder einen Blutsturz. Ueber die übrigen Ursachen des Todes, die denselben erst späterhin herbeiführen, vergleiche den Paragraphen über die Nachkrankheiten des Keuchhustens.

§. 1961.

Der Keuchhusten hinterlässt oft langwierige Lungenbeschwerden, Aneuvrysmen des Herzens und der Aorta, Kröpfe, Gehirnaffectionen, Schwäche des Gedächtnisses und des Verstandes, Epilepsie, Brüche und Vorfälle.

§. 1962.

Bei mehrern Leichenöffnungen habe ich, in Uebereinstimmung mit den Beobachtungen Anderer, die Schleimhaut der Lunge, der Luftröhre und des Kehlkopfes theilweise entzündet gefunden, das Gewebe der Lunge mit Blut überfüllt und hepatisirt, pleuritisches Extravasat in der Brusthöhle, das Brustfell mit einer falschen Membran, wie nach der Pleuritis, überzogen und in einem Falle den Theil desselben, welcher die Brustwandung umzieht, auf seiner rauhen Seite mit einzeln stehenden, fast das Bild eines Ausschlags darstellenden Eiterpunkten besäet, wobei die kleinen Ansammlungen von Eiter in Kapseln eingeschlossen waren, welche denen in erweichten Tuberkeln ähnlich waren. *Autenrieth* fand in einem Falle weder in den Lungen, noch am Herzen und dem Brustfelle eine Spur von Entzündung, dagegen die herumschweifenden Nerven, so wie auch die grossen sympathischen Nerven mit ihren Ganglien innerhalb der Brusthöhle entzündet. *Holzhausen* und *Clarus* fanden bei einem am Keuchhusten gestorbenen Knaben die Zwerchfellsnerven lockerer und nach unten zu etwas angeschwollen, die Stämme der Nervi vagi ebenfalls dicker, lockerer und breiter, als im natürlichen Zustande, den Sympathicus magnus und die von ihm entspringenden Splanchnici, besonders leztere von festerer Consistenz als sonst, und den Plexus coeliacus fester als gewöhnlich und etwas aufgetrieben.

§. 1963.

Ursachen. Es haben zum Keuchhusten vorzüglich Individuen vom kindlichen Alter Anlage, bei Erwachsenen kommt jedoch die Krankheit in höchst seltenen Fällen ebenfalls vor und man bemerkt auch zuweilen, dass einzelne Erwachsene von einem starken Husten befallen werden, wenn der Keuchhusten unter den Kindern herrscht. Die Anlage wird in der Regel durch die Krankheit selbst getilgt.

Der Keuchhusten herrscht immer als Epidemie, die Ursache davon ist jedoch nicht genügend bekannt; *Wendt* hält dieselbe für ein Miasma, das mit dem, wodurch die Masern veranlasst werden, nahe verwandt ist, indem Masern- und Keuchhusten-Epidemien oft mit einander abwechseln. Ueber die Ansteckungsfähigkeit des Keuchhustens wird noch fortwährend gestritten, für dieselbe erklären sich *Rosenstein*, *Cullen*, *Schäffer*, *Autenrieth*, *Jahn*, *Henke* u. a., gegen dieselbe *Stoll*, *Danz*, *Sprengel*, *Wendt* u. a., und es werden für beide Meinungen gewichtige Gründe angeführt. Dafür: dass die Krankheit, ähnlich den contagiösen Fiebern, eine gewisse nothwendige Dauer habe, dass sie dasselbe Subject nur einmal befalle, dass gewöhnlich mehrere Kinder in einer Familie von dem Keuchhusten befallen werden, wenn er einmal eines ergriffen hat; Gründe dagegen: die Krankheit zeige grosse Verschiedenheiten von den contagiösen Krankheiten, insbesondere bemerke man nicht, wie bei jenen, Blüthen oder Semina in Hautausschlägen und Geschwüren, wodurch sich die Krankheit fortpflanze, sie sei eine reine Nervenkrankheit und diese sei nie ansteckend, das gleichzeitige Befallenwerden mehrerer Kinder in einer Familie lasse sich auch durch ein Miasma erklären. — Mir scheint, nach vielfältigen Beobachtungen, die Krankheit Ansteckungsfähigkeit zu besizen. Zwar kann ich eine solche einer reinen Nervenkrankheit nicht zuschreiben, doch lässt sich denken, dass, wie in der Hundswuth, ausser den Nervenzufällen andere Krankheitsvorgänge statt finden, an denen das Blut einen unmittelbaren Theil nimmt und welche wahrscheinlich in den Capillargefässen des Kehlkopfes, der Luftröhre und der Luftröhrenäste ihren vorzüglichen Siz haben. Vielleicht werden die Nerven der Lunge nur secundär, durch die specifische Reizung der Schleimhaut der Lunge ergriffen.

§. 1964.

Wesen. Bei dem Keuchhusten ist stets die Schleimhaut der Bronchien in geringerm oder in stärkerm Grade ergriffen, indem auch in den leichtesten Fällen der Krankheit doch wenigstens eine veränderte Secretion wahrgenommen wird, oft spricht sich eine wirkliche Bronchitis durch die deutlichsten Zeichen aus, und manchmal ist selbst Pneumonie vorhanden, die Leichenöffnungen zeigen auch die Schleimhaut der Bronchien geröthet und öfters auch die Lungensubstanz entzündet. Diese Umstände sprechen für die Ansicht *Whatts*, *Marcus* und Anderer, welche den Keuchhusten für eine Bronchitis erklären. — Dieser Ansicht steht die von *Hufeland*, *Jahn* und Andern, dass die Krankheit eine Nervenaffection, namentlich des nervus vagus mit den von ihm und dem sympathischen Nerven gebildeten Lungengeflechten und des Nervus phrenicus sei, gegenüber. Diese Ansicht scheint auch wenigstens darin die richtigere zu sein, dass der Keuchhusten nicht blos eine einfache Bronchitis oder blos ein katarrhalisches Leiden der Lungenschleimhaut sei, sondern immer zugleich in einem heftigen und wie es scheint eigenthümlichen Nervenleiden bestehe, denn die Bronchitis und die Pneumonie der Kinder sind nur dann, wenn sie in einer Epidemie des Keuchhustens vorkommen, von den Symptomen des Keuchhustens begleitet, bieten aber, wenn sie sporadisch erscheinen, ein von dieser Krankheit sehr verschiedenes Krankheitsbild dar, und bei dem Keuchhusten sind auf der andern Seite häufig die der Bronchitis eigenen Zufälle nicht deutlich ausgesprochen, dagegen deuten die wesentlichen Erscheinungen der Krankheit, der convulsivische Husten, der krampfhafte Zustand bei den Inspirationen, der öfters vorkommende Lungenkrampf und die manchmal vor oder statt der Anfälle des Hustens

sich einstellenden allgemeinen Krämpfe unverkennbar auf ein Nervenleiden hin.

Hufeland sucht das Wesen des Keuchhustens auf folgende Weise zu erklären: Der Keuchhusten entsteht durch einen eigenthümlichen Nervenreiz, der vorzüglich in dem herumschweifenden und Zwerchfellsnerven, so wie in den von dem erstern und den sympathischen Nerven gebildeten Lungen- und Magengeflechten stattfindet. Dieser Reiz bringt zunächst das stossweise erfolgende convulsivische Husten hervor. Die gestörte Wirkung des Zwerchfellsnerven zeigt sich insbesondere durch eine das pfeifende Einathmen hervorbringende Zusammenschnürung der Stimmrize, welche von diesen Nerven mit mehrern Zweigen versehen wird. Der regelmässige Antagonismus zwischen den Bewegungen des Ein- und Ausathmens, oder vielmehr zwischen der Wirkung des herumschweifenden und des Zwerchfellsnervens wird aufgehoben; diese Nerven bringen krampfhafte und unordentliche Bewegungen in den Lungen, wie in dem Zwerchfelle, hervor, und ist diese unregelmässige Thätigkeit auf's Höchste gestiegen, so wird sich die krampferregende Wirkung des herumschweifenden Nervens auch bis auf den Magen erstrecken, und in diesem eine Zusammenziehung und Erbrechen erregen, mit welchem der Reiz von den Lungen abgeleitet und der Anfall beendiget wird. Das Erbrechen ist daher als eine dem Lungenkrampf entgegengesezte Convulsion zu betrachten, es erfolgt aber erst dann, wenn der Krampf einen höhern Grad erreicht und die abnorme Thätigkeit der Lungennerven auch das Magengeflecht in Mitleidenschaft zieht, oder vielmehr sich auf dasselbe fortpflanzt.

Durch diese Annahmen sind die meisten Zufälle des Keuchhustens erklärt, doch ist nicht angegeben, worin der Reiz bestehe, der auf die Nerven wirkt, und es sind noch zwei Erscheinungen da, welche durch eine

einfache Nervenreizung nicht erklärt werden können. Es ist dieses die Dauer der Krankheit, welche nicht wie die der andern Krampfkrankheiten oder die der schmerzhaften Krankheiten von Zufälligkeiten abhängt, sondern ähnlich den contagiösen Fiebern durch einen innern Vorgang, welcher niemals unter einer gewissen Zeit vollendet wird, bedingt zu sein scheint, und die Ansteckungsfähigkeit des Keuchhustens. Es ist die Erklärung dieser Erscheinungen um so schwieriger, als die Hauptzufälle des Keuchhustens nicht wie die Prozesse in den contagiösen Fiebern zwischen Nerven und Blut, sondern lediglich in dem Nervensysteme statt finden; es lässt sich aber wohl annehmen, dass der krankhafte Prozess, welcher zu seiner Beendigung eine bestimmte Dauer erfordert und wodurch ein Contagium sich entwickelt, in den Capillargefässen der Lunge vorgehe, und die Affectionen, welche von den Nervenstämmen ausgehen, nur Begleiter jener Krankheit seien. — *Autenrieth* glaubt, dem Keuchhusten liege ein materielles Substrat, eine pathische Schärfe zum Grunde, *Harless* hält denselben für eine exanthematische Infection der innern Membran der Bronchialäste und ihrer Nerven.[1])

§. 1965.

Die Vorhersage hängt vorzüglich ab von dem Zustand der Lunge in der Zeit zwischen den Hustenanfällen, ferner von der Heftigkeit der Anfälle, von dem Vorhandensein oder dem Mangel allgemeiner Zuckungen, von dem Alter des Kindes, indem die Krankheit bei ganz jungen Kindern gefährlicher ist, als bei solchen von mehrern Jahren, von der Constitution des Kranken, indem die Krankheit bei den Kindern, welche sehr schwächlich sind und an Scropheln, Rhachitis oder

1) System I. 107.

Atrophie leiden, am leichtesten tödtlich wird, und von dem Character der Epidemie.

§. 1966.

Behandlung des Keuchhustens. Da es nach meinen bisherigen Erfahrungen keine Behandlungsweise gibt, wodurch der Keuchhusten in seinem Verlaufe unterbrochen und beseitigt werden kann, und da in den gewöhnlichen Fällen die Natur die Krankheit von selbst heilt, so beschränke ich die Behandlung darauf, die Zufälle zu beseitigen oder zu mässigen, durch welche der Tod herbeigeführt werden kann.

In den ganz leichtern Fällen ist es genügend, die kranken Kinder warm zu kleiden, insbesondere Brust und Füsse, und sie vor einer rauhen Luft zu schüzen; auch ist es gut, ihnen leichte, besänftigende und den Schleim lösende Dinge zu geben, warmes Zuckerwasser, insbesondere mit Kandiszucker, eine Abkochung von Eibischwurzel mit Süssholz, einen Thee von den Species ad Infusum pectorale Ph. B., Brustsäftchen von Syrupus Althaeae, Liquiritiae, Capillorum Veneris, Gerstenzucker, Süssholzsaft, bei etwas stärkerm Krampfhusten die Trochisci Ipecacuanhae oder auch ein Infusum Ipecacuanhae 4 — 6 Grane auf 2 Unzen Wasser und 1 Unze Syrup, Kaffelöffelvollweise zu nehmen. Zugleich können Einreibungen von erwärmtem Schmalz in die Brust, das Tragen von Opiatpflaster mit Kampher auf der Brust und andere äusserliche besänftigende Mittel zu Hilfe gezogen werden. Dabei kann man auch leichte Ableitungsmittel, insbesondere Fussbäder, anwenden, wozu *Wendt* den Zusaz des 7ten Theiles scharfen Essigs empfiehlt, allgemeine Bäder etc.

Die Behandlung der schwerern Fälle von Keuchhusten besteht vorzugsweise:

a) In der Mässigung der heftigen krampfhaften Nervenaffection. Es ist hier, nach meinen Erfahrungen,

das Opium das vorzüglichste Mittel, welches nicht allein den Husten sehr mässigt, sondern die allgemeinen Zuckungen aufzuheben und zu verhüten vermag, wenn sie nämlich nicht von einem Gehirnleiden, dem in seltenen Fällen hinzukommenden Hydrocephalus acutus, entspringen. Ich gebe das Opium auch den jüngsten Kindern und zwar dieses mit der Vorsicht, dass ich ihnen das Mixtürchen selbst bereite, indem ich einen Tropfen Tinctura thebaica mit 6 oder 4 Kaffeelöffel voll Zuckerwasser verdünne und von diesem zuerst einen, und wenn keine Wirkung sichtbar wird, zwei Kaffelöffel voll gebe. Oft ist eine solche Dosis zur Milderung der Zufälle hinreichend, wo sodann an demselben Tage keine weitere Gabe dieses Mittels gereicht wird, oft müssen mehrere solche Dosen in einem Tage gegeben werden, jedoch immer nur in Zwischenräumen von wenigstens zwei Stunden, und es muss die Darreichung des Opiums sogleich unterbrochen werden, wenn sich eine grosse Neigung zum Schlafe zeigt. Oft genügt es, nur an einem Tage, an welchem gerade heftigere Krampfzufälle eintreten, das Opium zu geben, oft ist es nothwendig, dasselbe eine längere Zeit fortzusezen, doch muss man Kindern unter drei Jahren nicht leicht mehr als 2 — 3 Tropfen an einem Tage reichen und dabei beständig den Leib durch Klystiere oder innerliche Mittel offen erhalten. Kindern über drei Jahren können etwas grössere Dosen gegeben werden. Bei dieser vorsichtigen Anwendungsart des Opiums habe ich oft die herrliche Wirkung dieses grossen Mittels gesehen und niemals ist ein Unglück durch dasselbe herbeigeführt worden.

b) Es sind in den schwerern Fällen die krankhaften Veränderungen, welche sich in der Schleimhaut oder dem Parenchym der Lunge oder dem Brustfell auszubilden anfangen, zu bekämpfen. Die Veränderungen beginnen meistens mit Entzündung, welche sowohl gleich

im Anfange des Keuchhustens vorhanden sein kann, als auch, nach meinen Erfahrungen in den häufigern Fällen, sich erst während des Verlaufes des Keuchhustens entwickelt. Man hat daher die Kranken täglich genau mit dem Ohr oder vermittelst des Stethoscops zu untersuchen und sobald man hierdurch, so wie durch die übrigen Zeichen, die Entzündung in einem der genannten Theile erkennt, die antiphlogistische Methode eintreten zu lassen. Man sezt Blutegel, gibt kühlende Salze, verdünnte Säuren, späterhin Salmiak, oder wendet den Tartarus emeticus an. Oft ist es nothwendig, mit der antiphlogistischen die krampfstillende Methode zu verbinden; man kann daher den Tartarus emeticus, in Verbindung mit Opium, geben. Ist die entzündliche Affection beseitiget, so sezt man mit diesen Mitteln wieder aus und behandelt die Krankheit wie den leichtern Grad des Keuchhustens.

In den Fällen, in welchen sich in dem Lungengewebe Veränderungen auszubilden drohen, jedoch nicht bei einer wirklich ausgebildeten Pneumonie, so wie auch in den Fällen von heftigem und hartnäckigem Krampfhusten, wende ich auch die stärkern Ableitungsmittel auf die Haut, nämlich die von *Autenrieth* empfohlene Brechweinsteinsalbe an, welche, nach der Pharmacopoea borussica, aus 1 Theile Brechweinstein und 2 Theilen Schweinefett besteht, aber hinreichend stark ist, wenn auf eine Unze Fett 2½ Drachmen Tartarus emeticus genommen werden. Die Salbe wird dreimal täglich in die Herzgrube eingerieben und damit fortgefahren, bis die entstehenden Pusteln sich in Geschwüre verwandeln. Gewöhnlich muss diese Behandlung 8 — 12 Tage fortgesezt werden, wobei man die Salbe immer an den weniger stark mit Pusteln besezten Stellen einreiben lässt. Heilen die Pusteln und Geschwüre nicht von selbst,

so lässt man dieselben mit einer Abkochung von Schierlingskraut bähen.

§. 1967.

Ausser den beiden angegebenen Verhältnissen, welche in der Behandlung des Keuchhustens vorzugsweise berücksichtiget werden müssen, hat man auch auf die Kräfte der Kranken Rücksicht zu nehmen. Liegt die Reaction des Körpers sehr darnieder, so ist es oft nothwendig, erregende Mittel anzuwenden, einen Aufguss der Senega, der Arnica, etwas Kampher, die versüssten Säuren oder auch die China. — Endlich müssen auch frühzeitig gegen die sich entwickelnden Nachkrankheiten des Keuchhustens die geeigneten Mittel angewandt werden, z. B. gegen das sich bildende pleuritische Extravasat und die allgemeine Wassersucht die Digitalis und andere gegen Hydrops wirksame Mittel.

§. 1968.

Unter den vielfachen, gegen den Keuchhusten als specifisch gerühmten Mitteln verdienen folgende erwähnt zu werden: Narcotische Mittel, wie die von *Schäffer*, *Jahn*, *Ettmüller*, *Wiedemann* und *Wetzler* empfohlene Belladonna; nach *Schäffer* 4—8 jährigen Kindern täglich 2—2½ Gran der Wurzel der Belladonna, bis Trockenheit im Halse und Verdunklung des Gesichtes erfolgt (ist gefährlich), nach *Henke* ½ — 1 Gran der Wurzel, mit ebensoviel Goldschwefel, nach *Wendt* aber nur $^1/_{48}$ Gran des Extractes einem Kinde unter 4 Jahren täglich 3—4 mal und $^1/_{96}$ Gran bei noch jüngern Kindern. — *Störk* und *Butter* empfehlen das Conium, — *Hufeland* Hyoscyamus, einem Kinde von 1 Jahre täglich 2 Grane des Extractes, — *Löbel* das Extract der Pulsatilla nigricans zu ⅛ — ½ Gran täglich dreimal, mit Zusaz von 2—4 Gr. Baldrianpulver, — *Hufeland* und *Thilesius* das Extractum Nicotianae, — *Memminger* die von *Stütz* gegen Tetanus empfohlene Methode. — Das

Opium ist vielfältig empfohlen worden, in Verbindung mit der Ipecacuanha, mit dem Tartarus emeticus und von *Henke* mit der China. — Ferner nicht narcotische, krampfstillende Mittel. Hieher gehören die Zinkblumen, die Asa foetida, die Ipecacuanha, von *Hufeland* empfohlen, der Spiritus Salis dulcis, nach *Werlhof* 1 Theil auf 8 Theile Syrup, alle zwei Stunden 1 Theelöffel voll (ist für ein sehr junges Kind wohl zu stark), der Moschus von *Home*, *Hufeland* u. a. empfohlen zu ½ bis einem ganzen Grane. — Ferner auflösende Mittel. — Nach *Horst* der Schwefel zu 4 — 10 Grane dreimal täglich. — Auf die Nieren ableitende Mittel, die von *Lettson* und *Armstrong* empfohlenen Canthariden. — *Thiel* hat die Salzsäure zu 2 — 3 Drachmen im Tage in Aqua und Syrupus Rubi Idaei, — *Rosenstein*, *Löbenstein*, *Löbel* u. a. haben die China gerühmt.

Unter den äusserlichen Mitteln müssen erwähnt werden: Senfteige, Blasenpflaster, Fontanelle, die Brechweinsteinsalbe, welche *Autenrieth* nach der oben angegebenen Methode ohne innerliche Mittel anwendet, Fussbäder, allgemeine Bäder, Einreibungen von Unguentum nervinum, Linimentum volatile, Cajeputöl und Räucherungen nach *Dohrn's* Empfehlung von Olibanum Unc. ij, Benzoe, Styr. calamita aa. Unc. ß, Lavendul, Rosae rubr. aa. Drachm. ij ß.

Das nervöse Herzklopfen.

(*Palpitatio cordis nervosa.*)

Die B. I. S. 466 angegebenen Schriftsteller über die Krankheiten des Herzens. — *Laennec* (de l'auscult. méd.).

§. 1969.

Das nervöse Herzklopfen sind die vermehrten und unordentlichen Herzbewegungen, welche anfallsweise sich einstellen und allein durch eine Affection des Nervensystems hervorgebracht sind.

§. 1970.

Es stellen sich bei dieser Krankheit meistens auf äussere Einflüsse, insbesondere Gemüthsbewegungen, mehr oder weniger heftige Anfälle von Herzklopfen, die in beschleunigtem Rhythmus, verstärktem Stoss und etwas vermehrtem Geräusch bestehen, ein, wobei aber der Umfang des Herzschlages nicht vermehrt ist, die Percussion einen guten Ton gibt und das Feilengeräusch und Kazenschnurren, welche bei organischen Fehlern des Herzens, z. B. Verknöcherung der Klappen, vorkommen, fehlen; doch gibt es auch einen krampfhaften Zustand des Herzens, in welchem diese Geräusche oder wenigstens das Blasbalggeräusch, wahrgenommen werden. Meistens ist bei dem nervösen Herzklopfen kein oder wenigstens kein so bedeutendes Gefühl von Beengung und Angst vorhanden, wie bei manchen organischen Herzfehlern, bei welchen mehr oder weniger der Blutlauf gehemmt ist. In der Zeit zwischen den Anfällen ist der Herzschlag ganz normal, wodurch ebenfalls das nervöse Herzklopfen sich von den organischen Herzfehlern unterscheidet, wiewohl bei dem oben erwähnten krampfhaften Zustand des Herzens, der mit dem Blasbalggeräusch und zuweilen mit dem Kazenschnurren

verbunden ist, manchmal die erwähnten Geräusche mehr anhaltend vorkommen sollen, wobei aber doch wohl meistens sich ein organischer Fehler, namentlich Erweiterung der Ventrikel, zu entwickeln beginnen möchte. — Oft dauert die Krankheit viele Jahre und hat bei so langer Dauer zuweilen Aneuvrysmen und Hypertrophie des Herzens zur Folge.

§. 1971.

Anlage haben sehr reizbare, nervenschwache Personen, insbesondere Hysterische und Hypochondristen und solche, bei welchen das Nervensystem durch Onanie geschwächt ist. Gelegenheitsursachen sind vorzüglich Gemüthsbewegungen, insbesondere Schrecken.

§. 1972.

Vorhersage. Der Anfall verschwindet, nach vorübergegangener äusserer Ursache, schnell wieder und wird nur in höchst seltenen Fällen, z. B. bei sehr heftigem Schrecken, tödtlich. Auch die besondere Anlage zu diesem Leiden verliert sich meistens mit dem Eintritt des geseztern Alters wieder. Eine lange Dauer der Krankheit kann, wie schon bemerkt wurde, organische Fehler des Herzens veranlassen.

§. 1973.

Behandlung. Was die Entfernung der Ursachen betrifft, so ist die psychische Behandlung des Kranken von Wichtigkeit. Bei entkräfteten und nervenschwachen Personen müssen oft China und Eisen in Gebrauch gezogen werden. — Zur Beruhigung der abnormen Herzthätigkeit dienen lauwarme Bäder, Fussbäder, die Digitalis, Blausäure, auch Salpeter, verdünnte Mineralsäuren etc. Ist mehr andauernd eine abnorme Herzthätigkeit zu bemerken, namentlich durch das Blasbalggeräusch, so hat man die Krankheit wie ein beginnendes Anevrysma und Hypertrophie des Herzens zu behandeln.

Der Schluchzen.

(*Singultus.*)

Brüning (lat. Traject. 1758).

§. 1974.

Der Schluchzen ist ein unwillkürliches, schnelles und kurzes, mit einem schallenden Geräusch in dem Kehlkopfe verbundenes Einathmen, welches in Zwischenräumen von wenigen Secunden wiederkehrt, oft nur einige Augenblicke, oft aber auch Tage und Wochen hindurch fortdauert und für sich nicht leicht gefährlich wird, doch hat es, wenn es sehr lange dauert, zuweilen Ohnmachten und Erbrechen zur Folge, und kommt oft in Begleitung von schweren Krankheiten vor.

§. 1975.

Ursachen: Schnelles Schlucken von kaltem Getränke, von einem grossen Bissen, Verkältung, gastrische Stoffe, grosse Aufblähung des Unterleibes bei der Tympanitis, in bösartigen Fiebern etc., ein hoher Grad von Bauchwassersucht, Entzündung und Brand des Zwerchfelles, des Magens oder der Gedärme, Eindruck des schwertförmigen Knorpels, Bruch einer Rippe, Kopfverlezungen, Verlezungen des Rückenmarkes etc.

§. 1976.

Für das Wesen des Schluchzens sieht man eine schnelle, krampfhafte Zusammenziehung des Zwerchfells mit krampfhafter Verengerung der Stimmrize an.

§. 1977.

Behandlung. Nebst der Beseitigung der Ursachen dienen in den gewöhnlichen leichtern Fällen das An-

halten des Athems, Ablenken der Aufmerksamkeit, die Erregung einer plözlichen Gemüthsbewegung, z. B. durch leichtes Erschrecken, das feste Anlegen einer Binde um die Brust; in den schwerern Fällen Einreibungen von Opiatsalben und andern besänftigenden Mitteln, warme Bäder, Klystiere, Senfteige, Blasenpflaster und der innerliche Gebrauch krampfstillender Mittel, insbesondere des Opiums.

Das Erbrechen.

(*Vomitus.*)

Wichmann (Ideen zur Diagnost.). — *Magendie* (a. d. Franz. v. Dittmar. Bremen 1814).

§. 1978.

Das **Erbrechen** ist die unwillkürliche, unter Begleitung von Uebelsein und mit Heftigkeit erfolgende Entleerung der im Magen befindlichen Stoffe durch den Schlund, den Mund und die Nase.

§. 1979.

Meistens geht dem Erbrechen die Empfindung von Uebelkeit vorher, der Kranke muss viel ausspeien, die Lippen und die Haut an dem Kinne zittern beim Sprechen, das Gesicht wird blass, der Kranke fühlt sich sehr schwach, endlich kommen Anstrengungen zum Erbrechen (Vomituritiones) und oft auch Würgen hinzu, und es werden nun, oft aber auch ohne dass die zulezt genannten Vorläufer sich eingestellt haben, die im Magen enthaltenen Stoffe oft in grossem Strahl durch den Mund und zum Theil durch die Nase ausgestossen.

Zuerst werden gewöhnlich die Speisen ausgeleert, bei wiederholtem Erbrechen aber nur etwas Magensaft und Galle und zuweilen selbst etwas Blut. Der Kranke ist dabei sehr angegriffen, entweder roth von der Anstrengung oder blass und mit kaltem Schweisse bedeckt, er fühlt sich äusserst schwach und zittert selbst mit den Gliedern.

Nach dem Erbrechen fühlt sich der Kranke erleichtert, und meistens geht das Erbrechen schon nach dem ersten oder nach einigen Anfällen vorüber, besonders wenn durch dasselbe selbst die Ursache der Krankheit (fehlerhafte Stoffe im Magen) entfernt wird, bei sehr heftigen Anstrengungen und bei sehr häufigen Wiederholungen hat das Erbrechen aber auch zuweilen Congestionen und Blutungen, Abortus, Bruch, Vorfall der Gebärmutter und Erschöpfung der Kräfte zur Folge.

§. 1980.

Ursachen des Erbrechens sind zum Theil Stoffe im Magen, welche denselben zur antiperistaltischen Bewegung reizen, wie Ueberladung mit Speisen und Getränken (Vomitus heluonum, Vom. a crapula), Stoffe, gegen welche eine Idiosynkrasie vorhanden ist, Gifte, Brechmittel, Galle, eine grosse Menge sauren Magensaftes etc., zum Theil rein erhöhte Sensibilität (Vomitus nervosus), oft Entzündung des Magens oder Geschwüre oder Verhärtungen in demselben, so wie auch Druck auf den Magen durch Geschwulst und Verhärtung der Leber, die durch die Schwangerschaft ausgedehnte Gebärmutter etc., ferner auf den Magen fortgepflanzte antiperistaltische Bewegung wegen Verstopfung, Volvulus oder Umschlingung der Gedärme, einen eingeklemmten Bruch etc., consensuelle Erregung des Magens bei Gehirnentzündung, Kopfverlezungen, dem Schwindel, im Anfange der Schwangerschaft etc., so wie auch allgemeine Affectionen des Nervensystems, wie z. B. bei der

unordentlichen Bewegung und der Erschütterung des Körpers bei dem Fahren im Wagen und auf dem Meere.*)

§. 1981.

Vorhersage. Das Erbrechen wird selten für sich tödtlich, begleitet aber häufig sehr gefährliche Krankheiten.

§. 1982.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Ist das Erbrechen durch Stoffe im Magen hervorgebracht, so darf man es, so lange noch solche entleert werden, nicht stillen, und muss es selbst zuweilen, wenn die Natur dasselbe nicht gehörig zu Stande bringt, befördern, so wie man auch die Stoffe, die oft nicht gänzlich entleert werden können, einzuhüllen und zu neutralisiren sucht.**) Es dürfen nur die Speisen genossen werden, die der Magen verträgt. Oft ist es nothwendig, Oeffnung zu bewirken oder einen eingeklemmten Bruch zu operiren. Bei dem Fahren auf dem Meere ist es zuträglich, andauernd eine Rückenlage auf einem feststehenden Ruhebette, besonders auf dem Verdecke beizubehalten etc.

*) Die Seekrankheit (Vomitus marinus) ist eigentlich nur ein Erbrechen, welches oft sehr heftig ist, meistens aufhört, so wie das Schiff verlassen wird oder die Bewegung der Wellen ruhiger wird, so wie auch meistens bei der Gewöhnung an das Seefahren, daher in der Regel nach wenigen Tagen, wiewohl es auch längere Seefahrten hindurch mit einzelnen Unterbrechungen fortdauern kann. — Schriftsteller sind: *Ludwig* (Diss. Lpz. 1758). — *Autenrieth* (Hufeland's Journal. B. 2.) — *Miller* (Albers amerik. Annal. Th. 1.). — *Wollaston* (Gilbert's Annal. d. Physik. 1812). — *Larrey* (Mem. de Chirurgie milit., übersezt v. Engelmann. Leipz. 1813). — *Keraudren* (Hufeland's Journ. 1814).

**) Vergl. das Kapitel über die Vergiftungen.

§. 1983.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um die krampfhafte, antiperistaltische Bewegung zu hemmen, werden mit Vortheil gebraucht: das Opium, der *Riveri*'sche Trank (Nro. 61) oder das Brausepulver (Nro. 62), so wie ein durch Zucker zu starkem Musiren gebrachtes kohlensaures Wasser und der Champagner, die versüssten Säuren, namentlich die *Hoffmänn*'schen Tropfen, die Naphthen, insbesondere die Essignaphthe, Chamillen, Melissen, Pfeffermünze, Zimmt in Theeform oder der Form von Oelzuckern, etwas warmer Wein, so wie auch frisch gemolkene Milch, kaltes Wasser und äusserliche Mittel, ein erwärmter Deckel, das Emplastrum opiatum oder Empl. aromaticum mit Kampher auf die Magengegend gelegt, desgleichen ein in Kirschenwasser getauchtes dickes Papier, aromatische und weinigte Umschläge, Einreibungen von aromatischen Geistern, mit Oleum Caryophyllorum oder Ammonium causticum oder von dem flüchtigen Linimente, der Opiumtinktur etc. in die Magengegend, und auch Senfteige oder Blasenpflaster auf dieselbe gelegt, aromatische und krampfstillende Klystiere etc. — Um das Erbrechen zu verhüten, z. B. bei dem Fahren im Wagen und auf dem Meere, ist es oft sehr zuträglich, durch erregende Getränke und Speisen die Verdauungskräfte in Anspruch zu nehmen, z. B. durch rothen Wein und etwas gesalzenes Fleisch (Schinken); auch dienen, besonders bei dem chronischen Erbrechen, zu demselben Zwecke die aromatisch-bittern Mittel.

Der Starrkrampf.

(*Tetanus.*)

Ackermann (lat. Goett. 1775, deutsch. Nürnb. 1778). — *Trnka de Krzowitz* (lat. Wien 1777). — *Stark* (lat. Jena 1781). — *Theden* (neue Bemerkungen und Erfahrungen. Berl. 1782). — *Bilguer* (Berl. 1791). — *Mursinna* (neue med. chirurg. Beobacht. Berl. 1796). — *Rusch* (Samml. auserles. Abhandl. B. 2.). — *Fournier de Pescay* (Par. 1803). — *Stütz* (Stuttg. 1804). — *Larrey* (Mém. de Chirurg. milit. vol. 1 u. 3.). — *Walther* (Abhandl. Thl. 1.). — *Bergamaschi* (Pavia 1820) .— *Beck* (Heidelb. klin. Annal. Bd. 1.). — *Pelletier* (Revue méd. 1827).

§. 1984.

Der **Starrkrampf** ist der Krampf in dem ganzen Körper oder in einzelnen Theilen, bei welchem die ergriffenen Theile steif und unbeweglich sind.

§. 1985.

Geht der Starrkrampf von einer Wunde aus, so empfindet der Kranke meistens zuerst ein schmerzhaftes Ziehen von der verwundeten Stelle aus nach dem Verlaufe der Nerven, wozu sich sodann eine Spannung im Nacken und die übrigen Erscheinungen des Starrkrampfes hinzugesellen.

Gewöhnlich geben sich die ersten Spuren des Starrkrampfes durch ein erschwertes Schlingen zu erkennen, wobei die Kiefer nicht gehörig von einander gebracht werden können und der Kranke mit dem Unterkiefer eine Art kauende Bewegung macht, ferner durch eine veränderte Stimme, eine bleibende Verziehung im Gesichte und ein spannendes Gefühl im Nacken, wobei oft ziehende Schmerzen im ganzen Körper vorhanden sind. Sodann wird die untere Kinnlade fest an die obere gepresst, so dass der Mund nicht geöffnet werden kann (Trismus),

wobei die Kaumuskeln oft gespannt und aufgeschwollen sind und schmerzen, der Mund ist zusammengezogen und geschlossen, die Pupille meistens verengt und Lichtscheue vorhanden, die Augäpfel sind zuweilen verdreht. Oft wird der ganze Körper steif und grad ausgestreckt (Tetanus im engsten Sinne des Wortes), oft ist der Rumpf rückwärts gebogen, und zwar oft in der Art, dass der Kranke nur an den Absäzen und dem Kopfe aufliegt und der übrige Körper hohl liegt (Opisthotonus), in seltenen Fällen ist der Körper in einem Halbzirkel nach vorne gebogen (Emprosthotonus) oder seitwärts gekrümmt (Pleurosthotonus). Hiebei ist der Unterleib gewöhnlich hart und einwärts gezogen, der Stuhlgang und Harn zurückgehalten, die Wärme und der Puls sind oft unverändert, oft ist der Puls aber beschleunigt, zuweilen auch seltener als gewöhnlich und aussezend, das Athmen bleibt lange unverlezt, meistens wird es aber späterhin keuchend und es stellt sich von Zeit zu Zeit ein eigenthümlicher Krampf unter dem Brustbein ein, das Schlingen wird immer beschwerlicher und es ist zuweilen eine Scheu gegen Flüssigkeit, wie in der Hundswuth, vorhanden, das männliche Glied wird oft steif und es erfolgen Samenergiessungen, das Bewusstsein ist oft unverlezt, zuweilen unterdrückt, oft stellen sich anfallsweise heftigere Schmerzen und Convulsionen ein.

§. 1986.

Der Krampf dauert nicht mit gleicher Heftigkeit ununterbrochen fort, sondern lässt von Zeit zu Zeit, wiewohl meistens nur sehr wenig, nach, so dass die Zähne so weit von einander gebracht werden können, um dem Kranken die Arzneien und etwas Speise beizubringen. — Der Uebergang in Genesung erfolgt durch allmäligen Nachlass des Krampfes, oft unter Eintritt eines allgemeinen Schweisses und eines ruhigen Schlafes,

manchmal, nachdem vorher der tonische Krampf in allgemeine Zuckungen übergegangen ist. — Zum Tode führt die Krankheit durch Erschöpfung der Kräfte und nachdem sich der Krampf auf das Herz oder die Lunge geworfen hat oder durch Schlagfluss, meistens nach Verlauf von etwa 4 Tagen, zuweilen auch schon nach 24 Stunden. — In seltenen Fällen dauert die Krankheit mehrere Wochen.

§. 1987.

Bei Leichenöffnungen findet man zuweilen Blutüberfüllung, Extravasate und Entzündung im Gehirne, Blutüberfüllung in den Häuten des Rückenmarkes, seröse Ausschwizung im Kanal der Wirbelsäule, Knochenfrass der Wirbel und die Nerven in der Gegend der Verwundung und an ihrem Ursprung aus dem Rückenmark entzündet.

§. 1988.

Eine besondere Anlage zum Starrkrampfe, in der Form des Kinbackenkrampfes, bemerkt man bei neugebornen Kindern (Trismus neonatorum). Zum Wundstarrkrampfe sind vorzüglich junge, kräftige Individuen geneigt.

Gelegenheitsursachen sind: Verwundungen (Tetanus traumaticus), insbesondere Quetschwunden und vorzüglich solche, in welchen sehnigte Theile oder Nerven verlezt sind oder fremde Körper die Weichtheile reizen, wie z. B. bei complicirten Knochenbrüchen, und auch vorzüglich Wunden der Finger, der Zehen, des Saamenstranges, des Halses, des Gesichtes, und zur Zeit der Eiterung, insbesondere wenn die Wunde hiebei eine schlechte Beschaffenheit erhält, wiewohl auch der Wundstarrkrampf noch bei schon erfolgter Vernarbung eintreten kann; zugleich eine mit der Verwundung einwirkende hohe Temperatur der Atmosphäre (die Tropenländer), schneller Wechsel der Temperatur, eine

feuchte Luft, verdorbene Luft in den Hospitälern, Gemüthsbewegungen etc.; ferner Vergiftungen, Metastasen auf das Gehirn und Rückenmark, Entzündung und andere Krankheiten dieser Organe, heftige Schmerzen, heftige Gemüthsbewegungen, Hysterie etc. Der Kinnbackenkrampf der Kinder insbesondere wird oft veranlasst durch hizige Gehirnhöhlenwassersucht, Entzündung irgend eines Organes, gastrische Reize, z. B. Säure und zurückgehaltenes Kindspech, fehlerhafte Behandlung des Nabelstranges, Verkältung, verdorbene Luft in der Kinderstube, Gemüthsbewegungen der Mutter während des Säugens etc.

§. 1989.

Das **Wesen** des Starrkrampfes ist ein tonischer Krampf in den betreffenden Muskeln. — Eine Entzündung der Nerven oder des Rückenmarkes kann immer nur, wie jede andere Reizung der Nerven, als entferntere Ursache des Krampfes angesehen werden und ist auch nicht immer vorhanden.

§. 1990.

Vorhersage. Der Wundstarrkrampf ist meistens tödtlich, höchst gefährlich auch der Kinnbackenkrampf der Kinder, von geringerer Bedeutung der bei der Hysterie vorkommende Starrkrampf.

§. 1991.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Bei dem Wundstarrkrampfe entfernt man fremde Körper aus der Wunde, durchschneidet halb zerrissene Sehnen und Nerven, erweitert bei stockendem Eiter die Wunde, lässt erweichende Umschläge machen etc. Von *Larrey* ist die Amputation des verwundeten Gliedes vorgeschlagen worden, doch möchte bei dem Beginne des Uebels diese Operation von dem Kranken nicht leicht zugegeben werden und bei vollständiger Entwicklung der Krankheit dieselbe nuzlos

sein; mehr scheint dagegen von dem Ausbrennen der Wunde erwartet werden zu dürfen. — Gegen entzündliche Affection des Gehirns oder des Rückenmarkes, gastrische Reize, die Hysterie etc. wendet man in dem einen Fall Blutentleerungen und Calomel (von *Walther* in Beziehung auf die antiphlogistische Kraft als das Hauptmittel empfohlen), nebst Einreibungen von der grauen Quecksilbersalbe, in dem andern Brech- und Abführungsmittel, in dem dritten Castoreum und Moschus an etc.

§. 1992.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Das vorzüglichste krampfstillende Mittel, das Opium, ist auch bei dem Starrkrampfe, namentlich dem Wundstarrkrampf, als das Hauptmittel anerkannt; doch darf es bei dem Kinnbackenkrampf der Neugebornen, wenn er von einem Gehirnleiden ausgeht, nicht in Anwendung gebracht werden. Bei dem Wundstarrkrampfe gibt man das Opium in grossen Gaben, wenigstens alle zwei Stunden einen Gran und selbst zu 5 oder 10 und mehr Granen, und, wenn es durch den Mund nicht beigebracht werden kann, in Klystieren. Hiermit verbindet man, nach *Stütz* Methode, das Kali carbonicum, abwechselnd mit dem Opium gegeben, und lässt zugleich Laugenbäder gebrauchen. — Ausserdem hat man empfohlen: Blausäure (*Klein*), Kampher, Moschus, Cantharidentinktur, Terpenthinöl, Arsenik etc., so wie Cauterien auf den Rücken, besonders den Nacken, angewandt, welches leztere Mittel sich schon öfters hilfreich erwiesen hat.

Dritte Gruppe

der ersten Ordnung der Nervenkrankheiten.

Vom Nervensystem ausgehende krankhafte Erregung der geistigen Thätigkeit.

Die Schlaflosigkeit.

(*Agrypnia, Pervigilium, Vigilium morbosum.*)

Cloquet (Paris 1808). — *Joerdens* (Hufel. Journ. 17ter Bd.). — *Ammon* (lat. Göttingen 1820). — *Heusinger* (lat. Eisenach 1820). — *Buchholz* (mit einer Vorrede von Hufeland. Berlin 1821). — *Waller* (Frankfurt 1824).

§. 1993.

Die **Schlaflosigkeit** erscheint häufig als Symptom anderer Krankheiten, oft aber kommt sie, ohne dass sonst ein Leiden wahrgenommen wird, vor, und besteht auch oft, ohne dass eine äussere Veranlassung aufgefunden werden kann. Oft wird der Schlaf nur einige Mal in der Nacht unterbrochen, wo sodann auch gewöhnlich derselbe nicht sehr fest ist und viele Träume sich einstellen, oft werden die ganze Nacht und oft mehrere Nächte hinter einander schlaflos zugebracht. Die Folgen sind: Eingenommenheit des Kopfes, vermindertes Vermögen zu geistigen Arbeiten, Schwindel, Neigung zum Schlagfluss und unter gewissen Verhältnissen zum Delirium tremens, allgemeine Schwäche, Verdauungsbeschwerden und Abmagerung des Körpers.

§. 1994.

Anlage: Das höhere Alter. **Gelegenheitsursachen:** Verschiedene Affectionen des Gehirns, insbesondere Gehirnentzündung, Entzündung anderer Organe, Fieber, Schmerzen, gastrische Reize, insbesondere reichlicher Genuss von Speisen und geistigen Getränken oder von Thee oder Kaffee unmittelbar vor dem Schlafengehen, Gemüthsaffecte und wirkliche Gemüths- und Geisteskrankheit, Aufregung des Geistes oder der Sinne unmittelbar vor dem Schlafengehen, übermässige Körperanstrengungen etc.

§. 1995.

Behandlung. Man entferne den Krankheitszustand, von dem die Schlaflosigkeit ein Symptom ist, und suche alle äussern schädlichen Einflüsse abzuhalten; insbesondere vermeide der Kranke des Abends anstrengende Geistesbeschäftigung, den Geist erregende Gesellschaft und das Gemüth reizende Gespräche und geniesse nur ein mässiges Abendessen. — Um das Nervensystem zum Schlafe zu stimmen, dient frühes Aufstehen und mässige Ermüdung durch Gehen, Fahren im Wagen, angemessene Beschäftigung und Bäder im Freien. Sind diese Mittel nicht anwendbar oder genügen sie nicht, so gibt man das Opium oder das Morphium aceticum. Das ebenfalls empfohlene Lactucarium, der Hyoscyamus, die Belladonna, der Moschus, der Kampher etc. gewähren wenig Nuzen.

Das Schlafwandeln.

(*Nachtwandeln, Somnambulismus Noctambulatio.*)

Richter (Diss. Goettingen 1756). — *Meyer* (Halle 1758). — *Pigatti* (aus d. Ital. Nürnberg 1782). — *Wienholt* (Lemgo 1805). — *Schlözer* (Wilna 1816).

§. 1996.

Das Schlafwandeln ist der Zustand eines Individuums, in welchem dasselbe im Schlafe Handlungen wie im Wachen begeht.

§. 1997.

Einige Stunden nach dem Eintritt des Schlafes erhebt sich der Schlafwandler im Bette, spricht, singt und benimmt sich, wie wenn er das eine oder das andere Geschäft verrichten würde (das unvollkommene Nachtwandeln), er steht auf, geht im Hemde umher, zieht sich an, und nimmt verschiedene andere Verrichtungen, wie im wachenden Zustande, vor. Meistens entsprechen die Handlungen des Nachtwandlers seinem gewöhnlichen Benehmen; zuweilen klettern die Kranken aber auf die Dächer und auf andere hohe Punkte, oft mit grosser Geschicklichkeit, was besonders zur Zeit des Mondscheins geschehen soll, und manchmal befinden sie sich in einem Zustande von Wuth (Somnambulismus furens). Bei diesen Unternehmungen hat der Kranke entweder die Augen geschlossen oder geöffnet, in welch leztern Falle aber dieselben sich nicht bewegen und die Pupille auch sich nicht beweglich zeigt. Nach einiger Zeit gehen die Kranken wieder in das Bett zurück und schlafen ruhig fort; am andern Tage wissen dieselben Nichts von dem, was sie in der Nacht gethan haben.

§. 1998.

Meistens verliert sich das Uebel mit dem Vorrücken des Alters wieder, zuweilen geht es aber in andere Nervenkrankheiten, namentlich in die Epilepsie über.

§. 1999.

Ursachen. Es kommt dieser Zufall vorzüglich bei jugendlichen Individuen, mehr bei Jünglingen, als Mädchen und solchen mit lebhafter Phantasie vor, oft wird er durch übertriebenes Studiren und lebhafte Eindrücke auf Geist und Gemüth, und auch nach Manchen durch den Samenreiz, den Missbrauch geistiger Getränke, narkotischer Stoffe etc. erregt und ist oft auch der Begleiter und die Folge von Gehirn- und Nervenkrankheiten, namentlich der Fallsucht; oft vermag man gar keine Ursache aufzufinden.

Ueber die nächste Ursache wird man so lange nichts mit Bestimmtheit anzugeben vermögen, bis man über den Zustand des Menschen im Schlafe nähere Auskunft erhalten hat.

§. 2000.

Behandlung. Kann eine Ursache aufgefunden werden, so suche man sie zu entfernen. — Man hat das Opium empfohlen, um einen festern Schlaf zu bewirken, auch Kampher und andere Mittel, um das erregte Nervensystem zu beruhigen. Oefters thaten Erweckung aus dem Schlafe, während des Anfalls, und Bestrafung gute Dienste, doch darf die Erweckung, wie es sich von selbst versteht, nicht vorgenommen werden, wenn der Nachtwandler sich gerade an einem gefährlichen Orte befindet; auch darf sie nicht allzuschnell und gewaltsam bewirkt werden.

Der Alp.

(Das Alpdrücken, die Trute, Incubus, Ephialtes, Pnigalion.)

Reil (Fieberlehre). — *Waller* (aus d. Engl. v. Wolf. Frankfurt 1820).

§. 2001.

Der Alp sind während des Schlafes sich einstellende Anfälle, welche in dem Gefühl von Erstickung, wobei oft das Gesicht des Kranken bläulich-roth wird, und zu gleicher Zeit in phantastischen Träumen besteht, in welchem sich der Kranke insbesondere häufig vorstellt, dass ein Ungeheuer auf seiner Brust size oder eine schwere Last auf ihm liege. Der Kranke sucht sich zu befreien, kann sich aber nicht bewegen, bis er endlich erwacht, wo sodann die Beengung und die Phantasiegebilde verschwinden.

§. 2002.

Es ist der Alp eigentlich keine besondere Krankheitsart, sondern besteht in Brustaffectionen verschiedener Art, namentlich Blutcongestionen nach den Lungen und verschiedenen Herzkrankheiten, bei welchen während des Schlafes Hemmungen in der Respiration und dem Blutlauf sich einstellen und wodurch die bezeichneten schreckhaften Träume erregt werden.

§. 2003.

Die **Behandlung** besteht in der Behandlung der vorhandenen Lungen- oder Herzaffection, und insbesondere in sorgfältiger Beseitigung alles dessen, was die Beengungs-Anfälle in der Nacht erregen könnte, wesshalb der Kranke am Abend nicht viel geniessen darf, die geistigen Getränke vermeiden muss, gehörige

Leibesöffnung bewirkt werden muss etc. Zeigt der Kranke im Schlafe Unruhe, was den beginnenden Anfall anzeigt, so muss man ihn aus demselben erwecken.

Der Säuferwahnsinn.

(*Delirium tremens potatorum.*)

Th. Sutton gab die erste, diese Krankheit von andern genauer scheidende Beschreibung (Lond. 1813, a. d. Engl. v. Heinecken, mit einer Vorrede v. Albers. Bremen 1820). — Ausserdem: *Rayer* (Paris 1819). — *Lind* (lat. Hannover 1821). — *Göden* (Berlin 1825). — *Möhl* (Gerson u. Julius Magaz. 1826). — *Barkhausen* (Brem. 1828). — *Léveillé* (Paris 1831).

§. 2004.

Der Säuferwahnsinn ist das bei Trinkern im nicht berauschten Zustande vorkommende Irrereden, das als selbstständige Krankheit auftritt und mit Schlaflosigkeit und starkem Zittern der Glieder, insbesondere der Hände, verbunden ist.

§. 2005.

Gewöhnlich zittern die Trinker schon lange vor dem Ausbruch der Krankheit stark mit den Händen und leiden oft an Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen etc. Es wird nun der Schlaf unruhig, im Einschlafen gehen dem Kranken viele verworrene Bilder vorüber und es bleibt zuletzt der Schlaf ganz aus oder es tritt vollkommene Schlaflosigkeit plözlich ein. Nunmehr verfällt der Kranke unter Zunahme des Zitterns der Hände in ein wunderbares Delirium. Er sieht die mannigfaltigsten Gegenstände, Kröten hüpfen auf seinem Bette, Eidechsen und Schlangen schlüpfen darauf hin, ein Geier droht auf ihn herabzustossen, ein Krokodill öffnet seinen Rachen, eiserne Stangen schiessen aus den Ecken des

Zimmers hervor, und er wehrt diese Gegenstände von sich ab, ein Leichenzug geht an dem Fenster vorüber, Männer mit glühenden Zangen wollen hereindringen, der Doctor hat weisse Flecken am Kleide und der Kranke ist bemüht, sie ihm abzuwischen, der Hirschwirth von N. geht vorüber und hat zwei Tannbäume auf dem Kopfe, Leute sprizen Wasser aus dem Fussboden herauf und der Kranke müht sich an, seine Kleider dagegen zu schüzen, stets sieht er mit scheuem Blick von einer Stelle zur andern, wo sich ihm stets die nämlichen oder immer neue Erscheinungen darstellen. Dabei erkennt der Kranke gewöhnlich seine Umgebungen und gibt meistens auf die an ihn gestellten Fragen, insofern ihn nicht in diesem Augenblick die Luftgebilde foppen, genügende Antwort. Der Puls, die Temperatur und die Absonderungen sind wenig verändert.

§. 2006.

Der Anfall dauert einige Tage, bis von selbst oder durch die Kunst erregt Schlaf eintritt, nach welchen gewöhnlich das Delirium beendigt ist; in den Tod geht sie nach acht Tagen und später über, indem sich ein comatöser Zustand und manchmal auch plözlich ein Schlag einstellt. Zuweilen wird die Krankheit chronisch, so zwar, dass das Delirium nur mit Unterbrechungen erscheint, z. B. bei einbrechender Dunkelheit.

§. 2007.

Bei den Leichenöffnungen findet man oft Blutüberfüllung, seröse Ausschwizungen und andere Zeichen von Entzündung im Gehirne, welche Veränderungen übrigens auch bei Trinkern vorkommen, die nicht am Delirium tremens gelitten haben.

§. 2008.

Ursachen. Die Krankheit kommt nur bei Trinkern, insbesondere Branntweintrinkern vor; zum Ausbruch tragen oft auch Gemüthsbewegungen bei.

§. 2009.

Wesen. Man hat die Krankheit für Entzündung des Gehirns erklärt, was sie aber nicht ist, wenn auch oft ein entzündlicher Zustand des Gehirns damit verbunden ist. Ueber den wesentlichen Unterschied zwischen diesem Delirium und den Seelenkrankheiten vergleiche das Kapitel von dieser Krankheitsfamilie.

§. 2010.

Vorhersage. Die Krankheit wird bei richtiger Behandlung in der Regel geheilt.

§. 2011.

Behandlung. Der Weg der Heilung ist der Schlaf und das Mittel, durch welches dieser bewirkt werden muss, das Opium. Ich gebe gewöhnlich Abends einen Gran Opium und nach jedesmaligen Zwischenräumen von zwei Stunden zwei bis drei weitere gleiche Gaben. Tritt kein Schlaf ein, so wird am andern Nachmittag frühzeitig mit dem Gebrauche des Opiums angefangen und am Abend die einzelne Gabe auf zwei Grane erhöht. Meistens genügen diese Gaben, doch ist es zuweilen nothwendig, zu noch grössern zu steigen. Bei Vollblütigkeit und bei der Darreichung stärkerer Gaben des Opiums muss man das Gehirn schüzen durch kalte Umschläge auf den Kopf und eine Aderlässe. Ist Verstopfung vorhanden, so gebe man kühlende eröffnende Salze; doch bewirkt das Opium in grössern Gaben oft keine Verstopfung, sondern eher Durchfälle. Auch sind die Digitalis und das Kali carbonicum empfohlen worden. — Ein leichterer Grad des Delirium tremens kommt zuweilen bei Personen, die nicht die geistigen Getränke gewohnt sind, nach bacchanalischen Ausschweifungen vor. Diese Art wird ohne Opium, blos durch eine antiphlogistische Diät, Wassertrinken und kalte Umschläge auf den Kopf geheilt.

Zweite Ordnung der Nervenkrankheiten.

Nervenkrankheiten mit verminderter Nerventhätigkeit.

Der Schlagfluss.

(*Schlag, Apoplexia.*)

Wepfer (lat. Amst. 1724). — *Zuliani* (lat. Brixen 1789). — *Kirkland* (London 1791, aus d. Engl. Lpz. 1794). — *Bethke* (Lpz. 1797). — *Ottensee* (m. Vorrede v. Fritze. Berl. 1805). — *Burdach* (Lpz. 1806). — *Portal* (Paris 1811). — *Hopf* (Stuttgart 1817). — *Moulin* (Par. 1819, a. d. Franz. v. Caspari. Lpz. 1820). — *Richelmy* (a. d. Franz. v. Gräfe. Berl. 1821). — *J. H. Beck* (Nürnb. 1826). — *Rochoux* (Dictionnaire de Médecine).

§. 2012.

Der **Schlagfluss** ist die plözliche Beraubung des Bewusstseins, mit welcher zugleich mehr oder weniger vollständige Lähmungen eintreten.

§. 2013.

Es erscheint der Schlagfluss unter mannigfaltigen Formverschiedenheiten, wesshalb es schwer ist, ein allgemeines Bild desselben zu entwerfen.

Oft gehen dem Anfalle längere oder kürzere Zeit Vorboten vorher. Der Kranke hat öfters das Gefühl, wie wenn ihm Etwas plözlich in den Kopf steige, wobei Ohrenklingen entsteht, er wird sodann von stärkerm Schwindel befallen, der entweder nur vorübergehend ist oder auch mehr anhält und bei dem Aufrichten oder Drehen des Kopfes zunimmt und zuweilen so bedeutend

wird, dass der Kranke in Gefahr ist, umzufallen. Derselbe empfindet zuweilen Lichterscheinungen, wie wenn es blize, manchmal bemerkt man an demselben eine allmälige Abnahme des Gedächtnisses, eine ungewohnte Schläfrigkeit, wobei aber der Schlaf doch wegen schweren Träumen sehr unruhig und nicht erquickend ist, und beschwerliches Sprechen und selbst Stammeln; zuweilen hat der Kranke langwierige Kopfschmerzen an einer bestimmten Stelle, er hat das Gefühl von Schwäche und Ameisenkriechen in den Gliedern, manchmal auch Reissen in denselben, krampfhafte Zufälle, eine Neigung zum Erbrechen, Herzklopfen etc. Diese Vorboten können eine sehr verschieden lange Zeit dem Anfalle vorausgehen, oft nur wenige Stunden und oft Monate lang und selbst mehrere Jahre hindurch von Zeit zu Zeit erscheinen.

§. 2014.

Auf diese Erscheinungen oder auch ganz ohne alle vorhergegangene Anzeigen folgt sodann der Schlaganfall. Gewöhnlich empfindet der Kranke einen heftigen Kopfschmerz, Kribeln in der Stirngegend und Schwindel, seine Sprache wird lallend, die Lippen und verschiedene Muskeln des Gesichts zucken auf der einen Seite, zuweilen werden der Kopf und die Augen verdreht. Der Kranke fallt um ohne Bewusstsein, zuweilen unter allgemeinen Zuckungen, die aber bald wieder aufhören, das Athmen ist schnarchend und langsam und hie und da unterbrochen, der Mund steht offen, es steht Schaum vor demselben und es fliesst Speichel aus. Gewöhnlich sind der eine Mundwinkel, die eine Wange und das eine Augenlied herunterhängend. Der Kranke bewegt nur den Arm und den Fuss der einen Seite, die Gliedmassen der andern Seite sind gelähmt. Der Puls ist oft wenig verändert, meistens ist er langsam, manchmal sehr voll und hart, zuweilen auch aussezend; ein kalter Schweiss

bedeckt die Stirne, Koth und Harn gehen unwillkürlich ab.

§. 2015.

Von diesem Krankheitsbild, welches die am häufigsten vorkommende Form des Schlagflusses darstellt, weichen die Krankheitszufälle oft auf verschiedene Weise ab. Oft wird bei dem Anfall das Bewusstsein nicht vollkommen geraubt und die lähmende Wirkung desselben deutet sich nur durch Schwere der Zunge und erschwerte Sprache, so wie durch ein Kriebeln in einzelnen Gliedern an, in seltenen Fällen zeigt sich dieses Kriebeln oder ein Gefühl von Eingeschlafensein mehr oder weniger in allen Gliedern; es ist dasselbe in der Regel mit Muskelschwäche verbunden. Oefters kommen Lähmungen einzelner Theile, z. B. der Zunge, des einen Augenliedes, des einen Fusses vor, welche oft unter geringem Schwindel und nur momentaner und unvollkommener Unterdrückung des Bewusstseins sich einstellen. Diese verschiedenen Formen begreift man unter dem Namen Parapoplexia oder Apoplexia imperfecta. Wird dagegen im Anfall das Bewusstsein vollkommen unterdrückt und stellen sich ausgebreitete und vollkommene Lähmungen ein (in der Regel eine Hemiplegia), so nennt man diesen Zustand die Apoplexia exquisita s. perfecta. In andern Fällen endlich wird das Leben so schnell zernichtet, dass die characteristischen Zeichen dieser Krankheit nicht mehr gehörig hervortreten können. Der Kranke sinkt plözlich zusammen und gibt keine Zeichen des Bewusstseins mehr, er hat ein leichenartiges Ansehen, wird schnell kalt, der Puls und der Athem bleiben aus, lezterer wird oft noch röchelnd und es tritt zuweilen auch etwas Schaum vor den Mund (Apoplexia fulminans), doch sind nicht alle derartige plözliche Zufälle dem Schlagflusse zuzuschreiben, indem sie auch von andern Ursachen, z. B. einem Herzfehler herrühren können.

§. 2016.

Wie in den wesentlichen Erscheinungen des Schlagflusses mancherlei, jedoch meistens nur in dem Grade des Leidens, so wie in der Verschiedenheit der ergriffenen Nervenparthien beruhenden Verschiedenheiten sich kund geben, so gibt es auch wichtige Unterschiede in dieser Krankheit, die sich auf die die Nervenzerrüttung bedingenden, jedoch in Beziehung zu ihr nur als entferntere Ursache anzusehenden oder sie nur begleitenden und modifizirenden Krankheitszustände beziehen. Nach diesen Verhältnissen können folgende Arten des Schlagflusses angenommen werden:

1) Der Schlagfluss von oder mit Congestion oder der *blutige Schlag* (Apoplexia sanguinea). Wir können das Vorhandensein desselben mit Sicherheit annehmen, wenn das vom Schlag getroffene Individuum stark und vollsaftig ist, einen kurzen Hals hat, sein Gesicht sehr roth und bläulich ist, die Venen von Blut strozen, die Augen hervorragen und prall anzufühlen sind, der Puls voll und hart ist, der Kranke starken Schwindel hat, Funken und Blize vor den Augen und Ohrensausen empfindet und wenn die Gelegenheitsursache geeignet war, eine Blutcongestion hervorzubringen, wie z. B. der übermässige Genuss geistiger Getränke, die Einwirkung starker Hize auf den Kopf, die Unterdrückung gewohnter Blutflüsse etc. Oft fehlen übrigens die meisten dieser Merkmale und es ist doch ein Blutschlag vorhanden. Man kann in solchen Fällen sein Dasein vermuthen, wenn nur die eine oder andere dieser Erscheinungen mehr oder weniger hervortritt und der Anfall nicht die Charactere der andern Arten des Schlagflusses deutlich und rein darbietet.

§. 2017.

2) Der *seröse Schlagfluss* (Apoplexia serosa, hydrocephalica) ist selten, indem die wässerige Ausschwizung,

die die Unterdrückung in dem Nervenleben bedingt, gewöhnlich nur allmälig eintritt und sodann die Form der hizigen Gehirnhöhlenwassersucht darstellt; geschieht die Ausschwizung aber wirklich in der Art, dass jene Hemmung der Verrichtung der Nerven plözlich, das heisst als Schlagfluss, eintritt, so werden die Kranken unter Beraubung des Bewusstseins plözlich von halbseitigen Zuckungen und tetanischen Krämpfen befallen, worauf Lähmungen, erschwertes Athmen und der Tod eintreten. Zur Erkennung dieser Art des Schlages ist es auch nothwendig, die erregenden Ursachen zu berücksichtigen; man kann z. B. auf dieselbe schliessen, wenn die bezeichneten Zufälle plözlich nach zurückgetretenem Scharlachausschlag sich einstellen etc.

§. 2018.

3) Der *Schlag von organischen Fehlern* (Apoplexia ex vitiis organicis). Diese Art des Schlagflusses erkennt man oft an den dem Anfalle meistens lange vorhergehenden Zufällen einer Desorganisation im Gehirn, an dem auf eine bestimmte Stelle beschränkten Kopfschmerz, dem Gefühl von Druck, einem von einer bestimmten Stelle ausgehenden Schwindel etc.; oft fehlen aber auch diese Vorläufer und der Schlaganfall tritt unerwartet ein. In diesem Falle deuten nur die Abwesenheit der bei dem blutigen Schlage gewöhnlich vorkommenden Erscheinungen und der Mangel der den Nervenschlag meistens bedingenden äussern Veranlassungen auf die bezeichnete Quelle des Uebels hin, doch wird in diesem Falle immer ein Zweifel übrig bleiben, ob der Schlag von einer Desorganisation herrühre oder ein blutiger oder ein Nervenschlag sei.

§. 2019.

4) Der *Nervenschlag* (Apoplexia nervosa s. immaterialis). Seine Unterscheidung vom Blutschlag ist von der grössten Wichtigkeit, da das vorzüglichste Heil-

mittel beim Blutschlag, nämlich die Aderlässe, hier nicht angezeigt ist und selbst den schwachen Lebensfunken vollends zum Erlöschen bringen kann. Wir können das Vorhandensein eines Nervenschlages annehmen, wenn das vom Schlag getroffene Individuum alt, mager und abgelebt ist, oder auch, wenn es ein jüngeres Individuum ist, das ein sehr reizbares Nervensystem besizt, hysterisch, hypochondrisch oder cholerisch ist, nicht vollblütig und dick, sondern blass und mager ist, einen mehr schlanken Körperbau und langen Hals besizt, keine dunkle Röthe im Gesicht und den Augen, kein harter voller Puls, kein schnarchendes Athmen etc., sondern mehr ein leichenartiges Aussehen, ein kleiner schwacher und aussezender Puls und nur in längern Zwischenräumen erfolgende kurze Athemzüge sich zeigen, die bei dem Blutschlag angegebenen Vorboten nicht vorhanden waren und die Ursachen des Schlaganfalls von der Art waren, dass sie zunächst zerrüttend auf's Nervensystem einwirken mussten, wie z. B. eine heftige Gemüthsbewegung, wiewohl eine solche Ursache auch den Blutschlag veranlassen kann, da eine Erregung des Nervensystems leicht auch auf die Blutbewegung zurückwirkt.

§. 2020.

Die Ausgänge des Schlagflusses sind: 1) Die *Genesung*. Es kehrt zuerst das Bewusstsein zurück, das oft nur für einen Augenblick geraubt oder nicht einmal vollständig verloren war, aber auch mehrere Stunden und selbst Tage lang fehlen kann, und sodann verschwinden allmälig der Schwindel und nach längerer Zeit die Lähmungen. — 2) *Nachkrankheiten*. Dieselben sind ein öfters wiederkehrender oder auch ein mehr andauernder Schwindel, Schwäche oder gänzlicher Verlust des Gedächtnisses und anderer Geisteskräfte, eine erschwerte Sprache, Lähmungen einzelner Glieder, ins-

besondere halbseitige Lähmung. — 3) Der *Tod.* Es erfolgt derselbe oft augenblicklich, oft auch, meistens unter Zunahme der schlagflussartigen Zufälle oder unter Wiederkehr des Anfalls, nach einigen Minuten oder Stunden, oder erst in einigen Tagen und selbst nach noch längerer Zeit, in welch lezterm Fall der Kranke mehr oder weniger betäubt daliegt, die Zunge trocken, braun und rissig wird, und sich eine Art Status nervosus ausbildet.

§. 2021.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Nach dem Blutschlag trifft man die Gefässe und grossen Blutbehälter des Gehirnes mit Blut überfüllt an und zugleich oft etwas Lymphe zwischen die Gehirnhäute und in die Hirnhöhlen ergossen, zuweilen auch ausgetretenes Blut zwischen dem Schädel und den Hirnhäuten, zwischen diesen und dem Gehirne, in der Hirnsubstanz und vorzüglich auch in den Hirnhöhlen, welche durch die grosse Menge des Extravasats oft bedeutend ausgedehnt sind; auch findet man zuweilen Bluterguss in dem Kanal der Wirbelsäule. — Nach dem serösen Schlag findet man die Veränderungen, die in dem Kapitel von der hizigen Hirnhöhlenwassersucht angegeben worden sind, — nach dem Schlag aus Desorganisation verschiedene Substanzveränderungen im Gehirne, Erweichung, Vereiterung, Verhärtung, Hydatiden, Steatome, nach den Untersuchungen von *Riobe*, *Rochoux* u. A. auch Narben im Gehirne und häutige Bälge, die Folge früher bestandener Blutextravasate, ferner krankhafte Veränderungen in den das Gehirn umgebenden Theilen, Knochenfrass und Eiteransammlung unter den Schädelknochen, Knochenauswüchse, stark angeschwollene *Pachion*'sche Drüsen, die Hirnhäute an einzelnen Stellen verdickt und verknöchert, Verknöcherungen in den Häuten der Gefässe des Gehirnes etc. Diese Veränderungen trifft man meistens in

der der gelähmten Seite des Körpers gegenüberstehenden Hälfte des Gehirnes an. — Nach dem reinen Nervenschlag endlich findet man meistens gar keine Veränderungen in dem Gehirne, oft sind die Blutgefässe etwas zu stark mit Blut angefüllt, was aber nicht die genügende Ursache des Schlagflusses sein kann, öfters soll aber das Gehirn auch auffallend blutleer sein.

§. 2022.

Anlage zum Schlagfluss, mit Ausnahme der zum sogen. Wasserschlage, haben beinahe nur erwachsene Personen, und zwar vorzüglich solche männlichen Geschlechtes und von dem Alter von 40 — 60 Jahren. Uebrigens spricht sich nur zu dem Blutschlage eine besondere Anlage durch den Habitus des Körpers aus. Ein solcher Bau (Habitus apoplecticus) gibt sich zu erkennen durch einen untersezten, mehr oder weniger fetten Körper, etwas grossen Kopf, kurzen Hals (statt 7 nur 6 Halswirbel), breite Schultern, rothes Gesicht, das beim Bücken dunkelroth wird und wobei ein solches Individuum leicht Schwindel empfindet. Der Nervenschlag kommt mehr bei magern und sehr reizbaren Personen vor, doch ist der Schlagfluss bei Personen von dieser Constitution nicht besonders häufig und es kann daher dieselbe nicht als eine besondere Anlage zum Schlage überhaupt betrachtet werden.

§. 2023.

Gelegenheitsursachen können alle äussern Einflüsse werden, welche Vollblütigkeit verursachen und Reizung, Erschütterung oder Zerstörung des Gehirnes oder mehr oder weniger des ganzen Nervensystems veranlassen können, daher eine zu reichlich besezte Tafel, der zu starke Genuss der geistigen Getränke, Mangel an Bewegung und zu grosse Geistesruhe, zu vieles Schlafen, die Unterdrückung gewohnter Blutflüsse und anderer Ausleerungen, die Hemmung der freien Blut-

bewegung und insbesondere des Rückflusses des Blutes vom Kopfe durch das Tragen zu enger Halsbinden, Hemmung des Athmens af irgend eine Weise, zu starke Herzthätigkeit bei Hypertrophie und andern Krankheiten des Herzens, Zurücktreibung der Lebensthätigkeit aus den peripherischen Theilen, z. B. durch einen unvorsichtigen Gebrauch des kalten Bades und andere Verkältungen, durch strenge Kälte im Winter, zu starke Einwirkung der Sonnenhize auf den Kopf, zu starke Geistesanstrengungen, insbesondere wenn sie mit einer gewissen Hast und Gemüthsunruhe geschehen, häufig gestörte Nachtruhe, heftige Gemüthsbewegungen, insbesondere Verdruss und Schrecken, starke und häufige Geschlechtsreizung, Verlezungen und Erschütterungen des Gehirnes, consensuelle Reize durch Ueberladung des Magens, gallichte Reize etc. Endlich müssen diejenigen Einflüsse erwähnt werden, die zwar für sich nicht leicht einen Schlagfluss zu Stande bringen, aber dazu geneigt machen, indem sie die Lebenskräfte herabstimmen, die Empfindlichkeit des Nervensystems erhöhen etc., dahin gehören Blutflüsse und andere schwächende Ausleerungen, schlechte Nahrungsmittel, eine niedergebeugte Gemüthsstimmung etc.

§. 2024.

Das Wesen des Schlagflusses scheint eine plözlich eintretende, mehr oder weniger vollkommene Lähmung des ganzen Gehirnes oder einzelner Theile desselben zu sein. Dieser lähmungsartige Zustand kann auf verschiedene Weise hervorgebracht werden: durch Druck auf's Gehirn bei dem blutigen Schlagflusse, dem serösen Extravasat etc., durch eine Zerstörung der Gehirnmasse, wenn sie bis zu solchen Gehirntheilen fortschreitet, deren Unverleztheit zum Bewusstsein, zur Empfindung und zur willkürlichen Bewegung nothwendig ist, und durch Erschütterung des Gehirns und des ganzen Nervensystems,

wodurch vielleicht in seinem feinern Bau unsichtbare Verlezungen eintreten und seine Verrichtung gehemmt wird. Wie nun aber die im Nervensystem vorgehenden Lebensprozesse verändert sind, bleibt näher zu bestimmen so lange unmöglich, bis wir die innern Vorgänge im Nervensystem im gesunden Zustande näher kennen. Alle bisher vorgebrachten nähern Erklärungsweisen des Schlagflusses sind zu sehr Hypothesen, als dass sie hier angeführt werden können, man findet übrigens eine Zusammenstellung der wichtigern Ansichten in *Richter's* Therapie.

Der Streit, ob ein Schlagfluss auch in andern Theilen des Nervensystems, als dem Gehirne, statt finden könne, ist nur ein Wortstreit, indem man denselben Vorgang, nämlich die schnell eintretende Lähmung bald Lähmung und bald Schlagfluss nennt.

§. 2025.

Die Vorhersage. Schlaganfälle gehen zwar sehr häufig, ohne tödtlich zu werden, vorüber, und manche Kranke erholen sich scheinbar ganz, doch ist ein solches schon einmal von einem Schlaganfall getroffenes Individuum in der Regel dem Tode durch diese Krankheit geweiht, indem die Anfälle in hohem Grade die Anlage zu dieser Krankheit steigern und daher meistens sich wiederholen. In der Regel werden die später erfolgenden Anfälle stärker, als die vorhergegangenen. Am wenigsten scheint ein reiner Nervenschlag die Neigung zu Rückfällen zu hinterlassen. Der Schlagfluss von Desorganisation und von Wasserergiessung sind unheilbar, wenn nicht bei dem ersten die materielle Ursache an der Oberfläche des Gehirnes liegt, so dass sie durch chirurgische Mittel hinweggenommen werden kann. Am günstigsten ist noch die Vorhersage bei einem leichtern Grade eines durch eine äussere Veranlassung entstandenen Blut- oder Nervenschlages.

§. 2026.

Behandlung. Ist der Character des Blutschlages deutlich ausgesprochen, so nimmt man, so schnell als möglich, indem zugleich die Hals- und andere Binden und fest anliegende Kleidungsstücke gelöst werden und der Körper in eine mehr aufrechte Lage gebracht wird, eine starke Aderlässe am Arme der nicht gelähmten Seite, und wenn daselbst kein Blut mehr fliesst, an der Drosselader, die aber so wenig wie möglich beim Verbinden zusammengedrückt werden darf, vor. Nebst der Aderlässe scheinen mir das beste Mittel, kalte Begiessungen des Kopfes zu sein, in der Art vorgenommen, wie sie gegen die hizige Gehirnhöhlenwassersucht angewandt werden. Dieselben werden nach gemachter Aderlässe oder, bei zu langer Dauer bis zu deren Vollführung, sogleich vorgenommen. Nach dem Gebrauche beider Mittel, die zuweilen wiederholt in Anwendung gebracht werden müssen, lässt man nun, statt der Begiessungen, kalte Umschläge auf den Kopf machen, wendet eröffnende Klystiere an, gibt kühlende, eröffnende Mittel innerlich, und kann auch zur Ableitung Fussbäder, Senfteige und Frictionen der Glieder in Gebrauch ziehen.

Ist auf diese Weise die Kraft des Anfalls gebrochen, so ist es nunmehr erst Zeit nach den gewöhnlichen Heilanzeigen einen geordneten Heilplan zu entwerfen. Man sucht die Ursachen der Blutcongestion auf. Ist es Ueberladung des Magens oder der Gedärme von Speisen und geistigen Getränken oder andern Stoffen, so sucht man diese Stoffe durch gelindes, vermittelst lauwarmen Wassers, Kizeln des Schlundes etc. erregtes Erbrechen, unter Vermeidung heftig wirkender Brechmittel, und auch durch abführende Mittel auszuleeren, oder sezt den schädlich wirkenden Stoffen andere, sie einhüllende und neutralisirende entgegen; tragen unterdrückte Hämor-

rhoiden die Schuld, so lässt man Blutegel an den After sezen; ist es zurückgetretener Rothlauf, Gicht etc., so sucht man dieselben durch Senfteige und andere Mittel wieder auf die peripherischen Theile zu werfen; ist eine äussere Verlezung vorhanden, so lasse man sogleich das nothwendige chirurgische Verfahren eintreten etc.

Während man die entferntern Ursachen der Blutanhäufung im Gehirne zu beseitigen sucht, wendet man fortgesezt das gegen die, dem Schlagfluss zunächst zum Grunde liegende Krankheit gerichtete Verfahren an. Zuweilen sind noch fortgesezt kleine Blutentleerungen durch kleine Aderlässe, Blutegel an den Kopf gesezt oder durch Schröpfen nothwendig, kalte Umschläge auf den Kopf, an deren Stelle auch das Verdunsten der Naphthe auf dem Kopf gesezt werden kann, kühlende Mittel und geeignete Ableitungsmittel. Erst wenn die Blutcongestion gänzlich beseitiget ist, aber noch Lähmung vorhanden ist, fängt man nun an, zu dem gegen das Wesen der Lähmung unmittelbar gerichteten Verfahren überzugehen. Man wendet zuerst auf die gelähmten Glieder die äussern erregenden Mittel an und zieht sodann, insofern es nothwendig ist, auch die innern s. g. Nervina zu Hilfe, unter denen aber diejenigen möglichst vermieden werden müssen, die einen Orgasmus des Blutes und Wallungen nach dem Kopfe hervorzubringen geneigt sind.

§. 2027.

In den Fällen, in welchen es zweifelhaft ist, ob der Schlaganfall in einem Blut- oder in einem Nervenschlag besteht, glaube ich, sehr kräftig vollführte Besprizungen des Kopfes, des Gesichtes und auch der Brust mit kaltem Wasser als das beste Mittel empfehlen zu dürfen. Es wird hier nicht das Wasser, wie in dem entschiedenen Blutschlage, in einem andauernden, starken Strome aus einem Gefässe auf den Kopf gegossen, son-

dern vermittelst der hohlen Hand mit möglichster Kraft auf die bezeichneten Theile des Körpers geschleudert, was eine geraume Zeit fortgesezt werden muss. Es gewährt dieses Mittel den Vortheil, dass es zugleich gegen etwa bestehende Congestionen gegen den Kopf wirkt und ein äusserst kräftiges, das Leben erweckendes Mittel ist und dass es überall ohne Zeitverlust in Anwendung gebracht werden kann. Sind mehr Gründe für das Dasein eines Blutschlages, als für das eines Nervenschlages vorhanden, so kann eine Probeaderlässe gemacht werden. Bessert sich der Kranke etwas, während das Blut fliesst, so wird mehr die Behandlung eingeleitet, welche gegen den Blutschlag angezeigt ist, sinkt der Puls aber und wird der Kranke schwächer, so muss schnell die Ader geschlossen und das Verfahren zu Hilfe gezogen werden, das man gegen den Nervenschlag in Anwendung bringt. In jedem Falle können übrigens die nicht schwächenden Ableitungsmittel angewandt werden.

§. 2028.

Bei dem rein ausgesprochenen Nervenschlag können ebenfalls die Besprizungen mit kaltem Wasser in Anwendung gebracht werden und sind von vorzüglichem Nuzen, wenn der Schlag durch eine plözliche Erschütterung des Nervensystems, z. B. durch eine heftige Gemüthsbewegung, hervorgebracht wurde; ist dem Schlage schon eine bedeutende Erschöpfung vorhergegangen, so wird man aber bald von diesem Verfahren abstehen und zur Anwendung der nunmehr zu bezeichnenden Methode übergehen müssen. Man bestreicht und wäscht dem Kranken die Schläfen, die Stirne, den Nacken mit flüchtig erregenden Mitteln und hält auch dieselben ihm unter die Nase. Hiezu taugen das Kölnische Wasser, der Hirschhorngeist, der Salmiakgeist, die Hoffmännischen Tropfen, die Naphthen, die ätherischen Oele, der

Balsamus vitae Hoffmanni, der aromatische Essig etc. Ferner dienen: aromatische Umschläge auf den Kopf, Reiben der Gliedmassen mit wollenen Tüchern, Bürsten derselben, warme Fussbäder, Senfteige in den Nacken, auf die Waden, die Arme und selbst auf den Kopf gelegt, desgleichen Blasenpflaster und selbst Moxen oder das glühende Eisen. Kann der Kranke wieder schlingen, so flösst man demselben einige *Hoffmänn*'sche Tropfen, Hirschhorngeist, etwas Wein und nach Umständen auch Castoreum oder Moschus ein, und wenn er sich noch mehr erholt hat, einen Melissen- oder Pfeffermünzthee und etwas Fleischbrühe. Dauert noch ein lähmungsartiger Zustand des Gehirnes und einzelner Gliedmassen fort, so gibt man einen Aufguss von Flor. Arnicae, rad. Serpentariae und andere Mittel, die bei Lähmungen nüzlich sind.

§. 2029.

Gegen den Wasserschlag, welcher immer mit einem Congestionszustand gegen das Gehirn in Verbindung zu stehen scheint, können die bei dem Blutschlag angezeigten Mittel und die gegen die hizige Gehirnhöhlenwassersucht gebräuchlichen Mittel versucht werden. Gegen den Schlagfluss aus Desorganisation bringt man, je nachdem die Form desselben sich mehr dem blutigen oder mehr dem nervösen Schlagfluss nähert, in dem einen Fall die gegen jenen in dem andern die gegen diesen gerichtete Verfahrungsweise in Anwendung.

§. 2030.

Sind durch den Schlagfluss alle Aeusserungen des Lebens plözlich aufgehoben worden, so müssen noch, so lange das Vorhandensein der Lebensfähigkeit möglich ist, die bei dem Scheintod üblichen Belebungsversuche unternommen werden.

§. 2031.

Eine bei Kindern vorkommende, der Apoplexie sich

nähernde Krankheit, der s. g. **venöse Schlagfluss der Kinder** (Apoplexia infantum venosa) hat erst in den lezten Jahren die Aufmerksamkeit der Aerzte auf sich gezogen.*) Es gibt sich die Krankheit zu erkennen durch ein häufiges, äusserst leichtes, besonders bei dem Aufrichten des Kindes, erfolgendes Erbrechen, welches beinahe nur in einem Herausschwappen des Mageninhalts besteht, häufige Stuhlgänge ohne Leibweh, einen Ausdruck von Hinfälligkeit und tiefem Ergriffensein, welcher mit der Stärke der übrigen Erscheinungen und der Dauer der Krankheit in keinem Verhältniss steht, bleiches, eingefallenes Gesicht, mit lividen Ringen um die Augen, abgespannte, ausdruckslose Gesichtszüge, träge Pupille, eine russige Schwärze an der Nasenöffnung, verminderte Temperatur des Körpers, einen häufigen kleinen Puls. Das Kind äussert keinen Schmerz, sondern ist in einem apathischen Zustand, der nur zuweilen durch Aeusserung von Verdriesslichkeit unterbrochen wird, richtet man dasselbe auf, so legt es den Kopf an und lässt die Glieder schlaff herabhängen; der Schlaf ist unruhig und zuweilen durch krampfhafte Zufälle unterbrochen, es findet übrigens nie der tiefe soporöse Zustand statt, wie bei der hizigen Gehirnhöhlenwassersucht. Zulezt wird das Gesicht wachsgelb, die Lippen werden welk und kalt, die Gliedmassen röthlich gefleckt, wie nach Einwirkung von Frost, und der Puls kaum fühlbar. Der Tod erfolgt ohne stürmische Erscheinungen, manchmal durch Wasserschlag. Die Dauer der Krankheit ist drei bis vier Tage.

§. 2032.

Die **Leichenöffnung** zeigt eine auffallende Ueberfüllung der grössern Gefässe im ganzen Körper mit

*) *Krukenberg* (Jahrbücher der ambulator. Klinik. B. II.). — *Hochmann* (Hecker's lit. Annal. 6ter Jahrg.). — *Tott* (in Most's Encyklopädie).

venösem Blute, besonders aber im Gehirne, das nach Hinwegnahme der Schädelknochen wie ein Schwamm hervorquillt und nicht wieder zurückgebracht werden kann. Die Schädelknochen sind bläulich gefärbt, die Hirnsubstanz ist zuweilen wie mit Wasser getränkt, und in den Hirnhöhlen mehr Wasser als gewöhnlich; es fehlen übrigens die Erscheinungen der wirklichen Gehirnentzündung. Auch hat man die Milz mussig und die Gedärme mit Ecchymosen besezt angetroffen.

§. 2033.

Ursachen. Die Krankheit kommt vorzüglich in den zwei ersten Lebensaltern und bei vollsaftigen Kindern vor. Gelegenheitsursache sind das Zahnen, der Aufenthalt in der Mittagssonne, Verkältung etc.

§. 2034.

Vorhersage. Hat das Uebel schon über einen Tag gedauert, so soll (nach *Krukenberg* und *Hachmann*) stets der Tod erfolgen. Günstige Zeichen sind: Wiederkehr des Lebensturgors, der Wärme und Farbe, allgemeiner, starker Schweiss unter Nachlass der Apathie, stärkerer Pulsschlag und Nachlass des Erbrechens und der Diarrhoe.

§. 2035.

Behandlung. Das Hauptmittel ist wohl eine reichliche Blutentziehung durch Blutegel an den Kopf gesezt. Man sucht zugleich den Blutandrang nach dem Kopf durch kalte Umschläge auf denselben zu mässigen und die peripherische Thätigkeit zu erwecken durch warme Fomentationen des Körpers, Bäder mit Salz und Pfeffer, Einhüllen des Körpers in erwärmten Flanell, Bewerfen mit kaltem Wasser, auch Einreibungen des ganzen Körpers mit Spirit. sal. Ammoniac. caust. und Mercurialsalbe etc. Auch leitet man, wenn nicht schon Durchfälle vorhanden sind, auf den Darmkanal ab, und sucht auch im Allgemeinen die Reaction im Körper zu erhöhen. Zu

diesen Zwecken empfiehlt man kleine Gaben von Calomel mit Moschus, Ammonium und Arnica; es können aber die innerlichen erregenden Mittel, besonders Moschus und Ammonium leicht nachtheilig auf das Gehirn wirken.

Die Lähmung.

(*Paralysis, Resolutio nervorum.*)

Chandler. Kirkland (in den im Kapitel vom Schlagfluss angeführten Werken). — *J. Cooke* (London 1821).

§. 2036.

Lähmung ist der Verlust der Bewegungsfähigkeit und der Empfindung in einem Theile, wenn der erstere nicht in einem mechanischen Hinderniss der Bewegung begründet ist und die angegebenen Erscheinungen nicht die Symptome einer vorübergehenden allgemeinen Hemmung der Lebensäusserungen sind.

Ist noch einige Bewegungsfähigkeit vorhanden, so nennt man dieses unvollkommene Lähmung (Paresis), doch wird unter dieser Bezeichnung auch der Zustand verstanden, in welchem zwar die Bewegungsfähigigkeit verloren, die Empfindung aber noch vorhanden ist. Die Lähmung der einen Seite des Körpers (die halbseitige Lähmung) pflegt man Hemiplegia, die Lähmung, welche von einer bestimmten Stelle an auf beiden Körperhälften besteht, Paraplegia zu nennen; doch bedeuten diese Ausdrücke vielmehr den Schlag, durch welchen diese Lähmungen entstehen, als die Lähmung selbst (Halbschlag, Querschlag).

§. 2037.

Die Lähmungen entstehen in der Mehrzahl der Fälle plözlich in Folge des eigentlichen Schlagflusses und zuweilen, ohne dass Zufälle eines Gehirnleidens zugegen sind, was auch von Vielen Schlag genannt wird (Apoplexia spinalis); in andern Fällen entwickeln sie sich allmälig. Die Kranken haben oft lange Zeit das Gefühl von Schwäche, Ameisenkriechen, Eingeschlafensein in einem oder mehrern Gliedern und manchmal auch die Empfindung, wie wenn kalte Wassertropfen in den Gliedern herabflössen, und zuweilen gehen auch der Lähmung Schmerzen und Zuckungen voraus. Hat sich dieselbe ausgebildet, so ist bei vollkommener Lähmung in dem gelähmten Gliede die Bewegungsfähigkeit und oft auch das Empfindungsvermögen gänzlich verloren, bei unvollkommener Lähmung ist noch etwas Fähigkeit der Bewegung und mehr oder weniger vollkommene Empfindlichkeit vorhanden. Das gelähmte Glied zeigt meistens eine geringere Wärme als die gesunden Theile des Körpers, der Puls ist meistens etwas kleiner als auf der gesunden Seite, doch zeigt er oft auch keine Verschiedenheit von dem dieser Seite, gerne schwillt das gelähmte Glied, das in der Regel sehr schlaff ist, wassersüchtig an, zuweilen, bei einem hohen Grade der Krankheit, wird es brandig, dauert die Lähmung lange Zeit, so tritt mehr oder weniger das Schwinden des Gliedes ein (Aridura).

§. 2038.

Es hat diese Krankheit einen langwierigen Verlauf. Stellt sich die Bewegungsfähigkeit in dem gelähmten Gliede wieder ein, so geschieht dieses meistens sehr langsam und es gehen dieser Umänderung oft das Gefühl von Kriebeln und Ameisenkriechen, so wie starke Schmerzen, zuweilen wie wenn das Glied mit Nadeln gestochen würde, und manchmal auch leichte Zuckungen vorher,

die Wärme tritt wieder ein, der Puls hebt sich, die Haut des gelähmten Gliedes wird dünstend etc. In den Tod geht die Lähmung durch die im ganzen Körper gewöhnlich zugleich gesunkene Lebensthätigkeit über, wobei oft noch aufgelegene Stellen und theilweiser Brand die Erschöpfung beschleunigen, zuweilen kommt noch ein wassersüchtiger Zustand hinzu, manchmal breitet sich die Lähmung immer weiter aus, bis sie zuletzt ein zum Leben unbedingt nothwendiges Organ ergreift und dadurch tödtet. Zuweilen gehen dem Tode allgemeine Zuckungen vorher.

§. 2039.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Am häufigsten findet man in den Centraltheilen des Nervensystems Zerstörungen, oder Veränderungen in ihren Hüllen, wodurch ein Druck auf diese Theile ausgeübt wird; im Gehirn und seinen Umgebungen dieselben Veränderungen, wie beim Schlagfluss, an der Wirbelsäule Caries, Verkrümmungen, Steatome, in der Wirbelhöhle Blut, Eiter, das Rückenmark gedrückt, erweicht, verhärtet etc. Nur in seltenern Fällen findet man die Nerven, die zu dem gelähmten Theile gehen, verändert, oder Geschwülste, welche auf dieselben drücken. Zuweilen trifft man [1]) in dem gelähmten Gliede das Muskelgewebe zu Fett umgewandelt und die Arterien verknöchert an. Oft kann man durchaus keine Veränderung im Gehirn, dem Rückenmark oder den Nerven oder im gelähmten Gliede selbst wahrnehmen.

§. 2040.

Ursachen. Die häufigsten Veranlassungen zu Lähmungen sind Verlezungen des Gehirnes oder des Rückenmarkes und zwar sowohl durch äussere Gewalt, wie einen

1) *Schröder van der Kolk*, Observ. anat. path. et pract. Amstel. 1826. F. I.

Schlag oder Fall auf diese Theile, als Krankheiten in ihnen und ihren Umgebungen. [1]) Oefters müssen auch allgemein das Nervensystem erschütternde oder auf andere Weise verlezende Einflüsse beschuldigt werden, wie heftiger Schrecken und Verdruss, heftige Krampfanfälle, ein Schlag vom Blize, viele oder alle Gifte, namentlich Blei, Arsenik, Blausäure. Am seltensten kommen wohl unmittelbar und ausschliesslich auf den Nerven des gelähmten Theiles wirkende Einflüsse vor, welche die Lähmung hervorbringen. Hieher gehören übrigens Durchschneidung und Quetschung des Nervens, Druck durch nahliegende Geschwülste, Ausschwizung in die Nervenscheiden bei heftigen Nevralgien entstanden, andauernd und gänzlich gehemmter Zufluss des Blutes nach einem Theile etc.

§. 2041.

Die nächste Ursache der Lähmung ist die aufgehobene Fähigkeit einzelner Nerven auf die Muskeln bewegend einzuwirken; aber in einem ausgedehntern, weniger gebräuchlichen Sinn: die aufgehobene Fähigkeit einzelner Nerven, Eindrücke aufzunehmen und zum Gehirne zu leiten, oder auf die ihnen entgegenstehenden Similartheile irgend einer Art einzuwirken.

§. 2042.

Vorhersage. Die Lähmung ist immer eine hartnäckige Krankheit. Die Lebensgefahr hängt vorzüglich von dem Size der Krankheit ab, indem Lähmungen wichtiger innerer Theile augenblicklich tödten können, die Lähmung in äussern Theilen aber für sich nicht leicht tödtlich wird und oft unverändert stehen bleibt; meistens jedoch zeigt auch die Lähmung in äussern Theilen

1) Vergleiche das über den Schlagfluss Gesagte und den §. über das Ergebniss der Leichenöffnungen.

ein tiefes inneres Leiden an, das mit der Zeit dem Leben Gefahr zu bringen droht.

§. 2043.

Behandlung. a) Die Erfüllung der *Anzeigen aus den Ursachen.* Man erforsche genau die Entstehungsweise der Lähmung und insbesondere den Zustand des Gehirnes und Rückenmarkes, der ihr etwa zum Grunde liegt. Zuweilen können selbst noch Blutentleerungen nüzlich sein, wenn die Lähmung durch eine andauernde Blutüberfüllung im Gehirn unterhalten wird; bei dem Pottschen Uebel dienen Fontanelle und Moxen in die Nähe der leidenden Wirbelbeine gesezt, ebenso wendet man auch gegen andere Krankheiten der Wirbel und des Rückenmarkes die geeigneten Mittel an; haben Gifte eingewirkt, so sucht man diese aus dem Körper zu führen, zu neutralisiren und einzuhüllen, vermuthet man Ausschwizungen in den Nervenscheiden, so sucht man dieselben durch Bäder, Einreibungen, Blasenpflaster etc. zur Zertheilung zu bringen. Unterdrückte Hautausschläge, Blutflüsse etc. sucht man wieder herzustellen u. s. w.

§. 2044.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um die Nerventhätigkeit zu erwecken, dienen zum Theil die flüchtig erregenden Mittel, wie der Wein, die Valeriana, Angelica, Chenopodium ambrosioides, die versüssten Säuren, die Naphthen, das Ammonium und seine Präparate, namentlich der Hirschhorngeist, die ätherischen Oele, der Kampher, der Moschus, selbst der Phosphor, zum Theil solche mit scharfem Prinzip und zwar sowohl solche, welche zugleich flüchtig erregen, wie die Arnica, die Senega, manche ätherische Oele, zum Theil der Calamus aromaticus etc., als auch solche, die diese Wirkung in geringerm Grade oder gar nicht haben, wie der Senf, die Canthariden, die Coloquinthen, die Gratiola etc., und selbst und zwar vorzüglich auch

solche, die zugleich mehr oder weniger narkotisch wirken, wie die Belladonna, Nux vomica und das aus ihr bereitete Strychnin, der Giftsumach (Rhus Toxicodendron), die sibirische Schneerose (Folia Rhododendri) etc. Mehrere dieser Mittel wirken auf einzelne Theile des Nervensystems mehr als auf die übrigen ein, z. B. das Strychnin und der Giftsumach auf das Rückenmark und sind daher in Anwendung zu bringen, wenn die Lähmung von diesen Theilen ausgeht.

§. 2045.

Mit der innerlichen verbindet man auch die äusserliche Anwendung entsprechender Mittel, welche immer so nahe als möglich an den gelähmten Nerven und insbesondere an der Stelle, von welcher die Lähmung ausging, angebracht werden müssen, wie z. B. in vielen Fällen von Lähmung der untern Gliedmassen nicht allein auf diese, sondern auch auf die der leidenden Stelle des Rückenmarkes entsprechende Stelle des Rückens. Man lässt Einreibungen von aromatischen Geistern mit Zusaz von Liquor Ammon. caustic., Naphthe, ätherischen Oelen und Balsamen, z. B. mit Balsamus vitae Hoffmanni, oder Canthаridentinktur, so wie von Unguentum nervinum, Linimentu m volatile, Linimentum saponato camphoratum etc. machen, lässt das gelähmte Glied mit einem Aufgusse von aromatischen und gewürzhaften Stoffen mit Wein oder Weingeist bähen, stark reiben, künstliche oder natürliche warme Bäder, Schwefelbäder, das Dampfbad, das Bad in heisser Luft oder auch Tropfbäder gebrauchen, einen heissen Strahl des Dampfes an das gelähmte Glied gehen und wendet Senfteige, Blasenpflaster, das Schlagen mit Brennesseln, Einreibungen der Brechweinsteinsalbe, die Acupunctur, Electricität, Galvanismus und die Moxen an. Bei der Lähmung der Zunge wendet man ausserdem Kaumittel, wie Meerrettig, Radix Pyrethri, Senf, Pfeffer etc., an, von welchen Mitteln man auch einen Aufguss

bereiten und den Mund ausspülen lassen kann; auch lässt man ätherische Oele auf die Zunge tröpfeln oder vermittelst Zucker auf dieselbe bringen.

Die Starrsucht.

(*Catalepsis*, *Catoche*, *Catochus*.)

Delius (lat. ed. 2. Erlangen 1754). — *Hirschel* (Berl. 1769). — *Fabri* (lat. Halle 1786). — *Göbel* (Diss. Berl. 1818). — *Tissot* (über die Nervenkrankheiten).

§. 2046.

Die **Starrsucht** sind Anfälle, welche sich vorzüglich in plözlich eintretender, aber nur vorübergehender Hemmung des Einflusses der Willenskraft auf die Muskeln der willkürlichen Bewegung aussprechen, wobei die Gliedmassen oft die Stellung beibehalten, die man ihnen gibt, die Sinnes- und Geistesthätigkeit ruht, oft mit Ausnahme der des Gehöres, (wo sodann auch das Bewusstsein vorhanden ist), und bei welchen die vegetativen Prozesse unverändert fortdauern oder geschwächt erscheinen.

§. 2047.

Es gibt verschiedene Grade und Modifikationen der Starrsucht.

Als eine Art Starrsucht und zwar als den niedersten Grad derselben, möchte ich die zuweilen vorkommenden Anfälle von unwillkürlichem **Staunen** ansehen. Es gibt nämlich Personen, die mitten im Gespräch und der Beschäftigung von Anfällen befallen werden, in welchen das Gespräch plözlich abgebrochen wird, die Augen einen staunenden Blick erhalten und grad hinaus starren,

und die Kranken, wenn sie gerade im Gehen begriffen sind, in der nämlichen Richtung unwillkürlich fortlaufen. Es sind die Kranken in diesen Anfällen bei keinem klaren Bewusstsein, es geht aber der Anfall schnell vorüber, worauf sie sodann in dem angefangenen Gespräch und ihrer Beschäftigung fortfahren.

Bei vollständiger Entwicklung der Krankheit wird der Kranke, oft nach vorhergegangenem Schwindel, Kopfschmerz, Schmerz im Nacken, Eckel, Magenkrampf und dem Gefühl von Schwäche, plözlich der Fähigkeit der willkürlichen Bewegung beraubt und verliert meistens dabei das Gefühl und das Bewusstsein, er behält die Stellung, in der er sich gerade befand, bei, und es bleiben selbst zuweilen die Glieder in der Stellung, die ihnen ein Anderer giebt (wächserne Biegsamkeit), oder sie sinken langsam in die Lage, die ihnen das Gesez der Schwere anweist. Die Temperatur des Körpers, der Puls, das Athmen und selbst das Aussehen des Kranken sind hiebei nicht oder nur wenig verändert.

In andern Fällen endlich sinkt auch die Temperatur des Körpers zu einem niedern Grade herab, der Puls wird sehr klein und das Athmen kaum merklich, ja es kann, wenn das Athmen und der Puls nicht mehr bemerkt werden, der Kranke für todt gehalten werden, dabei findet zuweilen der merkwürdige Umstand statt, dass während die übrigen Sinne ruhen, doch das Gehör noch wach ist, und der Kranke daher das, was um ihn vorgeht, z. B. die Besprechung über seine Beerdigung hört, während er kein Zeichen des Lebens zu geben im Stande ist.

Nach dem Anfalle weiss oft der Kranke von dem, was mit ihm vorgegangen ist, nichts und vollendet die vor dem Anfall angefangene Periode des Gespräches, doch fühlt er sich oft matt, eingenommen im Kopfe und spricht selbst zuweilen irre.

§. 2048.

Solche Anfälle dauern einige Minuten und selbst einen Tag und länger, und kehren meistens in unbestimmter Zeit wieder zurück. — Der Uebergang in Gesundheit erfolgt allmälig, der in den Tod durch allmäliges Erlöschen des Lebens und auch durch Schlagfluss. Häufiger als in den Tod geht die Krankheit in eine andere Form von Nervenkrankheit, insbesondere die Fallsucht, über.

§. 2049.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Man fand, wie bei der Fallsucht, die Gefässe des Gehirns mit Blut überfüllt, und auch blutiges Extravasat, so wie Substanzveränderungen verschiedener Art im Gehirne und Fehler in der Lunge, der Leber, den Eierstöcken etc.

§. 2050.

Ursachen. Die Krankheit kommt am häufigsten bei hysterischen Personen vor. Veranlassungen sind Gemüthsbewegungen, insbesondere aus unglücklicher Liebe, Zorn und Schrecken, Unordnungen in der monatlichen Reinigung, Onanie, Entartungen in der Gebärmutter, Würmer, der Missbrauch geistiger Getränke etc. — Die nächste Ursache dieser Krankheit ist unbekannt.

§. 2051.

Vorhersage. Es wird die Starrsucht nur sehr selten tödtlich und verschwindet meistens nach einer kürzern oder längern Zeit, doch ist der Uebergang in eine andere Form von Nervenkrankheit nicht selten.

§. 2052.

Behandlung. Während des Anfalls ist eine eingreifende Behandlung meistens nicht nothwendig und kann selbst schädlich werden. Droht das Leben im Anfall zu erlöschen, so verfährt man wie bei der Ohnmacht und dem Scheintode; droht ein Schlagfluss, so lässt man mit Vorsicht zur Ader. — Ausser dem Anfall sucht man

die Ursachen zu beseitigen, und wendet, wenn das Nervensystem in dem Zustande erhöhter Reizbarkeit sich befindet, besänftigende Mittel, insbesondere antihysterische an, und wenn zugleich Körperschwäche vorhanden ist, die stärkende Methode, insbesondere China und Eisen.

Die Ohnmacht und der Scheintod.

(*Syncope et Asphyxia.*)

Hensler (Alton. 1770, umgearb. v. Scherf. Altona 1780, neue Aufl. 1787). — *Goodwin* (a. d. Engl. v. Michaelis, Lpz. 1790). — *Kite* (a. d. Engl. v. Michaelis, Lpz. 1790). — *Coleman* (a. d. Engl. Lpz. 1793.) — *Fothergill* (a. d. Engl. v. Michaelis, Lpz. 1796.) — *Zarda* (Prag 1796). — *Wiedemann* (Braunschweig 1797, neue Aufl. 1804). — *Portal* (a. d. Franz. v. Humpel, Wien 1798). — *Ackermann* (Frankf. 1804). — *P. Frank* (System d. med. Polizei.) — Anonym. (mit einer Vorrede v. Hufeland. Berlin 1808). — *Wendt* (Breslau 1818). — *Bernt* (Wien 1819). — *Troussel* (Par. 1823, a. d. Franz. v. Schlegel. Ilmenau 1826). — *Flittner* (Samml. k. preuss. Edikte über die Rettung in Lebensgefahr. Berl. 1825). — *Marc* (Par. 1835).

§. 2053.

Die Ohnmacht ist eine plözlich eintretende Schwäche in allen Lebensverrichtungen, so dass insbesondere plözlich die Wärmebildung sich vermindert und der Puls sinkt, und der Kranke den Gebrauch der Glieder nicht mehr in seiner Macht hat. — Der Scheintod ist der Zustand, in welchem der Körper des Kranken nicht mehr von dem einer Leiche unterschieden werden kann, aber noch Lebensfähigkeit vorhanden ist.

§. 2054.

Wird eine Person von Ohnmacht befallen, so wird es ihr schwach, so dass sie sich nicht mehr aufrecht halten kann, es wird ihr dunkel vor den Augen, sie fühlt oft Schwindel und Ohrenklingen, das Gesicht,

insbesondere die Lippen, werden blass und kalt, ebenso die Hände, ein kalter Schweiss bedeckt die Stirne und der Puls wird klein. Bleibt der ohnmächtige Zustand im niedern Grade (Lipothymia, Animi deliquium), so dauern Bewusstsein und Empfindung noch einigermassen fort; steigert er sich aber zu dem höhern Grade (Syncope), so verschwinden das Bewusstsein und die Empfindung völlig, der Puls und der Herzschlag werden kaum mehr fühlbar, der ganze Körper wird kalt, und es wird auch das Athmen kaum merklich. In dem Scheintod endlich haben das Athmen und der Herzschlag ganz aufgehört und es ist der Körper des Kranken von einer Leiche nicht mit Sicherheit zu unterscheiden, insofern dieselbe noch nicht in Verwesung übergegangen ist, indem die übrigen, als Merkmale des Todes angegebenen Erscheinungen, nämlich der gänzlich fehlende Athem und Herzschlag, das Aufhören des Gefühles und der Bewegung, Steifigkeit der Glieder, völlige Kälte des Körpers, Nichtausfluss des Blutes aus der geöffneten Ader, Gebrochensein der Augen, Erschlaffung der Muskeln, das Plattliegen und Mangel der Reizempfänglichkeit für Electricität und Galvanismus, auch beim Scheintode vorkommen.

§. 2055.

Nach Verschiedenheit der Ursachen des Scheintodes zeigen die Körper der scheintodten Individuen verschiedene Zustände, unter welchen vorzüglich der merkwürdig ist, dass in dem einen Falle das Gesicht bläulichroth und aufgetrieben ist und die Gefässchen der Augen mit Blut überfüllt sind, wie z. B. bei dem Scheintod der Erhängten, zuweilen bei dem der Ertrunkenen, dem der in mephitischen Gasarten scheintodt gewordenen Individuen und der einen Art des Scheintodes der Neugebornen, und in dem andern Falle das Gesicht blass ist und überhaupt die Zeichen der Blutüberfüllung im Gehirne und andern innern Theilen fehlen, wie dieses

namentlich bei der zweiten Art des Scheintodes der Neugebornen der Fall ist. — Bei den Ertrunkenen findet man viel Wasser und Schlamm in dem Munde und dem Schlunde, und es soll oft Wasser bis in die Lunge gedrungen sein. — Die Erfrornen sind kalt wie Eis. — Bei den vom Blize Getroffenen ist ebenfalls das Gesicht aufgetrieben und roth und es fliesst Blut aus der Nase und den Ohren; die Spuren des Strahles findet man in der Regel nur an der Haut, an welcher man schlangenförmige, rothe Streifen antrifft, und welche oft an denselben mit Blasen bedeckt ist, so wie auch die Haare versengt sind.

§. 2056.

Die Dauer der Ohnmacht ist gewöhnlich nur wenige Minuten, die höhern Grade halten länger an, der Scheintod soll zuweilen mehrere Tage fortbestehen. Erholen sich die Kranken wieder, so stellt sich ein leichtes Klopfen des Herzens ein, die Pupille wird beweglich, es kehrt allmälig die Wärme zurück und der Kranke kommt unter Seufzen, Gähnen und Dehnen der Glieder wieder zu sich, oft stellen sich hierbei Erbrechen, Abgang von Blähungen, stinkende Stuhlentleerungen und zuweilen auch Zuckungen ein.

§. 2057.

Anlage zur Ohnmacht haben schwache und sehr reizbare Individuen, insbesondere hysterische Personen.

Gelegenheitsursachen der Ohnmacht und des Scheintodes sind: *a*) solche, die die Blutmasse plözlich vermindern oder dieselbe zu den Lebensprozessen weniger tauglich machen, daher Blut- und Säfteverlust, alle Einflüsse, die das Athmen hemmen, wie das Einathmen irrespirabler und giftiger Gasarten und die Hemmung des Athmens auf mechanische Weise und eine plözliche Hemmung im Blutlauf, wie dieses durch manche Herzfehler geschieht, und *b*) solche, welche plözlich die

Nervenkraft schwächen und unterdrücken, insbesondere Gemüthsbewegungen, wie Schrecken, Zorn und Furcht, widrige Eindrücke auf die Sinne, grosse Körper- und Geistesanstrengung, heftige Schmerzen, Hunger, Kälte, gewisse Gifte, der Blizstrahl, alle Ursachen des Schlagflusses etc.

§. 2058.

Das **Wesen** der Ohnmacht ist eine plözliche, im ganzen Körper stattfindende Verminderung der Wechselwirkung zwischen Nerven und Blut und den übrigen, dem Nervensystem entgegenwirkenden Similartheilen, entweder erzeugt durch Verminderung des Blutes, so dass hierdurch die Nervenkraft auch so sehr geschwächt wird, dass sie nicht mehr auf die Muskeln einwirkt, oder durch unmittelbare Schwächung der Nervenkraft und Hemmung ihrer Thätigkeit. — Der Scheintod ist der Stillstand dieser Wechselwirkungen mit noch nicht erloschener Lebenskraft; wie auch ein ähnliches Ruhen der Kräfte bei dem nicht bebrüteten Hühnerei stattfindet.

§. 2059.

Was insbesondere den Scheintod der Ertrunkenen betrifft, so wird derselbe vorzüglich durch die Entziehung des feinen Pabulum vitae bedingt, welches durch das Athmen dem Körper mitgetheilt wird, zum Theil auch durch Blutüberfüllung im Gehirn, durch den gehinderten Blutlauf und vielleicht auch durch den bei dem Untertauchen in das kalte Wasser geschehenden Zurücktritt der Säfte aus der Peripherie nach den innern Theilen.

Der Scheintod bei Erhängten ist ebenfalls durch die Hemmung des Athmens und zugleich durch starke Blutüberfüllung im Gehirne hervorgebracht. Zuweilen wird auch das Rückenmark gezerrt.

Der Scheintod durch mephitische Gasarten wird durch die Hemmung des Athmens und wie es scheint zugleich durch eine hiebei stattfindende giftige Einwirkung auf

die Nerven erzeugt, die bei mehreren Arten der verdorbenen Luft, namentlich dem kohlensauren Gase, dem Kohlendampf und der Kloakenluft, ähnlich, wie bei narkotischen Giften sich äussert.

Der Scheintod der Erfrornen wird wahrscheinlich durch unmittelbare zerstörende Einwirkung der heftigen Kälte auf das Nervenleben und auch durch Zurückdrängung der Säfte aus der Peripherie nach den innern Theilen hervorgebracht.

Der Scheintod der vom Bliz Getroffenen ist durch heftige Erschütterung des ganzen Nervensystems und zum Theil auch durch Blutüberfüllung im Gehirne bedingt.

Die eine Art des Scheintodes der Neugebornen, bei welcher nämlich die Kinder ein aufgedunsenes und rothes Gesicht haben, ist durch Blutüberfüllung im Gehirne und gehemmten Lebensprozess in dem Mutterkuchen bedingt und durch langwierige Geburten, wobei die Nabelschnur zusammengepresst wird, veranlasst; die andere Art, bei welchen die Kinder blass aussehen und oft mager und klein sind, ist nicht in Unterdrückung der Lebenskräfte, sondern in wirklicher Verminderung derselben und der nöthigen Stoffe begründet und durch Schwächekrankheiten der Mutter, wobei die Ernährung des Kindes nicht gehörig von statten geht, durch Blutflüsse vor und während der Geburt, durch Gemüthsaffecte der Mutter und zuweilen durch eine Frühgeburt bedingt.

§. 2060.

Vorhersage. Die Ohnmacht ist in der Regel nicht sehr gefährlich, wenn nicht ihre Ursache fortdauert. Ueber das Verhältniss der Zahl der bei dem Scheintod gelingenden Rettungsversuche zu der der unglücklich sich endenden Fälle lässt sich Nichts angeben, da eine sichere Unterscheidung des Scheintodes von dem Tode nicht möglich ist.

§. 2061.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Ist die Ohnmacht durch verdorbene Luft erzeugt, so muss der Kranke sogleich in die frische Luft gebracht werden, und es müssen alle das Athmen und den Blutlauf hemmenden Bänder des Körpers gelöst werden; ist Oedigkeit die Ursache, so muss schnell etwas Fleischbrühe gereicht werden; noch fortdauernde Blutflüsse müssen aufs schleunigste gestillt werden; bei Blutüberfüllung im Gehirne muss zur Ader gelassen werden; sind heftige Schmerzen die Veranlassung der Ohnmacht, so muss Opium gegeben werden etc.

§. 2062.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um die gesunkenen oder ganz ruhenden Wechselwirkungen zwischen Nerven und Blut wieder herzustellen, bedienen wir uns dreier Wege: 1) wir suchen die Sensibilität wieder zu erwecken, 2) den Blutlauf wieder herzustellen und 3) den auf Blut und Nerven wirkenden Athmungsprozess wieder in Gang zu bringen.

§. 2063.

1) *Erweckung der Sensibilität.* Bei den Ohnmachten ist es gewöhnlich genügend, das Gesicht und die Brust des Kranken mit kaltem Wasser zu besprengen, Riechmittel von kölnischem Wasser, Hoffmännischen Tropfen, Naphthen, Salmiakgeist, Hirschhorngeist, ätherischen Oelen etc. anzuwenden, mit denselben Flüssigkeiten, oder mit Essig, aromatischem Essig, aromatischen Geistern etc. die Schläfe, die Brust und die Gliedmassen zu reiben, und wenn der Kranke schlucken kann, ihm einige Hoffmännische Tropfen in Wasser, etwas Wein und sodann auch Fleischbrühe einzuflössen; bei dem Scheintode wende man noch ausserdem an: starke Reibungen des Körpers, besonders der Handflächen, der Fusssohlen und des Rückens, mit rauhem und besonders

mit erwärmten Tüchern, mit Werg, Stroh oder mit Bürsten, Kizeln des Schlundes mit dem Finger oder mit einer in Oel getauchten Feder, das Auftröpfeln von scharfen Dingen auf die Zunge, Prikeln zwischen den Nägeln der Finger und der Zehen mit Nadeln, Senfteige auf verschiedene Stellen des Körpers gelegt, Peitschen mit Brennesseln, trockene Schröpfköpfe, das Auftröpfeln von Siegellack, Moxen, Tabaksrauchklystiere, die Electricität und den Galvanismus; auch hat man Einsprizungen von warmem Wasser und Milch und von Reizmitteln in die Adern empfohlen.

§. 2064.

2) *Wiederherstellung des Blutlaufes.* Wir vermögen auf dreierlei Weise erregend auf den Blutlauf zu wirken. 1) Durch Beförderung der centripetalen Blutbewegung vermittelst der alt-herkömmlichen Reibungen nach dem Verlaufe der Gefässe von der Peripherie gegen den Stamm des Körpers hin. Diese Methode ist sehr zweckmässig, da sie den Gang der Natur nachahmt, da auch *bei* der Entstehung des Thieres die Blutbewegung zuerst eine centripetale ist. — 2) Durch Erhöhung der Lebensthätigkeit in den Capillargefässen, vermittelst Anwendung der Wärme durch Auflegen von Ziegelsteinen auf die Fusssohlen, die innere Seite der Schenkel, die Herzgrube etc., und warme Sand- oder Aschbäder und vermittelst der allgemeinen Reibungen des Körpers, und 3) durch Erregung der Herzbewegung, vermittelst leichter electrischer Schläge, die man durch die Brust in der Herzgegend leiten kann, und der von *Carraro* bei Thieren mit Glück in Anwendung gebrachten Acupunctur des Herzens.

Diese neue, von *Carraro* empfohlene, Methode scheint zwar keineswegs gefahrlos zu sein und es ist daher immer mit den centripetalen Reibungen und der peripherischen Erwärmung der Anfang zu machen, doch ist

dieselbe keineswegs zu verwerfen und von ihr und noch mehr von der Electropunctur des Herzens allerdings etwas zu erwarten. Ich habe bei einem plözlich verschiedenen, früherhin gesunden Mädchen, nachdem mehrere Stunden hindurch die gewöhnlichen Belebungsversuche fruchtlos unternommen worden waren, eine Acupuncturnadel in das Herz eingeführt, worauf keine Herzbewegung wahrgenommen werden konnte; hierauf habe ich eine Acupuncturnadel, die durch ein an dem Griffe derselben befindliches Ringchen und eine Kette mit einer schwachen Electrisirmaschine in Verbindung gesezt war, in das Herz gesenkt und electrische Schläge durch dieselbe geleitet, worauf in der That mehrere Contractionen des Herzens erfolgten, die vermittelst des Stethoscops deutlich wahrgenommen werden konnten; doch wurde der Kreislauf hierdurch nicht hergestellt und das Mädchen nicht mehr zum Leben gebracht. Bei der Leichenöffnung zeigte sich kein Bluterguss in der Höhle des Herzbeutels.

§. 2065.

3) *Wiederherstellung des Athmens.* Man bläst dem Kranken Luft durch Mund und Nase ein, oder, was vorzuziehen ist, vermittelst einer Röhre, die man durch den Mund in den Kehlkopf bringt, unmittelbar in die Luftröhre, oder bringt, vermittelst eines geeigneten Blasbalges, reine atmosphärische Luft oder Sauerstoffgas in die Wege der Respiration; doch darf das Einblasen der Luft nicht mit zu grosser Gewalt geschehen, besonders bei Kindern. Nach jedem Act des Einblasens von Luft drückt man sanft die Brust von unten nach oben zusammen, wodurch ein abwechselndes Ein- und Ausströmen von Luft in die Lunge bewirkt und somit das Athmen nachgeahmt wird. In der Zeit, in welcher das Einblasen der Luft nicht fortgesezt werden kann, fächle man dem Kranken frische Luft zu.

§. 2066.

Diese Belebungsversuche müssen 5 bis 7 Stunden fortgesezt werden. Treten keine Erscheinungen des Lebens ein, so legt man den Körper noch so lange in ein warmes Bett oder ein warmes Sand- oder Aschbad, bis unzweifelhafte Zeichen des Todes sich einstellen.

§. 2067.

Die angegebene Verfahrungsweise passt im Allgemeinen in allen Arten des Scheintodes, doch muss die Behandlung auch nach der erregenden Ursache eingerichtet werden, und erhält hiernach verschiedene Modificationen.

§. 2068.

Die Ertrunkenen werden eine Zeit lang in eine solche Lage gebracht, dass der Kopf und insbesondere der Mund etwas nach unten liegt, so dass das Wasser aus dem Mund und der Lunge ausfliessen kann, doch ist das Aufheben an den Füssen (das Stürzen) verwerflich; ihr Mund muss von Schleim und Schlamm gereinigt werden, sie müssen abgetrocknet und in warme Tücher eingehüllt werden, wenn nämlich nicht das Ertrinken in eiskaltem Wasser statt fand, in welchem Falle die Behandlung des Scheintodes der Erfrornen eintreten muss. Hierauf sucht man die Sensibilität und den Blutlauf wieder herzustellen und bläst Luft ein. Zuweilen muss dem schon zu sich gekommenen Kranken zur Entleerung des Schleimes ein Brechmittel gegeben werden. Bei dringendem Verdacht von blutigem Schlag lässt man zur Ader.

§. 2069.

Erhängte bringt man nach schleuniger Lösung des Strickes in eine aufrechte Lage in frischer Luft und begiesst stark den Kopf mit frischem Wasser, zugleich öffnet man eine Vene am Arm und wenn das Blut nicht fliesst, eine Jugularvene, hierauf wird Luft ein-

geblasen und mit den übrigen Belebungsversuchen begonnen. Auf den gequetschten Hals kann man erweichende Bähungen machen lassen.

§. 2070.

Bei dem Scheintode durch das Einathmen mephitischer Dünste bringt man den Kranken sogleich in frische Luft und in eine aufrechte Lage, begiesst den Kopf und den ganzen Körper desselben eimerweis mit frischem Wasser und sprizt auch frisches Wasser in sein Gesicht und auf die Brust, zugleich öffnet man eine Ader, wäscht und reibt den ganzen Körper mit Essig und giebt Klystiere mit Essig. Auch wird Luft eingeblasen, der Körper mit Bürsten gerieben etc.; doch muss das Werfen mit Wasser mehrere Stunden fortgeseczt werden und darf nicht lange unterbrochen werden. Auch hat man empfohlen, ein der schädlichen Luftart entgegenwirkendes Gas in die Lunge zu bringen, wie z. B. bei Kloakenluft schwache Chlordämpfe, doch ist jedenfalls hierin grosse Vorsicht nothwendig. Ist der Kranke nicht mehr scheintodt, aber von tetanischen Krämpfen und andern schweren Zufällen befallen, so lässt man zur Ader, sezt die kalten Begiessungen, Essigwaschungen etc. fort, giebt dem Kranken innerlich frisches Wasser mit Essig und späterhin etwas Melissenthee, schwarzen Kaffe und andere gelind erregende Dinge.

Damit bei der Herausbringung aus dem mit mephitischer Luft gefüllten Raume kein neues Unglück sich ereigne, müssen sogleich die Luftlöcher geöffnet, grosse Massen Wasser oder Seifensiederlauge oder einer Auflösung von Chlorkalk hineingegossen und brennende Strohwische hineingeworfen werden, und die zur Rettung in jenen Ort sich begebenden Personen sich durch einen mit Essig oder verdünnten Salmiakgeist getränkten und vor den Mund gehaltenen Schwamm, durch Besprengung der Kleider mit kaltem Wasser oder einer Auflö-

sung von Chlorkalk, durch ein Seil, an das sie, um wieder herausgezogen werden zu können, gebunden werden, und, wo es vorhanden ist, durch ein Respirationsrohr sichern. Man kann erst mit weniger Gefahr sich in den gefährlichen Raum begeben, wenn ein in denselben gebrachtes Licht fortbrennt.

§. 2071.

Bei dem Scheintode durch Erfrieren muss man sich hüten, den Körper des Erfrorenen zu schnell zu erwärmen. Man bedecke denselben zuerst mit Schnee oder mit Tüchern in eiskaltes Wasser getaucht, oder bringe ihn in eine Wanne mit eiskaltem Wasser, bis der Körper etwas aufthaut, sodann reibe man ihn mit Tüchern, in etwas weniger kaltes Wasser getaucht, bringe ihn hierauf in ein mässig erwärmtes Bett und sodann auch in ein mässig erwärmtes Zimmer und vollführe nunmehr die gewöhnlichen Belebungsversuche mit gehöriger Vorsicht. Zuweilen ist auch eine Aderlässe nothwendig.

§. 2072.

Die vom Blize Getroffenen übergiesst man stark mit kaltem Wasser, besonders den Kopf derselben, lässt ihnen, wenn man Blutüberfüllung im Gehirn annehmen kann, zur Ader, hält ihnen Salmiakgeist unter die Nase, sprizt denselben, mit Wasser verdünnt, in die Nasenlöcher ein, lässt auch einige Tropfen auf die Zunge fallen und bringt die übrigen Belebungsversuche in Anwendung. Von Einigen ist empfohlen worden, die vom Blize Getroffenen in ein Erdbad zu bringen, das heisst, den Körper derselben in eine Grube zu legen und eine Hand hoch mit frischer Erde zu bedecken.

§. 2073.

Bei der ersten Art des Scheintodes der Neugebornen, der von Blutüberfüllung im Gehirne herrührenden, sorge man, dass die Nabelschnur nicht sogleich unterbunden

werde; kommt der Blutlauf nicht zu Stande, so wird die Nabelschnur abgeschnitten und etwas Blut entleert; ist dieses nicht mehr möglich, so sezt man ein bis zwei Blutegel auf die Brust und bringt das Kind in ein warmes Bad; zugleich reinigt man den Mund des Kindes und fängt mit Vorsicht an, Luft einzublasen; hierauf werden auch allmälig die übrigen Belebungsversuche in Anwendung gebracht.

Bei der zweiten Art, dem Scheintod aus Schwäche, lässt man das Kind längere Zeit in Verbindung mit dem Mutterkuchen, schlägt es in ein warmes Tuch ein, reinigt den Mund, bläst Luft ein und sucht auf die schon angegebene Weise den Blutlauf und die Sensibilität herzustellen; hierauf unterbindet man die Nabelschnur, legt das Kind einige Zeit in ein warmes Bad und sezt sodann die gewöhnlichen Belebungsversuche wieder fort.

Anhang zu den Nervenkrankheiten.

Zusammengesezte Krankheiten mit vorwaltender Nervenaffection.

Die durch Vergiftung entstandenen Krankheiten.

Gmelin (thier. u. min. Gifte, Lpz. 1776, n. Ausg. mit Vorrede v. Blumenbach, Erf. 1810, Pflanzengifte, Erf. 1803). — *Plenk* (Wien 1801). — *Jos. Frank* (Wien 1803). — *Buchner* (2te Aufl. Nürnb. 1827). — *Orfila* (2 Bde. Par. 1813, nach d. neuesten Aufl. deutsch herausgeg. v. Kühn, Lpz. 1830). — *Schneider* (2te Aufl. 1821). — *Guérin de Mamers* (Paris 1826). — *Marx* (Goett. 1827—29). — *Christison* (a. d. Engl. Weimar 1831, 3te Aufl. Edinb. 1836). — *Stucke* (toxicolog. Tabellen, Köln 1837).

§. 2074.

Krankheiten aus Vergiftung sind solche Krankheitszufälle, welche durch Stoffe erzeugt sind, die unmittelbar, das heisst, ohne zu grosse Erregung und ihre Folgen, die Lebenskräfte zu zerstören im Stande sind, und zwar, ohne dass dieses durch Zerstörung der Organisation geschieht.

§. 2075.

Die Vergiftungskrankheiten sind von verschiedenartigen Zufällen begleitet, je nachdem das eine oder das andere Gift eingewirkt hat; in den höhern Graden der Krankheit aber, in welchen die wesentlichen Vergiftungserscheinungen stärker hervortreten, stellen sie Krankheitsformen dar, die unter einander die grösste Aehn-

lichkeit haben, ja oft nicht von einander zu unterscheiden sind. Die meisten Gifte bringen zunächst in dem Theile, durch welchen sie aufgenommen worden sind, Störungen hervor, leichteres Magenweh oder heftigeren Magenkrampf, Erbrechen, selbst die Zufälle von Magenentzündung, Colik, Durchfälle oder auch Verstopfung, einige veranlassen Schmerz und Zusammenschnürung im Halse; die meisten verursachen bei höherm Grade der Wirkung Eingenommenheit des Kopfes, Kopfschmerz, zum Theil Betäubung, bei längerer Einwirkung einer geringeren Menge des Giftes einen kachektischen Zustand, sämmtliche Gifte bringen aber vorzüglich ein Gefühl von Auflösung der Körperkräfte und insbesondere ein Gefühl von Muskelschwäche hervor, sie bewirken, wenn sie in geringen Mengen, aber öfters genommen wurden, allmälig sich entwickelnde Lähmungen, und verursachen, wenn sie in grosser Masse in den Körper gekommen sind, heftige, meistens mit Unterdrückung des Bewusstseins verbundene tetanische Verdrehungen des ganzen Körpers, Lähmung, aussezendes Athmen und aussezenden Herzschlag und auf diese Weise den Tod.

§. 2076.

Bei den Leichenöffnungen findet man häufig die Schleimhaut des Magens und Darmkanals geröthet, zuweilen auch brandige Stellen in diesen Theilen, und das Gehirn, die Lungen etc. mit Blut überfüllt. Doch sind häufig diese und andere Veränderungen, die man etwa antrifft, nicht in dem Grade vorhanden, dass sie die genügende Todesursache sein konnten. Zuweilen bemerkt man auch eine Abweichung in der Beschaffenheit des Blutes.

§. 2077.

Ursachen. Die Substanzen, welche die oben bezeichnete Wirkung äussern, gelangen in der Regel durch die ersten Wege in den Körper, indem sie dahin bei

absichtlicher Vergiftung oder durch zufällige Beimengung zu den Nahrungsmitteln oder zu dem Schleime im Munde gebracht werden, zuweilen sind Gifte in der Atmosphäre enthalten und werden eingeathmet, andere werden durch Verwundung des Körpers beigebracht, wie z. B. das Gift giftiger Thiere etc.

§. 2078.

Wesen der Krankheit. Es entsteht die Frage: sind die Krankheitszufälle, welche durch die Vergiftungen hervorgebracht werden, eigenthümliche Krankheitsprozesse und demnach eigene Krankheitsarten, oder sind sie nur Zufälle, welche auch ohne die Einwirkung eines bestimmten Giftes zu Stande kommen können. Gewisse giftartige Stoffe gibt es, die offenbar eigenthümliche Krankheitsprozesse zur Folge haben, das sind die sog. contagiösen Gifte, wie z. B. das Wuthgift, indem durch dieselben specifische Prozesse erzeugt werden, wodurch das Contagium vervielfältigt wird; auch giebt es gewisse Gifte, die eine eigenthümliche Veränderung in den Säften und den festen Theilen bewirken, die auf specifische Krankheitsprocesse schliessen lassen; die den Giften allgemein zukommende Wirkung aber besteht in Krankheitszufällen, die auch ohne Vergiftung vorkommen und wir müssen daher, wenn wir nicht auf die erzeugende Ursache, sondern nur auf die Form der Krankheit sehen, die Vergiftungen zu jenen Krankheitsarten zählen, deren Form sie darstellen.

Untersuchen wir, welches die wesentlichen Krankheitszufälle der durch Gifte veranlassten Krankheiten sind, und zu welchen Krankheitsgattungen und Arten daher die Vergiftungen gehören, so werden wir erkennen, dass die oft vorkommenden fehlerhaften Absonderungen, Entzündungen und Congestionen es nicht sind, indem diese Zufälle oft fehlen oder nur in einem geringen Grade vorhanden sind und doch die tödliche Wirkung

des Giftes eintritt. Ein Zufall, der bei allen Vergiftungen sich einstellt, wenn das Gift in grosser Menge gewirkt hat, sind allgemeine Krämpfe, die die Form der Eclampsia darstellen; aber auch zu dieser Krankheitsart können die durch Vergiftung entstandenen Krankheiten nicht gezählt werden, da bei allmäliger Wirkung des Giftes die Eclampsie oft nicht entsteht, sondern nur allmälig sich Lähmungen ausbilden. Diese einzige, allen Giften gemeinschaftliche und unter allen Verhältnissen eintretende Wirkung ist die Auflösung der Lebenskräfte, die in den höhern Graden die Lähmung darstellt, und wir müssen demnach die durch Vergiftung erzeugten Krankheiten ihrer wesentlichen Erscheinung nach zu den Adynamien zählen.

Eine Adynamie oder Lähmung, die also die wesentliche Erscheinung aller Vergiftungen ist, kann auf zweierlei Weise entstehen, durch Ueberreizung und durch unmittelbare Schwächung. Manche Gifte bringen nun allerdings zuweilen Entzündungen und Congestionen hervor, die für sich schon tödtlich werden können, unter andern Verhältnissen äussern aber die nämlichen Gifte ihre giftige Wirkung, ohne dass die erregende Wirkung in einem solchen Grade eingetreten wäre, dass die Zerstörung des Lebens die Folge davon hätte sein können. Die Gifte unterscheiden sich demnach von andern Stoffen, die auch in kleinen Gaben sehr nachtheilig wirken können, wie z. B. den Naphthen, dadurch, dass sie nicht, wie diese, blos durch zu starke Erregung und dadurch bewirkte Congestion, Blutextravasat, Entzündung etc. dem Leben nachtheilig werden, sondern ohne Ueberreizung das Leben zu zerstören vermögen.

Diese unmittelbare Zerstörung der Lebenskräfte könnte dadurch bewirkt werden, dass die Gifte, die in die Wege des Blutumlaufes zu gelangen pflegen, das Blut in der Art verändern, dass es nicht mehr im Stande ist,

die Lebensprozesse, die in der Wechselwirkung zwischen Nerven und Blut bestehen, nämlich die Blutbewegung, die Wärmebildung, die Absonderungen und die Ernährung zu unterhalten, und es bringt auch theilweise das Gift diese Wirkung hervor, die Hauptwirkung des Giftes besteht aber nicht in den so eben bezeichneten Störungen, indem oft Blutbewegung, Wärmebildung etc. noch unverändert fortdauern, nachdem schon schwere Vergiftungszufälle eingetreten sind, es äussert sich vielmehr die Vergiftung, vorzüglich in Störungen solcher Lebensprozesse, an welchen das Blut keinen Antheil nimmt, nämlich in Störungen der Sinnesverrichtungen und der Muskelbewegung.

Es ist nun allerdings auch möglich, dass die Gifte zuerst das Blut verändern und dadurch nur secundär die Nerventhätigkeit zerstören, indem sie das Blut unfähig machen, den Reiz dem Nervensystem zu gewähren, welcher auch zur Fortdauer der rein-sensiblen Verrichtungen nothwendig ist, doch ist auch dieses nicht die alleinige Wirkung der Gifte, indem bei Fröschen, die man ganz von Blut entleert, doch noch geraume Zeit Empfindung, Bewegung und Bildung von Vorstellungen fortdauern, während sie durch Gifte sehr schnell getödtet werden können.

Diesemnach müssen wir annehmen, dass die Gifte (und zwar vorzüglich, wenn sie resorbirt sind) dadurch wirken, dass sie unmittelbar die Nervenkraft zerstören (das in den Nerven wirkende Agens neutralisiren), wobei, bis dieses vollständig bewirkt ist, Unordnungen in den Bewegungen im Nervensysteme nothwendigerweise eintreten müssen.

Aus dieser Erklärung der Wirkungsart der Gifte geht auch hervor, wie die Gifte als Arzneimittel wirken können, indem sie in kleinern Gaben genommen, dem Nervensystem nicht das in ihm wirkende Etwas ganz

entziehen, sondern es nur vermindern, wo es z. B. zu sehr angehäuft ist, oder in zu reichlichem Grade sich entwickelt, und daher Schmerzen und Krämpfe stillen, was auch metallische Gifte zu thun vermögen, wie z. B. Zinkpräparate, das salpetersaure Wissmuthoxyd, das salzsaure Silber etc.

Nehmen wir diese unmittelbare, nicht auf dem Wege der Ueberreizung erfolgende Zerstörung der Lebenskräfte als die wesentliche Wirkung der Gifte an, und sezen wir in das Vorhandensein dieser Eigenschaft das characteristische Merkmal von Gift, so werden wir den gewöhnlich begangenen Fehler in der Begriffsbestimmung von Gift vermeiden, nämlich in der geringen Menge, in welcher ein Stoff wirkt, das wesentliche Merkmal des Giftes zu suchen, was aus vielfachen Gründen unstatthaft ist.

§. 2079.

Behandlung: a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Lässt sich annehmen, dass das Gift noch im Magen des Kranken befindlich ist, so muss schleunigst dasselbe ausgeleert werden. Bei nicht scharfen Giften giebt man sogleich ein Brechmittel, wozu gewöhnlich das schon von *Boerhave* bei Vergiftungen gerühmte Zincum sulphuricum gewählt wird, weil es am schnellsten wirkt und nicht leicht Durchfälle erregt. Man giebt dasselbe zu 6 — 12 Granen auf einmal und sodann alle 5 — 10 Minuten 6 Grane und auch mehr, bis die Wirkung eintritt. Bei scharfen Giften wird gewöhnlich die Anwendung der eigentlichen Brechmittel missrathen, weil durch dieselben die ohnehin bestehende grosse Reizung noch vermehrt werden würde, man empfiehlt dagegen grosse Mengen warmes Wasser, schleimige Dinge, Seifenauflösung etc. trinken zu lassen, und den Schlund vermittelst des in denselben eingebrachten Fingers zu reizen, damit Erbrechen erfolge, wo dieses etwa nicht

durch das Gift selbst in hinreichender Stärke erregt worden ist; es hängt übrigens immer von den gerade obwaltenden Umständen in dem einzelnen Falle ab, ob ein eigentliches Brechmittel bei der Einwirkung scharfer Gifte gegeben werden darf oder nicht, indem es auch Fälle giebt, in welchen ein Brechmittel nothwendig wird, indem Gift, das im Magen liegen bleibt, auch auf die Gefahr hin, die Entzündung im Augenblick noch zu vermehren, hinweggeschafft werden muss. Endlich bedient man sich auch zur Hinwegbringung des Giftes mit grossem Vortheil der Magenpumpen (von *Read*), durch welche wiederholt lauwarmes Wasser in den Magen gebracht und, nachdem dasselbe von dem Gift in sich aufgenommen hat, wieder ausgezogen wird.

So lange noch Gift in dem Magen sich befindet, dürfen keine Abführungsmittel gegeben werden, ist dagegen dieses nicht mehr der Fall und vermuthet man, dass von dem Gifte in die dünnen und dicken Gedärme gelangt sei, so sucht man dasselbe nach unten durch geeignete Abführungsmittel, z. B. Ricinusöl, auszuleeren.

§. 2080.

Um das in den ersten Wegen liegende Gift, das meistens nicht ganz vollkommen ausgeleert werden kann, unschädlich zu machen, sucht man es zu verdünnen, einzuhüllen und mit Stoffen zu vereinigen, mit welchen dasselbe, chemisch verbunden, eine weniger schädliche Substanz darstellt. — Zu den beiden erstern Zwecken lässt man den Kranken warmes Zuckerwasser, Eibischthee, Milch, Magsaamenöl, Oliven- oder Süssmandelöl, frische Butter, Eiweiss, warmes Seifenwasser etc. in reichlicher Menge nehmen, wählt jedoch unter diesen Mitteln jedes Mal diejenigen, die der Erfahrung gemäss, oder wegen ihrer chemischen Eigenschaft bei dem eingenommenen Gifte vorzugsweise passen. — Zum leztern Zwecke giebt man solche Mittel, die mit dem Gifte in

chemische Verbindung eingehen, und entweder eine Substanz bilden, die keine giftige Eigenschaft mehr besizt oder wenigstens in geringerm Grade die giftige Wirkung äussert, indem sie z. B. im Wasser unlösliche Stoffe bilden. Die Unlöslichkeit einer Substanz im Wasser gewährt übrigens keine Bürgschaft, dass dieselbe nicht giftig wirke, indem der Magen manche Stoffe auflöst, die das Wasser für sich nicht zu lösen im Stande ist, und man kann daher nur diejenigen Mittel mit Sicherheit als Gegengifte betrachten, die auch durch die Erfahrung als solche bestätigt worden sind.

§. 2081.

Ist das Gift vermittelst einer Verwundung *beigebracht* worden, so sucht man dasselbe aus der Wunde auszuziehen, oder es in derselben einzuhüllen, oder zu zerstören; man wascht daher die Wunde sorgfältig aus, saugt sie aus, sezt Schröpfköpfe oder eine Luftpumpe auf dieselbe, bringt erwärmtes Baumöl in sie ein und reibt zugleich dasselbe in die Umgegend ein; man scarificirt und äzt die Wunde oder schneidet sie aus und erhält die Eiterung in derselben; auch unterbindet man das verlezte Glied oder nimmt es bei sehr schnell tödtlich werdenden Giften schleunigst hinweg.

§. 2082.

Ist die giftige Materie auf dem Wege des Athmens in die Lunge gelangt, so bringt man schnell den Kranken in frische Luft, die man auch bei mangelndem Athmen einblasen kann und lässt auch Stoffe einathmen, die die giftige Substanz neutralisiren; doch muss man sich hüten, durch dieses Verfahren die Lunge zu sehr zu reizen.

§. 2083.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Um den Blutandrang nach dem Kopfe, welcher vorzüglich bei den mit Eclampsie verbundenen Ver-

giftungen statt findet, zu mässigen, kann man vorerst die kalten Begiessungen des Kopfes zu Hilfe ziehen. Zu demselben Zwecke, so wie gegen die Entzündung in dem Magen und andern Organen dienen Blutentleerungen. Ich habe kräftige Aderlässe in einem Falle von Vergiftung durch Blausäure, in zwei Vergiftungen durch Kohlendampf, zwei durch Kloakenluft und in einem durch Blei, in welchen sämmtlichen Fällen heftige Eclampsie vorhanden war, mit dem grössten Nuzen in Anwendung gebracht. Ich halte dafür, dass durch dieses Mittel nicht allein die Congestion nach dem Gehirne und die sich etwa entwickelnden Entzündungen gehoben werden, sondern dass dasselbe auch dadurch wirke, dass hierdurch auch der Hauptträger des Giftes, zu welchem es auf dem Wege der Aufsaugung gelangt und von wo aus es auf die Nerven wirkt, nämlich das Blut, theilweise entleert wird, wornach es den Nervenkräften, besonders wenn die Säfte zugleich durch reichliches mildes Getränk verbessert werden, eher möglich wird, dem Gifte zu widerstehen, und auf diese Weise erleichtert, mit dem Reste des Blutes die Lebensprozesse fortzusezen. Durch Mässigung der Congestionen und Verbesserung der Säfte wirken vielleicht auch die bei vielen Vergiftungen sehr gerühmten Pflanzensäuren mit reichlichem Wasser verdünnt. Um die Krämpfe zu mässigen, können ausser der eben angegebenen, vorzüglich bei den mit Unterdrückung der Gehirnthätigkeit verbundenen Krämpfen (Eclampsia) passende Methode, auch verschiedene andere besänftigende Mittel, wie z. B. Bäder, zu Hilfe gezogen werden. Das Opium, das früher als ein Hauptmittel in den meisten Vergiftungen angesehen wurde, kann wohl nur dann in Anwendung gebracht werden, wenn die Krämpfe nicht mit einer Unterdrückung der Gehirnthätigkeit in Verbindung stehen. — Gegen die die eigentlich wesentliche Erscheinung der Vergiftung

bildende Auflösung der Kräfte und die Lähmungen dient endlich, so weit die Unordnung in der Blutbewegung diese Mittel zulässt, die erregende Methode, der schwarze Kaffe, die versüssten Säuren, die Naphthen, das Ammonium, der Wein, die Angelica, Serpentaria, Arnica, China, Reibungen des Körpers mit geistigen und aromatischen Stoffen etc.

§. 2084.

Die Vergiftungskrankheiten können nach Verschiedenheit der Nebensymptome, die die wesentlichen Erscheinungen der Vergiftungen begleiten, in folgende Ordnungen eingetheilt werden: 1) Die Vergiftungen durch narkotische Substanzen. 2) Die Vergiftungen durch scharfe Gifte. 3) Die durch austrocknende Gifte und 4) die durch septische Gifte.

1) Vergiftungen durch narkotische Substanzen.

§. 2085.

Die narkotischen Vergiftungen können in Hinsicht ihrer Erscheinungen in drei Reihen getheilt werden: *a)* in eine solche, in welcher dem Narcotismus keine oder nur eine unbedeutende Erregung vorausgeht, *b)* in diejenige, in welcher im Anfange der Wirkung des Giftes eine deutliche Gefäss- und Nervenerregung, wie auf den Gebrauch erhizender Reizmittel, sich einstellt, und *c)* in diejenige, in welcher Erscheinungen sich kund geben, wie nach dem Gebrauche scharfer Mittel. Die Vergiftung durch Blausäure, die durch Opium und die durch Belladonna mögen als Repräsentanten dieser drei Ordnungen angeführt werden.

§. 2086.

a) *Die Vergiftung durch Blausäure.* Die ersten Zeichen der zu starken Wirkung der Blausäure sind: das Gefühl von Auflösung der Kräfte, Schwindel, Kopfschmerz, Uebelkeit, Erbrechen und zuweilen etwas Magenweh; im höhern Grade des Uebels sehr erweiterte Pupillen, nur wenn Krämpfe sich einstellen, Verengerung derselben, Verlust des Sehvermögens, die Augen sind fest anzufühlen, die Augenlieder hängen herab und haben varicös ausgedehnte Gefässe, der Herzschlag wird schwankend und aussezend, es gesellen sich unwillkürliches Zittern und sodann heftige Krämpfe, Trismus, furchtbare Verdrehungen der Glieder und Verzerrung der Gesichtsmuskeln und vollkommener allgemeiner Starrkrampf mit Bewusstlosigkeit hinzu, der Koth und der Harn gehen unwillkürlich ab, oft ergiesst sich auch der Samen, im höchsten Grad des Leidens macht das Athmen grosse Pausen, und der Herz- und der Arterienschlag scheinen zu verschwinden, der Kranke fällt in Scheintod.

Diese verschiedenen Grade der Vergiftung folgen nicht immer in der angegebenen Reihenfolge aufeinander, es stellt sich oft sogleich der höchste Grad ein, so dass selbst die Kranken unmittelbar nach der Aufnahme des Giftes wie vom Blize getroffen niederstürzen und augenblicklich sterben; auch folgen die leichtern Grade auf die heftigen, wenn Besserung zu Stande kommt; zuweilen folgen noch Zufälle von Hirnentzündung und es bleibt einige Zeit ein Schmerz in der Tiefe der Augen und der Schläfen, und im Hinterhaupte und manchmal auch Empfindlichkeit des Magens zurück. Bis zum völligen Verschwinden der Vergiftungssymptome dauert es oft mehrere Tage und länger.

In den Leichnamen findet man meistens die Gefässe des Gehirns mit Blut überfüllt, zuweilen auch entzündliche Stellen in der Lunge, dem Magen und dem Darm-

kanal, das Blut sehr dunkel und den Blausäuregeruch zeigend.

§. 2087.

b) *Die Vergiftung durch Opium.* Es äussert sich die zu starke Wirkung des Opiums durch starke Erregung des Gefäss- und Nervensystems, einen häufigen und vollen Puls, Turgescenz der Haut, Schweisse, zuweilen mit symptomatischen Ausschlägen verbunden, Aufregung des Gehirns, eine Art Rausch, hierauf Abgespanntheit und tiefen Schlaf. — Nach wiederholten Einwirkungen der Art werden das Gehirn und die Sinne abgestumpft und der Kranke selbst blödsinnig. — Nach sehr grossen Gaben ist der Zeitraum der Aufregung kurz, wildes Herumschweifen der Augen, Verengerung der Pupillen, Lichterscheinungen, wildes Delirium, aufgetriebenes blaurothes Gesicht, bald hierauf der tiefste Sopor, Unbeweglichkeit der Pupillen und pralles, mit überfüllten Blutgefässen durchzogenes Auge, erschwertes, schnarchendes, zuweilen aber auch unmerkliches Athmen, ein wankender, aussezender Puls in immer grössern Pausen, auf welche Weise oft das Leben erlöscht, meistens aber Trismus, krampfhafte Verdrehungen der Glieder und allgemeiner Starrkrampf, unter welchem der Tod zuweilen nach hinzugekommenem Schlaganfall eintritt.

In den Leichen trifft man Blutüberfüllungen im Gehirne und Entzündungen in verschiedenen Organen, insbesondere dem Magen und dem Darmkanal an.

§. 2088.

c) *Die Vergiftung durch die Belladonna.* Es entsteht Trockenheit im Halse, erschwertes Schlingen und Zusammenschnürung des Halses, oft auch Empfindlichkeit in der Magengegend und Erythemata im Gesichte und andern Theilen des Körpers, Gesichtstäuschungen, zuweilen Verengerung, meistens aber Erweiterung der

Pupillen, Schwindel und Kopfschmerz; in höhern Graden der Vergiftung heftige Schmerzen im Halse, Würgen und entzündliche Geschwulst der Mandeln, Erbrechen, Magenkrampf, wildes Irrereden und Neigung zum Beissen, sodann Sopor, Trismus, heftige Verdrehungen der Glieder, Starrkrampf, unwillkürlicher Abgang des Kothes, Tod meistens durch Schlagfluss.

Die Leichenöffnungen geben ungefähr dieselben Resultate wie bei den Vergiftungen durch die Blausäure und das Opium, doch sind hier meistens der Magen, Darmkanal und Schlund mehr entzündet.

§. 2089.

In der **Behandlung** der narkotischen Vergiftungen ist eine vorzügliche Aufgabe, das Gehirn zu schüzen, wesswegen sogleich kräftige Begiessungen des Kopfes mit kaltem Wasser vorgenommen werden und nach Umständen auch eine und selbst mehrere Aderlässe unternommen werden müssen. — Das Gift sucht man durch Brechmittel zu entleeren. — Die Gegengifte scheinen meistens das nicht zu leisten, was man sich von ihnen verspricht. Gegen die Blausäure sind gerühmt worden: das Olivenöl, die Milch, das Chlor, das Ammoniak (beide Mittel lässt man in Gasform einathmen und auch innerlich gebrauchen), das kaustische Kali, der concentrirte Kaffe, das Terpenthinöl, das schwefelsaure Eisen, das Opium; gegen Opium der Weinessig und andere vegetabilische Säuren, die übrigens nach *Orfila*, so lange das Gift nicht durch Erbrechen ausgeleert ist, eher schaden, und daher erst nach Entleerung des Giftes gegeben werden dürfen, der Kaffe, die Galläpfel oder die Eichenrinde, Weidenrinde, China, eine Auflösung von Chlor, der Kampher; gegen die Tollkirsche vegetabilische Säuren, schwarzer Kaffe, Milch, Essignaphtha, Ammonium, Opium; gegen Hyoscyamus vegetabilische

Säuren, Kaffe, Terpenthinöl; gegen den Stechapfel die Citronensäure etc.

Gegen den nach einer Blausäurevergiftung noch einige Tage andauernden schwarzen Staar (den ich aus einer Apoplexia retinae herleitete) habe ich mit günstigem Erfolg Blutegel in die Umgegend des Auges gesezt und kalte Umschläge auf den Kopf und das Verdunsten des Schwefeläthers auf der Umgegend des Auges angewandt.

2) Vergiftungen durch scharfe Gifte.

§. 2090.

Die Vergiftung durch Arsenik. In der acuten Arsenikvergiftung treten die Zufälle so rasch auf, dass der Tod in wenigen Stunden erfolgen kann. Dieselben sind (nach *Orfila*) folgende: herber Geschmack, stinkender Mund, häufiger Speichelfluss, fortwährendes Ausspucken, Zusammenziehung des Schlundkopfes und der Speiseröhre, Stumpfheit der Zähne, Schluchzen, Eckel, Erbrechen bald bräunlicher, bald blutiger Stoffe, Angst, häufiges Schwinden der Sinne, Hize in der Präcordialgegend, Entzündung der Lippen, der Zunge, des Gaumens, der Speiseröhre, ein so schmerzhafter Magen, dass die mildesten Getränke nicht ertragen werden, Darmentleerungen von einer schwarzen Farbe und einem unerträglichen Geruche, kleiner, häufiger, zusammengezogener und unregelmässiger, bisweilen langsamer und ungleicher Puls, Herzklopfen, Ohnmachten, unauslöschlicher Durst, heftige Hize über den ganzen Körper, Empfindung eines verzehrenden Feuers, bisweilen Eiskälte, erschwertes Athmen, kalte Schweisse, sparsamer, rother und blutiger Urin, Veränderung der Gesichts-

züge, ein missfarbiger Ring um die Augenlieder, Geschwulst und Jucken am ganzen Körper, der mit missfarbigen Flecken und zuweilen mit einem frieselartigen Ausschlag sich bedeckt, Sinken der Kräfte, Verlust der Empfindung, namentlich an den Händen und Füssen, Irrereden, Convulsionen, oft von einem unerträglichen Priapismus begleitet, Ausfallen der Haare, Ablösung der Oberhaut, endlich der Tod.

Diese Symptome sind selten alle bei einem Individuum vorhanden, doch zuweilen zu verschiedenen Zeiten, wenn die Krankheit mehrere Tage dauert, auch gibt es seltene Fälle, in welchen diese Erscheinungen beinahe gänzlich fehlen und die Kranken blos unter Ohnmacht sterben.

§. 2091.

Die chronische Form äussert sich durch Verdauungsbeschwerden, Neigung zum Erbrechen, chronisches Magenweh, Durchfälle oder Verstopfung, vermehrte Speichelabsonderung, asthmatische Zufälle, Husten, Verlust der Kräfte, cachectisches Aussehen, Abmagerung, hektisches Fieber, ödematöse Geschwülste, flechtenartige Ausschläge und rothlaufartige Entzündungen, Geschwüre, pergamentartige Vertrocknung der Haut, Ausgehen der Haare, herumziehende Schmerzen, Lähmungen, besonders der untern Gliedmassen, Abstumpfung des Geistes. Der Tod stellt sich oft erst nach mehreren Monaten oder Jahren ein.

§. 2092.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Meistens zeigen sich im Munde, der Speiseröhre und vorzüglich im Magen und Darmkanal entzündete Stellen, brandige Flecken, Krusten, Durchlöcherungen, die Schleimhaut des Magens breiartig erweicht und braunroth, das Herz entzündet und gefleckt, blaue, von Blutextravasat herrührende Flecken auf der äussern Haut und verschiedenen

innern Theilen, die Venen mit flüssigem, schwarzem Blut überfüllt, die Fäulniss macht langsame Fortschritte. Bei schnell eingetretenem Tode findet man zuweilen gar keine Veränderungen in den Geweben.

§. 2093.

Behandlung. Vorerst muss der im Magen liegende Arsenik durch Erbrechen ausgeleert werden, zu welchem Zwecke meistens die Darreichung von reichlichem, lauwarmen Wasser, Zuckerwasser, Honigwasser, Milch, Eibischabkochung etc. und das Reizen des Gaumens mit dem Finger genügen. Sollte hierauf nicht bald Erbrechen erfolgen, so muss dieses allerdings durch ein Brechmittel erregt werden. Die vielen, gegen den Arsenik empfohlenen Gegengifte haben sich sämmtlich nicht bewährt, mit Ausnahme der Hydrothionsäure und des Kalkwassers in dem Falle, wenn die arsenige Säure (der weisse Arsenik) in flüssiger Form beigebracht worden ist, in welchem Falle das erstere Mittel mit reichlichem Wasser verdünnt, das leztere mit Milch gegeben werden kann. Ueber das von *Bunsen* und *Berthold* als Gegengift des Arseniks gerühmte Eisen-Oxydhydrat müssen noch weitere Versuche entscheiden. Im Uebrigen gibt man blos die oben erwähnten Getränke fort, indem auch fette Stoffe, wie Oel, Butter etc., in dieser Vergiftung eher nachtheilig als nüzlich wirken sollen. — Um die Folgen des Giftes zu bekämpfen, sezt man Blutegel, lässt zur Ader, lässt besänftigende Umschläge auf die Magengegend legen, verordnet lauwarme Bäder, erweichende Klystiere, bei heftigen Schmerzen und Krämpfen Opium etc.

§. 2094.

Auf eine ähnliche Weise werden die übrigen Vergiftungen durch scharfe Stoffe behandelt. Bei der Sublimatvergiftung empfiehlt *Orfila* mehrere Gläser Eiweiss (das Gegengift des Sublimates), in Wasser gelöst, nehmen

zu lassen, oder wenn dieses nicht sogleich vorhanden ist, mit einer Abkochung von Leinsamen, Eibischthee, Zuckerwasser oder blosem Wasser von 25 bis 30 Graden Wärme den Magen anzufüllen, worauf es gewöhnlich zum Erbrechen kommt. *Taddäi* rühmt Weizenmehl mit Wasser angerührt, da der Kleber den Sublimat in versüsstes salzsaures Quecksilberoxydul verwandle. — Bei Kupfervergiftung wird von *Orfila* ebenfalls Eiweiss empfohlen. — Bei Vergiftung durch Antimonialpräparate, wenn nicht Erbrechen zu Stande kommt, die Galläpfel (4 bis 5 zerstossene Galläpfel mit zwei Maas Wasser gekocht und hievon einige Gläser voll gegeben), auch China in Ermanglung derselben und Eichen- oder Weidenrinde. — Bei Vergiftung durch den Höllenstein Küchensalz mit einer grossen Menge Wasser. — Bei der Aufnahme von concentrirten Säuren in den Magen die verkalkte Magnesia mit Wasser (1 Unce auf 1 Maas Wasser) und in deren Ermanglung Seife in Wasser aufgelöst ($\frac{1}{2}$ Unce in eine Maas Wasser) und auch Kreide etc. — Bei der von äzenden Alkalien der Essig und der Citronensaft (jedesmal 2 Löffel voll in einem Glas Wasser) etc.

3) Die Vergiftungen durch austrocknende Gifte.

§. 2095.

Die Bleivergiftung. Diese äussert sich vorzüglich durch Coliken, welche immer von neuem zurückkehren und oft sehr heftig werden, der Bauch ist in der Nabelgegend gegen die Wirbelsäule hingezogen und der Koth geht nur in kleinen, harten Stücken, wie Schafkoth ab, oder es ist gänzliche Verstopfung vorhanden; oft sind

Eckel und Erbrechen und Beängstigung zugegen; der Kranke erhält ein blasses, cachectisches Aussehen, magert ab, und es stellen sich Schmerzen in den Gliedern, Krämpfe, Ohnmachten und Lähmungen ein. In einem Falle sah ich Trismus und heftige tetanische Krämpfe des ganzen Körpers, mit Abwesenheit des Bewusstseins und Verdrehung der Augen, ähnlich den Krämpfen bei Blausäurevergiftung, entstehen. — In den Leichnamen findet man öfters Spuren von Entzündung auf der Schleimhaut des Magens und des Darmkanals oder schwärzliche Flecken von extravasirtem Blute oder venöser Ueberfüllung der feinsten Gefässchen. *Orfila* hat nach grossen Gaben von Bleiauflösung bei Thieren einen häutigen, dicken, aschgrauen Ueberzug, der sich leicht in Flocken ablöste, auf der innern Fläche des Magens gefunden; den Dickdarm, besonders das Colon trifft man zusammengezogen an.

§. 2096.

Behandlung. Da in der Regel das Blei nur nach und nach in den Körper gelangt, so kann die Erregung des Erbrechens keinen grossen Nuzen gewähren. Als Gegengifte sind vorzüglich die schwefelsauren Salze, namentlich Natrum sulphuricum und Magnesia sulphurica im Gebrauche, welche dadurch wirken sollen, dass die Schwefelsäure mit dem Blei sich zu dem unauflöslichen schwefelsauren Blei vereinigt, aber, da oft von dem Blei wenig oder nichts mehr in dem Darmkanal vorhanden sein dürfte, wie es scheint noch mehr dadurch nüzen, dass sie einer Hauptwirkung des Bleies, nämlich der Austrocknung und Verstopfung, entgegenwirken, wie auch eine Senneaufguss und das Ricinusöl mit Vortheil gegeben werden. Nebst diesen Mitteln gibt man Oelmixturen, und was noch nüzlicher ist, Butter in grossen Massen und angemessene Gaben von Opium. In dem oben erwähnten Fall von starker Vergiftung wandte

ich, nebst den so eben angegebenen Mitteln eine Aderlässe mit gutem Erfolg an. Auch können Klystiere, Bäder und andere, den Umständen entsprechende Mittel zu Hülfe gezogen werden.

4) Die Vergiftungen durch septische Gifte.

§. 2097.

Unter den bezeichneten Vergiftungen versteht man diejenigen, in welchen die Säfte eine aufgelöste Beschaffenheit erhalten und die festen Theile eine vorzügliche Neigung in den Brand überzugehen zeigen; es kommen übrigens beide Erscheinungen auch bei andern Vergiftungen vor, z. B. eine Veränderung der Blutmasse bei der Blausäurevergiftung und die Neigung zum Brande bei der Arsenikvergiftung, und anderer Seits fehlen bei den septischen Vergiftungen die heftigen Nervenaffectionen keineswegs. Zu den septischen Vergiftungen können gerechnet werden: 1) die durch Kloakenluft, Kohlendampf, kohlensaures Gas etc. bewirkten Vergiftungen bei welchen das Blut sich immer verändert zeigt, die aber eben so sehr narkotische Wirkungen äussern und deren Behandlung in dem Kapitel von dem Scheintod schon angegeben worden ist, 2) die durch in Fäulniss übergegangene Stoffe erzeugten Vergiftungen, wohin *Orfila* die Vergiftung durch verdorbene Würste zählt, und 3) die von giftigen Thieren verursachten Vergiftungen. Zu den leztern gehören auch die durch das Gift des Milzbrandes erzeugte Krankheit und die Hundswuth, welche ich aber, da sie zu gleicher Zeit contagiöse Krankheiten sind, in besondern Kapiteln abhandeln werde.

§. 2098.

Die Vergiftung durch verdorbene Würste *). Die Vergiftungserscheinungen zeigen sich 12 — 24 Stunden nach der Aufnahme des Giftes und sind folgende: grosses Mattigkeitsgefühl, brennender Schmerz in der Magengegend, Erbrechen von blutigen Materien und von Stoffen, die nach der verdorbenen Wurst riechen, Starrheit der Augen, Erweiterung und Unempfindlichkeit der Pupillen, Doppeltsehen; Unbeweglichkeit der Augenlieder, Veränderung und Unterdrückung der Stimme, erschwertes Athmen, kaum fühlbarer Herzschlag, Ohnmachten, erschwertes Schlucken, Unterdrückung aller Absonderungen, Verstopfung und harte Excremente, wie von Erde und mit Galle nicht gefärbt, kalte, trockene Haut, ein Gefühl von Reissen in den Gliedern, Tod unter leichten Convulsionen oder allmäligem Erlöschen des Athmens und Verschwinden des Herzschlages.

Die Leichen sind oft steif und hart, wie Erfrorne, zuweilen aber auch schlaff, die innern Organe, besonders Gehirn, Lunge, Leber und Milz, strozen von blauschwarzem, aufgelöstem Blute, blutiger Schleim ist in den Bronchien, blutige oder sonst veränderte Galle in der Gallenblase, Spuren von Entzündungen in verschiedenen Organen und im Zwerchfells- und dem herumschweifenden Nerven.

§. 2099.

Ursachen: Diese Krankheit wird durch verdorbene, schlecht bereitete, insbesondere unvollkommen geräucherte Blut- und Leberwürste erzeugt und kommt besonders in Würtemberg vor. *Kerner* hält das Gift für eine Säure und bezeichnet dasselbe als Fett-, Leichen-, Thier- oder Blutsäure.

*) *Kerner* hat diese Vergiftung zuerst beschrieben (Tübingen 1820 und Stuttgart 1822). — *Kühn* (Lpz. 1824). — *Weiss* (mit einer Vorrede und Anhang von Kerner, Karlsruhe 1824).

§. 2100.

Behandlung. Zuerst sind Brechmittel und sodann abführende Mittel nothwendig. Als specifische Gegenmittel sind von *Kerner* die alkalische Schwefelleber (5—10 Grane Schwefelleber in 1 bis 2 Pfund Wasser aufgelöst), von *Weiss* die Milch und von *Steinbuch* die Terra Catechu empfohlen worden. Nach den erregten Krankheitszufällen sind meistens im Anfange eine Aderlässe und späterhin erregende Mittel erforderlich.

§. 2101.

Die *Vergiftung durch den Biss giftiger Schlangen*, besonders der in heissen Ländern einheimischen. Die Erscheinungen sind: ein heftiger Schmerz in der Wunde, welcher sich über das ganze Glied ausbreitet, hierauf Geschwulst, welche meistens zuerst fest und blass ist und hierauf röthlich, bleifarben und brandig wird, die lymphatischen Gefässe insbesondere sind angeschwollen und geröthet und die Drüsen angeschwollen, grosse Mattigkeit, Erbrechen, Trismus, allgemeine Krämpfe, oft Empfindlichkeit des Magens, Gelbsucht, Sinken des Pulses, erschwertes Athmen, kalte, starke Schweisse. Der Tod erfolgt oft, besonders wenn eine bedeutende Blutader verlezt worden ist, sehr bald.

§. 2102.

Die **Behandlung** der Wunde ist die im §. 2081 angegebene. Durch die innerlich gegebenen Mittel beabsichtigt man vorzüglich die Transpiration und den Schlaf; man wendet an: Hollunderthee mit einigen Tropfen Ammoniak, ein Glas Maderawein, gute Bedeckung des Körpers etc. und etwas Opium. Auch sind mehrere Mittel im Rufe einer specifischen Wirkung, vorzüglich der Guaco, dessen Saft in den Körper eingerieben und in Wunden geimpft, auch die Schlangen abhalten soll zu beissen, und das arseniksaure Kali, so wie die arsenige Säure.

Die Kriebelkrankheit.

(*Convulsio cerealis*, *Morbus cerealis*, *Raphania*.)

Gruner (lat. Jena 1793). — *Tissot* (üb. d. Nervenkrankheiten). — *Wichmann* (Lpz. u. Zelle 1771 und in dessen kleinen medizin. Schriften). — *Leidenfrost* (lat. Duisb. 1771). — *Hensler* (Kopenh. 1772). — *Marcard* (Hamb. u. Stade 1772 u. s. med. Versuche). — *Lentin* (Beobacht. einig. Krankh. Gött. 1774). — *Taube* (Gött. 1782).

§. 2103.

Die Kriebelkrankheit ist die auf den Genuss von verdorbenem Getreide entstehende Krankheit, die sich vorzüglich durch ein Gefühl von Kriebeln, Krämpfe und die Entstehung von Brand auszeichnet.

§. 2104.

Die Krankheit beginnt mit Magenkrampf, Sodbrennen, Erbrechen, Durchfällen, Eingenommenheit des Kopfes und dem Gefühl von Kriebeln in den Gliedern, das zulezt in der ganzen Haut und in der Zunge bemerkt wird. Sodann kommen Anfälle von Convulsionen und Starrkrampf hinzu, endlich werden einzelne Glieder gefühllos und lahm, die Pupille ist erweitert, die Sprache stammelnd, der Geist abgestumpft, auch entstehen meistens Brandblasen und oft werden selbst ganze Gliedmassen bleifarbig und brandig.

§. 2105.

Die Krankheit hat bald einen mehr chronischen Verlauf von mehreren Wochen und ist fieberlos, bald einen acuten und ist mit Fieber verbunden. In dieser leztern Form, die in Frankreich in dem Lande von Sologne beobachtet worden ist und mit den Namen Necrosis usti-

laginea, Convulsio soloniensis und Ergot belegt wurde, kam insbesondere der ausgebreitete Brand vor, durch welchen oft ganze Glieder ohne alle Ergiessung von Blut abgestossen wurden.

§. 2106.

Der Uebergang in Gesundheit erfolgt unter schleimigem Erbrechen und Durchfällen, womit oft der Trichocephalus dispar ausgeleert wird, in den Tod durch Lähmung und Brand. Nachkrankheiten sind: Fallsucht, Lähmungen, schwarzer Staar, colliquative Durchfälle, Abzehrung, Wassersucht.

§. 2107.

Ursachen. Die Krankheit wird dem, besonders in nassen Jahren oft in reichlicher Menge in dem Getreide enthaltenen Mutterkorn und den Samen von Lolium temulentum, Raphanus Raphanistrum, Agrostemma Githago, Nigella arvensis, Bromus multiflorus u. Br. vitiosus etc. zugeschrieben und scheint demnach eine Vergiftungskrankheit zu sein.

§. 2108.

Behandlung. Man verordnet im Anfange Brechmittel, sodann Abführungsmittel und hierauf einhüllende Mittel und wendet das durch die Zufälle angezeigte Verfahren an; insbesondere sind wegen den Krämpfen, den Lähmungen und dem Brande, warme Bäder, Opium, Baldrian, Kampher, Moschus und erregende Einreibungen und Umschläge empfohlen worden.

§. 2109.

Prophylaxis. Man versorge den Ort, in welchem die Krankheit epidemisch herrscht, mit gesunden Nahrungsmitteln und lasse die vorräthige Frucht durch gehöriges Werfen und Sieben von dem Mutterkorn und fremden Samen befreien, auch ist empfohlen worden, das Getreide lange liegen zu lassen, es vor dem Mahlen zu waschen, um alles Schädliche wegzuspülen und es sodann in einem

Backofen zu trocknen, wodurch das noch vorhandene Mutterkorn und der Taumellolch ihr flüchtiges narcotisches Prinzip verlieren sollen.

Die Cholera.

(*Brechdurchfall, Gallenruhr, Cholera, Cholera morbus.*)

Sydenham (Observ. med. sect. III). — *Henrici* (Diss. Halle 1740, rec. in Haller. Diss. pract. vol. III). — *Brendel* (Diss. Goett. 1747, rec. in opusc. ed. Wrisberg. P. II). — *Tralles* (lat. Vratislav. 1753).

Ueber die asiatische Cholera: *Curtis* (Edinburg. 1807). — *Tytler* (2 Thle. Calcutta 1820). — *Orton* (2 Bde. Madras 1820). — *Blane* (Lond. 1820). — *Scott* (Madras 1824). — *Kéraudren* (Par. 1825 u. 1831). — *Annesley* (2 Bde. m. K. Lond. 1828, n. d. 2ten engl. Aufl. v. Himly, Hannov. 1831). — *Moreau de Jonnès* (Par. 1821, 24, 26, 29 u. 31). — *Mason Good* (a. d. Engl. v. Gmelin, Tübing. 1831). — *Tilesius* (Nürnb. 1830 u. Lpz. 1831). — *Schnurrer* (Stuttg. u. Tübing. 1831). — *Lichtenstädt* (Berl. 1831). — *Elsner* (Königsb. 1831). — *Harless* (2 Bde. Braunschw. 1831). — *Jänichen* u. *Marcus* (lat. Moskau 1830) — *Krieger-Hansen* (Rostock 1831). — *Simon* (jun. Hamb. 1831). — *Marx* (Karlsr. u. Baden 1831). — *Plya* u. *Grünhut* (m. Abbildungen, Pesth 1831). — *Sachs* (Königsb. 1832). — *Bartels* (Berl. 1832). — *Casper* (Berl. 1832). — *Heyfelder* (Bonn 1832). — *Leo* (Warschau 1832). — *Zeller* (Tübing. 1832). — *Hergt* und *Sommerschu* (Karlsruhe 1832). — *R. Froriep* (m. Abbildungen, Weimar 1832). — *Fabre* (a. d. Franz. v. Schüler, Mannh. 1832). — *Dieffenbach* (2te Aufl. Güstrow 1834). — *Phoebus* (Berl. 1833). — *Delpech* (Par. 1832). — *Gendrin* (Par. 1832). — *Magendie* (Par. 1832) — *Broussais* (Nant. 1832). — *French* (Lond. 1835). — *Richter* (Berl. 1836). — *Wagner* (Prag 1836). — *Isensee* (Charte üb. d. Verbreitung d. Cholera. Berl. 1836).

§. 2110.

Die Cholera tritt unter sehr mannigfachen Formsverschiedenheiten auf und anderer Seits gibt es Krankheitszustände, die oft nicht von der Cholera unterschieden

werden können und doch gewöhnlich nicht zu ihr gerechnet werden, wie z. B. gewisse Vergiftungen und es ist daher nicht wohl möglich, eine genau bezeichnende descriptive Definition von der Cholera zu geben; ihrer gewöhnlicheren Form nach stellt übrigens die Cholera eine Krankheit dar, die sich vorzüglich durch stürmisch eintretende krampfhafte Schmerzen im Unterleibe, Erbrechen, Durchfälle, Krämpfe in den Gliedern und schnelle Erschöpfung der Lebenskräfte ausspricht.

§. 2111.

Man unterscheidet gewöhnlich die *sporadische* oder bei uns *einheimische* von der *epidemischen* oder *ostindischen* Cholera und es muss auch angenommen werden, dass der asiatischen Cholera andere ursächliche Momente als der bei uns vorkommenden zum Grunde liegen, so wie auch das Krankheitsbild der höhern Grade der ostindischen Cholera sich wohl von dem der gewöhnlichen Fälle der sporadischen unterscheidet, doch kennt man die Ursachen der ostindischen Cholera nicht und es kann die Verschiedenheit der entfernteren Ursachen keinen Grund zur Annahme verschiedener Krankheitsarten geben, auch gibt es bei Epidemien der ostindischen Cholera eine grosse Anzahl von Krankheitsfällen, die der sporadischen Cholera vollkommen gleich sind, und auf der andern Seite beobachtet man einzeln vorkommende Cholerafälle, die so heftig sind, wie selbst bedeutendere Fälle der epidemischen (ostindischen) Cholera; es ist daher zweckmässig, die sogenannte sporadische und epidemische Cholera nicht als zwei verschiedene Krankheitsarten abzuhandeln, sondern die verschiedenen Grade der Cholera zu beschreiben, von denen die niedern die sog. sporadische Cholera darstellen, aber auch zugleich die niedern Grade und häufig die ersten Stadien der ostindischen Cholera sind.

§. 2112.

Bricht die ostindische Cholera in einer Gegend aus, so geschieht dieses häufig, nachdem schon einige Zeit vorher sich mit der Cholera verwandte Krankheitszufälle, insbesondere Fälle von sporadischer Cholera gezeigt haben, auch wird bei vollkommenem Ausbruch der Epidemie ein grosser Theil der Bevölkerung von Krankheitszufällen befallen, die nicht die Form der ausgebildeten Cholera haben, aber offenbar aus der nämlichen Krankheitsconstitution entspringen und sich oft wie Anfänge und Bruchstücke der vollendeten Krankheit darstellen.

Diese verschiedenen Krankheitszustände, die die Epidemie darstellen, können in drei Reihen geordnet werden, von denen ich die erste unter dem Namen Cholera-Regungen, die zweite unter dem Namen Cholerine und die dritte unter dem der schweren Cholera beschreiben will.

§. 2113.

1) *Die Cholera-Regungen.* Bei sehr vielen Individuen erscheinen, während die Cholera herrscht, folgende Zufälle, ohne dass sich die Cholera weiter bei ihnen ausbildet: vermehrte Neigung zum Stuhlgange und wirkliche Durchfälle, Aufblähen und Kollern im Leibe, etwas Leibweh, ein schmerzhaftes Gefühl im Magen, Aufstossen von Blähungen, Mangel an Appetit und ein besonderes Gefühl von Mattigkeit. Wenn in den dünnflüssigen Stuhlentleerungen weissliche Flocken wahrgenommen werden, so wird dieses als ein näheres Zeichen der bevorstehenden Cholera angesehen.

§. 2114.

2) *Die Cholerine.* Oft, nachdem die so eben angegebenen Erscheinungen einige Zeit vorhergegangen sind, oft aber auch sehr schnell werden die Kranken von häufig wiederkehrendem Erbrechen und Durchfällen befallen, wodurch meistens eine weissliche, dem Reisswasser

ähnliche Flüssigkeit ausgeleert wird, welche Beschaffenheit der Entleerungen mehr der sog. asiatischen als der bei uns sporadisch vorkommenden Cholera eigenthümlich ist; doch kamen auch bei der asiatischen Cholera grünliches und bräunliches Erbrechen und bräunliche Stuhlentleerungen vor; es haben die Kranken dabei das Gefühl von grosser Zerrüttung in den Gedärmen und insbesondere von heftig klemmenden Schmerzen, vorzüglich im Magen, auch in der Herzgrube die Empfindung von grosser Hize und Feuer, wobei meistens diese Stelle bei einem Druck auf dieselbe eine krankhafte Empfindlichkeit zeigt. Es ist grosser Durst vorhanden, die Urinsecretion sparsam, der Puls etwas klein und zusammengezogen. Hierzu gesellen sich schmerzhafte Krämpfe in den Füssen, wobei die Waden ganz hart und die Zehen nach dem Rücken des Fusses gezogen werden, und eine mehr schmerzlose Verdrehung der Arme, so dass die Arme grad ausgestreckt erscheinen und der Radius um die Ulna gedreht ist, und wobei die Finger gradgestreckt, aber einwärts gegen die Fläche der Hand gezogen sind. Meistens ist Schwindel vorhanden und das Gefühl von grosser Kraftlosigkeit.

§. 2115.

3) *Die schwere Cholera.* Indem die genannten Erscheinungen fortdauern und zum Theil zunehmen, namentlich das Gefühl von Feuer in der Herzgrube, was die Kranken noch einige Zeit sehr unruhig macht und zu wimmern veranlasst, oder auch ein Theil derselben, namentlich das Erbrechen, die Durchfälle und die Krämpfe, nachlassen, wird der Körper marmorkalt, insbesondere im Gesichte, den Händen und den Füssen, und es wird selbst der Athem kühl; die Augen sinken tief in ihre Höhlen zurück und werden von einem breiten, bleifarbenen dunkeln, oft ins Schwärzliche oder Violette gehenden Ring umzogen, in geringerm Grade färbt sich

oft auch mehr oder weniger der ganze Körper, insbesondere die Hände und Füsse auf eine ähnliche Weise, und in seltenern Fällen werden einzelne Hautstellen, z. B. die Haut der Finger, die Nase etc. ganz dunkelviolett und selbst brandig, ebenso wird in seltenen Fällen die Haut der Hände und Füsse runzlich, wie die einer Wäscherin, es ist die Haut teigig anzufühlen und verzieht sich (nach *Casper*), in eine Falte gelegt, nicht oder nur zum Theil. Die Zunge ist platt, breit und kalt, die Stimme der Kranken wird heiser, fein und schwach (Vox cholerica), der Harnabgang fehlt meistens gänzlich, der Puls wird immer schwächer und verliert sich zulezt ganz und die Athemzüge geschehen immer langsamer und mit grosser Anstrengung. Die Kranken können nur noch ihre Hände und Füsse regen, ihr Rumpf wird unbeweglich, wie wenn er von Stein oder Holz wäre, sie sinken nun in einen Zustand von Bewusstlosigkeit, sie liegen grad ausgestreckt auf dem Rücken, die Augenlieder halb geschlossen und die Augen nach oben gedreht, wie bei Gichtern der Kinder, die Oberlippe etwas in die Höhe gezogen, so dass man die Zähne sehen kann, sie sind pulslos und kalt und lange Zeit ohne Athemzug, einer Leiche gleich (Chol. asphyctica), doch kann man sie bis kurz vor dem Tode durch rasches Anreden noch zu sich bringen. Nach *Dieffenbach's* Versuchen blutet die Haut nicht, wenn man sie einschneidet, und selbst aus geöffneten grossen Arterien (der Armarterie) fliesst kein Blut aus*). Manchmal erfolgen noch, nachdem das Leben schon lange erloschen zu sein scheint, Zuckungen in einzelnen Muskeln

*) Ich habe ebenfalls bei Oeffnung der Armarterie bei einem asphyctischen Cholerakranken beobachtet, dass nur wenige Tropfen eines bräunlichen Blutes ausflossen.

§. 2116.

Diese Krankheitszufälle treten entweder in der Reihenfolge, in welcher ich sie hier beschrieben habe, auf, so dass die leichteren Grade der Cholera sich zuerst zeigen und die schwerern sich aus diesen entwickeln, oder es bricht die Krankheit sogleich in ihrer ganzen Heftigkeit aus. — Der Uebergang in Genesung erfolgt meistens unter allmähligem Nachlass der Erscheinungen, zuweilen unter einer stärkern Rückwirkung der Natur (Reactionsstadium), wobei der Puls voll, die Haut roth und warm wird und Schweiss eintritt, und in seltenern Fällen durch den Uebergang in das Choleratyphoid. Nach diesen Verschiedenheiten kann die Genesung in wenigen Tagen und auch erst nach einigen Wochen erfolgen. — Zum Tod führt die Cholera oft schon nach 2 bis 3 Stunden, meistens im Verlaufe von 1, 2 bis 4 Tagen, nach einigen Erzählungen zuweilen fast augenblicklich, wie wenn der Kranke vom Blize getroffen worden wäre, oft aber erst später durch den Uebergang in eine andere Krankheitsform. Meistens erfolgt der Tod unmittelbar durch den asphyctischen Zustand, zuweilen, nachdem noch Darmblutungen hinzugekommen sind, und häufig durch den Uebergang in das Typhoid. Es tritt nämlich eine Reaction ein, der Puls erhebt sich wieder, die Haut wird wieder elastisch und warm, es entwickelt sich aber ein fieberhafter Zustand, wobei die Zunge trocken wird, der Kranke in Delirium verfällt etc. und zulezt bilden sich alle Symptome eines tödtlich werdenden Nervenfiebers aus. — Nachkrankheiten sind ausser dem schon erwähnten Typhoid verschiedene Störungen in den Verdauungsorganen, so wie Harnverhaltung, Lähmungen, Wassersucht etc.

§. 2117.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Bei Oeffnung der Bauchhöhle fällt insbesondere in die Augen, dass

die Venen stark mit einem schwarzen Blute angefüllt sind, wie wenn sie mit schwarzer Masse eingesprizt wären; der Magen und der Darmkanal sind meistens mit einer grossen Menge jener weisslichen flockigen Flüssigkeit angefüllt, die auch durch Erbrechen und die Stuhlgänge ausgeleert wird, die Schleimhaut des Magens ist zuweilen mit einem eiweisartigen Ueberzug bedeckt, sie ist etwas aufgelockert und meistens gleichförmig blassroth gefärbt, oft zeigt sie dunkelrothe und bräunliche Flecken von überfüllten kleinen Gefässchen, zuweilen ist sie auch ganz blass; ebenso ist die Schleimhaut des Darmkanals meistens geröthet, oft mehr blassroth, oft aber in grossen Stellen dunkelroth, wie ein Schwamm, der in schwarzes Blut getaucht ist, zuweilen aber auch von normaler Farbe, was vorzüglich von dem Stadium herrührt, in welchem der Kranke gestorben ist; die Peyerschen Drüsen sind besonders im untern Theile des Dünndarmes aufgeschwollen, und stellen Platten von granulirter Oberfläche und von ovaler oder länglichter Form von 1—3 Zollen Länge und 3—10 Linien Breite dar, eben so sind die Brunnerschen Drüsen an mehreren Stellen aufgeschwollen, welche aber nur ein einzeln stehendes Korn bilden. — Die Leber ist nicht verändert, blos oft von schwarzem Blute überfüllt, die Gallenblase ist von dunkelgefärbter Galle sehr ausgedehnt. — Die Milz ist oft sehr mit Blut angefüllt. Die Nieren sind ebenfalls blutreich, in den Nierenbecken und Kelchen ist oft etwas weisser Schleim. — Die Blase ist zusammengezogen und leer. — Die Lunge ist in der Regel gesund, doch mehr zusammengefallen als gewöhnlich, nur selten mit Blut überfüllt. — Das Herz ist mit dunkelm Blute angefüllt. — In den Hirnhäuten sind die Venen mit schwarzem Blute überfüllt. — Die grossen Arterien und Venenstämme sind fast gleichmässig mit

Blut angefüllt, während das Blut in den Arterien der dritten Ordnung, z. B. der axillaris fast immer fehlt.

§. 2118.

Geschichte der Krankheit. Schon von *Hippokrates* und *Celsus* sind Krankheitsformen beschrieben worden, die im Wesentlichen mit der Cholera übereinstimmen, und *Sydenham* schildert eine Epidemie, die im Jahre 1669 (in England) geherrscht hat, und zum Theil so heftig war, dass die Kranken innerhalb 24 Stunden starben. Nach *Livingstone* soll die Cholera in der heftigsten Art schon frühe in China vorgekommen sein. In den Jahren 1782 und 83 herrschte zu Madras eine Epidemie, die von *Curtis* gut beschrieben worden ist, und die nämliche Krankheit, wie die gegenwärtige grosse Epidemie gewesen zu seyn scheint. Eine so furchtbare und allgemein verbreitete Choleraepidemie, wie die gegenwärtig herrschende scheint aber noch nie den Erdboden heimgesucht zu haben.

Diese grosse Krankheit zeigte sich zuerst im Jahre 1817 in Jessore, erschien sodann in Calcutta und durchlief innerhalb 15 Monaten ganz Ostindien, wo sie vorzüglich dem Marsche der Truppen gefolgt sein soll; auch brach sie auf den meisten Inseln des Ozeans aus; wohin sie durch die Schifffahrt gebracht worden sein soll; 1820 war sie in China. Nachdem die Krankheit 5 Jahre in Indien an verschiedenen Orten geherrscht hatte, erschien sie 1821 an den Ufern des persischen Meerbusens, wo sie bald nach der Ankunft von Schiffen aus Bombay ausgebrochen sein soll. Sie durchzog nun Persien und Arabien, wie man angiebt, vorzüglich auf den Caravannenstrassen, und erschien nunmehr in Aleppo und an den Küsten Syriens. Im Jahre 1825 herrschte die Krankheit in Astrachan und schritt nun langsam im russischen Reich vorwärts, 1829 war sie in Orenburg, 1830 in Moskau, 1831 in Polen, in Gallizien, in Un-

garn und zugleich auch in Danzig und St. Petersburg, und sodann in Wien und Berlin und einem grossen Theil des östlichen und nördlichen Deutschlands. Hierauf erschien sie in England, und im Frühjahr 1832 plözlich in der Mitte von Paris; sie brach nun in vielen Orten von Frankreich aus und in den Jahren 1833 und 1834 in den Niederlanden, Spanien, Portugal und in Amerika. 1835 zeigte sich die Krankheit von Neuem im südlichen Frankreich, trat noch in demselben Jahre nach Italien über und suchte in den Jahren 1836 und 1837 die meisten Städte dieses Landes auf eine furchtbare Weise heim (z. B. Palermo, wo innerhalb sechs Wochen mehr als der sechste Theil der Bevölkerung, 26,000 Menschen, starb). Auch herrschte die Krankheit 1836 eine geraume Zeit, jedoch in einem milderen Grade, in München, dem südlichen Theile von Baiern und Tyrol, und erschien im Sommer 1837 von Neuem in Berlin, Breslau und andern Orten des östlichen Deutschlands.

§. 2119.

Ursachen der Cholera. Die Krankheit befällt Personen von jedem Alter, Geschlecht und Constitution, die asiatische Cholera kommt selten bei Kindern vor, häufig aber erscheint die sporadische bei denselben.

Die Gelegenheitsursachen der sporadischen Cholera sind: der Genuss fehlerhafter Nahrungsmittel, namentlich erkältender Obstarten, fetter Kuchen, verdorbenen Käses, fauligter Stoffe, jungen Weines, unausgegohrnen Bieres, und bei ganz jungen Kindern der eines schlechten Breies, fehlerhafter Milch etc., und ein solcher von giftigen Stoffen, wie giftiger Schwämme, des Arseniks, des Sublimats, des zuweilen im Mehl enthaltenen Secale cornutum, der Saamen von Lolium temulentum, Agrostemma Githago etc., auch Verkältung, Metastasen etc.

§. 2120.

Als Ursache der Verbreitung der ostindischen Cholera wird von vielen Aerzten die Ansteckung angenommen und für diese Annahme angeführt, dass die Cholera von Ostindien aus von Land zu Land sich nach Europa gezogen habe, dass sie hierbei vorzüglich den Caravannenstrassen gefolgt sei, und dass sich öfters die Fortpflanzung von einem Kranken und von einem Orte zum andern genau nachweisen lasse. — Unter den zur Unterstüzung dieser Behauptungen angeführten Thatsachen giebt es nun allerdings solche, die die Fortpflanzung von einem Kranken auf den andern mit ziemlicher Sicherheit beweisen, doch hat man Grund, die Richtigkeit vieler in Zweifel zu ziehen, z. B. die angebliche Thatsache, dass die Krankheit auf den Caravannenstrassen zu uns gekommen sei, indem wohl hier die Krankheit geherrscht haben mag, aber wahrscheinlich zugleich in unzähligen andern Orten, von denen die Reisenden nichts zu erzählen wissen, und für viele der angeführten Thatsachen lässt sich eine andere Erklärung als die Ansteckung geben, so z. B. kann das Erkranken mehrerer Glieder einer Familie eben so wohl als durch Ansteckung durch eine andere auf alle wirkende Gelegenheitsursache erfolgen, und selbst die Wanderung von Asien über Europa und America kann durch andere Ursachen bedingt sein.

Unter den Gründen, die gegen die Verbreitung der Cholera durch die Ansteckung allein angeführt werden, scheint mir der der wichtigste zu sein, dass sich häufig in den Orten, in welchen die Cholera ausbricht, einige Zeit vorher eine mit der Cholera verwandte Krankheitsconstitution zeigt und namentlich die Cholerine vorkommt, dass ferner in solchen Orten oft beinahe die ganze Bevölkerung von gastrischen Beschwerden befallen wird, und dass zu gleicher Zeit in vielen Orten, in welchen

die Cholera nicht zum Ausbruch kommt, zur Zeit der Choleraepidemien häufig sich Krankheiten zeigen, die mit der Cholera die nächste Verwandtschaft haben, namentlich die sog. sporadische Cholera, Magenkrämpfe, Durchfälle, Ruhr etc. Dieser oft in weiten Landstrecken sich zeigende Krankheitsgenius kann unmöglich der Ansteckung zugeschrieben werden. Ausserdem werden gegen die contagiöse Natur der Krankheit angeführt, die Unzulänglichkeit selbst der besten Sperrmassregeln (von Oestreich und Preussen), die geringe Mortalität der Sanitätsbeamten und der Krankenwärter, die Unähnlichkeit der Krankheit mit den contagiösen Krankheiten und selbst einige Fälle, in welchen die Cholera auf Schiffen ausgebrochen sein soll, die längere Zeit in keine Berührung mit dem Lande kamen.

Die so eben vorgebrachten Gründe bestimmten mich anzunehmen, dass die Hauptursache der Verbreitung der Cholera nicht in einem Contagium zu suchen sei, sondern in einem allgemeiner verbreiteten schädlichen Einfluss, dessen Natur uns übrigens gänzlich unbekannt ist. — Nicht unmöglich ist allerdings ein tellurischer Einfluss. Was ist die Ursache, warum heute dichte Nebel aufsteigen und Wolken sich sammeln, während gestern ein herrlicher Tag war, und warum oft plözlich auf die mildeste Frühlingswärme heftiger Winterfrost eintritt? Können wir hier nicht Veränderungen, die in der Erde vorgehen, beschuldigen? Sind wir nicht selbst Theile der Erde? Können nicht abnorme Vorgänge in der Erde unmittelbar störend auf unsere Lebenskräfte, wie auf die Beschaffenheit der Atmosphäre, wirken, und können nicht solche tellurische Vorgänge in gewissen Richtungen sich fortpflanzen, wodurch der Zug mancher Epidemien bedingt wird? — Ich behaupte nicht, dass solche Vorgänge der Cholera wirklich zum Grunde liegen, halte es aber für eine oberflächliche Weise der

Naturanschauung, wenn man die unmittelbaren cosmischen Einwirkungen auf unser Leben gar nicht der Aufmerksamkeit werth hält. — Wenn ich blos nach meinen eigenen, in Paris im Frühjahr 1832 gesammelten Beobachtungen mich über die Ansteckungsfähigkeit der Cholera entscheiden soll, so kann ich sie nicht zu den eigentlichen contagiösen Krankheiten, wie die Blattern, die Pest, der Typhus etc. sind, rechnen; ja bei der asphyctischen Cholera, bei welcher auch meistens das Erbrechen und die Durchfälle aufhören, scheint mir eine Einwirkung des Kranken auf die Gesundheit eines andern Individuums, mit Ausnahme des psychischen Eindrucks, in den meisten Fällen kaum möglich zu sein, da meistens durchaus keine Ausdünstung statt findet, sondern der Körper kalt ist, wie eine Leiche, und nicht einmal ein warmer Hauch aus dem Munde des Kranken dringt. Nur die Ausdünstungen der durch Erbrechen und die Stuhlgänge ausgeleerten Massen scheinen mir, wenn sie in gehöriger Menge einwirken, zur Entstehung der Cholera beitragen zu können, wie auch die Ausdünstung anderer Fäcalmassen nachtheilig auf den Darmkanal wirkt, und die Galle auf die Leber, der Harnstoff auf die Nieren und der Nasenschleim auf die Schleimhaut der Nase als Reize wirken.

§. 2121.

Die den Ausbruch der asiatischen Cholera bei dem einzelnen Individuum begünstigenden Einflüsse sind vorzüglich: 1) schon bestehende krankhafte Zustände des Magens und der Gedärme und die Einwirkung der auch die sporadische Cholera veranlassenden schadhaften Stoffe, 2) Furcht und 3) Verkältung, ausserdem auch Ausschweifungen in den Geschlechtsverrichtungen, Körper- und Geistesanstrengungen etc.

§. 2122.

Wesen. Es lässt sich zwar Einiges über das Wesen

der einzelnen Krankheitsvorgänge angeben, so lange aber die erregende Ursache nicht bekannt ist, der Zusammenhang des Ganzen nicht erklären. Diese Prozesse sind vorzüglich Krampf im Magen und Darmkanal und in den Muskeln der willkürlichen Bewegung, theilweise Entzündung der Schleimhaut des Darmkanals, vermehrte und veränderte Absonderung der Darmsäfte, Anziehung des Blutes nach den centralen Körpertheilen, insbesondere den grossen Gefässstämmen und den Gefässen der Unterleibsorgane, Verminderung oder völliger Stillstand der Wechselwirkungen zwischen Nerven und Blut in den peripherischen Theilen, chemische Veränderung des Blutes (vielleicht unmittelbar durch die einwirkende Schädlichkeit, jedenfalls aber auch durch den Stillstand des Blutlaufes und den gehemmten Athmungsprozess hervorgebracht) baldige Zernichtung der Lebenskräfte. Es zeigt die Krankheit grosse Aehnlichkeit mit den Vergiftungskrankheiten.

§. 2123.

Vorhersage. Die sogen. sporadische Cholera ist meistens leicht zu heben, wird jedoch zuweilen auch tödtlich. Die ostindische Cholera soll, wenn der Kranke sich selbst überlassen bleibt, beinahe immer tödten; durch die Kunst wird eine grosse Anzahl der Kranken gerettet, doch kommt es auf den Grad der Krankheit an, indem die asphyctische Cholera doch in der grossen Mehrzahl der Fälle tödtlich endet.

§. 2124.

Behandlung. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Bei der sporadischen Cholera hat man, wenn schädliche Stoffe im Magen enthalten sind und nicht durch Erbrechen ausgeleert werden, auf die Weise zu verfahren, die in den Kapiteln von dem Magenkrampf, der Magenentzündung und den Vergiftungen angegeben worden ist. Auch bei der ostindischen Cholera wenden

viele Aerzte, wenn kein gehöriges Erbrechen eintritt, Brechmittel an, so wie auch bei nicht gehörig erfolgenden Stuhlentleerungen abführende Mittel, insbesondere das Ricinusöl. Vorzüglich sind wiederholt gereichte Brechmittel aus Ipecacuanha empfohlen worden, welche ausser der Entleerung der Stoffe auch durch Erschütterung des Nervensystems nüzlich sein können. Um die vorhandenen schadhaften Stoffe weniger schädlich zu machen, sind auch einhüllende Mittel zweckmässig.

§. 2125.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Es scheinen mir vorzüglich folgende Anzeigen Berücksichtigung zu verdienen: 1) Milderung der krampfhaften Zustände, insbesondere des Darmkanals, 2) Bekämpfung der Entzündung und des heftigen Blutandranges nach den innern Theilen, 3) Wiederherstellung der Lebensprozesse in den äussern Theilen und 4) Unterstüzung der Lebenskräfte zur geeigneten Zeit.

In den leichtern Fällen der Cholerine hat man nur die erstere Anzeige zu erfüllen und es genügen gewöhnlich einige Gaben Opium, z. B. von 10 Tropfen, das Auflegen von einem erwärmten irdenen Deckel auf den Magen, ein schweisstreibender Thee, z. B. aus Holunderblüthen, und die übrigen in dem Kapitel von dem Magenkrampf angegebenen Mittel.

In einigen schweren, durch das Gefühl von Feuer und zusammenschnürendem Schmerz im Magen, Krämpfe und Kälte des Körpers ausgezeichneten Fällen von Cholera, die zwar nicht in einer eigentlichen Epidemie, aber während die ostindische Cholera in Deutschland und Frankreich herrschte, bei uns vorkamen, und ganz dasselbe Krankheitsbild darstellten, wie viele, schon bedeutendere Cholerafälle, die ich in Paris sah, wandte ich, nachdem ich in einem solchen Falle ohne Nuzen die englisch-ostindische Methode zu Hilfe gezogen hatte,

folgendes Verfahren mit auffallend günstigem Erfolge an. Ich liess abwechselnd Opiumtropfen und grosse Stücke Butter, die vorher in Eiswasser gelegt waren, nehmen, so dass die Kranken innerhalb eines Tages etwa $^3/_4$ Pfund Butter gebrauchten. Zugleich liess ich den Körper durch sehr warme Sandsäckchen, die auf den Unterleib des Kranken und die Füsse gelegt waren, erwärmen, und wandte auch einigemale Blutegel, auf die Magengegend gesezt, an. — Durch dieses Verfahren werden die Wandungen des Magens und des Darmkanals gegen schadhafte Stoffe möglichst geschüzt, die Butter wirkt besänftigend auf den gereizten Darmkanal und die Kälte (die schon früher in Deutschland in Form von Eispillen und Eiswasser und später besonders von *Broussais* gerühmt worden ist) bekämpft die Entzündung und die Blutcongestion nach innern Theilen. — Mit diesen Mitteln können verschiedene andere in Verbindung gesezt werden, z. B. die Eispillen, die von *Casper* mit Erfolg in Anwendung gebrachten Begiessungen und doucheförmigen Anwürfe mit kaltem Wasser, Hautreize etc.

Die Unterstüzung und Erregung der Lebenskräfte scheint in der Regel erst dann angezeigt zu sein, wenn der Entzündungs- und Congestionszustand in den innern Theilen bekämpft ist, doch können die zu diesem Zwecke dienlichen Mittel, wie z. B. erregende Getränke, zuweilen neben der besänftigenden Methode in Anwendung gebracht werden.

§. 2126.

Nach denselben Anzeigen können auch verschiedene andere Mittel gebraucht werden: Aderlässe, einhüllende Getränke, z. B. Reisabkochung mit arabischem Gummi, Oelmixturen, die Ipecacuanha in kleinen Gaben, die Aufgüsse von Chamillen, Melisse, Pfeffermünze, sehr verdünntes Ammonium, Kampher, das warme Wasser-

bad, Dampfbad, Bad von heisser Luft, Reibungen des Körpers mit Schnee, Einreibungen mit aromatischen Geistern und Ammonium- oder Canthariden-Tinctur, Blasenpflaster etc.

§. 2127.

Von den vielen, gegen die ostindische Cholera in Anwendung gebrachten Heilmethoden und den empfohlenen specifischen Mitteln erwähne ich folgende.

Die *englisch-ostindische* Methode: allgemeine und örtliche Blutentleerungen, Opiumtinctur, zu 60 Tropfen mit 20 Tropfen Pfeffermünzöl und 2 Unzen Wasser, welche Dosis selbst manchmal wiederholt wird, oder jede Viertelstunde 10 bis 15 Tropfen Opiumtinctur, zugleich das Calomel in Scrupeldosen in Zwischenräumen von 2 — 3 Stunden ein Paarmal gegeben, auch nach Umständen Naphthen, Kampher, Arak mit Wasser, das Erwärmen des Körpers durch heisse Aschesäckchen und das Kneten des Körpers.

Casper's Methode: Der Kranke wird, wenn die Haut trocken und welk ist, in eine leere, wenn diese aber weich, mässig dünstend oder mit klebrigem Schweisse bedeckt ist, in eine bis zum Nabel des Kranken mit lauwarmem Wasser gefüllte Badwanne gesezt und hierauf mit 4 bis 5 Eimern eiskaltem Wasser übergossen und auch mit kaltem Wasser aus einem Topfe auf Brust und Magengegend geworfen, dieses wird alle 2 bis 4 Stunden wiederholt, nach dem Bade wird derselbe ins Bett gelegt, erhält eiskalte Umschläge auf Kopf, Brust und Unterleib, die Füsse werden aber in nassheisse wollene Tücher eingeschlagen und zuweilen auch heisse Fussbäder angewandt. Zum Getränke wird kaltes Wasser oder kaltes Bier gegeben. Wenn die Stuhlausleerungen stocken, werden Klystiere von gleichen Theilen kaltem Wasser und Essig angewandt. Nicht immer wird die Kälte in dieser vollen Ausdehnung in Gebrauch gezogen.

Blumenthal liess bei grosser Reizbarkeit des Magens, heftigem Erbrechen und grossem Durst Eispillen alle 5 Minuten nehmen.

Gräfe empfiehlt das Chininum sulphuricum.

Leo rühmt das Bismuthum nitricum zu drei Granen auf die einzelne Gabe.

Gumbert und *Bärens* gaben das Extractum nucis vomicae.

Broussais wandte innerlich Eis und zuweilen Opium an, sezte Blutegel auf die Magengegend, liess zur Ader und suchte den Körper zu erwärmen.

Magendie lässt Reizmittel, insbesondere den Punsch gebrauchen.

Chabert in Mexico wandte zuerst das Guaco an, welches vortreffliche Dienste leisten soll. In den leichtern Fällen gibt man alle $\frac{1}{2}$ Stunde eine kleine Tasse Guacoabkochung (2 Drachmen Stengel und $\frac{1}{2}$ Drachme Blätter mit $1\frac{1}{2}$ Flaschen Wasser auf 1 Flasche eingekocht) bis allgemeiner Schweiss und gehörige Wärme eintritt, welche man einige Tage unterhält. Zum Löschen des Durstes gibt man die Abkochung mit zwei Dritteln oder der Hälfte Wasser. In den gefährlichen Fällen lässt man von der weingeistigen Tinctur von Guaco einen Löffel voll mit 6 oder 8 Löffel Wasser mischen und alle $\frac{1}{4}$ Stunde abwechselnd einen Löffel von dieser Mixtur und eine kleine Tasse des Decocts nehmen. Bei Besserung der Zufälle lässt man blos die Abkochung und in grössern Zwischenräumen fortgebrauchen. Neben dem Guaco wendet man auch allgemeine und örtliche Blutentziehungen und verschiedene äussere Mittel an.

§. 2128.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* Gegen das heftige Erbrechen dienen viele der gegen den gereizten Zustand im Allgemeinen anzuwendenden Mittel. Die Durchfälle darf man nicht zu schnell stillen; übri-

gens sind gegen dieselben die gewöhnlichen Mittel, namentlich Columbo in Gebrauch gezogen worden. Zuweilen ist es nothwendig, Oeffnung zu bewirken, wozu man sich des Ricinusöls, des Glaubersalzes oder der Rhabarber bedienen kann, gegen den Durst gibt man kaltes Wasser, Selterserwasser, warme Milch etc.

§. 2129.

Prophylaxis. Die Sperrmassregeln und Desinfectionsanstalten haben bis jezt keine Vortheile gewährt und können, wenn die Verbreitung der Cholera auf eine andere Weise, als durch Ansteckung geschieht, auch von keinem Nuzen sein; eben so scheinen das Riechen an Chlorkalk oder aromatischem Essig, die wachstaffetnen Mäntel und andere Schuzmittel gegen die Ansteckung für den Einzelnen überflüssig zu sein; nur eine reine Luft in dem Krankenzimmer ist erforderlich, um Verbreitung der Krankheit durch Kranke zu verhüten, daher schnelle Entfernung der Entleerungen des Kranken, häufiges Auslüften des Zimmers etc. Zur Vorsicht kann man auch Chlorräucherungen vornehmen und nach Berührung der Kranken die Hände mit einer Auflösung von Chlorkalk waschen. — Auch die übrigen, gegen die Cholera empfohlenen Präservativa sind grossentheils ohne Nuzen und zum Theil selbst nachtheilig, dahin gehören der anhaltende Gebrauch ätherischer Oele (des Cajeput-, Chamillen-, Pfeffermünzöl) und anderer erregender Mittel, das Tragen von Pechpflastern, das Vesicatorium perpetuum u. dgl., Seifen- und Laugenbäder, das Tragen von Kampher und andern Stoffen in Säckchen und Gürteln etc.

Das, was allein zur Vermeidung der Cholera zu thun ist, lässt sich wohl auf folgendes zurückführen: Vermeidung von Excessen in der Diät und Vermeidung der Speisen und Getränke, die leicht die Verdauung in Unordnung bringen und Durchfälle veranlassen, Ver-

meidung der Verkältung, insbesondere des Unterleibes, wesshalb wohl eine leichte Flanellbinde um den Unterleib angelegt werden mag, Vermeidung von Erschöpfung der Kräfte durch zu starke Körperanstrengung, des Beischlafs etc. und wo möglich Beseitigung der Furcht vor der Krankheit, wozu angemessene Beschäftigung und Zerstreuung und Unterlassung aller überflüssigen Vorsichtsmassregeln, die nur beständig die Aufmerksamkeit auf die Krankheit hinlenken, im Allgemeinen die besten Mittel sind. Die besten Massregeln, welche der Staat und die Gemeinden gegen die Cholera ergreifen können, sind: Herbeischaffung der Mittel zu einer schleunigen ärztlichen Hilfeleistung und guten Krankenpflege, und Unterstüzung der Armen mit guter Nahrung, Kleidungsstücken und im Winter mit Brennholz.

Der Milzbrand der Menschen.

(Die bösartige, contagiöse Blatter, die schwarze Blatter, die schwarze Pocke, Pustula maligna.)

Enaux und *Chaussier* (Méthode de traiter les morsures des animaux enragés. Dijon 1785). — *La Chevrie* (Diss. Par. 1807). — *J. F. Hoffmann* (Stuttg. 1827). — *Basedov* (Journ. von Gräfe und Walther. B. 7 u. 12). — *Schroeder* (Rust's Magazin. B. 29).

§. 2130.

Der **Milzbrand der Menschen** ist die durch Ansteckung von milzbrandigen Thieren entstandene Krankheit, welche sich durch Brandbeulen mit Bläschen an der Ansteckungsstelle, Fieber und Nervenaffectionen auszeichnet.

§. 2131.

Die Brandbeulen entstehen an den Stellen des Körpers,

die mit dem thierischen Gift in Berührung gekommen sind. Man unterscheidet zwei Formen derselben:

1) Die hervorragende Brandbeule. Nach geringem Jucken und vorübergehendem Stechen löst sich, ohne Röthe der Haut, die Oberhaut ab, und es entsteht eine seröse Blase, zuerst nur von der Grösse eines Hirsekorns und sodann etwas grösser, welche bräunlich wird und aufgekrazt eine röthliche, seröse Flüssigkeit ergiesst. Es bildet sich nun an dieser Stelle eine platte, härtliche Geschwulst von der Grösse einer Linse, von natürlicher Hautfarbe, nur in der Mitte etwas livid, es kommt ein Gefühl von Fressen und Brennen hinzu, die Haut schwillt etwas an und wird gespannt, um den harten Mittelpunkt entsteht ein etwas hervorragender Kreis, welcher bald blass, bald röthlich oder livid gefärbt ist und mit Phlyctänchen besezt ist, die oft zusammenfliessen und eine seröse, rothe Flüssigkeit enthalten; das ursprüngliche Knötchen wird braun, schwarz, brandig und vergrössert sich. Die Geschwulst dringt nun auch in das Zellgewebe unter der Haut und der Brand schreitet auf den mit Blasen besezten Hof fort, um welche neue brandige Stellen sich ein neuer, mit Blasen besezter Ring bildet. So greift der Brand immer weiter um sich und zu gleicher Zeit entsteht eine weit ausgebreitete Anschwellung der Weichtheile, die eine grosse, elastische und pralle Geschwulst darstellt, und in dem ergriffenen Theile ein Gefühl von Zusammenschnürung und Betäubung veranlasst. — 2) Die eingesunkene Brandbeule. Nach starkem Jucken bildet sich ein schwarzer, dem Flohstiche ähnlicher Punkt, hierauf entstehen Phlyctänchen, die aufbrechen, eine bräunliche Flüssigkeit ergiessen und unter welchen die Haut schwarz und wie verkohlt sich darstellt, Schmerz, Hize und das Gefühl der Erstarrung in den unterhalb dieser Stelle gelegenen Theilen sind

damit verbunden, nur eine geringe Geschwulst ist zu bemerken.

Mit diesen örtlichen Zufällen verbindet sich ein nervöses und putrides Fieber, Magenschmerzen, Beängstigungen, Ohnmachten und Delirien. — So kann die Krankheit innerhalb sieben Tagen, zuweilen auch schon innerhalb 24 Stunden tödten. — Im glücklichen Fall begrenzt sich der Brand und nach dem Abfallen des Schorfes stellt sich eine reichliche Eiterung ein.

§. 2132.

Ursachen. Die Krankheit entsteht durch Berührung des Geifers, des Blutes etc. der am Milzbrand leidenden oder an dieser Krankheit gestorbenen Thiere, besonders an zarten und an wunden Stellen der Haut, und kommt daher vorzüglich bei Mezgern, Gerbern, Thierärzten, Wasenmeistern und Hirten vor. Auch soll der Genuss des Fleisches milzbrandiger Thiere zuweilen dieselbe Krankheit veranlassen. Ob das Contagium auch im Menschen sich erzeuge, ist unentschieden, doch ist dieses wahrscheinlich.

§. 2133.

Vorhersage. Wird der Kranke sich selbst überlassen, so führt die Krankheit meistens zum Tode; bei frühzeitiger Hilfe wird derselbe in der Regel gerettet, bei spät erst eingetretener Kunsthilfe aber ist der Ausgang sehr zweifelhaft.

§. 2134.

Behandlung. Man schneidet die harte, schwarze Stelle aus oder macht durch den Brandschorf einen Kreuzschnitt und cauterisirt die Wunde mit Höllenstein, Vitriolgeist, dem Glüheisen (was wohl den andern Arten der Cauterisation vorzuziehen ist) etc., man verbindet mit Charpie mit Chlorwasser befeuchtet, und nach Hinwegnahme des Schorfes mit Digestivsalbe etc.

Die innere Behandlung richtet sich nach der Beschaffenheit der Krankheitserscheinungen, vorzüglich sind antiseptische und erregende Mittel empfohlen worden, die Mineralsäuren, Serpentaria, Kampher, Wein, China.

Die Hundswuth.

(*Wasserscheu, Hydrophobia, Hygrophobia, Rabies canina.*)

Ueberlacher (in Stollii Diss. vol. 2.). — *Portal* (aus dem Franz. Lpz. 1782). — *Mederer* (lat. Freib. 1783). — *Enaux* u. *Chaussier* (Dijon 1785). — *Andry* (a. d. Franz. 1785). — *Hamilton* (aus dem Engl. Lpz. 1787). — *Bader* (Frankf. u. Lpz. 1792). — *Le Roux* (a. d. Franz. Tübingen 1793). — *Rougemont* (a. d. Franz. v. Wegeler, Frankf. 1798). — *Benedict* (Lpz. 1808). — *Fothergill* (a. d. Engl. v. Werner, Wien 1810). — *Göden* (Bresl. 1816). — *Ribbe* (Leipzig 1820). — *Trollier* (Lyon und Paris 1820). — *St. Martin* (übersezt v. Fitzler. Ilmenau 1824). — *Wendt* (Breslau 1824). — *Berndt* (Hufelands Journ. 1824). — *Krügelstein* (Gotha 1825). — *Urban* (Hufelands Journ. 1826). — *Berthold* (Götting. 1833). — *Rust* (Aufsäze u. Abhandl. a. d. Gebiete der Medizin, Chirurgie u. Staatsarzneikunde, 2 Bde. Berl. 1834 u. 1836.)

§. 2135.

Die **Hundswuth** ist die Krankheit des Menschen, welche durch den Biss wuthkranker und vielleicht auch durch den sehr erzürnter Thiere hervorgebracht wird, und sich vorzüglich durch Tobsucht, Wasserscheu und Krämpfe auszeichnet.

§. 2136.

Die Krankheit kommt eine oder mehrere Wochen, zuweilen aber erst viele Monate nach dem Bisse zum Ausbruch. Ist die Wunde noch offen, so wird sie schmerzhaft, verändert ihre Farbe und fängt an, nur

einen dünnen Eiter abzusondern; ist sie schon vernarbt, so fängt sie zu schmerzen an, entzündet sich, bricht auf und sondert eine jauchigte Flüssigkeit ab. Es ziehen sich nunmehr Schmerzen von der gebissenen Stelle nach dem Verlauf der Nerven nach dem Rumpfe hin, das leidende Glied wird oft wie gelähmt, zuweilen entstehen auch Zuckungen, die Saugadern und Drüsen schwellen aber gar nicht oder nur wenig an, und manchmal bemerkt man aber gar keine Veränderung in dem verwundeten Theile.

Es stellt sich nunmehr ein allgemeines Uebelbefinden ein, ein Ziehen im Rücken und Nacken, Mattigkeit, Schwindel, Klingen in den Ohren, Verdunklung des Gesichtes, Lichtscheue, schreckhafte Träume und Auffahren aus dem Schlafe, der Speichel läuft im Munde zusammen, es ist Neigung zum Erbrechen und zuweilen Schmerz in der Herzgrube vorhanden, und es kommt auch zu wirklichem Erbrechen, wodurch eine grüne Galle ausgeleert wird, der Athem ist beklemmt, oft stellt sich Schluchzen ein, der Puls ist klein und unordentlich, der Urin blass, der Kranke wird zuweilen ohnmächtig und ist in einer sehr niedergeschlagenen Gemüthsstimmung.

Nachdem diese Zufälle ein oder mehrere Tage gedauert haben, bemerkt man, dass bei heftigem Durste der Kranke doch die Flüssigkeit nicht gehörig zu schlucken vermag, er empfindet eine grosse Hize und Trockenheit im Schlunde, und bei dem Versuche, die Flüssigkeit hinabzuschlingen, entstehen Zuschnürung des Schlundes, Zuckungen der Hals-, Nacken- und Gesichtsmuskeln, und der Kranke zeigt nunmehr einen solchen Abscheu vor Wasser, dass ihm der Anblick desselben, ja alles, was den Gedanken an Flüssigkeit erregt, wie z. B. ein Glas, ein Siegel, ja eine helle Wand, so wie das Geräusch einer Flüssigkeit und selbst das Rauschen des

Windes die heftigste Angst und die Anfälle der Wuth erregen.

Die Anfälle der Wuth entstehen zum Theil nach den so eben angegebenen Veranlassungen, zum Theil auch ganz von selbst. Der Kranke rollt seine Augen, die meistens blutroth sind, er hat Schaum vor dem Munde, er springt auf, heult, schreit, sucht die Umstehenden anzuspeien, zu beissen und auf andere Weise zu verlezen, oft ist grosse Neigung zum Beischlafe vorhanden, der Harn und der Samen werden ausgesprizt, und der Kranke wird nunmehr auch von allgemeinen Zuckungen und oft auch von Starrkrampf befallen. Es dauern diese Anfälle im Anfange eine kürzere, später eine längere Zeit, oft über dreissig Minuten und noch länger.

Nach den Anfällen ist der Kranke sehr matt und äusserst niedergeschlagen, so dass er selbst den Selbstmord versucht. Die Anfälle kehren immer häufiger zurück und gehen zulezt in einen soporösen Zustand, Schlagfluss und Lähmungen über, wodurch der Tod in seltenen Fällen schon nach 30 Stunden, häufiger nach drei Tagen und zuweilen auch erst nach 5 bis 8 Tagen herbeigeführt wird.

§. 2137.

Bei den Leichenöffnungen traf man zuweilen die Nerven in der Umgebung der Wunde entzündet an, in andern Fällen aber schlaff und weich, öfters fand man Spuren von Entzündung in den Gehirnhäuten, im Schlunde, in dem Nervus vagus, sympathicus und phrenicus, im Herzen, den Lungen, dem Brustfell, dem Magen und Darmkanal, welche beide Theile auch zuweilen im brandigen Zustande sich befinden; auch sah man die Gefässe des Gehirnes mit schwarzem Blute überfüllt, die Muskeln zeigten eine dunkle Röthe, die Wundnarben stroztcn von geronnenem Blute und zeigten deutlich das Gepräge

einer vorhergegangenen Entzündung, schnell trat Fäulniss in den Leichen ein, oft wurde auch gar nichts ungewöhnliches angetroffen.

§. 2138.

Die alleinige **Ursache** der Hundswuth beim Menschen ist der Biss wuthkranker Thiere oder die Berührung des Geifers solcher Thiere an Stellen mit zarter Oberhaut, wie z. B. den Lippen, auch soll der Speichel sehr gereizter Thiere, besonders wenn sie gerade im Begattungsgeschäft begriffen waren und selbst ein solcher von Menschen unter ähnlichen Verhältnissen dieselbe Wirkung hervorbringen, ja man erzählt Fälle, in welchen Menschen, die sich selbst bissen, sich hierdurch die Wasserscheu zuzogen; eine spontane Entwicklung dieser Krankheit scheint es aber beim Menschen nicht zu geben. Das Wuthgift ist fixer Natur, bleibt an Kleidern haften und vermag noch nach langer Zeit die Ansteckung hervorzubringen. Die Thiere, welche diese Krankheit dem Menschen mittheilen, sind der Hund, die Kaze, der Fuchs, der Wolf, das Schwein, das Pferd, das Rind und andere Säugethiere, und nach Einigen auch selbst Geflügel *).

*) Die Zeichen der Hundswuth bei Hunden sind, nach *Hertwig's* Beobachtungen (Beiträge zur nähern Kenntniss der Wuthkrankheit oder Tollheit der Hunde, Berlin 1829) folgende. Zeichen der rasenden Wuth: Veränderung des gewöhnlichen Benehmens, Unruhe und vorherrschende Neigung, den Ort ihres Aufenthalts, ihres Lagers stets zu verändern, wegzulaufen etc.; grosse Neigung an kalten Gegenständen zu lecken, Verlust des Appetits, besonders zu fester, consistenter Nahrung, und grosse Neigung zum Genusse solcher Dinge, die sonst nicht zu ihrer Nahrung dienen, wie Holz, Leder, Stroh, Wolle etc., hartnäckige Leibesverstopfung, Neigung zum Beissen, besonders wenn sie zum Zorn gereizt werden, Schnappen in die Luft, als ob sie Fliegen oder Insecten fangen wollten, und ganz besonders eine ganz eigenthümliche Veränderung in der Stimme und in der Art des Bellens. Erstere ist rauh, heiser, widerlich und ängstlich klingend,

§. 2139.

Wenn man für das Wesen der Krankheit Entzündung der Nerven, Entzündung der Magenschleimhaut etc.

und das Bellen ist immer mit einem kurzen eigenthümlichen Geheul verbunden. Bei keinem Hunde verschwindet das Bewusstsein eher, als kurz vor dem Tode, alle wuthkranken Hunde können Wasser und andere Flüssigkeiten sehen, lecken und saufen, sie zeigen in der Regel keinen vermehrten Begattungstrieb; eben so wenig ist das äussere Ansehen der rasend-tollen Hunde in der ersten Zeit der Krankheit verändert, sie tragen den Schwanz noch ganz wie sonst, wedeln auch wohl freundlich mit demselben, wenn eine Veranlassung dazu vorhanden ist, ihr Maul ist in den meisten Fällen mehr trocken als feucht, daher in der Regel ohne Schaum und Geifer; auch gehen solche Hunde ganz wie gesunde und zwar nicht, wie man wohl sonst behauptet, nur gerade aus und immer in derselben Richtung, sondern laufen vielmehr in den verschiedensten Richtungen herum, und springen, wenn der Beiss-Paroxismus eingetreten ist, seitwärts ab, um den Biss anbringen zu können. Erst wenn die Krankheit höher gestiegen, röthen sich die Augen, die schon im Beginne des Uebels einen ganz eigenthümlich schielenden, characteristischen Blick verrathen, es zieht sich die Stirnhaut in Runzeln zusammen und der Schwanz sinkt herab, wodurch das Thier ein mürrisches und schläfriges Ansehen erhält. Auch wird dasselbe zuletzt kreuz- und lendenlahm. — Dieselben Erscheinungen finden sich auch in der Mehrzahl bei der **stillen Wuth** ein, nur mit dem Unterschiede, dass das Thier bei seinem anfänglich veränderten Betragen minder lebhaft ist, dagegen mehr still, ruhig und traurig wird, der Unterkiefer gleich im Beginne der Krankheit wie gelähmt herabhängt, Geifer und alles, was es zu verschlucken sucht, unwillkührlich aus dem Maule läuft und weit weniger bissig ist. — Nach dieser Darstellung ist die bisher angenommene Meinung, dass tolle Hunde auch wasserscheu seien, unrichtig, es kommt dagegen diese Erscheinung bei Menschen vor. — In den Leichnamen solcher Thiere findet man zuweilen keine merkliche Verlezung, zuweilen die auch in menschlichen Leichen nach der Wuthkrankheit sich vorfindenden Veränderungen, den Magen oft angefüllt mit Hobelspähnen, Stroh etc. — Als Hauptursache der auf spontane Weise entstandenen Wuth bei Hunden kann der unbefriedigte Geschlechtstrieb angesehen werden, es tragen übrigens auch schlechte Nahrung, grosse Hize, schneller Wechsel der Temperatur und Mangel an Wasser das ihrige

ansieht, so sucht man auch hier das Ganze nur in einem Theile. Die Krankheit kann als Vergiftungskrankheit, ähnlich der Vergiftung durch den Vipernbiss, angesehen werden, nur ist hier das Gift zugleich ein Contagium, das sich im Körper des Menschen erneuert und vorzüglich durch die Speicheldrüsen ausgeschieden wird.

§. 2140.

Vorhersage. Die Hundswuth tödtet auch bei der zweckmässigsten Behandlung, die man kennt, beinahe immer.

§. 2141.

Prophylaxis. Am zweckmässigsten ist es, die ganze Wunde vollkommen auszuschneiden, selbst wenn sie schon vernarbt wäre, (wobei, nach *Rust's* Bemerkung, darauf Bedacht genommen werden muss, dass die einmal der Bisswunde zugekehrte Seite des Scalpells nicht gewechselt werde, indem man sonst leicht die frische Schnittfläche mit der vergifteten Seite des Scalpells wiederum von Neuem mit Wuthgift impfen könnte) und wenn dieses nicht geschehen kann, mit Wasser oder Salzwasser auszuwaschen, zu scarificiren und das Bluten durch Aufsezen von Schröpfköpfen einige Zeit zu unterhalten; in beiden Fällen wird hierauf die Wunde cauterisirt, mit dem äzenden Kali, oder Spiessglanzbutter, Vitriol,

bei. Um die Häufigkeit dieser Krankheit bei den Hunden zu vermindern, ist es zweckmässig, diese Thiere selbst zu vermindern, was durch eine Hundstaxe erzielt wird. (Nach *Rust's* Mittheilungen wurden bis zum Jahre 1829 25 bis 30 tolle Hunde jährlich in die Thierarzneischule abgeliefert, im Jahre 1830 aber, wo die Hundssteuer eingeführt wurde, nur 3, im Jahr 1831 gar keiner, 1832 ebenfalls 3, und seitdem bis 1836 keiner). Zugleich sollte aber dafür gesorgt werden, dass eine der Zahl der Hunde entsprechende Anzahl Hündinnen vorhanden sei, zu welchem Zwecke *Rust* vorschlägt, für die lezteren keine oder nur eine geringere Steuer als für die ersteren festzusezen.

oder dem glühenden Eisen oder indem man Pulver in sie einstreut und dasselbe anzündet, die Brandschorfe nimmt man bald hinweg und unterhält die Eiterung in der Wunde wenigstens drei Monate lang vermittelst eingestreuter Canthariden und reizender Salben. In dem Umfang der Wunde wird Queksilbersalbe bis zur Erregung des Speichelflusses eingerieben.

Unter den innerlichen, als Prophylactica gerühmten Mitteln haben vorzüglich die Belladonna, das Calomel und (durch *Rust*) die Canthariden einen Ruf erhalten. Man gibt von der Belladonnawurzel zuerst einen Gran vor dem Schlafengehen und steigt täglich um einen halben Gran, bis Verdunklung der Augen und Trockenheit des Schlundes eintritt, sodann lässt man dieselbe einige Wochen in verminderter Gabe gebrauchen. Das Calomel gibt man bis zur Salivation, die man im mässigen Grade 6 Wochen lang unterhält. Von den Canthariden kann man täglich 2 Pulver und auch mehr, jedes zu einem Grane, geben. Es ist übrigens zweifelhaft, ob diese innerlichen Mittel Nuzen gewähren und der Erfolg der Kur nicht vielmehr allein der örtlichen Behandlung zuzuschreiben ist. Ausserdem sind gerühmt worden, der Terpenthin, Kampher, Salmiakgeist etc.

Nach *Marochetti* entstehen am sechsten Tage nach dem Biss oder später kleine Bläschen und Knötchen unter der Zunge, in welchen man mit der Sonde eine Fluctuation fühlen kann, und nach deren Vertrocknung die Wuth ausbreche. Es sollen diese Bläschen mit der Lancette geöffnet und sodann mit dem glühenden Eisen cauterisirt werden, und der Mund mit einer Abkochung der Genista lutea tinctorea ausgespühlt werden. Auch soll der Kranke 6 Wochen lang täglich 1½ Pfund von einer Abkochung der Genista trinken oder viermal täglich das Pulver zu 1 Quentchen nehmen. Um diese Bläschen nicht zu übersehen, ist es nothwendig, den Kranken von

der Zeit der Verwundung an sechs Wochen lang täglich zweimal zu untersuchen. Von mehreren Seiten wurden *Marochetti's* Beobachtungen bestätigt; doch fehlen auch diese Bläschen in vielen Fällen.

§. 2142.

Gegen die schon ausgebrochene Krankheit sind Aderlässe bis zur Ohnmacht, grosse Gaben der Belladonna, das Quecksilber bis zum Speichelfluss, die Canthariden (die ersten Tage 4 bis 6 Pulver, jedes zu 1 Gran, die folgenden Tage 2 Pulver), Kirschlorbeerwasser, Stramonium, Kampher, Moschus, kalte Sturzbäder etc. empfohlen worden. Man entferne dabei Alles, was den Kranken beunruhigt, und suche die Heftigkeit der Zufälle durch Opium, erweichende Umschläge um den Hals etc. zu mässigen. *Rust* räth sehr dringend, auch bei schon ausgebrochener Wuth die Behandlung der Wunde oder Narbe nicht zu vernachlässigen, und dieselbe auch in diesem Zeitpunkt noch auszuschneiden und zu brennen. *Hildenbrand* wandte das glühende Eisen auf eine Seite der Ohrendrüsengegend mit günstigem Erfolge an.

Neunte Krankheitsfamilie.

DIE SEELENKRANKHEITEN.

(*Seelenstörungen*, *Geisteskrankheiten*, *Gemüthskrankheiten*, *das Irresein*, *morbi animi*, *morbi mentis*, *morbi psychici*, *Alienatio mentis*, *Vesaniae*, *Paranoiae.*)

Schriftsteller.

Lorry (Paris 1765, aus dem Lat. v. Ch. A. Wichmann. 2 Bde. Frankf. 1769). — *Dufour* (aus dem Franz. 1769, Leipzig 1786). — *Arnold* (Leicester 1782 und Lond. 1806, a. d. Engl. v. Ackermann, Lpz. 1784—88). — *Perfect* (Lond. 1787 u. 1791, a. d. Engl. v. Michaelis, Leipz. 1789 und 1794). — *Pinel* (Paris 1791, 3me Ed. 1809, a. d. Franz. v. Wagner, Wien 1801). — *Wagner* (Beiträge zur philosoph. Anthropol. 2 Bde. Wien 1794—95). — *Chiarugi* (3 Vol. Florenz 1793 u. Turin 1808, aus d. Ital. Leipz. 1795). — *Crichton* (aus d. Engl. 1798, v. Hoffbauer Lpz. 1816). — *Haslam* (Lond. 1798, aus d. Engl. Stend. 1800, Eb. verschiedene Werke, Lond. 1809, 1810, 1811, 1817). — *Weickard* (Frankf. 1789 u. der 3te Theil des philos. Arztes). — *Coxe* (Lond. 1804, a. d. Engl. v. Reil, Halle 1811). — *Hoffbauer* (1r—2r Th. Hannover 1802, 3r Th. Halle 1807). — *Reil* (Fieberl. Bd. 4. — Eb. Rhapsod. über die Anwend. d. psych. Kurmethode auf Geisteszerrütt. Halle 1803, 2te Aufl. 1818; Eb. u. Hoffbauer, Beiträge zur Beförd. einer Kurmethode auf psych. Wege, 2 Bde. Halle 1808—1810). — *Haindorff* (Heidelb. 1811). — *Marschall* (Lond. 1815, a. d. Engl. v. Romberg,

Berl. 1820). — *Fodéré* (2 Vol. Par. 1816). — *Spurzheim* (London 1817. u. d. Engl. u. Franz. v. Emden, m. 3 K. Hamb. 1818). — *Vering* (2 Bde. Lpz. 1817—21). — *Heinroth* (Lehrb. d. Störungen d. Seelenlebens. 2 Bde. Lpz. 1818. Eb. Anweis. f. angehende Irrenärzte zu richtiger Behandl. ihrer Kranken. Berl. 1826). — *Esquirol* (nach d. betreffenden Art. im Dict. d. scienc. méd. frei bearbeitet v. Hille u. mit Zusäzen v. Heinroth). — *Georget* (Par. 1820, aus dem Franz. v. Heinroth, Lpz. 1821). — *Neumann* (Lpz. 1822). — *v. Lenhossek* (2 Bde. Wien 1824 u. 25). — *Rush* (aus d. Engl. v. König 1825). — *Burrows* (Lond. 1828, aus d. Engl. Weimar 1831). — *Friedreich* (Diagnost. d. psych. Krankh. Würzburg 1829, 2te Aufl. 1832. Eb. hist. krit. Darst. der Theorien über d. Wesen u. d. Siz d. psych. Krankh. Lpz. 1836). — *Leuret* (Paris 1834). — *Prichard* (Lond. 1835). — *Ideler* (Berl. 1835 u. Lpz. 1836). — *Amelung* u. *Bird* (Darmst. u. Lpz. 1836).

Erstes Hauptstück.

Von den Seelenkrankheiten im Allgemeinen.

§. 2143.

Die Seelenkrankheiten sind die Krankheitsformen, in welchen der Verstand und das Gemüth in der Art leidend erscheinen, dass die Kranken in Beziehung auf alle oder auf einzelne Gegenstände einfache Begriffe nicht richtig aufzufassen vermögen, und die Kraft der Selbstbestimmung verloren haben, insofern diese Erscheinungen nicht blos Symptome einer andern Krankheit sind.

§. 2144.

Verlauf. In der Mehrzahl der Fälle entwickeln

sich die Seelenkrankheiten allmälig, zuweilen jedoch entstehen sie plözlich. Dem aufmerksamen Beobachter zeigt sich oft schon frühe, selbst bei den ersten Regungen der Geisteskräfte, der Keim der Krankheit. Es giebt sich derselbe nicht selten dadurch zu erkennen, dass das Individuum etwas Unstetes in seinem Benehmen hat, von einem Gedanken zum andern und von einem Gefühl zu einem oft ganz entgegengesezten schnell überspringt, wobei es meistens in seinen Aeusserungen excentrisch ist, ungewöhnliche und oft schiefe Urtheile fällt und in seinem Blicke etwas Fremdartiges zeigt. Oft zeichnen sich solche Individuen dadurch aus, dass sie eine besondere Neigung zeigen, sich in Gedanken zu verlieren und beinahe immer von einzelnen, oft sehr unbedeutenden Gegenständen, tief ergriffen, das Interesse an allem Uebrigen verloren haben. Oft bemerkt man tief wurzelnde moralische Gebrechen, eine alle Handlungen beherrschende Eitelkeit, einen weit gehenden Egoismus und dabei doch Schwäche des Willens, so dass oft eben so sehr die Kraft fehlt, einem Anspruche oder einem Genusse des Lebens zu entsagen, als die, durch eine gewisse Anstrengung dem Verlangen des Gemüths Befriedigung zu verschaffen. Zuweilen geht dem Ausbruche der Seelenkrankheit das Gefühl der moralischen Auflösung vorher. Schon längere Zeit war der Geist auf nichts Edleres mehr gerichtet, Ausschweifung und fader Umgang haben eine Leere, oder Lüge und Entehrung eine Zerrüttung im Innern hervorgebracht. Der Kranke fühlt seine Lage und weiss sich nicht mehr zu helfen.

§. 2145.

Kommt nun die Krankheit zum Ausbruche, so geschieht dieses entweder auf die Weise, dass die schon vorhandenen Sonderbarkeiten in dem Benehmen des Kranken bis zu der Höhe sich steigern, dass sie den

Charakter der Seelenkrankheit erhalten, die Eigenthümlichkeiten im Urtheil steigern sich zum Wahnsinn und verbinden sich mit dem Unvermögen, die Richtigkeit gemachter Vorstellungen einzusehen, das Hinbrüten über gewisse Gegenstände wird zur Melancholie, das heisst, der Kranke wird gänzlich unvermögend, die Gedanken auf einen andern Gegenstand hinzuwenden etc., oder es zeigen sich bei dem Kranken bisher nicht wahrgenommene Erscheinungen, wo der Fall wieder ein doppelter sein kann. Entweder schlägt ein schon vorhandenes ungewöhnliches Betragen in ein anderes über, der in sich Gekehrte wird plauderhaft, der allzu Schüchterne und Friedliche zanksüchtig, der Gesprächige in sich gekehrt etc., oder es entwickeln sich bei einem Individuum, das bisher keine Hinneigung zur Gemüthskrankheit zeigte, meistens auf eine erschütternde äussere Einwirkung, mehr oder weniger schnell die Symptome der Seelenstörung. — Sehr häufig äussert sich die Krankheit zuerst durch einen Anfall, welcher durch eine äussere Ursache hervorgebracht worden zu seyn scheint, doch ist öfters diese scheinbare Ursache nicht sowohl die Veranlassung der Seelenkrankheit, als vielmehr die Gelegenheit, bei welcher eine schon bestehende Seelenstörung ans Licht tritt. Mit den angegebenen psychischen Störungen entwickelt sich öfters auch ein körperliches Leiden, das bei der ausgebildeten Krankheit immer stärker hervortritt.

§. 2146.

Die vollständig entwickelte Krankheit äussert sich durch folgende Erscheinungen. Vorzüglich sind in der Regel die Aeusserungen des Vorstellungsvermögens (Phantasie) abnorm. Einen unbedeutenden Vorfall malt sich der Kranke zu einem grossen, ganz anders gestalteten Ereigniss aus und sieht in einer ziemlich gleichgültigen Eigenschaft seiner selbst eine Tugend, die ihn zum Gott erhebt oder einen Fehler, der ihn zur verworfen-

sten Kreatur stempelt. Seine Phantasie erkennt z. B. in dem gleichgültigen Lächeln eines Menschen ein Merkmal von den feindlichen Gesinnungen desselben und sezt eine vollständige Geschichte feindlicher Unternehmungen gegen ihn zusammen, sie erklärt ein leichtes körperliches Uebelbefinden auf die wunderlichste Weise, z. B. einen Schmerz aus dem Einnisten von Schlangen und die Schwäche eines Gliedes aus einer Umwandlung desselben zu Glas, sie erblickt als Folge des leichtesten Vergehens gerichtliche Untersuchung und das Schaffot. In den höhern Graden der Krankheit ist die Phantasie auch ohne äussere Erregung thätig, sie schafft Königreiche aus Nichts, und lässt eine Geisterwelt in die Erscheinung treten. Oft beziehen die Ausschweifungen des Vorstellungsvermögens sich nur auf einen oder auf eine Reihe ähnlicher Gegenstände, oft aber erscheinen mehr oder weniger alle Gegenstände in einem falschen Lichte, und zuweilen wechseln die Vorstellungen so schnell auf einander, es findet ein so schnelles Vorüberjagen der Bilder statt, dass, wenn gleich jedes einzelne eine gewisse Vollendung hat, doch der Kranke dieses nicht eben so schnell in Worten ausdrücken kann, und daher eine wundersame Verwirrung in seinen Aeusserungen sich kund gibt. — Das Urtheil und die Combination sind entweder im Allgemeinen falsch, oder nur in Beziehung auf eine Reihe von Gegenständen, so dass der Kranke, so lange die verstimmte Saite nicht berührt wird, keine Dysharmonie zeigt, und sich selbst eine lebhafte Geistesthätigkeit durch scharfes Urtheil und sprühende Wizfunken kund gibt. — In manchen Fällen sind nur einzelne Verstandeskräfte abnorm, in andern sind alle leidend, so dass selbst das Gedächtniss mehr oder weniger erloschen ist.

§. 2147.

Wie die Verstandesthätigkeit abnorm ist, so ist mehr

oder weniger auch das Gemüth leidend. Die meisten Irren werden sehr leicht zu irgend einem Affecte erregt, sie sind ausgezeichnet lustig oder traurig, sie sind furchtsam, argwöhnisch, eigensinnig und gerathen leicht in Zorn. Oft ist die Gemüthsverstimmung die Haupterscheinung der ganzen Krankheit, indem oft das Gemüth so sehr von einem einzigen Affect ergriffen ist, dass die Kranken nichts Anderes zu fühlen und zu denken mehr im Stande sind und ihre Handlungen ganz durch denselben bestimmt werden. Die Gemüthsstimmung bleibt oft die ganze Krankheit hindurch ein und dieselbe, oft ist aber ein grosser Wechsel zu bemerken, und es finden oft sehr schnelle Uebergänge von ausgelassener Freude zur Betrübniss, von Ruhe zur Wuth statt. Zuweilen sind auch die Irren ganz gefühllos, indem nichts Neues sie mehr erfreut oder betrübt und oft auch der ursprüngliche Affect erloschen ist; sie sind ein ausgebrannter Vulcan.

§. 2148.

Bei starker und bei länger dauernder Vertandesstörung und Gemüthsleiden entwickelt sich in der Regel auch ein körperliches Kranksein. Bei den meisten Irren ist der Schlaf unruhig oder gänzlich gestört, nur bei Blödsinnigen ist derselbe vermehrt. Die Sinne sind im Ganzen wenig gestört, am häufigsten ist das Gehör vermindert; es frägt sich übrigens, ob die Erscheinungen, welche Irren manchmal angeben zu sehen, die Stimmen, welche sie zu hören glauben etc., immer nur Dichtungen sind, von der Phantasie geschaffen, oder ob sie öfters wirkliche Spectra sind, welche in den Sinnesorganen oder im Gehirne sich bilden, denen ähnlich, die im Delirium tremens vorkommen. Die thierischen Triebe sind sehr häufig krankhaft, oft ist Heisshunger und grosse Gefrässigkeit vorhanden, oft gänzlicher Mangel an Appetit, häufig haben die Kranken einen grossen

Geschlechtstrieb, oft ist derselbe gänzlich erloschen. Viele Kranken leiden, besonders im Anfange der Krankheit und in den Exacerbationen, an Kopfschmerz, zuweilen auch an epileptischen und andern Krämpfen. Die Unterleibsorgane sind meistens in ihren Verrichtungen mehr oder weniger gestört, insbesondere ist häufig eine sehr hartnäckige Verstopfung vorhanden. Der Herz- und Arterienschlag sind wenig verändert, zuweilen stellen sich übrigens auch Fieberbewegungen ein, die leicht ins Nervöse gehen, und bei Gemüthsbewegungen Herzklopfen. Die Absonderungen sind meistens wenig verändert, die Haut ist mehr trocken als schwizend, die Hautausdünstung und der Athem sind übrigens oft äusserst übelriechend, der Mund manchmal voll Speichel, der Urin oft roth, trüb und sparsam, oft aber auch wasserhell und reichlich. Bei manchen Kranken leidet die Ernährung so, dass Abzehrung eintritt, oft ist aber die Ernährung nicht verändert, und es wird selbst oft der Körper stark genährt und fett.

§. 2149.

Die Dauer der Seelenstörung ist oft nur wenige Tage, oft mehrere Wochen, Monate, Jahre und nicht selten ist selbst die Krankheit das ganze Leben bleibend, sie hält jedoch gewöhnlich nicht in ganz gleichem Grade an, sondern hat Remissionen und Exacerbationen, oft tritt am Abend Verschlimmerung ein, zuweilen soll sich die Krankheit nach dem Stande des Mondes richten und im Vollmond exacerbiren. Zuweilen hält die Krankheit auch vollkommene Intermissionen von mehreren Monaten und längerer Zeit.

§. 2150.

Der *Uebergang in Genesung* geschieht zuweilen sehr schnell, in welchem Falle aber seltener die Heilung von Dauer ist, häufiger allmälig, indem der Kranke nach und nach mehr Theilnahme für fremde Personen und

Gegenstände zeigt, der Gemüthssturm sich legt, Schlaf zurückkehrt, die vegetativen Prozesse wieder normal werden u. s. w. Die Besserung stellt sich entweder ohne den Eintritt besonderer Erscheinungen ein, oder es gehen ihr besondere Zufälle voran, es findet z. B. unmittelbar vor derselben eine heftige Gemüthserschütterung statt, oder die bestehende Art der Seelenstörung schlägt in eine andere Form der Geisteskrankheit noch vor dem Verschwinden der Krankheit über, z. B. die Melancholie in Wuth (die Krisen auf psychischem Wege) oder es kommen kritische Ausscheidungen zu Stande, die unterdrückt gewesene monatliche Reinigung, Hämorrhoiden, Schweisse, Durchfälle, ein Speichelfluss, es bilden sich Hautausschläge, Geschwülste der Speicheldrüsen, kritische Abscesse in den Gliedmassen etc.

§. 2151.

Nachkrankheiten der Seelenkrankheiten sind oft noch eine allzuleichte Beweglichkeit des Geistes und Gemüthes und oft auch eine Schwäche der Geisteskräfte. Nicht selten geht eine Seelenkrankheit in eine andere Form der Seelenstörung über; insbesondere ist der Blödsinn, so wie auch allgemeine Verwirrtheit, ein häufiger Ausgang der andern Geisteskrankheiten. Nicht selten werden durch die Seelenstörungen Gehirnkrankheiten hervorgebracht, Entzündung, Extravasat etc., und in deren Folge Lähmung, die Fallsucht u. s. w. Auch können Störungen in den Unterleibsorganen und andere körperliche Leiden zurückbleiben.

§. 2152.

Den Tod können die Seelenkrankheiten sowohl durch schnelle oder allmälige Verzehrung der Lebenskräfte durch die Heftigkeit der Anfälle und des nicht selten damit verbundenen nervösen Fiebers, als auch durch Zerstörung des Gehirnes zur Folge haben; die meisten Geisteskranken sterben übrigens an andern Krankheiten,

an welchen sie neben der Seelenstörung leiden, an Lungenschwindsucht, Wassersucht, Entzündungen etc.

§. 2153.

Ergebniss der Leichenöffnungen. Bei vielen verstorbenen Irren findet man weder im Gehirne noch in andern Theilen irgend Etwas, was Bezug auf die Seelenkrankheit hat, in manchen aber findet man insbesondere im Gehirne Veränderungen, die bald als die Folge, bald als die Ursache der gestörten Aeusserung der Seelenthätigkeit angesehen werden müssen, wie Entzündungen, Ausschwizungen, Verhärtungen im Gehirne, einen fehlerhaften Bau des Schädels etc., welche Veränderungen in den Kapiteln von den einzelnen Arten der Seelenkrankheiten näher dargestellt werden sollen, in so fern sie besondern Arten der psychischen Krankheiten vorzugsweise zukommen.

§. 2154.

Anlage. Eine krankhafte Veränderung der psychischen Thätigkeit wird zwar auch bei Thieren bemerkt, doch kommt dieselbe, wie es scheint, nur als Symptom körperlicher Krankheiten vor, zu den eigentlichen Seelenstörungen scheint nur der Mensch Anlage zu haben. Es wird diese Anlage zum Theil durch die eigenthümliche Stufe der Entwicklung seines Geistes bedingt, indem ihm vergönnt ist, höhere Begriffe, wie Gott, Ewigkeit u. s. w. gleichsam zu ahnen, aber nicht, sie vollständig aufzufassen, und daher leicht ein endloses Abmühen seines Geistes entsteht, und zum Theil durch seinen Standpunkt als moralisch-freies Wesen, indem hierdurch leicht ein zerstörender Kampf des Willens mit den Trieben eintritt, was bei dem Thiere nicht der Fall ist.

Eine besondere Anlage haben Individuen von glänzenden Verstandeskräften, insbesondere einer regen Phantasie, welche daher leicht im Fluge des Denkens über die Grenzen des menschlichen Begreifens emporsteigen,

ferner solche mit sehr beweglichem Gefühle und starken Leidenschaften und vernachlässigtem Gebrauche der Willenskräfte, so wie auch solche mit viel Gefühl und wenig Verstand, welche daher leicht den äussern Stürmen Preis gegeben sind und nicht vermögen, über die Regungen des Gemüthes Herr zu werden, und endlich solche mit leicht erregbarem Gehirn und Nerven und daher mit Anlage zu Schmerzen, Krämpfen etc., wobei leicht das psychische Leben in Mitleidenschaft gezogen wird.

Die Anlage ist oft angeerbt. Das sanguinische, das cholerische und das melancholische Temperament besizen sie mehr als das phlegmatische. Das Alter von der Mannbarkeit an bis zum 50sten Jahre ist dasjenige, in welchem die Seelenstörungen am häufigsten wahrgenommen werden. Die Krankheit ist so ziemlich gleich häufig beim männlichen und dem weiblichen Geschlecht, es bedingen aber bei dem leztern gewisse Veränderungen im körperlichen Zustand eine besondere Anlage, nämlich das Wochenbett, die Schwangerschaft und die Zeit der monatlichen Reinigung.

§. 2155.

Gelegenheitsursachen sind: *a*) solche Einwirkungen, welche die intellectuelle Kraft des Menschen über ihr Vermögen beschäftigen; angestrengtes Nachdenken über Gegenstände, welche der Verstand des Menschen nicht begreifen kann, über Gott, die Schöpfung, Anfang und Ende der Schöpfung, Begrenzung oder Unendlichkeit derselben, so wie übermässiges Studiren etc., häufiger noch *b*) solche Einflüsse, welche das Gefühl sehr erschüttern oder die Leidenschaften aufregen oder verlezen, die heftiger wirkenden Ursachen des Schreckens und des Kummers, häusliches Unglück, der Schrecken bei grossen politischen Ereignissen, die Furcht vor der Entdeckung eines Verbrechens, Verlez-

ungen der Ehre und Beleidigung der Eitelkeit, Unglück in der Liebe etc.; endlich *c*) solche, welche das Nervensystem, insbesondere das Gehirn verlezen, wie Versezungen der Kindbettreinigung, des Monatsflusses oder von Absonderungen nach dem Gehirne, die Fallsucht, der Sonnenstich, Verlezungen des Gehirnes, Gehirnentzündungen und ihre Folgen, übermässige Geschlechtsreizungen, ein heftiges hysterisches oder hypochondrisches Leiden, Stockungen im Pfortadersystem, gastrische Reize etc.

§. 2156.

Wesen der Seelenkrankheiten. In den ältesten Zeiten, so wie bei den rohen Völkern der gegenwärtigen Zeit, hielt man die Geisteskranken für Besessene, das heisst für Individuen, in welchen böse Dämonen ihren Wohnsiz genommen haben. — *Hippokrates* leitet die Melancholie, so wie auch die Manie und die Verwirrung von einem durch Galle und Schleim verdorbenen Blute ab, und in einer untergeschobenen hippokratischen Schrift findet man die Bemerkung: ein krankhafter Hirnzustand sei von Galle und Schleim abzuleiten, wovon jene die wüthende Melancholie erzeuge und dieser die stille [1]). Die Idee von der Erzeugung der Seelenstörungen durch das Ueberwiegen der erwähnten Säfte und vorzüglich auch durch schwarze Galle (daher der Name Melancholie) war im Alterthume die vorherrschende, doch hat man sich im Allgemeinen wenig mit der Theorie beschäftigt, obgleich schon treffliche Methoden der Behandlung, vorzüglich durch *Asklepiades*, eingeführt und in den Werken von *Celsus, Aretäus, Cälius Aurelianus* und *Galen* gute Darstellungen psychischer Krankheiten und ihrer Behandlung gegeben sind.

Seit der wissenschaftlichen Reform ist der Siz und das Wesen der Seelenkrankheiten Gegenstand vielfacher

1) Vergl. *Heinroth's* Lehrbuch der Seelenkrankheiten.

Forschungen geworden. Die Ansichten der Aerzte wichen in zwei durchaus entgegengesezten Richtungen von einander ab. Viele Aerzte halten die Krankheit für eine organische Störung, und zwar nehmen Manche an, es könne das Leiden aus verschiedenen Theilen des Körpers seinen Ursprung nehmen. Auf diese Seite neigen sich *Pinel*, welcher von der Manie sagt, dass der primitive Siz dieser Krankheit in der Gegend des Magens und der Gedärme zu liegen, und von diesem Centrum aus die Verwirrung des Verstandes, wie durch eine Art Ausstrahlung, sich auszubreiten scheine; [1]) *Esquirol*, welcher annimmt, es seien bald die Enden des Nervensystems und die an verschiedenen Punkten befindlichen Empfindungsheerde, bald der Verdauungsapparat, bald die Leber der Hauptsiz der Krankheit; [2]) *Amard*, der den Siz der Manie ohne Delirium, der Melancholie und Hypochondrie in den grossen sympathischen Nerven und den der Manie mit Delirium, der Narrheit und des Blödsinns in das Gehirn legt [3]) und *Nasse*, welcher das Herz als eine reiche Quelle der Seelenstörungen ansieht. [4]) Andere Aerzte, welche die Seelenkrankheiten ebenfalls als organische Störungen betrachten, nehmen ihren Siz ausschliesslich im Gehirne an. Hieher gehören *Reil*, [5]) *Spurzheim*, [6]) *Georget* [7]) und Andere. Einen vorzüglichen Einfluss hatte auf diese Ansicht die Organenlehre von *Gall*, [8]) welche in der neuern Zeit *Combe* [9]) weiter ausgebildet hat, und nach welcher das Gehirn aus einer

1) Traité sur l'alénation mentale. ed. II. p. 141. — 2) Dictionn. des scienc. med. art. Folie. — 3) Traité analitique de la Folie, Lyon 1807. — 4) *Nasse*, Zeitschrift für psych. Aerzte. Von der psych. Beziehung des Herzens, Lpz. 1818. — 5) Fieberl. 3te Ausg. B. 4. S. 480. — 6) Beobachtungen über den Wahnsinn, Hamb. 1818. — 7) Ueber die Verrücktheit, übersezt von Heinroth, Lpz. 1821. St. 24. — 8) Par. 1808, deutsch. Strassb. 1808. Par. 1810—22. — 9) In seinem System der Phrenologie.

Mehrheit von Organen besteht, aus deren Zusammenwirken die Gesammtheit der geistigen Funktionen hervorgeht. — Bei diesen Annahmen des organischen Ursprungs der Seelenkrankheiten hat man zum Theil die Meinung, dass die Seelenäusserungen eine reine organische Verrichtung seien; mehr aber ist die Ansicht verbreitet, dass ein höheres psychisches Prinzip vorhanden sei, das aber zu seiner Aeusserung der Organe bedürfe, und dass die Seelenkrankheiten nicht ihren Grund in dem immateriellen Geiste habe, sondern in den zu den Geschäften des Denkens mitwirkenden Organen. Diese Ansicht haben ausser Andern *Spurzheim* [1]) und *Hartmann* [2]) ausgesprochen. *Groos* hält zur Entwicklung von Seelenkrankheiten ebenfalls die Entstehung einer organischen Abnormität nothwendig, doch lässt er das psychische Prinzip dadurch mitwirken, dass er die Geisteskrankheiten aus dem Zusammenflusse einer psychischen Negation und eines somatischen Positiven erklärt. [3])

Andere Aerzte halten die psychischen Krankheiten für ein Leiden der Seele selbst. Zu diesen Aerzten gehören vorzüglich *Heindorf* [4]) und *Heinroth*. Die Ansichten des leztern Arztes sind im Wesentlichen folgende: Wir haben, wie die Flamme des Lichtes, welche lediglich durch das Zusammentreten des Sauerstoffs und des Stickstoffs erzeugt ist, kein selbstständiges Dasein und sind nur eine Erscheinung, welche durch das Aufeinanderwirken der beiden grossen, einander entgegenstrebenden Kräfte der Natur hervorgebracht ist; wird nun das negative oder böse Prinzip in uns überwiegend,

1) A. a. O. — 2) In seinem vortrefflichen Werke: der Geist des Menschen, Wien 1820. — 3) Entwurf einer philosoph. Grundlage für die Lehre von den Geisteskrankheiten, Heidelb. u. Lpz. 1828. — 4) Vers. e. Path. u. Therap. der Geistes- und Gemüthskrankheiten, Heidelb. 1811. §. 22 u. d. f.

so dass wir dadurch völlig gebunden werden, so ist dadurch Seelenstörung gegeben [3]).

§. 2157.

Um uns einen möglichst klaren Begriff von dem Wesen der Seelenkrankheiten zu bilden, ist es vorerst nothwendig, zu untersuchen, welche Theile des Menschen (Kräfte und Similartheile) einen unmittelbaren Antheil an dem Krankheitsprozesse nehmen. Da man die Entstehung der Seelenstörung häufig einem Fehler in dem Blute zuschreibt und selbst in der neuesten Zeit noch *Fodéré* [5]) die Krankheit aus Störungen eines in dem Blute haftenden Lebensgeistes hergeleitet hat, so müssen wir zuerst untersuchen, welchen Antheil das Blut an den Seelenstörungen nehme. Ausser andern Gründen, die mich veranlassen, dem Blute keinen unmittelbaren Antheil an den Prozessen der Empfindung und der Gedankenbildung zuzuschreiben, ist die Thatsache entscheidend, dass bei niedern Thieren die erwähnten Verrichtungen statt finden, wenn auch der Körper vollständig vom Blute entleert ist; [1]) wirkt aber das Blut bei den intellectuellen Funktionen in ihrem normalen Zustand nicht unmittelbar mit, so können wir auch nicht annehmen, dass dasselbe in den Seelenkrankheiten ein in den Krankheitsprozess selbst eingehender Factor sei und ich kann daher einen Fehler des Blutes nur als ein entfernteres Krankheitsmoment ansehen.

Da das Gehirn unstreitig ein Hauptsiz der Seelenkrankheiten ist, und in demselben den Nerven keine andern Similartheile entgegen stehen als das Blut, das Blut aber nicht ein den Krankheitsprozess bildender Factor ist, so müssen wir annehmen, dass die Seelen-

1) Lehrb. der Seelenstörungen, B. I. S. 378 u. d. f. — 2) Traité d. délire. T. II, pag. 133 sq. — 3) Vergleiche hierüber den §. 1835.

krankheiten ein ausschliesslich in dem Nervensystem vor sich gehender Krankheitsvorgang sind.

Betrachten wir sämmtliche Krankheiten, bei welchen Störungen der intellectuellen Verrichtungen vorkommen, so finden wir, dass dieselben Symptome vieler unbezweifelt rein körperlicher Krankheiten sind. Abgesehen von der Zerstörung der gröbern Materie kommen solche Störungen, insbesondere Irrereden, bei solchen Krankheiten vor, in welchen das Nervenagens, das bei der Blutbewegung, der Muskelbewegung etc. mitwirkt, den einen Krankheitsfactor bildet, in so fern hierbei das Gehirn mitleidet. Dieses ist z. B. der Fall bei der Gehirnentzündung und bei der eigenthümlichen, mit dem beständigen Zittern der Muskeln verbundenen Gehirn- und Nervenaffection, die man Delirium tremens nennt. — Diese Störungen in den intellectuellen Aeusserungen zählt man nicht zu den Geistes- und Gemüthskrankheiten und zwar mit vollkommenem Rechte, indem sie mit dem Seelenleben, wie es bei demselben Individuum ausserhalb des krankhaften Zustandes sich darstellt, durchaus in keiner Beziehung stehen, sondern den bei jeder Geistes- und Gemüthsbeschaffenheit gleichmässig vorkommenden Sinnestäuschungen analog sind, indem, wie bei diesen durch die Sinnesorgane, bei den genannten Krankheiten durch die Gehirnorgane Bilder vor die Seele geführt werden, die diese gleichsam als etwas äusseres anschaut, und indem bei diesen Krankheiten eine psychische Behandlung durchaus ohne Nuzen ist und dagegen oft ein rein somatisches Mittel den Krankheitszustand fast augenblicklich hebt, wie z. B. das auf das Nervenagens überhaupt so kräftig wirkende Opium dieses bei dem Delirium tremens thut.

Diesemnach müssen wir annehmen, dass bei den Seelenkrankheiten noch ein anderes Prinzip als jenes Nervenagens wirke, und untersuchen wir, welche Stör-

ungen in den intellectuellen Funktionen wir unzweifelhaft zu den Seelenkrankheiten zählen, so finden wir, dass es vorzüglich jene sind, die durch eine auf den Geist oder das Gemüth unmittelbar wirkende Ursache hervorgebracht sind, und welche mit dem Seelenleben, wie es ausser der Krankheit sich äussert, mehr oder weniger in Beziehung stehen.

Sehen wir nunmehr, dass die Störungen der intellectuellen Funktionen sowohl von dem Nervenagens als auch von einem höhern Prinzip, das wir noch über das Nervenagens zu stellen uns genöthigt sehen, ausgehen können, so frägt es sich, wie verhalten sich beide Theile zur Krankheit? ist der eine von ihnen etwa nur ein entfernteres Krankheitsmoment, wie z. B. auch das Blut. das durch Ueberfüllung der Gefässe des Gehirns die intellectuellen Verrichtungen hemmen kann, oder sind beide Theile unmittelbare Factoren des Krankheitsprozesses? — Es scheint mir, dass zu den intellectuellen Verrichtungen beide Agentien, das Nervenagens und die höchste Kraft in uns, die wir Seele nennen, unmittelbar mitwirken. Dem Nervenagens allein können wir die intellectuellen Funktionen nicht zuschreiben, denn einmal sehen wir, dass dasselbe in allen übrigen Verrichtungen nie für sich allein eine Thätigkeit äussert, sondern immer durch die Entgegenwirkung eines zweiten Factors, z. B. der Blutkügelchen oder der Muskularsimilartheile, und sodann müssen wir auch nach dem oben Gesagten anerkennen, dass die intellectuellen Störungen, die unzweifelhaft durch jenes Nervenagens erregt sind, keine Seelenkrankheiten sind; die Seele für sich aber vermag eben so wenig, in dem an den menschlichen Organismus gebundenen Zustand, ohne Mitwirkung der Organe irgend eine Thätigkeit zu äussern und erhält insbesondere durch das Nervenagens die Eindrücke der Aussenwelt, gleichsam das Materielle, welches die Seele zur Bildung

der Vorstellungen und Begriffe nothwendig hat, und durch welches diese auch wiederum mehr oder weniger ihre Gestalt erhalten.

Können wir nach diesen Voraussezungen die psychische Thätigkeit in eine Wechselwirkung zwischen der Seele und dem Nervenagens sezen und müssen wir aus den oben angegebenen Gründen die Störungen in den intellectuellen Verrichtungen, welche unzweifelhaft durch eine primäre Verlezung des Nervenagens hervorgebracht sind, von den Seelenkrankheiten ausschliessen, so müssen wir das Wesen der psychischen Krankheiten dahin bestimmen: Seelenkrankheiten sind die krankhaften Wechselwirkungen zwischen der Seele und dem Nervenagens, welche von der Seele erregt sind.

§. 2158.

Indem die gegebene Begriffsbestimmung die Seelenkrankheiten als eine krankhafte Wechselwirkung zwischen der Seele und dem Nervenagens bezeichnet, lässt sie noch zu bestimmen übrig, durch welches Verhältniss in den Wechselwirkungen zwischen der Seele und dem Nervenagens die Krankheit gesezt sei, und wodurch sich also die Seelenkrankheiten von den mannigfaltigen, in die Grenzen der Gesundheit fallenden Weisen, in welchen sich die geistige Thätigkeit nach Verschiedenheit des Characters des Individuums, nach dem Vorherrschen der Tugend oder der Lasterhaftigkeit etc. äussert, unterscheiden.

Das Merkmal der Gesundheit in den psychischen Verrichtungen ist die Freiheit in dem Geschäfte des Denkens, so wie im Handeln; das Merkmal der Krankheit ist das Gebundensein an gewisse Vorstellungen und Gefühle, so dass die Seele die Fähigkeit des freien Urtheils verloren hat und oft ganz ausser Stand ist, sich von einem Gegenstand loszureissen und nach freiem

Willen ihrer Thätigkeit eine bestimmte Richtung zu geben.

Diese Unfreiheit in der psychischen Thätigkeit scheint auf folgende Weise entstehen zu können. Wie in der Gehirnentzündung, dem Delirium tremens und andern somatischen Krankheiten durch die von aussen einwirkenden Reize viele frühere Eindrücke der Gehirnorgane wieder erregt werden, die der Seele sich vorstellend mannigfaltige Phantasiebilder erzeugen, so kann auch durch heftige und öfters wiederholte gleichartige Einwirkung der Seele auf das Gehirn die Reaction des Nervenagens gegen die Seele krankhaft werden. Gewisse von der Seele erhaltene Eindrücke stellen sich unwillkürlich immer von Neuem dar und binden gleichsam die Seele an sie. Wechseln diese Eindrücke schnell auf einander, so entsteht allgemeine Verwirrung; ist es nur ein einziger bestimmter Eindruck, der eine krankhafte Wechselwirkung zwischen den Organen und der Seele veranlasst und nur in Beziehung auf eine bestimmte Vorstellung den Vorgang des Denkens krankhaft macht, so ist dieses der fixe Wahn; ist es ein Gefühl, das die Seele in den gebundenen Zustand versezt, so ist dieses nach Verschiedenheit der Reaction entweder die Schwermuth oder die Wuth.

§. 2159.

Seelenkrankheiten sind demnach die durch eine bestimmte Weise der Einwirkung der Seele auf die bei den intellectuellen Verrichtungen mitwirkenden Organe bedingten und zunächst durch eine krankhafte Rückwirkung der leztern hervorgebrachten derartigen Störungen in den Vorgängen zwischen dem höchsten, im Menschen wirkenden Prinzip und dem Nervenagens, dass das erstere nicht mehr als das frei bestimmende erscheint.

§. 2160.

Die Vorhersage. Die Seelenkrankheiten sind im

Allgemeinen schwer zu heilen und nach geglückter Heilung treten leicht Recidive ein; lebensgefährlich sind sie dagegen selten. Angeborne Störungen in den Aeusserungen der intellectuellen Kräfte sind in der Regel unheilbar, meistens auch die aus einer erblichen Anlage hervorgegangenen Geistes- und Gemüths-Krankheiten. Wenig Hoffnung ist auch vorhanden, wenn die Krankheit ohne bedeutende äussere Ursache mehr allein aus der Anlage sich entwickelt hat, wenn sie Individuen von höherm Alter, namentlich solche über 50 Jahre befällt, wenn die veranlassende Ursache fortwirkt und wenn die Krankheit schon lange gedauert hat. Eher ist Heilung zu erwarten, wenn das Leiden bei geringer Anlage beinahe allein durch die äussere Ursache veranlasst worden ist, wenn die Kranken noch jung, z. B. 20 bis 30 Jahre alt sind und die Krankheit noch nicht lange gedauert hat, z. B. nur wenige Wochen und wenigstens nicht länger als zwei Jahre. Auch ist der Erfolg der Behandlung sehr von der Art der Seelenstörung abhängig.

§. 2161.

Behandlung der Seelenkrankheiten. a) *Nach den Anzeigen aus den Ursachen.* Man suche die etwa noch fortdauernd auf den Geist oder das Gemüth einwirkenden schädlichen Einflüsse zu entfernen. Schon zu diesem Zwecke ist es meistens gut, den Kranken aus seinen gewöhnlichen Verhältnissen herauszureissen, durch die Vornahme einer Reise oder durch Uebersiedlung desselben in eine gute Anstalt. Aendern sich seine äussern Verhältnisse zu seinen Gunsten, so muss man sich bemühen, von dem geschehenen glücklichen Wechsel ihm die Ueberzeugung beizubringen. In der Regel ist es zuträglich, den Gegenstand, auf den sich die Seelenstörung bezieht, so wenig wie möglich im Gespräche zu berühren etc. Ebenso wie die psychi-

schen Einwirkungen müssen die körperlichen Zustände, die auf die psychische Thätigkeit nachtheilig einwirken, gehoben werden; hartnäckige Verstopfungen und Stockungen im Pfortadersysteme sucht man zu beseitigen, Congestionen nach dem Gehirne oder einen entzündlichen Zustand zu heben, dem zu grossen Sinken der Kräfte, besonders im Nervensysteme, Einhalt zu thun, den Schlaf, wo er fehlt, zu bewirken etc.

§. 2162.

b) *Nach den Anzeigen aus dem Wesen der Krankheit.* Da der Krankheitsprozess, in welchem die Seelenstörungen bestehen, durch das Zusammenwirken des höchsten Prinzipes in uns und des Nervenagens hervorgebracht sind, so wirken wir unmittelbar auf den Krankheitsprozess ein, sowohl durch die Einwirkung auf den einen als durch die auf den andern Factor. Die psychische Behandlung ist häufig unzureichend, da die Rückwirkung des Nervensystems oft von der Art ist, dass die Seele mit aller Anstrengung nicht mehr zur freien Thätigkeit gelangen kann, und eine rein somatische Behandlung ist oft fruchtlos, da die Einwirkungen der Seele das Nervensystem immer in einem krankhaften Zustand erhalten. Wir haben demnach die doppelte Aufgabe, 1) unmittelbar auf die Seele einzuwirken, um ihre Wirkung auf die bei den intellectuellen Verrichtungen thätigen Organe zum Normalen zurückzuführen, und 2) die nöthigen Veränderungen in der Thätigkeit des Nervensystems hervorzubringen, um die Rückwirkung desselben auf die Seele zu ordnen.

§. 2163.

1) *Umstimmung der Wechselwirkung zwischen der Seele und den Organen durch Einwirkung auf das psychische Prinzip.* Wir haben hier zum Theil die Aufgabe, die Einwirkung der Seele auf die an den intellectuellen Verrichtungen Theil nehmenden Organe

in der *Art* ihrer Wirkung umzustimmen, zum Theil die Wirkung derselben überhaupt zu beschränken und auch in manchen Fällen dieselbe zu erhöhen. Den ersten und zweiten Zweck erreichen wir sehr häufig durch die nämlichen Mittel.

§. 2164.

Um die *Art* der Seelenstimmung zu verändern, müssen wir die Eigenthümlichkeiten des Geistes und Gemüthes des Kranken genau zu erkennen suchen. Am sichersten erreichen wir in der Regel unsern Zweck, wenn wir den Kranken an *der* Eigenthümlichkeit seines Characters anfassen, welche das prädisponirende Moment der Seelenstörung wurde. — Wir können hier zweierlei Wege einschlagen: Entweder suchen wir das Besondere in seinem Character auszugleichen, insbesondere den etwa vorhandenen moralischen Fehler zu verbessern, indem wir z. B. dem Geiste des Egoisten eine höhere Richtung zu geben suchen, oder wir verzichten auf diese Verbesserung des Individuums und bemühen uns, nur die schwache Seite desselben vor Verlezung zu schüzen, und den auf dieselbe gemachten Eindruck, wodurch die Seelenstörung entstand, durch einen entgegengesezten Eindruck wieder auszugleichen. Wir heilen z. B. die durch Kränkung entstandene Melancholie des Ehrgeizigen, indem wir durch Lob und andere Anerkennungen dem Ehrgeize desselben Befriedigung zu verschaffen suchen.

Ausser diesem das Uebel in seiner Wurzel angreifenden Verfahren vermögen wir noch auf verschiedene Weise die psychische Thätigkeit umzustimmen. Wir bekämpfen die einzelnen unrichtigen Vorstellungen unmittelbar durch den Verstand, wobei übrigens ein unmittelbarer Widerspruch oder eine ausführliche Beweisführung meistens wenig nüzen, sondern mehr frappante Gegensäze, wizige Einwürfe etc. Wir suchen ferner die psychische Thätigkeit auf einen andern Gegenstand

zu leiten. Dieses bewirken wir, indem wir das Gespräch auf andere Gegenstände führen und durch Gesellschaft, Lectüre, Reisen und vorzüglich durch Anhalten zum ununterbrochenen Arbeiten, die Aufmerksamkeit des Kranken auf andere Gegenstände als die, auf welche sich seine Seelenstörung bezieht, zu fesseln suchen, und auch dadurch, dass wir neue Gefühle, Gemüthsaffecte und selbst Leidenschaften in dem Kranken erregen. In dem einen Falle suchen wir ihn zur Freude zu stimmen durch eine freundliche Behandlung, den Anblick freudiger Gegenstände, durch Erweckung der Hoffnung, durch Ueberraschung, durch Musik etc., wir suchen das Gefühl der eigenen Kraft zu stärken, suchen die Gefühle der Zuneigung und selbst der Liebe zu erwecken etc.; in einem andern Falle erregen wir das Gefühl der Scham durch Demüthigung und Verachtung, wir versezen den Kranken in eine heilsame Furcht, oder bedienen uns selbst des Schreckens, um auf ihn zu wirken, oder erregen seinen Zorn, um seiner Geistesthätigkeit eine andere Richtung zu geben. — In manchen Fällen hält es sehr schwer, den psychischen umstimmenden Mitteln Eingang zu verschaffen, indem die Seele des Kranken beinahe für keine äussern Eindrücke mehr empfänglich ist. Man sucht in solchen Fällen die Aufmerksamkeit des Kranken zu erwecken und die erste Ableitung der geistigen Thätigkeit von dem Wahne auf andere Gegenstände vorzüglich durch folgende Mittel zu bewirken: durch aussergewöhnliche Sinneseindrücke, z. B. ein ungewöhnliches Geräusch, durch das Vorlesen interessanter Schriften, wobei man unrichtig lesen kann, so dass der Sinn entstellt wird, durch Belehrung, die man bei dem Kranken sucht, vorzüglich aber durch Erregung eines körperlichen Leidens, durch Hervorbringung eines Schmerzes vermittelst der Senfteige, Blasenpflaster, der Brechweinsteinsalbe und selbst der Moxen oder des Glüheisens,

so wie durch Erregung von Uebelkeit und Erbrechen vermittelst der innerlichen Anwendung der Nauseosa und der Brechmittel, und vermittelst der Schaukeln und Drehmaschinen, durch Erregung des Gefühls des Hungers, durch Erschütterung des Körpers vermittelst der Sturzbäder etc.

§. 2165.

Um die excessive Thätigkeit der Seele zu mässigen, dienen die meisten der im vorhergehenden Paragraphen angegebenen Mittel, indem dadurch, dass die Seelenthätigkeit eine andere Richtung erhält, auch in der Regel die Stärke der Aeusserung vermindert und zum Normalen zurückgeführt wird. Ausserdem vermögen wir aber auch die dem Grade nach das richtige Maas überschreitende Seelenthätigkeit durch folgende psychische Mittel zu beschränken: Wir entziehen die Reize, die die Seele zu einer bestimmten Thätigkeit erregen und nach Umständen, so viel wie möglich, auch alle Reize, die überhaupt ihre Thätigkeit erwecken. Wir hüten uns, die Erinnerung auf das hinzuleiten, was die Krankheit hervorgebracht hat, und irgend die verstimmte Seite zu berühren, ja manchmal ist es nothwendig, um die unordentlichen Schwingungen sich legen zu lassen, den Kranken ganz sich selbst zu überlassen oder ihm selbst alle Reize, die auf die Seele wirken, durch Verbringung in die dunkle Kammer möglichst zu entziehen, oder durch Erregung eines tiefen Schlafes ihn wenigstens momentan zu beruhigen. Schweift der Geist des Kranken schnell von einem Gegenstand zum andern und wechseln die Gefühle zu rasch, so suche man diese ausschweifende Thätigkeit durch Fixirung der Thätigkeit auf einen bestimmten Gegenstand zu beschränken, insbesondere durch eine dem Kranken aufgegebene Arbeit. Ist der Kranke exaltirt und pflegt er sich über die Grenzen unseres Begreifungsvermögens zu erheben, so

beschränke man diesen Flug durch Anhalten zu einer den Geist weniger in Anspruch nehmenden Arbeit, z. B. zum Abschreiben. Zuweilen ist es auch nothwendig, nicht allein um den Kranken unschädlich zu machen, sondern zum Zwecke der Heilung, die ausschweifende Thätigkeit desselben durch Zwang und selbst durch Strafe zu mässigen, und zwar ist dieses nicht allein bei wirklichen Handlungen zulässig, sondern zuweilen bei Ausschweifungen in der Phantasie und den Gefühlen nüzlich.

§. 2166.

Um die Seelenthätigkeit, wo sie darnieder liegt, durch psychische Mittel zu erwecken und zu erhöhen, halten wir den Kranken zur Thätigkeit an, von den leichtern Uebungen zu den schwerern übergehend, doch ist es zuweilen nothwendig, um den Kranken aus der Erstarrung, in welche die Seele versunken ist, zu wecken, sogleich starke psychische Eindrücke in Anwendung zu bringen, in welchem Falle man, wenn die Seelenthätigkeit durch das angewandte Mittel erregt ist, zu schwächer erregenden Mitteln übergehen kann.

§. 2167.

Um auf diese Weise die psychische Thätigkeit der Kranken zu lenken, muss der Arzt sogleich im Anfange der Behandlung ein Uebergewicht über den Kranken zu erhalten oder nach *Pargeters* Ausdruck sich denselben anzueignen suchen. Er kann dies nur, wenn er selbst keine Schwäche zeigt, das heisst, wenn sein Verstand scharf, sein Wille entschieden und sein Gemüth frei von Leidenschaft ist. Vortheilhaft ist es, wenn der Kranke ganz den Händen des Arztes übergeben ist, so dass dieser auch die äussern Mittel besizt, um den Kranken von sich abhängig zu machen, wie dieses insbesondere in gut eingerichteten Anstalten der Fall ist.

§. 2168.

2) *Umstimmung der Wechselwirkung zwischen der Seele und den Organen durch Einwirkung auf die bei den intellectuellen Verrichtungen mitwirkenden Organe.* — Wir vermögen die psychischen Verrichtungen durch Einwirkung auf die Organe zu vermindern und auch dieselben zu befördern.

§. 2168.

Wir vermindern die Thätigkeit der bei den Seelenkrankheiten betheiligten Organe:

1) Durch Ableitung der Nerventhätigkeit auf andere Organe (die antagonistische Methode, in der neuern Zeit vorzüglich von *Horn* in Anwendung gebracht). Auf eine milde Weise wird das Nervenagens vom Gehirn und Gangliensystem schon durch einen angemessenen Gebrauch der Muskelkräfte abgeleitet, und es ist daher auch in dieser Hinsicht eine etwas anstrengende körperliche Arbeit sehr wohlthätig.

Die Nerventhätigkeit ausgleichend und von den innern Organen ab, mehr nach der Peripherie leitend, wirken die allgemeinen warmen Bäder und die Fussbäder. Vielleicht auf eine ähnliche Weise, durch Erregung und Umstimmung der Hautthätigkeit, wirken auch theilweise die Begiessungen mit kaltem Wasser und die kalten Waschungen des Körpers. Vom Gehirne leiten auch ab das Reiben der Haut, das Bürsten der Fusssohlen, trockene Schröpfköpfe, Senfteige, Blasenpflaster, die Brechweinsteinsalbe (vorzüglich in den Nacken eingerieben), Fontanelle, Haarseile, Moxen und das Glüheisen.

Vorzügliche Mittel, um die Nerventhätigkeit vom Gehirne abzuleiten, sind ferner die Eckel und Brechen erregenden Mittel. Man gibt, um erstern zu erregen, die Brechmittel in kleinen Gaben, um lezteres zu bewirken, in vollen Gaben, und hat oft sehr bedeutende Dosen nothwendig. Am gebräuchlichsten ist der Brech-

weinstein; man gibt ihn zuerst in den gewöhnlichen Gaben und steigt sodann bis zu 10, 20, ja bis zu 30 Granen, in mehrere Portionen vertheilt in einem Tag gegeben; nach *Willis* und *Cox* soll aber der Brechweinstein in den gewöhnlichen Gaben genügend wirken, wenn man seiner Anwendung einen oder zwei Grane Opium vorausschickt. Die Ipecacuanha gibt man, um Eckel zu erregen, im Aufguss zu 2 Drachmen auf 6 Uncen Flüssigkeit, jede Stunde 1 Löffel voll, und kann, um Brechen zu veranlassen, bis zu einer Unce im Aufguss steigen. Vorzüglich möchte auch die von *Magendie* entdeckte Emetine passen. Das Zincum sulphuricum wird als Nauseosum zu 4 — 8 Granen in 6 Uncen Wasser, jede Stunde ein Löffel voll, angewandt, als emeticum zu 6 Granen bis zu 1 Scrupel in 3—4 Uncen Wasser, jede halbe Stunde 1 Löffel voll, oder auch 6—10 Grane mit einem Male in einer Tasse Fleischbrühe gereicht. Das Cuprum sulphuricum, besonders von englischen Aerzten in Gebrauch gezogen, wird als Nauseosum zu 6 – 10 Granen in 5—6 Uncen Wasser löffelvollweise gegeben, als Brechmittel zu 10 bis 30 Granen in derselben Form. Das Cuprum sulphurico-ammoniacum wird vorzüglich als Nauseosum gerühmt, zu welchem Zwecke man 4 — 10 Grane in 6 Uncen Wasser löffelvollweise nehmen lässt. Die Squilla wird vorzüglich als Nauseosum gebraucht, alle 2 Stunde 5 — 10 Grane, oder eine halbe Unce im Aufguss von 6 — 8 Uncen löffelvollweise. Zu gleichen Zwecken werden auch Radix Asari, Colchici, die Ignatiusbohne etc. angewandt. — Eben so kräftig und noch eingreifender wirken Eckel und Erbrechen erregend und die Nerventhätigkeit im Ganzen umstimmend und erschöpfend die Schaukel- und Drehmaschinen, die gewöhnliche Schaukel auch als Drehmaschine benuzt, die Schaukel von *Hayner*, der Drehstuhl von *Horn* und der

von *Hallaran*, und das Drehbett von *Hallaran* und das von *Horn*; insbesondere hat das leztere eine furchtbare Wirkung *).

Ferner verdienen als Ableitungsmittel vom Gehirn und auch als Mittel, die, wie es scheint, Anhäufungen des Nervenagens in den Ganglien zu zertheilen vermögen, die Abführungsmittel eine besondere Erwähnung. Bei kräftiger Reaction wählt man die kühlenden Abführungsmittel, das Kali sulphuricum, Natrum sulphuricum und die Magnesia sulphurica, das Karlsbader Wasser, auch das Calomel etc., bei mehr torpidem Character die Rhabarber, die Senneblätter, die Jalappe, die Gratiola und die bei den Alten in so grossem Rufe gestandene Radix Hellebori nigri, so wie auch die Radix Hellebori albi (von Veratrum album). Hiemit können die kämpfischen Visceralklystiere verbunden werden.

Endlich muss auch die Erregung eines Speichelflusses erwähnt werden, welches Mittel ebenfalls durch Ableitung vom Gehirne wirkt.

§. 2170.

2) Durch unmittelbare Besänftigung der erhöhten Nerventhätigkeit. Bei grosser Erregung des Nervensystems ist, wenn keine Congestionen nach dem Gehirne und kein besonderer Orgasmus des Blutes damit verbunden sind, das Opium in schlafmachenden Gaben oft vorzüglich nüzlich. Von *Hufeland* wird die Tinctura Stramonii für das grösste Stupefaciens erklärt (aus 8 Unc. span. Wein, 1 Unce Alcohol und 2 Uncen Samen bereitet); es wird dieselbe von 4 bis 50 Tropfen allmälig steigend dreimal täglich gegeben. Die Digitalis ist sehr stark in England in Gebrauch und wird vorzüglich von *Cox* gerühmt; man fange mit kleinen Gaben an, z. B.

*) Abbildungen von diesen Maschinen findet man in *Schneiders* Entwurf zu einer Heilmittellehre gegen psychische Krankheiten.

mit einem halben oder einem ganzen Gran zweimal täglich und steige allmälig zu grössern Gaben, z. B. zu 5 bis 6 Granen für eine Dosis. Die Belladonna wurde vorzüglich von *Evers* empfohlen, bei sehr wüthenden Personen allmälig bis auf 8 Grane der gepulverten Blätter, täglich zweimal, gestiegen. Auch wurden zu denselben Zwecken Herba Conii maculati, Cicutae virosae, Hyoscyami, Aqua Laurocerasi, Semina Lolii temulenti und andere narkotische Mittel gebraucht.

§. 2171.

5) Durch Schwächung der Lebensthätigkeit. Bei starker Reaction wirken wir auf den das Nervenleben unterhaltenden Factor des Lebens ein, das Blut, und suchen durch dasselbe die erhöhten Lebensprozesse im Gehirne und ganzen Nervensystem zu mässigen. Zu diesem Zwecke wenden wir die Aderlässe an, die Blutegel, die Schröpfköpfe, die antiphlogistischen Salze und Verminderung der Nahrung, und suchen die Lebensthätigkeit aus dem Gehirne zurückzudrängen, durch kalte Umschläge auf den Kopf, die Eiskappe, das Regenbad, Tropfbad und das Sturzbad, so wie durch warme Fussbäder und andere Ableitungsmittel.

§. 2172.

Wir erhöhen die Thätigkeit der bei den Seelenkrankheiten betheiligten Organe dadurch, dass wir die Gehirn- und Nerventhätigkeit, wo sie gesunken ist, theils durch die flüchtig erregenden, theils durch die permanent reizenden und stärkenden Mittel zu erregen suchen. Wir wenden desshalb an: Valeriana, Angelica, Serpentaria, Arnica, Senega, Kampher, Wein, Naphthen und Moschus, China und Eisen, so wie reizende und stärkende Nahrungsmittel. Mit diesen innerlichen Mitteln verbinden wir geistige und aromatische Einreibungen und Umschläge auf den Kopf, so wie auch Niessmittel, die Electricität, den Galvanismus etc.

§. 2173.

Zeigen sich kritische Bewegungen, so unterstüzt man dieselben. Nach Verschiedenheit dieser Bestrebungen der Natur wirkt man auf die Haut, auf die Darmentleerungen, man sucht Abscesse zur Reife zu bringen etc.

§. 2174.

c) *Nach den Anzeigen aus den Zufällen.* In Folge der bei den seelenkranken Individuen stattfindenden heftigen Gehirnanstrengungen entwickeln sich leicht ein Congestionszustand und Entzündung des Gehirnes, welchen durch die geeigneten Mittel entgegengewirkt werden muss. — Häufig leiden die Kranken an hartnäckiger Verstopfung und es bilden sich leicht eine Plethora abdominalis und ein Status nervosus und atrabilarius aus; es sind daher die eröffnenden und auflösenden Mittel häufig durchaus nothwendig, und, indem das erwähnte Unterleibsleiden selbst wieder auf die geistige Stimmung zurückwirkt, auch in Beziehung auf die Seelenkrankheit selbst von entschiedenem Nuzen. — Nicht selten verbinden sich mit den Seelenstörungen Unordnungen in der Herzbewegung, die man zu beschränken suchen muss. Ebenso wirkt man jedem andern körperlichen Leiden entgegen, insofern dasselbe nicht zur Heilung der Seelenstörung benuzt werden kann.

§. 2175.

Die Diät der Irren muss nach Verschiedenheit des psychischen und körperlichen Zustandes verschieden bestimmt werden. Die Orte, in welchen die Kranken sich aufhalten, müssen die Beschaffenheit haben, dass die Kranken gehörig Luft und Licht geniessen können, sich im Freien ergehen können, die geeignete Beschäftigung finden, sich nicht einander beunruhigen, für die Reinlichkeit gesorgt werden kann und alle dienlichen Mittel in Anwendung gebracht werden können.

§. 2176.

Um Kranke, die sich selbst und andern gefährlich sind, unschädlich zu machen, hat man verschiedene Zwangsmittel erfunden. Das vorzüglichste, das die Stricke und Ketten beinahe ganz entbehrlich macht, ist das Zwangskamisol, welches ein aus starkem Zeug verfertigtes Kleidungsstück, wie die Nachtschoben der Kinder, ist, nämlich auf dem Rücken zugemacht wird, und sehr lange Aermel hat, die auf dem Rücken des Kranken zugebunden werden. Aehnlich sind die weniger gebräuchlichen Zwangshosen. Von Vortheil ist auch der Zwangsstuhl, ein Lehnstuhl, auf welchem der Kranke vermittelst einer breiten Gurte um den Leib und an den Armen und Beinen durch Riemen befestigt wird, er darf jedoch nicht zu lange Zeit unausgesezt gebraucht werden. Noch stärkere Zwangsmittel sind der Sack, das hohle Rad, welches nach einer von *Langermann* angegebenen Idee *Reil* erfand und in einem Rade besteht, in welches der Kranke gebracht sich vollkommen ruhig verhalten muss, um nicht in Bewegung fortgerissen zu werden; es dient dieses Mittel auch, um zerstreute Irren anhaltend auf sich selbst zurückzuführen, und der Schrank, ähnlich einem Uhrenschranke, in welchen der Kranke in aufrechter Stellung eingeschlossen wird. Weniger vortheilhaft sind die Authenrieth'sche Maske, die Birne, der Tollriemen, die metallenen Armbänder, der Däumling und die Handschuhe. Ganz wilde Irren kann man in dem Pallisadenzimmer in Verwahrung bringen, von welchem *Authenrieth* eine zweckmässige Einrichtung angegeben hat. *)

*) Eine nähere Beschreibung und Abbildungen der erwähnten Vorrichtungen findet man in *Schneiders* Heilmittellehre gegen psychische Krankheiten.

§. 2177.

Eintheilung der Seelenkrankheiten. Die wichtigste Verschiedenheit zwischen den einzelnen Arten der Seelenkrankheiten ist wohl die, dass in der einen Reihe mehr die höhern geistigen Verrichtungen gestört erscheinen, in der andern mehr das Gemüth leidet. Zwar ist meistens Geist und Gemüth in den einzelnen Fällen zugleich ergriffen, doch sind bei der einen Krankheitsform Fehler in den Verstandeskräften die wesentlichen Merkmale derselben, wie z. B. in dem Blödsinn, und in der andern ein Leiden des Gemüthes, wie z. B. in der Melancholie, welche oft keineswegs aus einer fehlerhaften Vorstellung entsprungen ist, und bei welcher selbst oft der Verstand noch einige Zeit gegen das sich des Kranken bemeisternde Gefühl ankämpft. Auch scheint in der reinen Störung der Verstandesäusserungen nur das Gehirn in unordentlicher Thätigkeit zu sein, bei den Gemüthskrankheiten dagegen gibt sich sehr deutlich ein Ergriffensein der Abdominal- und zum Theil auch der Brust-Nervengeflechte kund.

Diesemnach können die Seelenkrankheiten eingetheilt werden:

1) In die Geisteskrankheiten; das sind solche, in welchen die wesentlichen Zufälle der Krankheit ein fehlerhafter Zustand des Vorstellungsvermögens ist. Hieher gehören: *a)* der Blödsinn, *b)* die allgemeine Verwirrtheit und *c)* die partielle Verrücktheit oder der fixe Wahn.

2) Die Gemüthskrankheiten; das sind solche, in welchen ein Leiden des Gemüthes das Characteristische der Krankheitsform ist. Diese sind: *a)* die Schwermuth (Melancholie) und *b)* die Wuth.

Zweites Hauptstück.

Von den einzelnen Arten der Seelenkrankheiten.

Erste Gruppe: die Geisteskrankheiten.

Der Blödsinn.

(*Geistesschwäche, Fatuitas, Stupiditas, Amentia, Anoia, Idiotismus.*)

§. 2178.

Blödsinn ist die Seelenkrankheit, welche sich vorzüglich durch Schwäche des Erkenntnissvermögens ausspricht.

§. 2179.

Im geringern Grade äussert sich die Geistesschwäche nur durch Mangel des richtigen Urtheils. Es fehlt nicht an Aufmerksamkeit, ja selbst nicht an einer gewissen Lebhaftigkeit des Geistes, die Gefühle sind ebenfalls rege und der Wille oft selbst kräftig, es fehlt aber an der Schärfe des Urtheils, das Gespräch ist albern (Fatuitas) und es missglücken in der Regel sämmtliche Unternehmungen, weil die Berechnung falsch ist. — In einem höhern Grade spricht sich das Uebel durch Mangel der Aufmerksamkeit, ein sehr langsames und unvollständiges Auffassen der Gegenstände, Mangel der Phan-

tasie, Schwäche des Gedächtnisses, Trägheit der Gefühle und Schwäche der Willenskraft aus (Stupiditas). — Im höchsten Grade des Blödsinns (Idiotismus) sind oft kaum mehr Spuren einer geistigen Thätigkeit zu bemerken, und es zeigt sich selbst ein krankhafter Zustand in den vegetativen Verrichtungen. Das Bild dieses höchsten Grades des Blödsinnes stellen insbesondere die in den tiefen Thälern von Savoyen, Wallis, Tyrol, Salzburg etc. wohnenden Cretinen *) dar. Die neugebornen Kinder haben ein scrophulöses und rhachitisches Aussehen, einen grossen Schädel, einen Kropf, sie weinen nicht und saugen nicht gehörig, sie zahnen schwer und die Zähne werden leicht cariös, sie fangen nicht an, mit den Händen die Speisen in den Mund zu stecken, so dass man ihnen bis in das zehnte und zwölfte Jahr die Speisen in denselben bringen muss. Die Erwachsenen haben einen schlotternden Gang, der Kopf hängt vor, die Mundwinkel hängen herab, die Lippen sind wulstig und aufgeworfen, die innern Augenwinkel stehen tiefer als die äussern, der Blick ist stier und dummlächelnd, die Sprache ist lallend oder fehlt ganz, die Sinne sind im Allgemeinen stumpf, insbesondere das Gehör, die Kranken interessirt nichts andauernd, doch haben sie oft Gedächtniss für empfangene Wohlthaten oder Verlezungen und sind zuweilen rachsüchtig, zuweilen haben sie auch grossen Geschlechtstrieb, oft sind sie aber ganz gleichgültig gegen Alles, ja sie nehmen oft nicht einmal von selbst Speise zu sich und lassen den Harn und den Koth ohne Scheu, wo sie sich gerade befinden, von sich gehen.

*) *Malacarne* (Turin 1789). — *Ackermann* (Gotha 1790). — *Fodéré* (Par. 1792, aus d. Franz. v. Lindemann, Berlin 1796). — *Wenzel* (Wien 1802). — *Iphofen* (Dresden 1817). — *Knolz* (med. Jahrb. d. k. k. östr. Staaten. Neueste Folge. B. I.)

§. 2180.

Es haben die Cretinen meist einen eigenen Schädelbau, an welchem insbesondere oft eine grosse Schiefheit zu bemerken ist, auch sollen die Foramina lacera und condyloidea sehr verengt sein, so dass die durch dieselben gehenden Gefässe und Nerven gedrückt werden, und nach *Malacarne* sollen im kleinen Gehirne nur 390 Blätter vorhanden sein, während bei Vernünftigen sich 800 vorfinden.

§. 2181.

Ursachen. Meistens ist der Blödsinn angeboren, wovon oft Abneigung der Eltern gegen einander und die Zeugung während eines Rausches etc. Schuld tragen sollen, häufig ist er angeerbt, was insbesondere bei dem Cretinismus der Fall ist. — Erworben wird die Krankheit durch verschiedenartige Gehirnaffectionen, z. B. die Fallsucht und den Schlagfluss, durch übermässige Anstrengungen des Geistes und insbesondere auch durch andere Seelenkrankheiten, von denen oft der Blödsinn ein Ausgang ist. — Als mitwirkende Ursachen des Cretinismus werden der in den bezeichneten Gegenden oft stattfindende Mangel am Zug der Luft und an Sonnenlicht und Sumpfausdünstungen beschuldigt.

§. 2182.

Vorhersage. Der angeborne Cretinismus ist unheilbar, in der Regel auch der nach Seelenkrankheiten eingetretene Blödsinn, eher lässt sich einige Milderung oder Heilung bei den geringern Graden und der aus vorübergehenden Ursachen entsprungenen Geistesschwäche hoffen.

§. 2183.

Behandlung. Bei den geringern Graden des Blödsinns gelingt es manchmal, durch eine sehr sorgfältige Erziehung und insbesondere durch allmäligen Uebergang von den leichtesten zu schwerern Verstandesübungen die

Geisteskräfte einigermassen zu wecken. — Die Cretinen müssen frühzeitig aus den tiefen Thälern auf die Höhe der Berge gebracht werden. Die ungesunde Gegend muss so viel wie möglich durch Cultur verbessert werden. Um das Uebel aus einer Gemeinde auszurotten, ist das beste Mittel, Vermeidung der Ehen der Familien des Ortes unter sich und dagegen eheliche Verbindung mit auswärtigen, gesunden und kräftigen Geschlechtern.

Die allgemeine Verwirrtheit.

§. 2184.

Die allgemeine Verwirrtheit ist die Seelenkrankheit, welche sich vorzüglich durch eine schnelle Aufeinanderfolge unzusammenhängender Vorstellungen, Gefühle und Handlungen zu erkennen gibt.

§. 2185.

Es entwickelt sich die allgemeine Verwirrtheit oft aus einer andern Seelenstörung; zuweilen tritt die Krankheit aber sogleich unter der angegebenen Form auf. Die Kranken sind geschwäzig, sie springen von einer Idee auf die andere, ohne sie vollständig auszubilden, wobei oft nur ein einziges Wort oder ein angefangener Saz, die ohne Zusammenhang zwischen andern Worten stehen, die schnell vorübergegangene Vorstellung anzeigen. Oft leuchten aus einem solchen Chaos von verworrenen Vorstellungen wizige Einfälle und einzelne schöne Gedanken hervor, oft taucht immer von neuem eine fixe Idee auf, die aber einem andern verworrenen Phantasiestück schnell wieder Plaz macht. Oft sind dabei die Kranken in

froher Gemüthsstimmung, sie schwazen, lachen und singen, oft sind sie in einer düstern Gemüthsstimmung, in welchem Falle ihre oft abgebrochenen Aeusserungen aus Anstrengungen des Geistes zu philosophiren hervorgehen, oder Bruchstücke vieler düsterer, mit einander abwechselnder Vorstellungen sind. Oft wechseln auch eine heitere und traurige Gemüthsstimmung, Lachen und Weinen, schnell mit einander ab. Hiebei ist der Kranke oft auch sehr thätig, aber die kaum angefangene Beschäftigung wird schnell wieder verlassen und eine andere ergriffen, und selbst die gewöhnlichen Verrichtungen werden auf eine verworrene und oft phantastische Weise vollführt. — Nur selten ist die Krankheit acut, in der Regel ist sie langwierig und oft habituell.*)

§. 2186.

Ursachen. Bei manchen Individuen ist die Anlage zur Verwirrtheit angeboren. Häufig ist die allgemeine Verwirrtheit der Ausgang einer andern Seelenstörung, namentlich des fixen Wahnes und der Wuth, zuweilen wird sie unmittelbar durch einen heftig erschütternden Eindruck auf Geist und Gemüth hervorgebracht, manchmal tragen somatische Krankheiten, insbesondere Gehirn- und Nervenkrankheiten, zu ihrer Entstehung bei, zuweilen ist sie die Folge des hohen Alters.

§. 2187.

Vorhersage. Die aus einer besondern Anlage entsprungene Verwirrtheit ist in der Regel unheilbar, die durch eine andere Seelenstörung, einen starken Gemüthseindruck etc. hervorgebrachte allgemeine Verwirrung wird oft geheilt.

*) Es ist dieses die Form von Seelenstörung, die man am häufigsten Narrheit nennt, doch legt man diesen Namen auch andern Seelenkrankheiten bei, namentlich dem fixen Wahne.

§. 2188.

Behandlung. Bei der aus einer besondern Anlage entsprungenen Verwirrtheit ist eine planmässige Erziehung vorzüglich nothwendig, insbesondere strenges Anhalten des Kranken zu einer bestimmten Arbeit, auf welche er seine Aufmerksamkeit fest zu richten genöthigt ist. Gegen die durch eine andere Ursache bedingte allgemeine Verwirrung, insofern dieselbe, was in der Regel der Fall ist, mit zu grosser Erregung der psychischen Thätigkeit verbunden ist, wendet man die in dem §. 2165 und den §§. 2169–71 angegebene beschränkende Methode an. Nur wenn die Verwirrung aus allgemeiner Schwäche entsprungen ist, sind die erregenden und tonischen Mittel in Gebrauch zu ziehen.

Die partielle Verrücktheit.

(*Fixer Wahn, Wahnsinn, Monomania.*)

§. 2189.

Die **partielle Verrücktheit** ist die Seelenkrankheit, in welcher die Urtheilskraft nur in Beziehung auf *einen* Gegenstand oder eine Reihe homogener Gegenstände krank erscheint.

§. 2190.

Tritt diese Krankheit ohne Verbindung mit einer andern Art der Seelenstörung auf, so ist oft an dem Kranken keine Spur einer Verwirrung zu bemerken und es zeigt sich selbst grosse Klarheit des Verstandes bis zu dem Augenblick, in welchem die fixe Idee hervortritt, ja selbst in der Vertheidigung der festgewurzelten

Vorstellung zeigt sich oft eine grosse Folgerichtigkeit in den Schlüssen, es betrachtet aber der Kranke den Gegenstand von einem verrückten Standpunkt aus und ist unvermögend, die Unrichtigkeit desselben einzusehen. Er hält z. B. einen längst sehnlich gehegten Wunsch für realisirt oder ein lange gefürchtetes Ereigniss für wirklich eingetreten und handelt hiernach ganz consequent, indem er zu gleicher Zeit ein freies Urtheil über alle Gegenstände besizt, mit Ausnahme des einzigen, der sein Gemüth so sehr ergriffen hat. — Häufig behält die Krankheit nicht ihre reine Form bei. Ausser dem fixen Wahne zeigen sich auch andere Erscheinungen eines gestörten Seelenlebens, mehr oder weniger Verwirrung in den Begriffen, auch in Beziehung auf andere Gegenstände, als die des fixen Wahnes, und leicht erregte Gemüthsaffecte.

§. 2191.

Nach Verschiedenheit des Gegenstandes, auf welchen sich der fixe Wahn bezieht, hat man verschiedene Arten der partiellen Verrücktheit angenommen. Hieher gehören vorzüglich:

Der Wahnsinn der Stolzen. Es hält sich der Kranke für unübertrefflich schön, reich, vornehm, er glaubt erstaunungswürdige und selbst unmögliche Dinge vollbracht zu haben, er glaubt dieser oder jener berühmte Gelehrte oder grosse Feldherr, ein Fürst, ein König, der Papst oder Gott selbst zu sein, seine Mienen sind stolz, und nach der Beschaffenheit seines Characters ist er entweder herablassend oder zurückstossend, herrisch und gewaltthätig.

Der Wahnsinn, der sich auf den Zustand des Körpers bezieht. Es entwickelt sich diese Art der Verrücktheit meistens aus der Hypochondrie, sie unterscheidet sich aber dadurch von dieser Krankheit, dass die Kranken nicht mehr im Stande sind, das Unmögliche

ihrer thörigten Vorstellung einzusehen. Ein Kranker ist z. B. fest überzeugt, er habe ein Vogelnest im Kopfe, ein anderer glaubt, seine Füsse seien von Glas, seine Nase von Wachs etc.

Der Wahnsinn der Geizigen. Es glaubt der Kranke, wenn er mitten im Ueberfluss sich befindet, verhungern zu müssen.

Der religiöse Wahnsinn. Es bildet sich der Kranke ein, von Gott zu seinem Werkzeug für bestimmte Zwecke auserlesen zu sein und begeht, von dieser Idee geleitet, mit kaltem Blute die grössten Verbrecheu, oder er verlässt die Arbeit, verschmähet Speis und Trank und erwartet betend seine Himmelfahrt bei lebendigem Körper etc.

Die Daemonomanie. Es glauben die Kranken von höllischen Geistern verfolgt zu werden, sich dem Teufel verschrieben zu haben, die Qualen der Hölle zu empfinden, zuweilen glauben sie auch behext zu sein, in Thiere, z. B. Wölfe und Hunde verwandelt worden zu sein (Lycanthropia, Cynanthropia) etc.

§. 2192.

Es ist die partielle Verrücktheit in der Regel ein chronisches Leiden. Der Uebergang zum gesunden Zustand geschieht oft sehr rasch. Manchmal geht das Leiden in eine andere Seelenkrankheit über, oft in Melancholie, anfallsweise in Wuth, zulezt in allgemeine Verwirrtheit oder Blödsinn.

§. 2193.

Ursachen. In der Regel liegen dieser Form von Seelenstörung gewisse Affecte und Leidenschaften zum Grunde, z. B. grosser Ehrgeiz. Nur in seltenen Fällen wird die Krankheit durch unmittelbare Einwirkung auf die Verstandeskräfte oder auf das Gehirn selbst hervorgebracht.

§. 2194.

Vorhersage. Der fixe Wahn gehört zu den Seelenkrankheiten, die am häufigsten geheilt werden.

§. 2195.

Behandlung. Bei der partiellen Verrücktheit tritt häufiger als bei den übrigen Seelenstörungen der Fall ein, dass die Verrücktheit durch geistreiche Einwendungen, Ueberraschung etc. mit Erfolg bekämpft wird (vergl. §. 2164). In der Mehrzahl der Fälle ist, da die Krankheit in einer excessiven Thätigkeit besteht, die beschränkende und ableitende Methode (§. 2165 u. 2169—71) angezeigt; nur in seltenen Fällen die erregende (§. 2172), wenn nämlich die krankhafte Vorstellung mit einem Gesunkensein der Lebenskräfte in Verbindung steht, und zuweilen auch, wenn sie aus einem deprimirenden Affect hervorgegangen ist.

Zweite Gruppe: die Gemüthskrankheiten.

Die Schwermuth.

(*Der Tiefsinn, Trübsinn, Melancholia, Athymia.*)

§. 2196.

Die **Schwermuth** ist eine so traurige Stimmung des Gemüthes, dass die ganze Denkkraft des Kranken an den Gegenstand seiner Betrübniss geheftet ist und der Kranke dadurch die Kraft der Selbstbestimmung verloren hat.

§. 2197.

Die Krankheit bildet sich oft nur langsam, oft auch schneller aus. Die Kranken verlieren sich gerne in Ge-

danken, doch geben sie im Anfange noch auf die an sie gerichteten Fragen die gehörige Antwort, sie suchen die Einsamkeit und überlassen sich im Anfange nur dort ihrem tiefen Kummer, bald beherrscht sie aber auch in der lebhaftesten Gesellschaft das niederbeugende Gefühl völlig, sie stieren mit düsterm Blicke vor sich hin und wissen nicht mehr, was um sie vorgeht; der Schlaf flieht von ihrem Lager und ihre Seele starrt Tag und Nacht auf den Gegenstand der Betrübniss hin, der Kranke wiederholt sich ohne Unterlass die Scene der erlittenen Schmach oder malt sich das Bild einer geliebten verlornen Person oder das der Heimat aus, nach welcher die Rückkehr ihm nicht vergönnt ist (das Heimweh, Nostalgia). Entweder ist hiebei der Kranke mehr regungslos und behält oft selbst Monate und Jahre dieselbe Stellung des Körpers bei, mit dem Blicke stets grad hinausstierend (Melancholia attonita), oder wird von innerer Unruhe getrieben und läuft von einem Orte zum andern (Melanch. errabunda). Oft ist der Kranke so sehr für alle äussern Einwirkungen unempfindlich, dass er selbst körperliche Eindrücke, namentlich die Einwirkung der Kälte, die übrigens für ihn, wie für gesunde Individuen, nachtheilig ist, nicht wahrnimmt und keine Speisen von selbst zu sich nimmt. Zuweilen verweigert auch der Kranke die Annahme der Nahrungsmittel, weil er den Selbstmord sich vorgesezt hat. — Häufig und selbst meistens ist das die Seele beherrschende Gefühl mit einer krankhaften Vorstellung über den Gegenstand, auf welchen sich die Melancholie bezieht, verbunden, so dass der Kranke einen geringfügigen Vorfall durch seine Phantasie zu einem Ereigniss bildet, das ihn allerdings physisch oder moralisch zu zernichten im Stande wäre. Es leidet dabei der Körper mit, das Aussehen des Kranken wird bleich, erdfahl, seine Haut trocken, er leidet an grosser Verstopfung, Aufgetrieben-

heit des Leibes, Appetitlosigkeit, er magert ab, in manchen Fällen, namentlich nicht selten bei dem Heimweh und der Schwermuth der Verliebten (Erotomania) verfallen die Kranken in ein nervöses Fieber, das oft schnell tödtlich wird, zuweilen stellt sich Gelbsucht oder Wassersucht ein.

§. 2198.

Die Krankheit ist meistens chronisch. Sie endigt sich mit Gesundheit, vorzüglich nach Beseitigung der veranlassenden Ursache, nicht selten auch durch Krisen. Selten geht die Melancholie in Wuth, häufiger in allgemeine Verwirrtheit und Blödsinn über; manchmal treten Anfälle von Fallsucht oder Schlagfluss hinzu. — Die Leichenöffnungen geben die im §. 2153 schon angeführten Resultate, insbesondere findet man öfters Verhärtungen und andere Organisations-Veränderungen in der Leber, der Milz, dem Herzen etc., und nach *Esquirol* zuweilen eine Verschiebung des Quergrimmdarms, so dass dieser eine senkrechte Lage zeigt und sein linkes Ende hinter dem Schambeine liegt, oder auch, dass er bogenförmig bis unter die Schambeine und selbst in das Becken herabsteigt; doch hat man diese eigenthümliche Lage des Quergrimmdarmes auch in andern Leichen als in solchen von melancholischen Individuen gefunden.

§. 2199.

Ursachen. Es ist die Anlage oft erblich und angeboren und haftet an dem cholerischen und melancholischen Temperament. Gelegenheitsursachen sind häusliche Sorgen, unglückliche Liebe, der Verlust geliebter Personen, die Entfernung aus der Heimat, verlezte Ehre, Unglück des Vaterlandes, körperliche Leiden, insbesondere die Krankheitszustände, die die Hypochondrie und Hysterie darstellen etc.

§. 2200.

Vorhersage. Diejenigen Fälle, in welchen die Melancholie allein oder vorzüglich durch eine äussere Ursache veranlasst worden ist und diese nur vorübergehend ist, sind die günstigsten, auch ist die Melancholie, die nicht mit Verkehrtheit verbunden ist, leichter zu heilen als die mit Verkehrtheit.

§. 2201.

Behandlung. Unter den psychischen Mitteln ist vorzüglich die Erregung des Interesses des Kranken für andere Gegenstände, als die, auf welche sich die Schwermuth bezieht, Zerstreuung und die Erhebung des Selbstgefühls des Kranken von Wichtigkeit. — Unter den somatischen Mitteln passen oft die erregenden und die stärkenden Mittel, z. B. etwas Wein, um das Gefühl körperlichen Wohlseins und Kraft zu erregen und dadurch auf das Gemüth zurückzuwirken. — Meistens sind auch eröffnende Mittel nothwendig.

Die Wuth.

(Raserei, Tobsucht, Mania, Furor.)

§. 2202.

Die Wuth ist die Seelenkrankheit, die durch einen blinden Trieb zu Gewaltthätigkeiten, der oft durch die geringste Veranlassung und zuweilen selbst nur durch körperliche Gefühle zur Thätigkeit geweckt wird, und durch welchen die Kraft der Selbstbestimmung gebunden ist, sich ausspricht.

§. 2203.

Gewöhnlich ist die Wuth mit einer andern Seelenkrankheit verbunden, insbesondere der partiellen Ver-

rücktheit, und es entspringen meistens die Wuthanfälle aus einer krankhaften Vorstellung (Wuth mit Verkehrtheit), doch ist auch in diesem Falle meistens die Gemüthsaufregung ungleich grösser, als sie die eingebildete Veranlassung, wenn sie gegründet wäre, naturgemäss hervorbringen sollte.

Es gehen oft der Wuth Vorboten vorher, brennende Hize im Unterleibe, grosser Durst, heisses und rothes Gesicht, starkes Klopfen der Arterien des Halses und der Schläfen etc., wiewohl in der Regel bei diesen Zufällen die Gemüthserregung schon begonnen zu haben scheint und sich nur noch nicht durch Thätlichkeiten äussert. In andern Fällen bricht auch die Wuth plözlich aus. Der Kranke schreit, brüllt, stampft mit den Füssen, wälzt sich auf dem Boden, zerreisst seine Kleider, und sucht alle Gegenstände zu zertrümmern und die Umstehenden zu verlezen, die Kraft der Muskeln scheint oft verstärkt zu sein, und zuweilen zeigen sich auch einzelne Geisteskräfte gesteigert, so dass z. B. die Kranken mit grosser Beredsamkeit declamiren, was sie sonst nicht vermochten. Beim weiblichen Geschlechte äussert sich die Wuth, mehr als durch Gewaltthätigkeiten, durch unaufhörliches Schwazen und Schimpfen. Zuweilen ist auch der Kranke ganz still, nur rollt er seinen Blick und knirscht mit den Zähnen. Er sucht selbst die Regungen in seinem Innern zu verbergen und wartet den günstigen Augenblick ab, um zu schaden (die stille Wuth). — Unmittelbar nach dem Anfalle weiss der Kranke in der Regel nicht, was er gethan hat, oder er hat nur eine dunkle Erinnerung davon.

§. 2204.

In seltenen Fällen bleiben (nach *Pinel*) bei der Wuth die intellectuellen Kräfte im normalen Zustande. Es werden die Wuthanfälle durch keine krankhafte Vorstellung geweckt, der Kranke erkennt selbst seinen

Zustand, er fühlt das Herannahen des Wuthanfalls und warnt selbst die Umstehenden, er vermag aber das Gefühl des Grimmes, das in ihm aufsteigt, nicht zu bemeistern und wird in solchen Augenblicken zu gewaltsamen Handlungen hingerissen (die Wuth ohne Verkehrtheit).

§. 2205.

Die Wuth macht häufig nur Anfälle von einigen Stunden oder Tagen (die acute Wuth), nach welchen aber meistens eine andere Seelenstörung, z. B. Melancholie, fortdauert, in andern Fällen hält sie mehrere Wochen und Monate an (die chronische Wuth). Oft kehren die Wuthanfälle nur in bestimmten Perioden, z. B. zur Zeit der monatlichen Reinigung, zurück. — Der Uebergang in Gesundheit geschieht oft schneller als bei andern Seelenstörungen. — Nachkrankheiten sind häufig allgemeine Verwirrtheit und Blödsinn. — Tod oft durch Erschöpfung und Schlagfluss.

§. 2206.

Ursachen. Die Anlage zur Manie ist oft angeerbt und vorzüglich Individuen von cholerischem und sanguinischem Temperament, von vollsaftiger und kräftiger Constitution, von einem Alter von 20 bis 40 Jahren und mehr Männern als Weibern eigen. Gelegenheitsursachen sind heftige Leidenschaften, alle äussern Einwirkungen, die zum Zorne reizen, der Missbrauch geistiger Getränke, grosse Hize, Versezungen der Milch, der Lochien etc.

§. 2207.

Vorhersage. Die erst entstandene und durch zufällige äussere Veranlassungen erregte Wuth wird häufiger geheilt, als in der Regel die andern Seelenstörungen.

§. 2208.

Behandlung. In der Wuth ist immer die besänftigende und herabstimmende Methode angezeigt. Häufiger, als in andern Seelenstörungen, passen die Aderlässe, wiewohl sie auch hier nicht unbedingt und zu kräftig, und vorzüglich nur dann, wenn sie durch einen Congestionszustand nach dem Gehirne angezeigt sind, in Anwendung gebracht werden dürfen. Dem Blutandrang wird oft genügsam durch kalte Umschläge auf den Kopf und innerliche schwächende Mittel entgegen gewirkt. — Vorzüglich nüzlich sind oft in der Wuth die in den §§. 2165 und 2169 bis 71 angegebenen herabstimmenden und beschränkenden Mittel, insbesondere die Brechmittel, die Sturzbäder und die Drehmaschinen. Der Rath, den Kranken sich austoben zu lassen, ist doch wohl nur für Anfälle von kürzerer Dauer angemessen, bei länger anhaltenden Anfällen ist die beschränkende Methode oft absolut nothwendig und häufig von dem besten Erfolg. — In der Zeit zwischen den Anfällen sucht man das Gemüthsleiden zu bekämpfen, aus welchem die Wuth entsprungen ist.

Nachtrag zum Rachencroup.

Als ich das Kapitel von dem Rachencroup niederschrieb, hatte ich noch keine vollkommene Form derjenigen Krankheit beobachtet, welche *Bretonneau* mit dem Namen Diphtherite pharyngienne belegt und konnte daher, besonders was die Behandlung betrifft, mich nicht entschieden genug aussprechen. Leider habe ich seitdem diese traurige Krankheit kennen gelernt und zwar an einem meiner eigenen Kinder. Möge dieser unglückliche Fall dazu beitragen, die Aufmerksamkeit der Aerzte auf diese, den meisten aus eigener Erfahrung noch gänzlich unbekannte, heimtückische und fürchterliche Krankheit hinzulenken.

Der Kranke war ein sehr kräftiger, blühend aussehender Knabe von 5¾ Jahren, ausser einigen schnell vorübergehenden Kinderkrankheiten und einem seit einiger Zeit zuweilen sich einstellendem Schwindel ganz gesund. Das Kranksein begann damit, dass der Knabe Nachts erwachte, eine kurze Zeit schrie und ängstlich sich benahm, sodann aber wieder sich zur Ruhe legte und schlief. Es hatte sich ein ähnlicher Vorfall schon einmal, jedoch eine lange Zeit vorher, zugetragen und ich war zweifelhaft, ob ich diese Zufälle einem schreckhaften Traume oder dem Schwindel zuschreiben sollte, dem der Knabe, wie gesagt, unterworfen war. Den andern Morgen klagte der Kranke auf Befragen über leichten Schwindel und auch zuweilen beim Schlingen,

welches übrigens leicht von statten gieng, über Ohrenweh. Da ich schon längst gegen den Schwindel, den ich von Unordnungen in dem gastrischen System ableitete, etwas unternehmen wollte, und indem ich auch hierdurch das Uebel im Halse zu bekämpfen hoffte, so gab ich ein Brechmittel. Auf dieses Mittel verlor sich der Schwindel gänzlich und der Kranke schien vollkommen wohl, nur klagte er zuweilen bei dem Genusse der Speisen, keineswegs aber bei dem Trinken von Zuckerwasser, Milch u. dergl. über Schmerz in dem rechten Ohr. Gegen dieses, dem Anscheine nach höchst unbedeutende Leiden, an einem durchaus nicht gefährlichen Orte, glaubte ich keine grosse Mittel in Anwendung bringen zu müssen, sondern beschränkte die Kur auf die Erregung einer leichten Transspiration. — Nach mehreren hiermit zugebrachten Tagen, in welchen übrigens der Knabe im Allgemeinen so wohl sich befand, dass er kaum im Bette zu halten war, zwang ich denselben, der sich bisher mit Heftigkeit dagegen gesträubt hatte, mit Gewalt, den Rachen untersuchen zu lassen, und entdeckte nun Folgendes: Auf der rechten Seite des Zäpfchens befand sich ein kleiner, weisslicher und etwas vertiefter Fleck, welcher einem Geschwürchen ähnlich sah, das mit einer weisslichen Borke bedeckt ist. Von dieser Stelle sezte sich ein schmaler Streifen dieser weisslichen Borke am rechten Rande der Uvula (die übrigens nicht geschwollen war) bis zu deren Spize fort und an der Seite dieser Borke war eine ganz schmale Entzündungsröthe bemerkbar. Die rechte Mandel war etwas angeschwollen und auf derselben bemerkte man einen weissen grössern Fleck, der von einer ähnlichen Borke herzurühren schien. Die linke Mandel war etwas vergrössert und es schien keine Kruste auf ihr zu sein, so wie auch auf dem hintern Theile des Rachens keine weisse Flecken entdeckt werden konnte.

Diese Untersuchung erregte in mir sogleich die Besorgniss, es möchte dieses Uebel die Diphtherit sein; ich zeigte dessbalb den Kranken noch einem andern Arzte, welcher in grossem Ansehen steht, erhielt aber die Zusicherung, ich sei zu ängstlich und die Krankheit bestehe nur in aphthösen Borken, so wie auch noch andere Aerzte, welchen ich den Fall erzählte, mich dadurch beruhigten, dass sie noch nie einen Fall beobachtet zu haben versicherten, in welchem Borken oder hautartige Concretionen von den Mandeln auf die Luftwege übergegangen wären. Hiezu kamen noch folgende Betrachtungen, welche in mir der Meinung den Sieg verschaffte, die Krankheit sei doch nicht die eigentliche Diphtherit. *Bretonneau* und andere Schriftsteller sprechen von diesem Uebel beinahe immer als von einer epidemischen Krankheit, von einer solchen war aber hier keine Spur bemerkbar; er und andere führen Symptome an, die hier gänzlich fehlten, wie z. B. ein fauler Geruch aus dem Munde, eine Hinneigung zum Status nervosus etc., und *Bretonneau* unterscheidet von dieser Krankheit eine viel leichtere und von selbst zur Heilung kommende Krankheitsart, die Angine covenneuse (eine mehr Borken als vollkommene Häute bildende Entzündung), deren Darstellung mehr als die der Diphtherit mit dem vorliegenden Krankheitsfall übereinstimmte. Diesemnach glaubte ich die Behandlung auf die Anwendung leichterer Mittel beschränken zu dürfen und die Arzneimittel umgehen zu können, die leicht auch Nachtheile bringen konnten und von denen ich ein wohl zu billigendes Bedenken trug, den ersten Versuch bei dem eigenen Kinde zu unternehmen. Ich wandte daher an: ein Gurgelwasser von einem Aufguss der Klatschrosen mit Honig, ein Pinselsaft von Rosenhonig mit Borax, Bähungen des Halses mit erwärmtem Schmalze und innerlich den Brechweinstein in einer solchen Gabe,

dass er kein Brechen aber Uebelkeit erregte. Während des Gebrauchs des Brechweinsteines stellte sich eine reichliche Speichel- und Schleimabsonderung ein, wie sie stattzufinden pflegt, wenn eine Halsentzündung in Zertheilung übergeht, sie hatte denselben Geruch und es giengen zulezt fadenartige Stückchen von jenen Borken ab. Unter diesen Versuchen, das Geschwürchen am Zäpfchen zur Heilung und die weisslichen Krusten zur Losstossung zu bringen, gieng eine Woche vorüber, während welcher Zeit aber der Knabe sein blühendes Aussehen, seinen Appetit und seine oft ausgelassene Munterkeit ungeschmälert behielt, fieberlos war und selbst das Ohrenweh beim Schlingen beinahe gänzlich verlor; selbst am Vorabend des Tages, an welchem die bedenklicheren Zufälle sich einstellten, fühlte der Kranke sich noch so wohl, dass er selbst in seinem Bette Liedchen sang.

In der Nacht vom 8. auf den 9. September glaubte ich einigemale zu bemerken, dass das Athmen mit einem solchen Rauschen verbunden sei, wie es bei Personen, die mit einem Kropfe behaftet sind, vorkommt, auch stellte sich einigemale, jedoch nur schnell vorübergehend, ein trockener und hohler Husten ein. Gegen Morgen wurde der Kranke heiser. — Nunmehr erkannte ich, dass meine schon frühe gehegte Besorgniss nur allzu gegründet war und griff nun zu einem sehr energischen Heilverfahren. Ich liess sogleich einen zuverlässigen Chirurgen kommen, und durch denselben die mit der hautartigen Schorfe bedeckten Stellen des Rachens mit Höllenstein cauterisiren und fünf Blutegel an den Kehlkopf sezen, wodurch eine starke Blutentleerung bewirkt wurde, und gab zugleich dem Kranken alle 2 Stunden 1 Gran Calomel. Ungeachtet dieser Mittel und des reichlich gereichten warmen Getränkes und Lecksäftchen nahm die Heiserkeit doch sehr schnell überhand, so dass

der Kranke bis zum Nachmittag beinahe stimmlos war. Gegen Abend stiess sich ein Stückchen der die rechte Mandel bedeckenden Pseudomembran los, das die Farbe des Knorpels und die Dicke des gewöhnlichen Handschuhleders zeigte. Da mit dem Höllenstein nur eine sehr kleine Stelle der Pseudomembran berührt werden konnte, so liess ich vermittelst eines grossen Pinsels eine Auflösung des Höllensteins auf die Schleimmembran des Rachens bringen, auf welcher übrigens die weissen Flecken sich nicht sehr ausgebreitet hatten. In der Nacht vom 9. auf den 10. September wurde unter heftigem Husten und Würgen ein $2\frac{1}{2}$ Zoll langes, übrigens sehr dünnes Stück Pseudomembran ausgeworfen, welches wahrscheinlich aus dem Kehlkopf kam, ohne dass übrigens die Zufälle bedeutend gemässigt wurden. Die Heiserkeit und eine allmälig überhand nehmende Schwerathmigkeit, welche übrigens der Kranke selbst nicht bemerkte, waren die Haupterscheinungen, der Husten war gering, Fieber keines vorhanden, der Kranke verneinte Schmerz zu haben und war noch so munter, dass er einen Theil des Tages mit Spielen zubrachte. Unter Zustimmung eines noch hinzugerufenen Arztes wurde nun statt des Calomels die *Herr*'sche Salbe (graue Quecksilbersalbe und Jod) und der Brechweinstein theils in kleinen, theils in brechenerregenden Gaben in Anwendung gebracht; der Krankheitszustand blieb aber so ziemlich der gleiche den 10. und 11. September hindurch. Die krankhaften Stellen im Rachen hatten sich während dieser Zeit einmal so ziemlich von den Pseudomembranen gereinigt und sahen in diesem Zustand tiefroth, wie wund, und mit einer halb schleim- und halb eiterartigen Materie überzogen aus; sie bedeckten sich aber von Neuem mit einer eben so festen Haut. Auch fanden sich während dieser Zeit dicke mucöse Sputa ein, welche den Schein der Besserung verursachten. In der Nacht

vom 11. auf den 12. September stellten sich häufig wiederkehrende Erstickungsanfälle ein, wobei die Augen stier hinaussahen, das Kind den Mund weit aufriss und eine Todesblässe und Kälte das Gesicht bedeckte. In einem solchen Momente gab ich 1½ Grane Cuprum sulphuricum, welche in demselben Augenblicke, als sie in den Mund und Magen kamen, eine reichliche Schleimabsonderung und heftiges Erbrechen erregten, wodurch zwei dicke Stückchen Pseudomembran nebst etwas Blut ausgestossen wurden. Hierauf trat eine überraschende Verbesserung des Zustandes ein. Das Kind bekam seine Wärme, Farbe, ja seine Munterkeit wieder und schien sich selbst wohler zu befinden als die lezten Tage vorher; im Verlaufe des Tages und der folgenden Nacht verschlimmerte sich aber das Befinden des Kranken wiederum ungeachtet einer wiederholten Anwendung des schwefelsauren Kupfers in der Weise, dass am Morgen vom 13. September unter einer zunehmenden Beengung der Tod erfolgte.

Ich habe diesen für mich höchst schmerzlichen Fall ausführlich erzählt, damit der Tod meines Knaben Andern das Leben retten möge, und füge zu diesem Zwecke noch folgende Bemerkungen bei: Es ist mir wahrscheinlich, dass der Rachencroup oft übersehen wird, indem das Halsübel höchst unbedeutend sein kann und der Arzt in einem solchen Falle vielleicht nur den später hinzugekommenen gewöhnlichen Croup erkennt; wir müssen daher auch bei dem leichtesten Halsübel, besonders bei Kindern, immer sogleich die ganze Rachenhöhle besichtigen, was ungeachtet des heftigsten Widerstrebens der Kranken geschehen muss. Haben wir den Rachencroup erkannt, so dürfen wir durchaus nichts mehr von den Heilkräften der Natur und auch sehr wenig von den innerlichen Mitteln erwarten, sondern müssen sogleich mit entschieden wirkenden örtlichen

Mitteln einschreiten. Welche örtliche Behandlung in den einzelnen Fällen die zweckmässigste sei, wage ich nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden, doch glaube ich folgende Bemerkungen machen zu dürfen: Zu den unsichersten Mitteln gehört wohl das von *Bretonneau* vorgeschlagene Einblasen von Calomel. Einen grössern Nuzen scheint mir das ebenfalls von *Bretonneau* vorgeschlagene Auftragen von Alaunpulver mit etwas Wasser zu einem Teige gemacht zu gewähren; ich halte jedoch dafür, dass dieses Mittel nur dann anzuwenden ist, wenn die Haut noch ganz weich und dünn ist, indem es veraltete dicke Pseudomembrane doch wohl nicht aufzulösen vermag. Gegen veraltete dicke Häute sollte jedesmal die schon von mehreren Aerzten in Anwendung gebrachte Cauterisation vermittelst des Höllensteines zu Hilfe gezogen werden, indem hierdurch diese Häute am schnellsten entfernt werden. Die von *Mackenzie* empfohlene Auflösung des Höllensteines scheint mir zu schwach zu sein. Bei grosser Ausbreitung der Pseudomembranen und grossem Entgegenstreben des Kranken (so dass die Cauterisation mit dem Höllenstein nicht gehörig vollführt werden kann), scheint mir die Anwendung der Hydrochlorsäure nach *Bretonneau's* Methode den Vorzug zu verdienen. Derselbe lässt einen feinen an einem Stiele festgemachten Schwamm (für den Erwachsenen von der Grösse eines Taubeneies) mit concentrirter Hydrochlorsäure sich anfüllen, drückt ihn aus, so dass er blos noch feucht bleibt und bringt hiermit die Säure auf den Grund des Pharynx und auf die Mandeln.

Schliesslich bemerke ich, dass die Natur des Rachencroups gleichzeitig mit oder noch vor *Bretonneau* auch ein deutscher Arzt erkannt hat. Es ist dieses *Ruppius*, welcher 1815 den ersten Fall der Art beobachtete und 1822 in den allgemeinen medizinischen Annalen von

Pierer und *Choulant* vier Fälle beschrieben, und das Wesen dieser Krankheit als das gleiche des gewöhnlichen Croups erklärt hat. Beschreibungen von Krankheitsformen, in welchen man den Rachencroup erkennt, kommen übrigens schon bei den ältesten Schriftstellern, namentlich bei *Araeteus* vor.

Zweiter Nachtrag zum Rachencroup.

Nach vollendetem Drucke meiner speciellen Pathologie kam mir ein zweiter Fall des Rachencroupes vor, der beweiset, wie versteckt das Uebel in seinem Anfange sich halten könne, und welcher zugleich darthut, dass in gewissen Fällen selbst noch ein entschiedeneres Verfahren, als die örtliche Anwendung des Höllensteins ist, nothwendig werde. — Bei einem Knaben von 9 Jahren stellte sich einige Tage nach einer starken Verkältung ein leichtes Ohrenweh beim Schlucken ein, welches beim Nachtessen sich zuerst zeigte, in der Bettwärme sich aber bald verminderte und am andern Morgen gänzlich aufgehört hatte. Der Knabe fühlte sich vollkommen wohl, man entdeckte aber eine kleine Anschwellung einer Drüse in der Gegend der rechten Mandel, welche bei starkem Druck auf dieselbe etwas Schmerz veranlasste, und bei Untersuchung des Rachens fand ich, dass sich schon eine dicke, gelblich-weisse Pseudomembran gebildet hatte, welche an der obern Spize der rechten Mandel sass, und etwa die Grösse einer in der Queere durchschnittenen Bohne zeigte. Am ersten Tage der Behandlung wurde auf die kranke Stelle eine Paste von Alaun mit Wasser mehreremal aufgetragen, am zweiten, dritten und vierten Tage diese Stelle und die Umgegend derselben stark mit Höllenstein betupft und zugleich Calomel bis zur Erregung von Durchfällen gegeben, am fünften wurden nur erweichende Mundwasser angewandt, erst am sechsten Tag trennte sich ein Theil der Pseudo-

membran los, und erst am achten oder neunten Tage nach einer zum Theil sehr kräftigen Behandlung verschwand dieselbe vollends, nachdem an der kranken Stelle mehreremale sich leichte, weiche, pseudomembranöse Ueberzüge gebildet hatten.

Dieser Fall fordert von Neuem Aerzte und Eltern auf, auch die scheinbar leichtesten Beschwerden im Schlingen bei Kindern nicht gering zu schätzen, er gibt mir aber auch die Ueberzeugung, dass selbst die Behandlung mit Höllenstein nicht immer mit einem glücklichen Resultate gekrönt sein werde, indem uns oft nicht genug Zeit übrig gelassen ist, das Uebel im Rachen zu beseitigen, bevor das beinahe immer tödtlich werdende Leiden in den Respirationswegen sich entwickelt. Für solche Fälle schlage ich meinen Collegen vor, die Exstirpation des ergriffenen Theiles der Mandeln vermittelst eines schneidenden Instrumentes vorzunehmen. Es ist diese Operation für einen geübten Wundarzt nicht schwierig, und von seiner Hand vollführt ist sie beinahe mit gar keiner Gefahr verbunden. Ich bin überzeugt, dass auf der Wundfläche sich keine Pseudomembran mehr bilden wird, und da das Uebel nicht leicht an neuen Stellen hervorbricht, wenn es in seinem ursprünglichen Heerde ausgerottet ist, so lässt sich von dieser Operation ein sicherer Erfolg erwarten. Ich halte diese Operation in folgenden Fällen für angezeigt: 1) Wenn wir so spät zu dem Kranken gerufen werden, dass der Uebergang der Krankheit auf die Respirationswege ganz nahe bevorsteht. Die Zeit, in welcher dieser gefährliche Fortschritt der Krankheit geschieht, ist freilich sehr verschieden, und wir können nur mit Wahrscheinlichkeit aus der bisherigen Schnelligkeit der Verbreitung des Uebels auf den weitern Gang der Krankheit schliessen. Zeigen sich schon Spuren von Heiserkeit, so ist der günstigste Zeitpunkt vorüber; es scheint mir aber diese

Erscheinung eine dringende Anzeige zur Operation zu sein, da der Croup in den Respirationswegen vielleicht nie mit Erfolg bekämpft wird, wenn das Uebel nicht an der Stelle schleunigst unterdrückt wird, von wo aus die Respirationswege in einen krankhaften Zustand versezt wurden. Hat die Pseudomembran andere Theile des Rachens ausserhalb der Mandeln übersponnen, so wird die Exstirpation des betreffenden Theils der Mandeln auch keinen so sicheren Erfolg gewähren, sie scheint übrigens doch noch in vielen Fällen Nuzen zu bringen, indem an solchen Stellen das Uebel vielleicht noch durch leichtere Mittel zu besiegen ist, wenn die Hauptwurzel desselben zerstört ist. Ist die Pseudomembran sehr dick, z. B. wie Handschuhleder, und sizt sie fest auf den Mandeln, wie angeleimt, so ist zu deren Entfernung durch Höllenstein oder andere ähnliche Mittel eine grössere Zeit nothwendig, als wenn sie dünn ist, und nur locker anhängt, es ist daher in diesem Falle die Operation eher nothwendig, als im entgegengesezten, wo durch leichtere Mittel noch Hilfe geleistet werden kann. 2) Wenn ungeachtet der Anwendung der Aezmittel oder vielleicht gar durch dieselbe veranlasst das Uebel im Halse, statt zu verschwinden, schlimmer wird. Man hat Fälle beobachtet, in welchen zwar auf die Anwendung von Aezmitteln (concentrirter Salzsäure) die ursprünglich vorhandene Haut abfiel, aber die Mandeln in einen solchen gereizten und entzündeten Zustand geriethen, dass sie sehr anschwollen und wie rohes Fleisch aussahen. Die Pseudomembran bildete sich immer von neuem und zulezt entstand ein tödtlich werdender Croup in den Respirationswegen. In solchen Fällen, glaube ich, ist die Exstirpation des betreffenden Theils der Mandeln dringend angezeigt.

Die Erfahrung wird lehren, ob Gegenanzeigen für das so eben erwähnte Heilverfahren vorhanden sind

und worin sie bestehen; da übrigens nach meinem Dafürhalten die Operation nur in den gefahrvollen Fällen Plaz greifen soll, in welchen die Entstehung des Kehlkopf- und Luftröhrencroupes zu befürchten ist, so scheint es kaum Umstände zu geben, welche gegenüber einer so grossen Gefahr Berücksichtigung verdienen.

Receptformeln.

Nro. 57.

Rp. Magnesiae carbonicae,
Sacchari albi, *aa. Drachmas duas.*

M., fiat pulvis, detur ad scatulam, signetur: zuweilen einen Kaffelöffel voll zu nehmen.

Nro. 58.

Rp. Lapidum Cancrorum, *Unciam dimidiam,*
Flavedinis corticum Aurantiorum,
Sacchari albi, *aa. Drachmam unam.*

M., fiat pulvis, detur ad scatulam, signetur: 2 bis 4mal täglich eine Messerspize voll zu nehmen.

Nro. 59.

Rp. Kali carbonici, *Drachmam unam,*
solve in
Aquae destillatae, *Unciis quatuor,*
adde
Extracti corticum Aurantiorum, *Drachmas duas,*
Tincturae Rhei vinosae,
Syrupi Cinnamonii, *aa. Unciam dimidiam.*

MDS. 4mal täglich einen Löffel voll zu nehmen.

Nro. 60.

Rp. Croci orientalis, *Grana quatuor*,
Lapidum Cancrorum,
Tincturae Rhei aquosae, *aa. Drachmam semis*,
Syrupi Cichorei, c. Rheo, *Drachmas septem*,
Aquae Foeniculi, *Unciam unam.*

MDS. Umgeschüttelt, jede halbe Stunde einen Theelöffel voll zu geben. (Für ein Kind, von *Richter*.)

Nro. 61.

Rp. Kali carbonici, *Drachmam unam et dimidiam*,
solve in
Aquae destillatae, *Unciis quatuor*,
adde
Syrupi Althaeae, *Unciam dimidiam*,

DS. Jede Stunde einen Löffel voll, mit 2 bis 3 Kaffelöffel voll Citronensaft, unter dem Aufbrausen zu nehmen. (*River*'scher Trank.)

Nro. 62.

Rp. Natri carbonici aciduli, *Grana octo*,
Acidi tartarici, *Grana quinque*,
Sacchari albi, *Grana decem.*

M. f. pulv. d. tal. dos. VI.

S. Alle 2 Stunden 1 Pulver mit Wasser während des Aufbrausens zu nehmen. (Brausepulver.)

Nro. 63.

Rp. Opii pur, *Granum unum*,
Pulveris radicis Columbo,
Sacchari albi, *aa. Grana decem.*

M. f. pulv. dent. tal dos. IV.

S. 2mal täglich ein Pulver zu nehmen.

Nro. 64.

Sp. Tincturae thebaicae, *Guttas duas*,
Aquae fontanae, *Unciam unam*,
Syrupi Althaeae, *Unciam dimidiam*,

MDS. Jüngern Kindern in 4, ältern Kindern in 2 Theilen, in Zwischenräumen von 3 bis 4 Stunden zu geben.

Nro. 65.

Rp. Radicis Columbo, *Unciam semis*,
coque Aqua fontana,
colaturae, *Unciarum sex*,
adde
Pulveris gummi arabici, *Drachmas duas*,
Syrupi corticum Aurantiorum, *Unciam unam*.

MDS. Jede Stunde 1 Löffel voll zu nehmen.

Nro. 66.

Rp. Balsami Copaivae, *Drachmas duas*,
Pulv. gummi arabici, *Drachmas tres*,
Aquae florum Sambuci, *Uncias quinque*,
Syrupi Althaeae, *Unciam unam*.

MDS. Alle 2 Stunden 1 Löffel voll zu nehmen.

Nro. 67.

Rp. Croci orientalis, *Drachmam unam*,
infunde Aquae fervidae, *Unciis quinque*,
Colaturae adde

Boracis, *Drachmam unam*,
Extracti Millefolii, *Drachmas duas*,
Syrupi corticum Aurantiorum, *Unciam unam*,

MDS. Alle 2 Stunden 1 Löffel voll zu nehmen.

Nro. 68.

Rp. Foliorum Sabinae, *Unciam dimidiam — unam*,
infunde Aqua fervida,
colaturae, *Unciarum sex*
adde
Boracis, *Drachmam unam*,
Syrupi simplicis, *Unciam unam*.

DS. 4mal täglich einen Löffel voll zu nehmen.

Nro. 69.

Rp. Sulphuris stibiati aurantiaci,
Calomelis, *aa. Granum dimidium — unum*.
Sacchari albi, *Grana decem*.

M. f. pulv. dent. tal. dos. XII.

S. 2mal täglich ein Pulver zu nehmen. (Die *Plummer*'schen Pulver.)

Nro. 70.

Rp. Hydrargyri stibiato-sulphurati,
Resinae Guajaci, *aa. Drachmam unam*,
Extracti Dulcamarae, *Drachmas duas*.

M. f. c. Syrupo Sacchari pilulae ponderis *Granorum duorum*.

DS. Früh und Abends 3 Stücke zu nehmen. (*P. Frank.*)

Nro. 71.

Rp. Radicis Graminis,
„ Bardanae,
„ Saponariae,
Ligni Guajaci, *aa. Unciam unam*,
Radicis Liquiritiae, *Unciam dimidiam*,
MDS. Zum Thee.

Nro. 72.

Rp. Boracis, *Drachmam unam*,
Mellis rosati, *Unciam unam.*
MDS. Mundsaft.

Nro. 73.

Rp. Hydrargyri ammoniato muriatici, *Drachmam dimidiam*,
Adipis suillae lotae, *Drachmas sex.*
MDS. 2mal täglich eine Bohne gross aufzustreichen.

Nro. 74.

Rp. Graphitis laevigati, *Drachmas duas*,
Unguenti rosati, *Drachmas decem.*
M. f. unguentum. DS. Theelöffelvollweise einzureiben. (*Weinhold.*)

Nro. 75.

Rp. Florum Sulphuris, *Unciam unam*,
Axungiae Porci, *Uncias duas*,
M. f. unguentum. DS. Zum Einreiben.

Nro. 76.

Rp. Sulphuris depurati, *Unciam unam*,
Pulveris radicis Hellebori albi, *Drachmas duas*,
Kali nitrici, *Grana decem*,
Saponis nigri, *Unciam unam*,
Adipis Suilli, *Uncias tres*.

MDS. Zum Einreiben. (Ung. antipsor. anglic.)

Nro. 77.

Rp. Stibii sulphurati nigri laevigati, *Unciam semis*,
Magnesiae carbonicae, *Drachmam unam*,
Pulveris florum Cassiae, *Drachmam semis*,
Sacchari albi, *Drachmas quinque*.

M. f. pulvis d. ad scatulam. S. 2mal täglich eine Messerspize oder Kaffelöffel voll zu nehmen. (*Kümpf.*)

Nro. 78.

Rp. Hydrargyri stibiato sulphurati, *Drachmam semis*,
Resinae Guajaci, *Drachmam unam*,
Magnesiae carbonicae,
Sacchari albi, *aa. Drachmas duas*.

M. f. pulv. d. ad scatulam. S. 2mal täglich eine starke Messerspize voll zu nehmen.

Nro. 79.

Rp. Barytae muriaticae, *Drachmam unam*,
Aquae Laurocerasi, *Unciam unam*.

MDS. Täglich 4mal 15 Tropfen zu nehmen. (*Hufeland.*)

Anwendung des Jod's nach *Lugol.*

Nro. 80.

(Jodmineralwasser.)

	Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.	Nr. 4.
Rp. Jodinae	Gr. 1/2.	Gr. 3/4.	Gr. 1.	Gr. 1 1/4.
Kali hydriod.	Gr. 6/4.	Gr. 1 1/2.	Gr. 2.	Gr. 2 1/2.
Aquae destillatae	Unc. 8.	Unc. 8.	Unc. 8.	Unc. 8.

Zuerst die Formel Nr. 1. täglich Morgens und Abends die Hälfte zu nehmen; nach 14 Tagen Nr. 2. in zwei Portionen, nach 4 bis 6 Wochen auf dieselbe Weise Nr. 3. und in seltenen Fällen noch Nr. 4.

Nro. 81.

Rp. Jodinae, *Scrupulum unum,*
Kali hydriodinici; *Scrupulos duos,*
Aquae destillatae, *Uncias octo,*

DS. Erwachsenen 2mal täglich 6 Tropfen, alle 8 Tage um 2 Tropfen bis auf 30 bis 36 Tropfen steigend; Kindern unter 7 Jahren bis zu 5 Tropfen, Kindern über 7 Jahren bis zu 16 Tropfen.

Nro. 82.

(Jodsalbe.)

	Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.	Nr. 4.
Rp. Jodinae	Gr. 12.	Gr. 18.	Gr. 21.	Gr. 24.
Kali hydriod.	Scr. 4.	Dr. 2.	Dr. 2 1/2.	Dr. 2 1/2.
Adip. suill.	Unc. 2.	Unc. 2.	Unc. 2.	Unc. 2.

Nro. 83.

(Mercurial - Protojod - Salbe.)

	Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.
Rp. Protojodureti Mercurii	Scr. 2.	Scr. 3.	Scr. 4.
Adip. suill.	Unc. 2.	Unc. 2.	Unc. 2.

Nro. 84.

(Jod - Liquor.)

	Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.
Rp. Jodinae	Gran 2.	Gran 3.	Gran 4.
Kali hydriod.	Gran 4.	Gran 6.	Gran 8.
Aq. destill.	Pfd. 1.	Pfd. 1.	Pfd. 1.

Nro. 85.

(Rothmachender Jod Liquor.)

Rp. Jodinae, *Drachmam dimidiam*,
Kali hydriodinici, *Unciam unam*,
Aquae destillatae, *Uncias sex*.
MD. ad vitrum epistomate vitreo clausum.

Nro. 86.

(Kaustischer Jod - Liquor.)

Rp. Jodinae, *Drachmam unam*,
Kali hydriodinici,
Aquae destillatae, *aa. Uncias duas*.

Nro. 87.

(Jod-Bäder. — Für Kinder.)

	Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.	Nr. 4.
Rp. Jodinae	Scr. 2.	Scr. 2½.	Scr. 3.	Scr. 4.
Kali hydrojod.	Scr. 4.	Scr. 5.	Scr. 6.	Scr. 8.
Aq. destillat.	Unc. 6.	Unc. 6.	Unc. 6.	Unc. 6.

(Für Erwachsene.)

	Nr. 1.	Nr. 2.	Nr. 3.	Nr. 4.
Rp. Jodinae	Dr. 2.	Dr. 2½.	Dr. 3.	Dr- 4.
Kali hydrojod.	Dr. 4.	Dr. 5.	Dr. 6.	Dr. 8.
Aq. destillat.	Unc. 6.	Unc. 6.	Unc. 6.	Unc. 6.

Die Salben wendet man auf Geschwülste und Geschwüre an, ein- bis zweimal täglich. Den zuerst angegebenen Jod-Liquor (Nr. 84) benüzt man bei scrophulösen Ophthalmien, zu Injectionen bei Fistelgängen, gegen Geschwüre und Flechten. Wirkt dieser Liquor nicht mehr, so kann der Nr. 85 angegebene gebraucht werden; auch dient dieser Liquor zu Local-Jod-Bädern und als Zusaz zu Jodkataplasmen. Den kaustischen Jodliquor kann man bei schwammigen Auswüchsen und fressenden Flechten in Anwendung bringen. Die Jodbäder gibt man wöchentlich zwei- bis dreimal in der Wärme von 28 bis 30 Gr. R.

Nro. 88.

Rp. Limaturae martis.
Pulveris radicis Rhei, *aa. Grana quinque*,
Sacchari albi, *Grana decem.*

M. f. pulv. dent. tal. dos. octo. S. 2mal täglich 1 Pulver zu nehmen.

Nro. 89.

Rp. Extracti Ferri pomati, *Drachmam unam et semis*,
Pulv. radicis Rhei,
„ corticis Cascarillae, *aa.* q. s. ut. f. pilul. *granor. duor.*

S. 2mal täglich 5 bis 8 Stücke zu nehmen.

Nro. 90.

Rp. Unguenti Althaeae, *Unciam unam*,
Fellis Tauri inspissati,
Saponis veneti, *aa. Drachmas tres*,
Petrolei, *Drachmas duas*,
Ammonii carbonici pyroleosi, *Drachmam semis*,
Camphorae, *Drachmam unam*.

M. f. linimentum. DS. Alle 3 Stunden einen Theelöffel voll einzureiben. (*Hufeland.*)

Nro. 91.

Rp. Radicis Rubiae tinctorum, *Unciam semis*,
Salis Tartari, *Drachmam dimidiam*,
coque Aquae fontanae, *Unciis decem*,
colaturae adde
Extracti Martis pomati, *Guttas viginti*,
Syrupi corticum Aurantiorum, *Unciam unam*.

MDS. Alle 2 Stunden einen Esslöffel voll. (*Henke.*)

Nro. 92.

Rp. Herbae Digitalis purpureae, *Grana quindecim*,
infunde Aqua fervida,
colaturae *Unciarum quinque*,
adde
Aquae Cinnamomi simplicis,
Syrupi corticum Aurantiorum, *Unciam unam*.

MDS. Alle 2 Stunden einen Löffel voll zu nehmen.

Nro. 93.

Rp. Aceti scillitici, *Unciam unam*,
Kali carbonici, q. s. ad saturationem,
Aquae destillatae, *Uncias quatuor*,
Syrupi Althaeae, *Unciam unam*.

MDS. Alle 2 Stunden einen Löffel voll zu nehmen.

Nro. 94.

Rp. Hydrargyri muriatici corrosivi, *Grana quatuor*,
solve in Aquae destillatae. q. s.
Micae panis albi. q. s. ut fiant pilulae triginta duae.

S. Täglich zweimal 1 — 2 Stücke genommen.

Nro. 95.

Rp. Hydrargyri muriati corrosivi, *Grana sex — duodecim*,
Extracti Cicutae,
Extracti florum Chamomillae, *aa. Drachmas duas*,
Tincturae anodynae simplicis, *Drachmam unam*,
Mellis rosati, *Unciam unam*.

DS. Pinselsaft (von *Rust*.)

Nro. 96.

Rp. Hydrargyri muriatici corrosivi, *Grana duodecim*,
solve in Aquae destillatae q. s.
adde
Micae panis albi,
Sacchari albi, *aa.* q. s. ut. f. pilulae Nr. 240.
D. (*Dzondi's* Sublimatpillen.)

Nro. 97.

Rp. Hydrargyri muriatici corrosivi,
Ammonii muriatici, *aa. Drachmam unam*,
Axungiae porcinae, *Unciam unam*,
M. exactissime in mortareo vitreo. D. (*Cirillo's* Salbe.)

Nro. 98.

Rp. Decocti radicis Althaeae, *Uncias quinque*,
Acidi borussici methodo Ittneri parati, *Guttas duodecim*,
Syrupi Althaeae, *Unciam unam*,
MDS. Alle 2 Stunden einen Löffel voll zu nehmen.

Nro. 99.

Rp. Seminum Phellandrii aquatici, *Drachmas duas*,
infunde Aqua fervida,
colaturae, *Unciarum quatuor*,
adde
Syrupi capillorum Veneris, *Unciam unam.*
DS. Alle 2 Stunden einen Löffel voll zu nehmen.

Nro. 100.

Rp. Lichenis islandici, *Drachmas tres*,
coque Aqua fontana,
colaturae, *Unciarum sex*,
adde
Elaeosacchari Anisi, *Drachmas tres*.
DS. Alle 2 Stunden einen Löffel voll zu nehmen.

Nro. 101.

Rp. Plumbi acetici,
Opii puri, *aa. Granum dimidium*,
Sacchari albi, *Grana decem*.
M. f. pulv. dentur tales doses octo. S. Morgens und Abends ein Pulver zu nehmen.

Nro. 102.

Rp. Morphii acetici, *Grana duo*,
solve in
Aquae destillatae, *Drachma una et dimidia*.
adde
Aceti Vini destillati, *Guttas octo*,
Vini malacensis, *Drachmam dimidiam*.
MDS. Abends 16 Tropfen zu geben.

Nro. 103.

Rp. Pulveris Radicis Valerianae minoris, *Drachmam unam et dimidiam*,
„ „ Jalappae, *Drachmam*
Seminis Santonici, *Unciam dimidiam*,
Kali sulphurici, *Drachmas duas*,
Oxymellis scillitici, *Drachmas sex*,
Mellis rosati q. s. fiat Electuarium. S. Theelöffelvollweise
(*Stoerk.*)

Nro. 104.

Rp. Zinci hydrocyanici, *Granum unum*,
Sacchari albi, *Grana decem*.

M. f. pulv. dent. tal. dos. octo. S. 2—4mal täglich ein Pulver zu nehmen.

Nro. 105.

Rp. Strychnii puri, *Granum unum*,
Acidi acetici, *Guttas duas*,
Sacchari albi, *Drachmas duas*,
Aquae florum Aurantii, *Uncias duas*.

MDS. Täglich 2mal 2 Theelöffel voll zu nehmen. (*Magendie*.)

Nro. 106.

Rp. Emetini fusci, *Grana quatuor*,
Aquae florum Aurantii, *Uncias duas*,
Syrup, *Unciam semis*.

MDS. Alle halbe Stunde 1 Esslöffel voll zu nehmen. (*Magendie*.)

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

Sachregister.

A.

	Band.	Seite
Abmagerung	II.	240
Absonderungskrankh.	II.	1
Abweichen	II.	38
Abzehrung	II.	240
Achores	II.	184
Acne	II.	170
Acor. primarum viar.	II.	27
Adstrictio alvi	II.	88
Afterbildungen	II.	463
Agalactia	II.	80
Agrypnia	II.	634
Alienatio mentis	II.	731
Alp	II.	638
Altersschwäche	II.	279
Alvi fluxus	II.	38
Alvus adstricta, constipata, obstructa	II.	88
Amenorrhoea	II.	103
Amentia	II.	762
Anasarca	II.	336
pulmonum	II.	358
Aneurysma cordis	II.	258
consecutiva, spuria	I.	481
Angewachsensein	II.	401
Angina	I.	407
bronchialis	I.	431
catarrhalis	I.	409
convenneuse	II.	166
faucium	I.	408
gangraenosa	I.	411
laryngea	I.	415
Angina maligna	I.	411
membranacea	I.	415
oedematodes	I.	409
parotidea	I.	397
pharyngea	I.	411
pectoris, n. *Heberden*	II.	546
— nach *Selle*	I.	431
phlegmonodes	I.	409
polyposa	I.	415
putrida	I.	411
serosa	I.	409
strangulatoria	I.	415
stridula	I.	415
suffocatoria	I.	415
tonsillaris	I.	408
— membranacea	II.	166
trachealis	I.	414
— humida	I.	415
ulcerosa	I.	411
uvularis	I.	408
Angiometritis	I.	544
Animi deliquium	II.	668
morbi	II.	731
Anoia	II.	762
Ansprung	II.	179
Anthrax	II.	162
Anuria	II.	86
Aphthae	II.	163
anginosae	II.	160
Apoplexia	II.	642
hydrocephalica	II.	552
Infantum venosa	II.	656

	Band.	Seite
Apoplexia pulmonum	I.	705
Aqua intercus	II.	336
Arachnitis	I.	383
spinalis	I.	394
Arquatus morbus	II.	300
Aridura	II.	240
Arsenikvergiftung	II.	692
Arterienentzündung	I.	345
Arthralgia	I.	595
Arthritis	I.	595
diaphragmatica	II.	546
Ascites	II.	361
Asphyxia	II.	667
Assimilationskrankh.	II.	238
Asthenopyra	I.	110
Asthma	II.	598
acut. infant. Millar.	II.	601
adultorum	II.	598
caducum	II.	598
convulsivum	II.	546
dolorificum	II.	546
nocturnum	II.	638
spasmodicum	II.	598
thymicum	II.	262
Asturische Rose	II.	215
Athymia	II.	770
Atrabilarius morbus, s. Febr. atrabilaria u. Morb. niger	I.	711
Atrophia	II.	240
glandularis	II.	267
neonatorum	II.	267
nervosa	II.	272
Aurigo	II.	300
Ausfahren, rothes	II.	141
Ausgehen der Haare	II.	235
Aussaz	II.	208
Ausschwizung, plast.	I.	334
seröse	I.	333
Aussonderungskrnkh.	II.	1
Austrocknen d. Greise	II.	279
Auswüchse	II.	112
hornartige	II.	229
Auszehrung	II.	240

B.

	Band.	Seite
Ballismus	II.	595
Baras	II.	210
Barbadosfieber	I.	166
Bauchfellsentzündung	I.	552
Bauchfluss, eiteriger u. jauchigter	II.	41
wässerigter	II.	38
Bauchspeicheldrüsenentzündung	I.	524
Bauchwassersucht	II.	361
Bauchweh	II.	561
Bauchwindsucht	II.	400
Bauernwezel	I.	397
Beerschwämme	II.	224
Belladonnavergiftung	II.	690
Beulen	II.	112
Bildungskrankheiten	II.	238
Bilis in praecordiis	II.	32
Bilis suffusio	II.	300
Blähungsbeschwerd.	II.	400
Bläschenemphysem	II.	404
Blätterchen	II.	111
Blase s. Harnblase.		
Blasen	II.	111
Blasenausschlag	II.	159
Blasenentzündung	I.	532
Blasenfieber	II.	159
Blasengrind	II.	155
Blasenhämorrhoiden	I.	681
Blattern	II.	111
falsche	I.	312
modificirte	I.	271
schwarze	II.	720
Blaue Krankheit	II.	314
Blauer Husten	II.	607
Blausäurevergiftung	II.	689
Blausucht	II.	314
Bleichsucht	II.	307
Bleikolik	II.	565
Bleivergiftung	II.	695
Blennorrhoea urethral.	II.	66
Blödsinn	II.	762
Blutandrang	I.	661

	Band.	Seite
Blutanhäufung	I.	657
Blutbrechen	I.	709
Blutfleckenkrankheit	II.	321
Blutfluss	I.	694
Bluthamen	I.	714
Bluthusten	I.	704
Blutmaal	II.	234
Blutspeien	I.	704
Blutschwär	II.	162
Blutschwamm	II.	498
Blutsturz	I.	695
Blutüberfüllung	I.	657
Blutung	I.	694
Borken	II.	115
Branchus	I.	634
Brand, heisser, kalter	I.	339
Bräune	I.	407
häutige, pfeifende, polypöse	I.	415
Brechdurchfall	II.	702
Brennfieber, westind.	I.	166
Bronchitis	I.	413
Bronchopneumonia	I.	435
Bronchorrhagia	I.	705
Brustbräune	II.	546
Brustfellsentzündung	I.	461
Brustkrampf	II.	598
Brustnervenschmerz	II.	546
Brustwassersucht	II.	356
Bubonen	II.	420
Bubonenpest	I.	318
Bulamfieber	I.	166
Bulimia	II.	27
Bulimos	II.	27
Bullae	II.	111

C.

	Band.	Seite
Cachexia	II.	238
virginea	II.	307
Caduca passio	II.	579
Caducus morbus	II.	579
Calvities	II.	236
Cancer	II.	488
Cancer aquaticus	II.	322
Carbunculus	II.	162
Carcinoma ventriculi	II.	490
Cardialgia	II.	550
biliosa	II.	32
Cardiogmus	II.	550
Carditis	I.	472
Carebaria	II.	536
Caries	I.	345
Catalepsia	II.	664
Catamenia, profusa	I.	717
suppressa	II.	105
Catarrhalfieber	I.	64
Catarrhus u. s. Arten	I.	633
suffocativus	I.	431
Catoche	II.	664
Causus	I.	157
tropicus	I.	166
Cayenne, morb. ruber	II.	215
Cephalagra	I.	597
Cephalalgia	II.	536
Ceratiasis	II.	250
Cerealis morbus	II.	700
Chanker	II.	419
Chicot, mal de	II.	447
Chiragra	I.	597
Chloasma	II.	217
Ephelis	II.	226
Chlorosis	II.	307
Cholecystitis	I.	511
Cholepyra	I.	157
Cholera-morbus	II.	702
Cholerareguugen	II.	704
Choleratyphoid	II.	707
Cholerine	II.	704
Chorda	II.	66
Chorea St. Viti	II.	595
Choreomania	II.	595
Circinus	II.	156
Clavus	II.	536
Coeruleus morbus	II.	314
Coerulosis	II.	314
Colica	II.	561
biliosa	II.	32

	Band.	Seite
Colika saturnina	II.	563
Comedones	II.	172
Comitialis morbus	II.	579
Condylomata	II.	423
Congestion	I.	661
Convulsionen der Gebärenden	II.	592
Convulsio cerealis	II.	700
soloniensis	II.	700
Cornua cutanea	II.	230
Coryza	I.	633
Croup	I.	415
spasmodic	II.	601
Crusta	II.	113
lactea	II.	179
serpiginosa	II.	179
Cyanosis	II.	314
Cyanopathia	II.	314
Cynanche	I.	407
parotidea	I.	397
stridula	I.	415
thyreoidea	I.	401
trachealis spasmod.	II.	601
Cynanthropia	II.	769
Cystis serosa	II.	371
Cystitis	I.	532

D.

Daemoniacus morbus	II.	579
Daemonomania	II.	769
Darmblutung	I.	709
Darmentzündung	I.	497
Darmgeschwüre	I.	500
Darmschmerz	II.	561
Darmwindsucht	II.	400
Darrsucht der Greise	II.	279
der Kinder	II.	267
Defluvium Capillorum	II.	235
Delirium potatorum, tremens	II.	639
Dementia	II.	762
Dermoceras	II.	230
Diabetes	II.	54
Diaphragmatitis	I.	434
Diarrhoea chylosa	II.	42
ichorosa	II.	41
mucosa	II.	35
serosa	II.	38
venosa	II.	32
Difficultas intestinor.	II.	47
Diphthérite	II.	166. 777
Dipsacus	II.	54
Dittmarsche Krankh.	II.	447
Divinus morbus	II.	579
Dolor colicus	II.	561
faciei Fothergill.	II.	541
Dothienteritis	I.	497
Drüsen	II.	283
Durchfall	II.	38
Dyscrasia	II.	241. 283
Dysenteria u. ihre Art.	II.	47
Dysmenorrhoea	II.	103
Dysuria	II.	94

E.

Ecchymoma	II.	145
Ecclampsia infantum	II.	592
parturientium	II.	592
Ecthyma u. s. Arten	II.	155
Eczema u. s. Arten	II.	151
Eicheltripper	II.	67
Eierstockwassersucht	II.	369
Eintägiges Fieber	I.	56
Eiterblase	II.	155
Eiterung	I.	335
Elephantenfuss	II.	212
Elephantiasis	II.	211
Emansio mensium	II.	105
Emesis	II.	625
Empfindung, krankh.	II.	534
Emphysema	II.	403
pulmonum	II.	404
Emprosthotonus	II.	630
Empyema	I.	464
Encephalitis	I.	383
Encephaloide	II.	498

	Band.	Seite
Encephalomalacia	II.	452
Endocarditis	I.	473
Engbrüstigkeit, krampfhafte	II.	598
Englische Krankheit	II.	293
Engouement	I.	443
Enteralgia	II.	561
Enteritis	I.	497
Enterorrhagia	I.	709
Entzündliches Fieber	I.	138
Entzündung	I.	329
catarrhalische	I.	633
erysipelatöse	I.	611
phlegmonöse	I.	574
seröse	I.	574
wahre	I.	330
Enuresis	II.	100
Ephelis	II.	226
Ephemera	I.	56
Ephialtes	II.	638
Ephidrosis	II.	12
Epiala	I.	82
Epilepsia	II.	579
pulmonum	II.	598
saltatoria	II.	595
Epiploitis	I.	554
Epistaxis	I.	701
Erbrechen	II.	625
schwarzes	I.	166
Erfrieren	II.	677
Erhängen	II.	675
Erhärtungsentzündung	I.	330
Erotomania	II.	772
Ersticken	II.	676
Ertrinken	II.	675
Erysipelas u. s. Arten	I.	611
phlyctaenodes	II.	156
pulmonum	I.	449
Zoster	II.	156
Erythema u. s. Arten	II.	134
rosaceum	II.	171
Eselshusten	II.	607
Essera	II.	140
Esthiomenos	II.	198
Exanthemata	II.	111
Exanthema miliare	II.	148
urticatum	II.	138
Excrescentia	II.	112
Exostosis	I.	345
Exulceratio	I.	538

F.

	Band.	Seite
Fallsucht	II.	579
Fasch	II.	163
Fatuitas	II.	762
Faulfieber	II.	182
Febris	I.	19
alba	II.	307
amatoria	II.	307
angeiotenica	I.	138
anglica	I.	223
atrabilaria	I.	70
bellica	I.	198
biliosa	I.	157
bullosa	II.	159
carceralis	I.	198
catarrhalis	I.	64
cholerica	I.	157
depascens	I.	190
dialeipyra	I.	73
diaria	I.	56
ephemera	I.	56
ex colluvie biliosa	I.	66
— — pituitosa	I.	66
ex consensu	I.	58
flava	I.	166
gastrica	I.	65
— venosa	I.	70
glutinosa	I.	147
hectica	I.	190
— meseraica	II.	267
hepatica	I.	70. 157
hydrocephalica	II.	346
inflammatoria	I.	138
— abdominalis	I.	67
intermittens	I.	73
— algida	I.	83

	Band.	Seite
Febris intermitt. anomala	I.	82
— cephalalgica	I.	83
— comitata	I.	83
— comatosa	I.	83
— diaphoretica	I.	83
— epiala	I.	82
— helodes	I.	83
— hydropyretos	I.	83
— imperfecta	I.	82
— incompleta	I.	82
— inordinata	I.	82
— irregularis	I.	82
— larvata und ihre Arten	I.	85
— legitima	I.	74
— maligna	I.	84
— manifesta	I.	74
— meraca	I.	74
— miliaris	I.	83
— normalis	I.	74
— perfecta	I.	74
— petechizans M.	I.	83
— quartana	I.	77
— — duplex	I.	79
— — duplicata	I.	79
— — triplicata	I.	79
— querquera	I.	82
— quotidiana	I.	77
— — duplex	I.	78
— regularis	I.	74
— stipata	I.	83
— subcontinua	I.	84
— subintrans	I.	84
— sudatoria	I.	83
— tertiana	I.	77
— — duplex	I.	78
— — duplicata	I.	78
— — triplex	I.	78
— urticata	I.	83
intestinalis saburral.	I.	69
lactea	I.	64
lenta, hectica	I.	190
— et nervosa	I.	110

	Band.	Seite
Febris lymphatica	I.	147
malign. bil. Americae	I.	166
— lenta	I.	110
miliaris	I.	198
morbillosa	I.	246
mucosa	I.	147
nervosa u. ihre Arten	I.	110
nosocomialis	I.	198
pestilential. oriental.	I.	318
petechialis	I. 182.	198
phlegmatica	I.	147
pituitosa	I.	147
polycholica	I.	157
puerperalis	I.	560
putrida	I.	182
rheumatica	I.	225
rubra	I.	225
— pruriginosa	II.	138
saburralis	I.	69
scarlatinosa	I.	225
septenaria	I.	138
simplex	I.	56
soporosa senum	II.	260
sthenica	I.	138
sudatoria	I.	225
traumatica	I.	65
ungarica	I.	198
variolosa	I.	259
venosa	I.	155
Feigwarzen	II.	425
Fettsucht	II.	329
Feuermasern	I.	245
Fieber	I.	19
Fieberkuchen	I.	87
Fièvre ataxique	I.	110
Finnen	II.	170
Fischschuppenausschl.	II.	231
Flatulentia	II.	400
Flechten u. ihre Arten	II.	183
Flechte von Aleppo	II.	214
Flecken	I. 248. II.	110
Fluor albus	II.	47
Flug	II.	145
Fluss	I.	578

	Band.	Seite
Fluss, weisser	II.	74
Fluxio	I.	578
Fluxus chylosus	II.	42
coeliacus	II.	42
haemorrhoidalis	I.	676
hepaticus I. 512.	II.	41
spleniticus	I.	521
Fothergillscher Gesichtsschmerz	II.	541
Framboesia	II.	448
Franzosenkrankheit	II.	416
Friesel	II.	148
Fungus haematodes	II.	498
medullaris	II.	498
Furfura	II.	115
Furfuratio	II.	176
Furor	II.	773
uterinus	II.	565
Furunculus	II.	162

G.

	Band.	Seite
Galactacrasia	II.	26
Galactia depravata	II.	26
Galactorrhoea	II.	21
Galle i. d. erst. Wegen	II.	32
Gallenfieber	I.	157
Gallenkolik	II.	663
Gallenmangel	II.	83
Gallenruhr	II.	702
Gallicus morbus	II.	416
Gallopirende Schwindsucht	II.	471
Ganglientyphus	I.	110
Gangraena u. i. Arten	I.	339
pulmonum	I.	449
senilis	II.	280
Gasanhäufung, krankhafte	II.	399
Gastrisches Fieber	I.	65
Gastritis	I.	487
Gastrodynia	II.	550
Gastromalacia	II.	455
Gastrorrhagia	I.	709
Gebärende, Krämpfe derselben	II.	592
Gebärmutterblutfluss	I.	717
Entzündung, Eiterung etc.	I.	541
Krebs	II.	492
Rheumatismus	I.	542
Wassersucht u. i. A.	II.	366
Gefängnissfieber	I.	198
Gehirnentzündung	I.	383
Gehirnerweichung	II.	452
Gehirnhöhlenwassers.	II.	346
Geisteskrankheiten	II.	731
Geistesschwäche	II.	762
Gekrösentzündung	I	555
Gelenksrheumatismus	I.	579
Gelbes Fieber	I.	166
Gelbsucht	II.	300
Gemüthskrankheiten	II.	731
Geschlechtstrieb, übermässiger	II.	565
Gesichtsrose	I.	616
Gesichtsschmerz	II.	541
Gicht	I.	595
Glazmaal	II.	236
Gliederreissen	I.	578
Glossitis	I.	404
Godziec	II.	219
Goldader	I.	676
Gonagra	I.	597
Gonorrhoea	II.	611
Gravedo	I.	634
Graviditas hydatitosa	II.	368
Grimmen	II.	561
Grind	II.	115
Grindflechte	II.	177
Grindkopf u. s. Arten	II.	193
Grippe	I.	648
Gürtel	II.	156
Gutta rosacea	II.	171

H.

	Band.	Seite
Haarverlust	II.	235
Haematemesis	I.	709

	Band.	Seite
Haematuria u. i. Arten	I.	714
Haemoptoe, -ptysis	I.	704
Haemorrhagia, -rhoea u. ihre Arten	I.	694
Haemorrhagicus maculosus Werlhofii morbus	II.	321
Haemorrhoea petechialis	II.	21
Haemorrhoidalknoten	I.	678
Haemorrhoidaltriebe	I.	677
Haemorrhoidaltripper	I.	681
Haemorrhoiden u. i. A.	I.	674
Halbschlag	II.	658
Halsentzündung, -weh u. ihre Arten	I.	407
Harnabgang, erschwerter	II.	94
unwillkürlicher	II.	100
Harnblasenentzündung, Eiterung etc.	I.	532
Harnmangel	II.	86
Harnruhr	II.	54
Harnverhaltung	II.	96
Hartleibigkeit	II.	88
Hautausdünstung, verminderte	II.	79
Hautausschläge	II.	108
Hautgrüze	II.	172
Hauthorn	II.	230
Hautjucken	II.	174
Hautkleie	II.	176
Hautmoos	II.	143
Hautröthe u. i. Arten	II.	134
Hautwassersucht	II.	336
Heimweh	II.	771
Heiserkeit	I.	634
Heisshunger	II.	27
Helminthiasis	II.	500
Hemicrania I. 582.	II.	536
Hemiplegia	II.	658
Hepatisation	I.	444
Hepatis hypertrophia	II.	264
Hepatitis	I.	509
Hepatomalacia	I.	516
Herculeus morbus	II.	579
Herpes u. seine Arten	II.	183
Herpes Aleppicus	II.	214
Zoster	II.	156
Herzbeutelentzündung, Eiterung etc.	I.	472
Wassersucht	II.	359
Herzentzündung, Eiterung etc.	I.	472
Herzgespann	II.	401
Herzklappenverknöch.	II.	622
Herzklopfen, nervöses	II.	622
von organ. Fehlern	II.	622
Himbeerausschlag	II.	448
Hirnentzündung, Eiterung etc.	I.	383
Hirnerweichung	II.	452
Hirnhautentzündung	I.	383
Hizbläschen	II.	151
Hizblätterchen	II.	141
Höllisches Feuer	II.	156
Hüftweh	II.	544
Hühnerhusten	I.	415
Hundswuth	II.	723
Husten	I.	635
Hydatiden	II.	505
in der Gebärmutter	II.	367
Hydrarthus I. 583.	II.	317
Hydroa u. s. Art. I. 79.	II.	151
consensuale	I.	79
Hydrocardia	II.	359
Hydrocele	II.	317
Hydrocephalus u. s. A.	II.	338
Hydrometra	II.	366
hydatica, cystica	II.	368
Hydrophobia	II.	723
Hydrops	II.	334
anasarca	II.	336
ad matulam	II.	54
ascites	II.	361
flatulentus	II.	400
pulmonum cellulare	II.	358
saccatus	II.	364

	Band.	Seite
Hydrops siccus	II.	400
ventriculorum cerebri	II.	346
Hydrophthalmus	II.	317
Hydrorrhachia	II.	353
Hydrothorax	II.	356
Hygroma	II.	317
Hygrophobia	II.	723
Hyperaesthesia	II.	533
Hyperemesis	II.	625
Hyperpiaenesis	II.	329
Hypertrophia	II.	239
cordis	II.	257
hepatis	II.	264
lienis	II.	267
Hypochondriasis	II.	567
Hysteria	II.	570
Hysteritis	I.	541
Hysteromania	II.	565
Hysterorrhagia	I.	717
Hystriciasis	II.	232

I. J.

	Band.	Seite
Ichthyosis	II.	231
Icterus u. seine Arten	II.	300
Idiotismus	II.	762
Ignis sacer	II.	156
Ileus	II.	562
Iliaca passio	II.	562
Impetigo u. s. Arten	II.	177
Incontinentia urinae	II.	100
Incubus	II.	638
Induratio telae cellularis	I.	619
Inflammatio	I.	329
Infiltratio purulenta	I.	445
Influenza	I.	648
Intestinalschweiss, -fieber	I.	70
Joannis Sti- morbus	II.	579
Jonthus acne	II.	170
carbunculus et furunculus	II.	162
Jonthus Sycosis	II.	171
Irresein	II.	731
Ischiagra	I.	597
Ischias nervosa Cotunni	II.	544
Ischuria u. seine Arten	II.	94
renalis	II.	86
Isthmitis	I.	408
Juckblätterchen	II.	174
Juckknötchen	II.	174

K.

	Band.	Seite
Kaltes Fieber	I.	73
Karfunkel	II.	162
Katarrh u. seine Arten	I.	633
Katarrhalfieber	I.	64
Kehlkopfsentzündung	I.	415
Schwindsucht	II.	483
Keloide	II.	229
Keratosis	II.	230
Keuchhusten	II.	607
Kindbettfieber	I.	560
Kinnbackenkrampf	II.	631
Kleien	II.	113
Kleiengrind u. s. Art.	II.	176
Knochenauswuchs	I.	345
Brand	I.	345
Erweichung	I.	345
Frass	I.	345
Fleischgeschwulst	I.	345
Speckgeschwulst	I.	345
Knötchen	II.	111
Knollbein	II.	212
Knoten	II.	112
Knotenaussaz	II.	211
Kolik	II.	561
Kopfgrind u. s. Arten	II.	193
Kopfschmerz u. s. Art.	II.	536
Kopfwassersucht und ihre Arten	II.	338
Kotherbrechen	II.	562
Kräze	II.	200
Krämpfe	II.	579

	Band.	Seite
Krebs	II.	487
Krebsschaden, rheumatischer	I.	581
Kretinismus	II.	763
Kriebelkrankheit	II.	700
Kriegspest	I.	198
Krimmische Krankheit	II.	215
Krustenflechte	II.	187
Kuhpockenimpfung	I.	295
Kupfergesicht, -handel, -nase	II.	171
-vergiftung	II.	695
Kurvos	II.	163

L.

	Band.	Seite
Lactumen	II.	179
Laevitas intestinorum	II.	44
Lähmung	II.	658
Laryngitis	I.	413
Laryngorrhagia	I.	705
Laubflecke	II.	227
Läusesucht	II.	518
Lazarethfieber	I.	195
Leberentzündung, -Eiterung, -Verhärtung	I.	509
Leberfieber	I.	70
Leberflecken	II.	227
fluss	I.	512
Leibgrind u. s. Arten	II.	177
Lendenweh	I.	583
Lenticulae solares	II.	226
Lentigo	II.	209. 226
Leontiasis	II.	212
Lepra u. ihre Arten	II.	208
Leucophlegmatia	II.	306
Leucorrhoea	II.	74
Lichen u. s. Arten	II.	143
Lienis hypertrophia	II.	267
Lienitis	I.	519
Lienteria	II.	44
Lipothymia	II.	668
Lochiorrhagia	I.	725
Lues syphilitica, venerea	II.	416
Luftröhrenentzündung	I.	431
Schwindsucht	II.	483
Lumbago	I.	583
Lunaticus morbus	II.	579
Lungenblutung	I.	704
Brand	I.	450
Congestion	I.	671
Emphysem	II.	404
Entzündung, Eiterung etc.	I.	435
Krampf	II.	598
Oedem	II.	358
Schwindsucht	II.	464
Sucht	II.	464
Tuberkeln	II.	464
Lupus	II.	188. 198
Lustseuche	I.	416
Lycanche	I.	407
Lycanthropia	II.	769
Lymphangioitis	I.	344

M.

	Band.	Seite
Maal, das dunkle und weisse	II.	209
Maalpläze	II.	111
Maculae	II.	110
Macula hepatica	II.	227
Madesis	II.	235
Magenentzündung, -Eiterung etc.	I.	487
Erweichung	II.	455
Krampf, Weh	II.	550
Krebs	II.	490
Ruhr	II.	44
Magensaft, saurer	II.	27
Mailändische Rose	II.	214
Malacia cerebri	II.	452
ventriculi	II.	455
Maladie de Siam	I.	166
Mal de Chicot	II.	447
Malmorto	II.	211

	Band.	Seite
Mal rouge v. Cayenne	II.	215
Mania	II.	773
Manntollheit	II.	565
Marasmopyra	I.	190
Marasmus senilis	II.	279
Mariscae I. 678.	II.	423
Markschwamm	II.	498
Marschkrankheit	II.	447
Masern	I.	248
Mastknoten	I.	578
Mastkörner	I.	678
Matrosenfieber	I.	166
Medorrhoea	II.	74
Medullarcarcinom	II.	498
Mehlhund	II.	163
Mehlkruste	II.	163
Melaena	II.	711
Melancholia	II.	770
Melanose	II.	486
Meningitis	I.	383
Menorrhagia, -rhoea	I.	718
Menostasia	II.	103
Menses aberrantes, insolitae viae	II.	104
Menstruatio difficilis	II.	103
Mentagra	I.	171
Mentis morbi	II.	731
Mesaraische Drüsenkrankheit	II.	267
Mesenteritis	I.	555
Meteorismus	II.	402
Metritis	I.	541
Metrorrhagia und ihre Arten	I.	717
Mictus cruentus	I.	714
Migrän	I.	582
Milchborke	II.	179
Fieber	I.	64
Fluss	II.	21
Friesel	II.	150
Grind	II.	179
Mangel	II.	80
Ruhr	II.	42
Schorf	II.	179
Milchversaz od. Depot	II.	23
Miliaria u. ihre Arten	II.	148
Millars Asthma	II.	601
Milzbrand	II.	720
Milzentzündung, -Eiterung etc.	I.	519
Milzsucht	II.	567
Mischungsausartungen	II.	241. 282
Mitesser	II.	172
Molae aereae, ventosae	II.	402
Molimina haemorrhoidalia	I.	677
Molluseum	II.	228
Monomania	II.	767
Morbilli	I.	248
Morbus niger Hippocratis	I.	711
Morphaea	II.	209
Mortuum malum	II.	211
Mucosus morbus	I.	147
Mumps	I.	397
Mundbluten	I.	703
Mundfäule	II.	321
Mundsöhr	II.	163
Mutterbeschwerde	II.	570
Blutfluss	I.	717
Maal	II.	233
Wuth, Weh	II.	565
Myelitis	I.	394

N.

Nachtwandeln	II.	636
Naevus	II.	233
Narrheit	II.	766
Nasenbluten	I.	701
Necrosis	I.	345
ustilaginea	I.	714
Nephritis	I.	525
Nervenentzündung	I.	344
Nervenfieber	I.	110
ansteckendes	I.	198
Nervenkopfweh	II.	536

	Band.	Seite
Nervenkrankheiten	II.	519
Nervenschlag	II.	646
Schwindsucht	II.	272
Nesselsucht	II.	138
Nezentzündung	I.	554
Nevralgia	II.	534
cordis	II.	541
facialis	II.	541
ishiadica	II.	544
pectoris interna	II.	546
Nevritis	I.	344
Nierenblutung	I.	714
Entzündung, Eiterung etc.	I.	525
Noctambulatio	II.	636
Noma	II.	322
Nostalgia	II.	771
Notiae comyelitis	I.	394
Nymphomania	II.	565

O.

Oaritis	I.	543
Obesitas nimia	II.	329
Obstipatio alvi	II.	88
Obstructio alvi	II.	88
Ochropyra	I.	166
Odontagra	I.	597
Odontalgia	II.	538
Oedema	II.	336
pulmonum	II.	358
Oesophagitis	I.	411
Ohnmacht	II.	667
Ohrendrüsen-Entzündung	I.	397
Omagra	I.	597
Omentitis	I.	554
Ophoritis	I.	543
Ophiasis	II-	236
Opisthotonus	II.	630
Opiumvergiftung	II.	690
Ordensband, asturisch.	II.	215
Orientalische Pest	I.	318
Osteomalacia	I.	345
Osteosarcoma	I.	345
steatoma	I.	345
Ovarien-Entzündung, Eiterung etc.	I.	543
Wassersucht	II.	398
Ozaena	I.	634
syphilitica	II.	422

P.

Paedatrophia	II.	267
Pallor virginum	II.	307
Palpitatio cordis	II.	622
Pancreas-Entzündung, Eiterung, Verhärtung etc.	I.	524
Pancreatitis	I.	524
Pannus	II.	111
Papulae	II.	111
Paralysis	II.	658
Paranoiae	II.	731
Paraphimosis	II.	67
Paraphrenitis	I.	484
Parotitis	I.	397
Passio iliaca	II.	562
Pechyagra	I.	597
Pellagra	II.	214
Pemphigus, -ix u. s. A.	II.	155
variolodes	I.	312
Pericarditis	I.	472
Peripneumonia	I.	435
notha	I.	451
Peritonitis, -nacitis	I.	555
intestinorum	I.	555
puerperalis	I.	560
uterinalis	I.	543
Pertussis	II.	607
Pervigilium	II.	634
Pest, amerikanische, westindische	I.	166
europäische	I.	198
levantische	I.	318
Pestis occidentalis	I.	166
orientalis	I.	318

	Band.	Seite
Petechiae, Peticulae u. ihre Arten	I.	145
Pharyngitis	I.	411
Phimosis	II.	67
Phlegmasia, -mone	I.	330
alba dolens	I.	570
lactea	I.	570
Phlegmopyra	I.	147
Phlogopyra	I.	138
Phlogosis	I.	329
Phlyctaenae	II.	112
Phlyzacium	II.	153
Phoenigmus	II.	171
Phrenitis	I.	383
Phthyriasis	II.	518
Phthisis	II.	240
hepatica	I.	512
laryngea	II.	483
meseraica	I.	556
pancreatica	I.	524
pituitosa	II.	464
pulmonalis	II.	464
renalis	I.	527
stomachica	I.	490
trachealis	II.	483
tuberculosa	II.	464
uterina	I.	545
vesicalis	I.	535
Phymata	II.	112
Physconia hepatis	II.	264
lienis	II.	266
Physometra	II.	402
Pians	II.	447
Pituita primar. viar.	II.	35
Pituitosus status	II.	35
Pityriasis u. ihre Arten	II.	176
Plethora abdominalis	I.	674
localis	I.	657
Pleuresia	I.	461
Pleuritis	I.	461
spuria	I.	468
Pleuritisch. Extravasat	I.	462
Pleuropneumonia	I.	435
Pleurosthotonus	II.	630
Plica polonica	II.	219
Pneumatosis	II.	399
Pneumonia, -nitis und ihre Arten	I.	435
hypostatica	I.	670
notha	I	151. 431
Pneumonorrhagia	I.	704
Pneumothorax	II.	402
Pnigalion	II.	638
Phnigophobia	II.	546
Pocken	I.	259
Podagra	I.	597
Pollutio	II.	61
Polyämia	II.	329
Polycholia	II.	51
Polypionia	II.	329
Polysarcia	II.	329
Pompholyx	II.	159
Porcinus morbus	II.	140
Porphyrisma	I.	225
Porrigo	II.	193
larvata	II.	179
Porzellanfieber	II.	140
Priapismus	II.	565
Profluvia cruenta	I.	694
Prosopalgia	II.	541
Prurigo u. ihre Arten	II.	174
Pruritus	II.	174
Pseudoerysipelas	I.	614
Pseudovariolae	I.	312
Psora	II.	200
Psoriasis und ihre Arten	II.	186
Psychichi morbi	II.	731
Psydracia	II.	202
Ptyalismus	II.	16
Puerilis morbus	II.	579
Purpura	II.	145. 148
maligna	II.	225
scarlatina	I.	225
Pustulae	II.	111
Pustula maligna	II.	720
Putrescenz des Uterus	I.	547
Pyrexiae	I.	19

Band. Seite

Pyrexia haematoseptica I. 182
Pyrosis II. 551

Q.

Quecksilbervergiftung II. 694
Querschlag II. 658

R.

Rabies canina II. 723
Rachencroup II. 166. 777
Radesyge II. 446
Raphania II. 700
Raserei II. 773
Raucedo, -itas I. 634
Regius morbus II. 300
Reproductionskrankheiten II. 238
Resolutio nervorum II. 658
Retentio alvi II. 88
mensium II. 103
urinae II. 94
Rhachiagra I. 597
Rhachitis II. 293
Rheuma I. 578
Rheumatismus u. seine Arten I. 578
Rhypia II. 155
Ritteln I. 243
Röschen II. 136
Rötheln I. 243
Rosa I. 611
asturica II. 215
Roseola u. ihre Arten II. 136
Rossalia, Rossania I. 225
Rother Hund I. 225. 243
Rothes Ausfahren II. 141
Rothlauf I. 611
der Neugebornen I. 617
Rubeola I. 243. 248
Rückendarre II. 275
Rückenmarksentzündung I. 394

Band. Seite

Rückenmarksschwindsucht II. 275
Wassersucht II. 353
Rückenspalte
Rugeole I. 248
Ruhr II. 47

S.

Saburralfieber I. 69
Sacer morbus II. 579
Sackbauchwassersucht II. 364
Sägesprung II. 179
Säuferwahnsinn II. 639
Salivatio II 16
Samenfluss II. 61
Sanguifluxus I. 694
uterinus I. 717
Sanguinis stillicidium I. 695
Sarcoma medullare II. 498
Satyriasis II. 565
Saurer Magensaft II. 27
Scabies u. ihre Arten II. 200
Scandinavisches Syphiloid II. 446
Scarlatina I. 225
Scelalgia puerperalis I. 570
Scelotyrbe II. 595
Schaafshusten II. 607
Schälblätterchen II. 141
Schanker II. 419
Scharbock II. 317
Scharlachfieber I. 225
Friesel I. 228
Scheintod II. 667
Schenkelgeschwulst, weisse d. Wöchnerinnen I. 570
Scherlievo II. 445
Schilddrüsenentzündung I. 401
Schlaflosigkeit II. 634
Schlafreden II. 636
Schlafwandeln II 636

	Band	Seite
Schlagfluss und seine Arten	II.	642
der Kinder	II.	656
Schleimfieber	I.	147
Schleimhämorrhoiden	I.	679
Schluchzen	II.	624
Schlundentzündung	I.	411
Schmerzkrankheiten	II.	534
Schmuzrufe	II.	155
Schnupfen	I.	633
Schuppen	II.	113
Schuppenflechte	II.	186
Schuzpocken	I.	295
Schwämmchen	II.	165
Schwangerschaft, falsche	II.	367
Schwarze Blatter, Pocke	II.	720
Schweissfieber, englisches	I.	223
Schwermuth	II.	770
Schwinden eines Gliedes	II.	240
Schwindflechten	II.	143
Schwindflecken	II.	143
Schwindsucht	II.	240
Schwizen, krankhaftes	II.	12
Scirrhus	II.	487
Sclerema neonatorum	I.	619
Scleroderma neonatorum	I.	619
Scorbutus	II.	317
Scropheln	II.	283
Scrophula mesenterica	II.	267
Secretionen, krankhafte	II.	1
Seekrankheit	II.	627
Seelenkrankheiten	II.	731
Störungen	II.	731
Seitenstich, entzündlicher	I.	461
gallichter	I.	510
Serpedo, Serpigo	II.	183
Sialadenitis	I.	397
Sibbens, Siwwens	II.	446
Singultus	II.	624
Skerlievo	II.	445
Soda	II.	551
Sodbrennen	II.	551
Sommerflecken, -sprossen	II.	226
Somnambulismus	II.	630
Soor	II.	163
Sora	II.	140
Spasmi	II.	579
Speicheldrüsen-Entzündung	I.	397
Speichelfluss	II.	16
Speiseröhren-Entzündung	I.	397
Spermatorrhoea	II.	61
Sphacelismus cerebri	I.	387
Sphacelus	I.	339
Spili	II.	234
Spina bifida	II.	354
Splenitis	I.	519
Squammae	II.	113
Stachelschweinmenschen	II.	232
Starrkrampf	II.	629
Starrsucht	II.	664
Status biliosus	II.	31
pituitosus	II.	31
Steckfluss	I.	671
Stenocardia	II.	546
Sthenopyra	I.	138
Sternalgia	II.	546
Sternodynia syncopalis	II.	546
Stickhusten	II.	607
Stigma	II.	111
Stockschnupfen	I.	634
Stomacace	II.	322
Stomatorrhagia	I.	705
Stranguria	II.	94
Streifmaal	II.	236
Strophulus u. s. Arten	II.	141

	Band.	Seite
Struma inflammatoria	I.	401
Stuhlverstopfung	II.	88
Stupiditas	II.	762
Stymatorrhagia	I.	716
Stymatosis	I.	716
Sudamina	II.	151
Sudatio morbosa	II.	12
Sudor anglicus	I.	223
Suppressio mensium	II.	103
Syam, Maladie de	I.	166
Sycosis menti	I.	171
Synanche	I.	407
Syncope	II.	667
anginosa	II.	546
Synocha	I.	138
imputris	I.	138
Synochus ardens	I.	157
biliosus	I.	157
icterodes	I.	166
putris	I.	82
simplex	I.	138
Syphiloiden	II.	444
Syphilis	II.	416

T.

	Band.	Seite
Tabes	II.	240
dorsalis	II.	275
mesaraica	II.	267
nervosa	II.	272
Tarantismus	II.	595
Tartareus morbus	I.	595
Teleangiectasia	II.	234
Tenesmus	II.	47
Tetanus	II.	629
Thymiosis	II.	224
Thyreoadenitis	I.	401
Thyreoncus inflammatorius	I.	401
Thyreophyma acutum	I.	401
Tiefsinn	II.	770
Tinea u. ihre Arten	II.	193
faciei	II.	179
Tobsucht	II.	773
Tölpel	I.	397
Tracheitis	I.	414
infantum	I.	415
Tracheorrhagia	II.	705
Trichoma	II.	219
Tripper	II.	66
Trismus	II.	631
dolorificus	II.	541
Trommelsucht	II.	400
Truculentus morbus	I.	414
infantum	I.	415
Trübsinn	II.	770
Trute	II.	638
Tuberkelbildung	II.	463
der Lungen	II.	464
Tubercula	II.	112
haemorrhoidalia	I.	678
Tussis catarrhalis	I.	635
convulsiva	II.	607
ferina	II.	607
strangulatoria	II.	607
suffocans	II.	607
Tympanites	II.	400
Typhomania	I.	204
Typhus	I.	198
abdominalis	I.	108
americanus	I.	166
anthracicus	I.	518
bubonicus	I.	518
contagiosus, europaeus, exanthematicus	I.	198
icterodes, americae	I.	166
mitior	I.	110
sporadicus	I.	120

U.

	Band.	Seite
Unvermögen den Harn zu halten	II.	100
Uredo	II.	138
Urethrorrhagia	I.	716
Urinblase, siehe Harnblase.		

	Band.	Seite
Urinae incontinentia	II.	100
suppressio, Retentio	II.	94
Urocystitis	I.	532
Urorrhoea	II.	54
Urschlechten	I.	259
Urticaria und ihre Arten	II.	138
Uteruskrankheiten, s. Gebärmutter.		

V.

	Band.	Seite
Vaccination	I.	295
Valentis st. morbus	II.	579
Vari	II.	170
Varicellae	I.	312
Variolae und ihre Arten	I.	259
spuriae	I.	312
Variola vaccinica s. modificata	I.	271
volatica	I.	312
Varioloiden	I.	259
Veitstanz	II.	595
Venenentzündung	I.	543
Venerische Krankheiten	II.	416
Venöse Fieber	I.	153
Verflüssigungs-Entzündungen	I.	577
Vergiftungen	II.	679
mit narcotischen Substanzen	II.	688
mit scharfen Giften	II.	692
mit austrocknenden Giften	II.	695
mit septischen Giften	II.	697
Verhärtung	I.	504
Verminatio	II.	504
Verminosus morbus	II.	504
Verruca	II.	228
Verrücktheit, partielle	II.	767
Verschleimung der ersten Wege	II.	35
Verschwärung	I.	338
Verstopfung	II.	88
Vesaniae	II.	751
Vesiculae	II.	14
Vigilium morbosum	I.	634
Vitiligo alba	II.	209
hepatica	II.	227
nigra	II.	209
violacea, cuprea	II.	445
Volvulus	II.	90
Vomica pulmonum	I. 445. II.	468
Vomitus	II.	625
biliosus	II.	32
cruentus	I.	709
marinus	II.	627
Voss	II.	163

W.

	Band.	Seite
Warzen	II.	228
Wasserkopf	II.	338
Wasserkrebs	II.	321
Wasserpocken	I.	314
Wasserscheu	II.	723
Wassersucht und ihre Arten	II.	334
Wechselfieber	I.	73
Weichselzopf	II.	219
Weisses Fieber	II.	307
Weisser Fluss	II.	74
Weisse Gelbsucht	II.	307
Weisse Geschwulst der Wöchnerinnen	I.	570
Werlhofische Blutfleckenkrankheit	II.	321
Windkolik	II.	563
Windpocken	I.	276
Windsucht	II.	399
Würmer	II.	504
Wundfieber	I.	65
Wurmfieber	I.	68

	Band.	Seite
Wurmkolik	II.	563
Wurmkrankheit	II.	504
Wurmsucht	II.	504
Wurstvergiftung	II.	698
Wuth	II.	773
Y.		
Yaws	II.	447
Z.		
Zacken	I.	678

	Band.	Seite
Zahnfieber	I.	64
Zahnschmerz	II.	538
Zehrfieber	I.	190
Zellgewebsverhärtung	I.	619
Ziegenpeter	I.	397
Zona	II.	156
Zoster	II.	156
Zungenentzündung	I.	404
Zweiwuchs	II.	293
Zwerchfells-Entzündung	I.	454

Inhalt des zweiten Bandes.

Fünfte Krankheitsfamilie.

Die krankhaften Absonderungen.

Seite

Erster Abschnitt. *Von den krankhaften Absonderungen im Allgemeinen* 1

Zweiter Abschnitt. *Von den einzelnen krankhaften Absonderungen* 12

Erste Ordnung der krankhaften Absonderungen.

Die vermehrten und die der Art nach veränderten Absonderungen 12

Das krankhafte Schwizen 12

Der Speichelfluss 16

Der Milchfluss 21

Die qualitativ veränderte Milchabsonderung 26

Der saure Magensaft 27

Die krankhaft vermehrte Gallenabsonderung 32

Die Verschleimung der ersten Wege 35

Der wässerige Durchfall 38

Der jauchige und der eiterige Bauchfluss 41

Die Milchruhr 42

Die Magenruhr 44

Die Ruhr 47

Die Harnruhr 54

Der Samenfluss 61

Der Tripper 66

Der weisse Fluss 74

Zweite Ordnung der krankhaften Absonderungen.

Seite

Verminderte und unterdrückte Absonderungen 79

Die verminderte Hautausdünstung 79

Die verminderte und die unterdrückte Milchabsonderung . . 80

Die verminderte Gallenabsonderung und die gehemmte Ablagerung der Galle in die Gedärme 83

Die verminderte Absonderung der Darmsäfte und des Saftes der Bauchspeicheldrüse 85

Die verminderte Absonderung des Harnes 86

Anhang zu den krankhaften Ausscheidungen.

Die Hartleibigkeit und die Verstopfung 88

Die Harnverhaltung 94

Der unwillkürliche Harnabgang 100

Der Mangel der monatlichen Reinigung 103

Sechste Krankheitsfamilie.

Die Hautausschläge.

Erster Abschnitt. *Von den Hautausschlägen im Allgemeinen* . 108

Zweiter Abschnitt. *Von den einzelnen Ausschlagsarten* . 133

Erste Ordnung der Hautausschläge.

Die specifischen fieberhaften Hautausschläge 133

Zweite Ordnung der Hautausschläge.

Die symptomatischen Ausschläge 134

Erste Gruppe. *Die flüchtigen symptomatischen Hautausschläge* 134

Die Hautröthe (Erythema) 134

Das Röschen (Roseola) 136

Die Nesselsucht (Urticaria) 138

Die Hizblätterchen (Strophulus) 141

Die Schwind flechte (Lichen) 143

Seite

Die Petechien und grössern Ecchymosen (Petechiae) 145
Der Friesel (Miliaria) 148
Die Hizbläschen (Hidroa und Eczema) 151
Die Eiterblase (Ecthyma) 153
Die Schmuzrufe (Rhypia) 155
Der Gürtel (Zona) 156
Der Blasenausschlag (Pemphigus) 159
Das Blutschwär und der Karfunkel (Furunculus et Carbunculus) 162
Die Schwämmchen (Aphthae) 163
Der Rachencroup (Diphthérite) 166

Zweite Gruppe. *Die symptomatischen Ausschläge* . . . 170

Die festwurzelnden symptomatischen Ausschläge 170

Die Finnen (Vari) 170
Die Juckknötchen (Prurigo) 174
Die Hautkleie (Pityriasis) 176
Der Leibgrind (Impetigo) 177
Die Flechten (Herpes) 183
Der Kopfgrind (Tinea) 193

Dritte Ordnung der Hautausschläge.

Die specifischen fieberlosen Ausschläge 200

Die Kräze (Scabies) 200
Der Aussaz (Lepra) 208
Der Weichselzopf (Plica polonica) 219
Die Beerschwämme (Thymiosis) 224

Vierte Ordnung der Hautausschläge.

Die unverändert bleibenden ausschlagsartigen Hautfehler . . 225

Die Sommersprossen (Ephelis) 226
Der Leberfleck (Chloasma hepaticum) 227
Die Warzen (Verrucae) 228
Die Mollusken (Mollusca) 228
Die Keloide . 229
Das Hauthorn (Dermoceras) 230
Der Fischschuppenausschlag (Ichthyosis) 231
Das Muttermaal (Naevus maternus) 233
Das Ausgehen der Haare (Madesis) 235

Siebente Krankheitsfamilie.

Die Cachexien und die örtlichen fehlerhaften Bildungsprozesse.

Seite

Erster Abschnitt. *Von den krankhaften Bildungsprozessen im Allgemeinen* 238

Zweiter Abschnitt. *Von den einzelnen Arten der Bildungskrankheiten* 257

Erste Ordnung der Bildungskrankheiten.

Die krankhaft vermehrten Bildungsprozesse 257

Die Substanzvermehrung des Herzens 257
Vergrösserung der Brustdrüse 262
Die Substanzvermehrung der Leber 264
Die Substanzvermehrung der Milz 266

Zweite Ordnung der Bildungskrankheiten.

Krankhaft verminderte Bildungsprozesse 267

Die Darrsucht der Kinder 267
Die Nervenschwindsucht 272
Die Rückendarre 275
Die Darrsucht der Greise 279

Dritte Ordnung der Bildungskrankheiten.

Krankhafte Umwandlungen der flüssigen und festen Theile 283

Erste Gruppe. *Die allgemeinen Mischungsausartungen* . 283

Die Scropheln . 283
Die englische Krankheit 295
Die Gelbsucht . 300
Die Bleichsucht 307
Die Blausucht . 314
Der Scorbut . 317
Die Fettsucht . 329
Die Wassersucht 334
Die Windsucht . 399
Die Lustseuche 415
Die Syphiloiden 444

Seite

Zweite Gruppe. *Die Erweichung der einzelnen Gewebe* . 452

Die Gehirnerweichung 452

Die Magenerweichung 455

Dritte Gruppe. *Die Erhärtung einzelner Gewebe* . . . 462

Vierte Gruppe. *Die Afterbildungen* 463

Die Tuberkelbildung 463

Die Lungenschwindsucht 464

Die Kehlkopf- und Luftröhrenschwindsucht 483

Die Bildung des Melanosengewebes 486

Die krebshafte Verhärtung und der Krebs 487

Der Marktschwamm 498

Fünfte Gruppe. *Die Bildung parasitischer Thiere* . . . 504

Die Wurmkrankheit 504

Die Läusesucht 518

Achte Krankheitsfamilie.

Die Nervenkrankheiten.

Erster Abschnitt. *Von den Nervenkrankheiten im Allgemeinen* 519

Zweiter Abschnitt. *Von den einzelnen Arten der Nervenkrankheiten* 534

Erste Ordnung der Nervenkrankheiten.

Nervenkrankheiten mit Aeusserung erhöhter Nerventhätigkeit . 534

Erste Gruppe. *Die krankhaften Empfindungen* 534

Die Schmerzkrankheiten 534

Das Nervenkopfweh 536

Das Zahnweh 538

Der Gesichtsschmerz 541

Das nervöse Hüftweh 544

Der Brustnervenschmerz 546

Das Magenweh 550

Das Bauchweh 561

Seite

Der übermässige Geschlechtstrieb 565
Die Hypochondrie 567
Die Hysterie 570

Zweite Gruppe. *Die Krämpfe* 579

Die Fallsucht 579
Die eigenthümlichen Convulsionen der Gebärenden 592
Der Veitstanz 595
Der Brustkrampf 598
Der Keuchhusten 607
Das nervöse Herzklopfen 622
Der Schluchzen 624
Das Erbrechen 625
Der Starrkrampf 629

Dritte Gruppe. *Vom Nervensystem ausgehende krankhafte Erregung der geistigen Thätigkeit* 634

Die Schlaflosigkeit 634
Das Schlafwandeln 636
Der Alp 638
Der Säuferwahnsinn 639

Zweite Ordnung der Nervenkrankheiten.

Nervenkrankheiten mit verminderter Nerventhätigkeit 642

Der Schlagfluss 642
Die Lähmung 658
Die Starrsucht 664
Die Ohnmacht und der Scheintod 667

Anhang zu den Nervenkrankheiten.

Zusammengesezte Krankheiten mit vorwaltender Nervenaffection 679

Die durch Vergiftung entstandenen Krankheiten 679
Vergiftungen durch narkotische Substanzen 688
Vergiftungen durch scharfe Gifte 692
Vergiftungen durch austrocknende Gifte 695
Vergiftungen durch septische Gifte 697
Die Kriebelkrankheit 700
Die Cholera 702
Der Milzbrand der Menschen 720
Die Hundswuth 725

Neunte Krankheitsfamilie.

Die Seelenkrankheiten.

Seite

Erstes Hauptstück. *Von den Seelenkrankheiten im Allgemeinen* 732

Zweites Hauptstück. *Von den einzelnen Arten der Seelenkrankheiten* 762

Erste Gruppe. *Die Geisteskrankheiten* 762

Der Blödsinn 762

Die allgemeine Verwirrtheit 765

Die partielle Verrücktheit 767

Zweite Gruppe. *Die Gemüthskrankheiten* 770

Die Schwermuth 770

Die Wuth 773

Nachtrag zum Rachencroup 777

Receptformeln 785

Alphabetisches Sachregister von beiden Bänden 799

Neunte Krankheitsfamilie.

Die Seelenkrankheiten.

[illegible]rstes Hauptstück. Von den Seelenkrankheiten im Allg[illegible]
[illegible]einen

[illegible]weites Hauptstück. Von den einzelnen Arten der Seelen[illegible]
[illegible]rankheiten

[illegible]rste Gruppe. Die Geistesschwächen
[illegible]er Blödsinn
[illegible]e allgemeine Verrücktheit
[illegible]e partielle Verrücktheit

Zweite Gruppe. Die Gemüthskrankheiten
[illegible]ielancholie
[illegible]ie Wuth
[illegible]

Anhang zur Nerventrenung[illegible]

[illegible]

BSB Bayerische StaatsBibliothek

MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Baumgärtner, Karl Heinrich,

Dualistisches System der Medicin oder Lehre von den Gegensätzen ... in den Kräften im lebenden thierischen Körper

Bd.: 2,2. Handbuch der speciellen Krankheits- und Heilungslehre. - Bd. 2

Stuttgart u.a. 1837

Path. 96 e-2,2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10470636-1